

الخطة الاجرائية للاعداد لامتحان بيزا

الهدف العام المنشود تحقيقه بنهاية هذه الخطة:- اعداد الطلبة للمشاركة في اختبار بيزا للرياضيات ٢٠١٨ لطلبة الصف العاشر							
الامكانيات اللازمة و مصادرها	الوقت و التوقيت			ادلة و مؤشرات النجاح	مسئولية التنفيذ	الاستراتيجيات (انشطة لتحقيق الاهداف الاجرائية)	الاهداف الاجرائية
	الى	من	المدة				
<ul style="list-style-type: none"> * الاذاعة المدرسية * شبكة الانترنت * الدليل الارشادي * نماذج الامتحان * المشرفين المتخصصين 	موعد الاختبار المقرر في شهر ٢	بداية الفصل الدراسي الثاني	شهر ٢، ٤، ٣	نسبة اهتمام الطلبة في الاستفسار عن الامتحان حضور اولياء الامور واستفسارهم عن الامتحان ودوره نسبة اجتياز الطلبة للامتحان وحصولهم على علامات مرتفعة تقليل نقاط الضعف في بعض المفاهيم عند الطلبة	مدير المدرسة ومعلم الرياضيات مدير المدرسة ومعلم الرياضيات معلم الرياضيات معلم الرياضيات معلم الرياضيات	تقديم تعريف الاختبارات الدولية للطلبة في حصص الرياضيات .. وفي الطابور الصباحي .. اطلاع اولياء الامور على الهدف من الامتحان وتحفيز ابناءهم للاستعداد والمشاركة له من خلال لقاء عرض نماذج لامتحانات التمس امام الطلبة ،،، ومشاركتهم في حلها اخضاع الطلبة لامتحانات تجريبية تحاكي امتحانات بيزا بواجبات بيتية تحفيز الطلبة من خلال الجوائز للتدرب على الامتحان تعزيز نقاط قوة الطلبة في المفاهيم التي سيتم تطبيق الامتحان عليهم ... معالجة نقاط الضعف في مفاهيم رياضية التي لدى الطلبة	١- تعريف الطلبة واولياء الامور بالامتحان ٢- تدريب الطلبة على نماذج لامتحان بيزا ٣- الوقوف على نقاط ضعف الطلبة وتصحيحها للطلبة

الخطة العلاجية

الصف : العاشر

التغذية الراجعة	التقويم	الزمن	الاجراءات العلاجية	الأهداف والنتائج التعليمية	جانب الضعف المحدد	الفئة المستهدفة
	ملاحظة حلول الطلبة		تنفيذ ورقة عمل/١	• يجد الطالب ناتج جمع عددين صحيحين أو طرحهما.	جمع الأعداد الصحيحة وطرحها	
	ملاحظة حلول الطلبة		تنفيذ ورقة عمل/٢	• يجد الطالب القيمة المطلقة لعدد حقيقي	القيمة المطلقة	
	ملاحظة حلول الطلبة		تنفيذ ورقة عمل/٣	• يجد الطالب ناتج ضرب عددين صحيحين أو قسمتهما.	ضرب الأعداد الصحيحة وقسمتها	
	ملاحظة حلول الطلبة		تنفيذ ورقة عمل/٤	• يجد الطالب ناتج ضرب كسر عشري في الأعداد ١٠، ١٠٠، ١٠٠٠، أو قسمتها.	ضرب كسر عشري في قوى العدد ١٠ وقسمتها	
	ملاحظة حلول الطلبة		تنفيذ ورقة عمل/٥	• يجد الطالب ناتج قسمة عدد صحيح على كسر عشري.	ضرب وقسمة الكسور العشرية	
	ملاحظة حلول الطلبة		تنفيذ ورقة عمل/٦	• يجد الطالب ناتج ضرب حد جبري في مقدار جبري من حدين أو ثلاثة حدود. • يجد ناتج الرفع للأس (٢) لتعبير جبري مكون من حدين.	ضرب المقادير الجبرية	

الصف

التغذية الراجعة	التقويم	الزمن	الاجراءات العلاجية	الأهداف والنتائج التعليمية	جانب الضعف المحدد	الفئة المستهدفة
	ملاحظة حلول الطلبة		تنفيذ ورقة عمل/٧	<ul style="list-style-type: none"> • يميّز الطالب الإقتران من غيره من بين عدّة علاقات • يحدد الطالب مجال ومدى الإقتران المكتوب على صورة أزواج مرتبة. 	الإقتران	
	ملاحظة حلول الطلبة		تنفيذ ورقة عمل/٨	<ul style="list-style-type: none"> • يحل الطالب معادلة خطية بمتغير واحد. 	المعادلة الخطية بمتغير واحد	
	ملاحظة حلول الطلبة		تنفيذ ورقة عمل/٩	<ul style="list-style-type: none"> • يميّز الطالب الإقتران الخطي من غيره من الإقترانات. • يمثل الطالب الإقتران الخطي بيانياً. 	الإقتران الخطي	
	ملاحظة حلول الطلبة		تنفيذ ورقة عمل/١٠	<ul style="list-style-type: none"> • يحلل الطالب العبارة التربيعية ثلاثية الحدود 	تحليل ثلاثي العبارة التربيعية (ثلاثي الحدود)	
	ملاحظة حلول الطلبة		تنفيذ ورقة عمل/١١	<ul style="list-style-type: none"> • يحل الطالب معادلة تربيعية بمتغير واحد بالتحليل. 	المعادلة التربيعية بمتغير واحد	
	ملاحظة حلول الطلبة		تنفيذ ورقة عمل/١٢	<ul style="list-style-type: none"> • يميّز الإقتران التربيعي من غيره • يمثل الإقتران التربيعي بيانياً 	الإقتران التربيعي	

الخطة العلاجية

:

التغذية الراجعة	التقويم	الزمن	الاجراءات العلاجية	الأهداف والنتائج التعليمية	جانب الضعف المحدد	الفئة المستهدفة
	ملاحظة حلول الطلبة		تنفيذ ورقة عمل/١٣	<ul style="list-style-type: none"> • يجد الطالب مجموعة حل المتباينة الخطية يمتغير واحد. 	المتباينة الخطية	
	ملاحظة حلول الطلبة		تنفيذ ورقة عمل/١٤	<ul style="list-style-type: none"> • يطبق الطالب نظرية فيثاغورس لاجاد طول ضلع مجهول في مثلث قائم الزاوية. 	نظرية فيثاغورس	
	ملاحظة حلول الطلبة		تنفيذ ورقة عمل/١٥	<ul style="list-style-type: none"> • يحدد الطالب حالة تطابق مثلثين معلومين. 	تطابق المثلثات	
	ملاحظة حلول الطلبة		تنفيذ ورقة عمل/١٦	<ul style="list-style-type: none"> • يعرف القطر و نصف القطر والوتر لدائرة ويعينها. 	الدائرة	
	ملاحظة حلول الطلبة		تنفيذ ورقة عمل/١٧	<ul style="list-style-type: none"> • يجد الطالب قياس زاوية مجهولة في مثلث إذا علمت فيه زاويتين. 	مجموع زوايا المثلث	

الخطة العلاجية

:

التغذية الراجعة	التقويم	الزمن	الاجراءات العلاجية	الأهداف والنتائج التعليمية	جانب الضعف المحدد	الفئة المستهدفة
	ملاحظة حلول الطلبة		تنفيذ ورقة عمل/١٨	<ul style="list-style-type: none"> يصف المثلث المتساوي الساقين ويجد قياس زوايا مجهوله فيه ضمن معطيات كافية 	المثلث المتساوي الساقين	
	ملاحظة حلول الطلبة		تنفيذ ورقة عمل/١٩	<ul style="list-style-type: none"> يجد قياس زاوية مجهولة في شكل رباعي ضمن معلومات كافية. 	مجموع زوايا الشكل الرباعي	
	ملاحظة حلول الطلبة		تنفيذ ورقة عمل/٢٠	<ul style="list-style-type: none"> يحل الطالب نظام مكون من معادلتين خطيتين بمتغيرين. 	حل معاليتين خطيتين بمتغيرين	
	ملاحظة حلول الطلبة		تنفيذ ورقة عمل/٢١	<ul style="list-style-type: none"> يجد الطالب قيمة جا ، جتا ، ظا زاوية حادة في مثلث قائم الزاوية. 	النسب المثلثية	
	ملاحظة حلول الطلبة		تنفيذ ورقة عمل/٢٢	<ul style="list-style-type: none"> يجد الطالب النسب المثلثية للزاويا ٣٠ ، ٤٥ ، ٦٠ يجد طول ضلع مجهول في مثلث قائم الزاوية مستخدماً النسب المثلثية. 	النسب المثلثية للزاويا الخاصة الحادة	

الخطة العلاجية

:

التغذية الراجعة	التقويم	الزمن	الاجراءات العلاجية	الأهداف والنتائج التعليمية	جانب الضعف المحدد	الفئة المستهدفة
	ملاحظة حلول الطلبة		تنفيذ ورقة عمل/٢٣	<ul style="list-style-type: none"> • يجد الطالب صورة نقطة في المستوى بعد انعكاسها في محور السينات. • يجد الطالب صورة نقطة في المستوى بعد انعكاسها في محور الصادات 	الانعكاس	
	ملاحظة حلول الطلبة		تنفيذ ورقة عمل/٢٤	<ul style="list-style-type: none"> • يجد الطالب مساحة مثلث علم ارتفاعه وطول قاعدته. 	مساحة المثلث	
	ملاحظة حلول الطلبة		تنفيذ ورقة عمل/٢٥	<ul style="list-style-type: none"> • يحدد الطالب زوايا الارتفاع والانخفاض 	زوايا الارتفاع والانخفاض	
	ملاحظة حلول الطلبة		تنفيذ ورقة عمل/٢٦	<ul style="list-style-type: none"> • يجد الطالب ميل الخط المستقيم إذا علمت نقطتين عليه • يجد الطالب ميل الخط المستقيم إذا علمت معادلته. 	ميل الخط المستقيم	
	ملاحظة حلول الطلبة		تنفيذ ورقة عمل/٢٧	<ul style="list-style-type: none"> • يجد معادلة خط مستقيم علم ميله ونقطة عليه. 	معادلة الخط المستقيم	

الخطة العلاجية

:

التغذية الراجعة	التقويم	الزمن	الاجراءات العلاجية	الأهداف والنتائج التعليمية	جانب الضعف المحدد	الفئة المستهدفة
	ملاحظة حلول الطلبة		تنفيذ ورقة عمل/٢٨	<ul style="list-style-type: none"> • يجد الطالب المسافة بين نقطتين عُلّمت احدائياتهما. 	المسافة بين نقطتين	
	ملاحظة حلول الطلبة			<ul style="list-style-type: none"> • يجد الطالب احدائيا نقطة منتصف قطعة مستقيمة. 	احدائيا نقطة المنتصف	
	ملاحظة حلول الطلبة		تنفيذ ورقة عمل/٢٩	<ul style="list-style-type: none"> • يصف الطالب متوازي الأضلاع وشبه المنحرف ويميّزهما عن غيرهما من الأشكال الرباعية. 	شبه المنحرف و متوازي الأضلاع	
	ملاحظة حلول الطلبة		تنفيذ ورقة عمل/٣٠	<ul style="list-style-type: none"> • يحسب الطالب قيمة الوسط الحسابي للمشاهدات المفردة. • يجد الطالب الوسيط للمشاهدات المفردة. • يجد الطالب المنوال للمشاهدات المفردة 	مقاييس النزعة المركزية	
	ملاحظة حلول الطلبة		تنفيذ ورقة عمل/٣١	<ul style="list-style-type: none"> • يحسب الطالب الوسط الحسابي في جدول تكراري ذي فئات 	الوسط الحسابي للجدول التكرارية ذي الفئات	

الخططة العلاجية

التغذية الراجعة	التقويم	الزمن	الاجراءات العلاجية	الأهداف والنتائج التعليمية	جانب الضعف المحدد	الفئة المستهدفة
	ملاحظة حلول الطلبة		تنفيذ ورقة عمل/٣٢	<ul style="list-style-type: none"> • يحسب الطالب مقاييس النزعة المركزية بعد التعديل الخطي عليها. 	اثر تعديل البيانات على مقاييس النزعة المركزية	
	ملاحظة حلول الطلبة		تنفيذ ورقة عمل/٣٣	<ul style="list-style-type: none"> • يحدد الفضاء العيني للتجارب العشوائية 	الفضاء العيني	
	ملاحظة حلول الطلبة		تنفيذ ورقة عمل/٣٤	<ul style="list-style-type: none"> • يكتب الحادث بذكر عناصره • يتعرف انواع الحوادث ويعطي أمثلة عليها. 	مفهوم الحادث و انواع الحوادث	
	ملاحظة حلول الطلبة		تنفيذ ورقة عمل/٣٥	<ul style="list-style-type: none"> • يجد الطالب احتمال حادث معلوم. 	احتمال الحادث	
	ملاحظة حلول الطلبة		تنفيذ ورقة عمل/٣٦	<ul style="list-style-type: none"> • يجري عمليات المتممة و التقاطع والاتحاد والطرح على الحوادث. 	العمليات على الحوادث	

الخططة العلاجية

:

التغذية الراجعة	التقويم	الزمن	الاجراءات العلاجية	الأهداف والنتائج التعليمية	جانب الضعف المحدد	الفئة المستهدفة
	ملاحظة حلول الطلبة		تنفيذ ورقة عمل/٣٧	• يتعرف الطالب إلى الحوادث المنفصلة.	الحادثين المنفصلين	
	ملاحظة حلول الطلبة		تنفيذ ورقة عمل/٣٨	• يكتب الكسر العشري المكافئ لنسبة مئوية معلومة.	النسبة المئوية	

ورقة عمل ١/١

جمع الأعداد الصحيحة وطرحها

تذكير: (١) لجمع عددين لهما الإشارة نفسها نجمع بدون اشارات ونضع الإشارة الموجوده.

$$\text{مثال: } ١٣ - = ٣ - + ٨ -$$

(٢) لجمع عددين مختلفين في الإشارة نأخذ الفرق بينهما ونضع إشارة الأكبر

$$\text{مثال: } ٧ = ٢ - + ٩ \quad , \quad ٥ - = ٣ + ٧ -$$

$$٨ - = ١٥ - + ٧ \quad , \quad ١ = ٩ + ٨ -$$

(٣) لأي عددين أ، ب يكون أ- ب = ب + أ-

$$\text{مثال: } ٢٤ = ١٥ + ٩ = ١٥ - - ٩ \quad , \quad ١ - = ٩ - + ٨ = ٩ - ٨$$

• جد ناتج ما يلي :

$$(٢) = ١٥ + ١٢ -$$

$$(٤) = ١٦ - ١٢$$

$$(٦) = ١٦ - + ١٥$$

$$(٨) = ٣ - - ١٥$$

$$(١٠) = ٩٠ + ٥٠ -$$

$$(١٢) = ١٥ - + ١٥$$

$$(١٤) = ٩ - - ٩ -$$

$$(١٦) = ٨ - + ١٩ -$$

$$(١٨) = ٤٩ - ٣٢$$

$$(٢٠) = ١٨ - - ١٥$$

$$(٢٢) = ٨٠ + ٧٦ -$$

$$(٢٤) = ٦ - + ١٨ -$$

$$(٢٦) = ٦ + ٣٤ -$$

$$(١) = ٣ + ٨ -$$

$$(٣) = ٣ - ٨ -$$

$$(٥) = ٣٤ - ٢٤$$

$$(٧) = ٣ + ٢٣ -$$

$$(٩) = ١٦ - - ٢٣ -$$

$$(١١) = ٧٠ - ٩٠$$

$$(١٣) = ١٠ + ٣٥ -$$

$$(١٥) = ١٥ - + ١٧$$

$$(١٧) = ٣ + ٣ -$$

$$(١٩) = ٦ - ٦ -$$

$$(٢١) = ٨ - - ٢٤ -$$

$$(٢٣) = ١٥ - ٠$$

$$(٢٥) = ٦ - ٣٤ -$$

ورقة عمل/٢

القيمة المطلقة

تذكير: (١) تُعرف القيمة المطلقة للعدد على أنها بعد ذلك العدد عن الصفر على خط الأعداد.

(٢) القيمة المطلقة تكون دائما اما موجبة أو صفر ولكن لا يمكن ان تكون سالبة.

مثال: $7 = |7|$ ، $7 = |-7|$ ، $0 = |0|$ ، $0 = |صفر|$

• جد ناتج ما يلي :

$$(١) = |٨ -|$$

$$(٣) = |صفر|$$

$$(٥) = |٦.٥|$$

$$(٧) = |-٣|$$

$$(٩) = \left| \frac{١}{٢} - \right|$$

$$(١١) = |١ + ٢ -|$$

$$(١٣) = |١٨ - ١٢|$$

$$(١٥) = |١٥ - + ١٧|$$

$$(١٧) = |٣ + ٣ -|$$

$$(١٩) = |٦ -| - |٦ -|$$

$$(٢١) = |٨ -| - |٢٤ -|$$

$$(٢٣) = |١٥ - ٠|$$

$$(٢٥) = |٦ + ٣٤ -|$$

$$(٢٧) = |\sqrt{٣} -|$$

$$(٢) = |١٥|$$

$$(٤) = |-١٦|$$

$$(٦) = |-٨.٢|$$

$$(٨) = |-٣ -|$$

$$(١٠) = \left| \frac{٣}{٧} - \right|$$

$$(١٢) = ١ + |-٢ -|$$

$$(١٤) = |٩ - - ٩ -|$$

$$(١٦) = |٥ - + ١٧ -|$$

$$(١٨) = |-٢ -| + |٣٢ -|$$

$$(٢٠) = |١٨ -| - ١٥$$

$$(٢٢) = |٨٠ + ٧٦ -|$$

$$(٢٤) = |٦ - ١٨ -|$$

$$(٢٦) = |٧ + ٣ -|$$

$$(٢٨) = |٤ - ٨ -|$$

• ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة ، قيمة $|-٢ -| + |٢٠ -|$

(د) ١٨-

(ج) ١٨

(ب) ٢٢

(أ) ٢٢-

مدرسة :

الاسم :

الصف العاشر ()

التاريخ: / / ٢٠

ورقة عمل /٣

ضرب الأعداد الصحيحة وقسمتها

تذكير: (١) عند ضرب أو قسمة عددين لهما نفس الإشارة فإن الناتج موجب.

مثال: $١٨ = ٣ \times ٦$ ، $١٨ = ٣ \times ٦$ ، $٢ = ٣ \div ٦$ ، $٢ = ٣ \div ٦$ ،

(٢) عند ضرب أو قسمة عددين مختلفين في الإشارة فإن الناتج سالب.

مثال: $١٨ = ٣ \times ٦$ ، $١٨ = ٣ \times ٦$ ، $٢ = ٣ \div ٦$ ، $٢ = ٣ \div ٦$ ،

• جد ناتج ما يلي :

(١) ٢×٤

(٣) ٢×١٠

(٥) ٣×١٥

(٧) ١×٣٦

(٩) ١×١

(١١) $١ \div ٣٥$

(١٣) $٤ \div ٤$

(١٥) $٤ \div ٤$

(١٧) $٧ \div ٣٥$

(١٩) $٨ \div ٨$

(٢١) $٣ \div ٠$

(٢٣) $\frac{٨}{٢}$

(٢٥) $\frac{١٥}{١٥}$

(٢) $٣ \div ١٥$

(٤) $٤ \div ١٦$

(٦) $٥٠ \div ١٠٠$

(٨) $٥ \div ٢٥$

(١٠) $٣ \div ١٢٥$

(١٢) ٢×١٨

(١٤) ٤×٤

(١٦) ٢×٧٢

(١٨) ١×٣٦

(٢٠) ١٢٥×٠

(٢٢) ١٢×١٢

(٢٤) $\frac{١٠٠}{٢٠}$

(٢٦) $\frac{١٣}{١}$

• ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة :

(١) قيمة ٢٤×٢

(أ) ٢٢

(ب) ١٢

(ج) ٤٨

(د) ٤٨

(٢) قيمة $٣ \div ٩$

(أ) ٣

(ب) ٦

(ج) ٣

(د) ١٢

ورقة عمل/٤

ضرب وقسمة كسر عشري في قوى العدد (١٠)

تذكير: (١) عند ضرب كسر عشري في قوى العدد (١٠) نحرك الفاصلة من اليسار إلى اليمين بعدد الأصفار،

مثال: $٢١,٢٣ = ١٠ \times ٢,١٣٤$ ، $٢١٣,٤ = ١٠٠ \times ٢,١٣٤$ ، $٢١٣٤٠ = ١٠٠٠٠ \times ٢,١٣٤$

(٢) عند قسمة كسر عشري على قوى العدد (١٠) نحرك الفاصلة من اليمين إلى اليسار بعدد الأصفار،

مثال: $٢١,٢٣ = ١٠ \div ٢١٣,٤$ ، $٢,١٣٤ = ١٠٠ \div ٢١٣,٤$ ، $٠,٢١٣٤ = ١٠٠٠٠ \div ٢١٣,٤$

• جد ناتج ما يلي :

$= ١٠ \div ٤٥,٨٩$ (٢)	$= ١٠ \times ٤٥,٨٩$ (١)
$= ١٠٠ \div ٤٥,٨٩$ (٤)	$= ١٠٠ \times ٤٥,٨٩$ (٣)
$= ١٠٠٠ \div ٤٥,٨٩$ (٦)	$= ١٠٠٠ \times ٤٥,٨٩$ (٥)
$= ١٠٠٠٠ \div ٤٥,٨٩$ (٨)	$١٠٠٠٠ \times ٤٥,٨٩$ (٧)
$= ١٠٠٠٠ \div ١,٢٣$ (١٠)	$١٠٠٠٠ \times ١,٢٣$ (٩)
$= ١٠ \times ٠,٢٣$ (١٢)	$= ١٠ \div ٠,٢٣$ (١١)
$= ١٠٠ \times ٠,٢٣$ (١٤)	$= ١٠٠ \div ٠,٢٣$ (١٣)
$= ١٠ \times ٢٥,١$ (١٦)	$= ١٠ \div ٢٥$ (١٥)
$= ١٠٠٠٠ \times ٠,٠٤$ (١٨)	$= ١٠٠ \div ٣$ (١٧)
$= ١٠٠٠٠ \times ١٢,٣٦٥$ (٢٠)	$= ١٠ \div ٥١٣,١١$ (١٩)
$= ١٠٠٠٠٠ \times ١,٤٤$ (٢٢)	$= ١٠٠ \div ١٢,٣٦٥$ (٢١)
$= \frac{٠٠١,٧٧}{١٠}$ (٢٤)	$= \frac{٤,٩}{١٠٠}$ (٢٣)
$= \frac{٢١٢١}{١٠٠٠٠}$ (٢٦)	$= \frac{١,٠}{١٠٠}$ (٢٥)

• ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة :

(١) قيمة $١٠٠ \times ١,٢٢١$

(أ) ١٢,٢١ (ب) ١٢٢,١ (ج) ٠,١٢٢١ (د) ٠,١٢٢١

(٢) قيمة $١٠٠ \div ٣١,٠٥٢$

(أ) ٠,٣١٠٥٢ (ب) ٣١٠,٥٢ (ج) ٣١,٥٢ (د) ٣,١٠٥٢

ورقة عمل/٥

ضرب وقسمة الكسور العشرية

تذكير: (١) لإجراء عملية الضرب على الكسور العشرية نضرب الأعداد بدون الفاصلة العشرية ثم نضع الفاصلة بحيث ان الناتج يحتوي على عدد من المنازل العشرية مساوياً لمجموع عدد المنازل العشرية في المضروب و المضروب فيه

$$\text{مثال: } ١,٥ \times ٢,٣$$

- نضرب الأعداد بعضها ببعض كأنها أعداد صحيحة ،

$$٣٤٥ = ٢٣ \times ١٥$$

- نبدأ من يمين حاصل الضرب  ونفصل منازل عشرية بقدر مجموع المنازل الموجودة في المضروب

والمضروب فيه ثم نضع الفاصلة العشرية  أي أن $٣,٤٥ = ٢,٣ \times ١,٥$

(٢) لإجراء عملية القسمة على الكسور العشرية نضرب المقسوم والمقسوم عليه بقوى العدد ١٠ للتخلص من الفواصل العشرية في البسط والمقام ثم نجري عملية القسمة،

• جد ناتج ما يلي :

$$(١) = ١,٢ \times ١,٣$$

$$(٣) = ٠,٢ \times ٤٥,٨$$

$$(٥) = ٠,٢ \times ١,٠٢$$

$$(٧) = ١١,٣ \times ١,٢$$

$$(٩) = ٠,٤ \times ٢٥$$

$$(١١) = ٠,٠١ \div ١,٠٢٣$$

$$(١٣) = ٠,٠٩ \div ١٨$$

$$(١٥) = ٠,٥ \div ٢٥$$

$$(١٧) = ٠,٣ \div ٧٢,٣$$

$$(١٩) = ٠,١١ \div ١٢,١$$

$$(٢١) = ٠,٦٤ \div ١,٢٨$$

$$(٢٣) = ٠,٧ \div ١٣٥$$

$$(٢٥) = ٠,٧ \div ١,٣٥$$

$$(٢) = ٠,٢ \div ٤,٨$$

$$(٤) = ١,٢ \div ٢٢,٤$$

$$(٦) = ٠,٠٠٥ \div ٠,٠٥$$

$$(٨) = ٠,٣ \div ٢٤$$

$$(١٠) = ٣,٢ \div ٦,٤$$

$$(١٢) = ٢,٣ \times ٠,٢٣$$

$$(١٤) = ٠,٨ \times ٠,٠٥$$

$$(١٦) = ٠,٤ \times ٢٥,٩$$

$$(١٨) = ١,٣ \times ٠,٠٤$$

$$(٢٠) = ٠,٢٢ \times ١٢,٣٦٥$$

$$(٢٢) = ٣ \times ١,٤٤$$

$$(٢٤) = ٠,٧ \times ١٣٥$$

$$(٢٦) = ٠,٧ \times ١٣,٥$$

ورقة عمل ٦/

ضرب المقادير الجبرية

تذكير: عند ضرب حد جبري في مقدار جبري يتم ضرب الحد الجبري بجميع حدود المقدار الجبري.

• **تدريب :**

ضع الحد المناسب في الفراغ لتصبح العبارة صحيحة.

$$\square + \square = ٥ص \times \square + س \times \square = (٥ص + س)٢$$
 (١)

$$\square - \square = \square \times ٣ص - \square \times ٢ص = (٣ص - ٢ص)٢$$
 (٢)

• **تمارين :** جد ناتج الضرب فيما يلي :

$$(١) = (٥ص + س)٤$$

$$(٢) = (٣ص - ٥ص)٦$$

$$(٣) = (٢س - ٢ص + ٢)١٨$$

$$(٤) = (٢ص + ٣ص)٣$$

$$(٥) = (٣ع - ٢ص - ٤ع)٢$$

$$(٦) = (٣ص - ٢ص + ٣ص)٣$$

$$(٧) = (٣ + ٥ص - ٢س)٧$$

$$(٨) = (٣س - ٦ص - ٧ص)٣$$

تذكير: لفك قوس من حدين مرفوع للأس (٢) نستخدم القاعدة:

$$(الأول \mp الثاني)^٢ = (الأول تربيع \mp ٢ \times الأول \times الثاني + الثاني تربيع)$$

• **تمارين :** جد ناتج التربيع فيما يلي:

$$(١) = (ص + س)٢$$

$$(٢) = (ص - س)٢$$

$$(٣) = (٣ص + ٢س)٢$$

$$(٤) = (٣ص - ٢س)٢$$

$$(٥) = (٣ + ٤س)٢$$

$$(٦) = (٥ - ٦ص)٢$$

$$(٧) = (١ - ٢س)٢$$

$$(٨) = (٨ص - ١٠)٢$$

$$(٩) = (٥ص + ٣ص)٢$$

$$(١٠) = (٦س - ٧ص)٢$$

مدرسة :

الاسم :

الصف العاشر ()

التاريخ: / / ٢٠

ورقة عمل/٧

الاقتران

- تذكير: تُسمى مجموعة كل العناصر الأولى للأزواج المرتبة في العلاقة مجال تلك العلاقة.
- تُسمى مجموعة كل العناصر الثانية للأزواج المرتبة في العلاقة مدى تلك العلاقة.
- الاقتران : هو علاقة تربط كل عنصر في المجال بعنصر واحد فقط في المدى.

• تمرين (١) : جد مجال ومدى كل من العلاقات التالية وبين فيما اذا كانت تمثل اقتراناً.

$$(١) \quad \{ (١, -١), (٢, ٠), (٤, ٦), (٤, -٢), (٣, ٥), (٢, ٤) \} = ١ع$$

$$(٢) \quad \{ (٥, ١), (١, ٥), (٠, ٠), (٤, -٢), (٤, ٢), (٩, ١), (٩, ٣) \} = ٢ع$$

$$(٣) \quad \{ (١٥, ٤), (١, -٢), (٨, ٣), (٣, ٢), (٠, ١) \} = ٣ع$$

$$(٤) \quad \{ (٢, ٥), (٢, ٠), (٢, -٢), (٢, ٢), (٢, ٣) \} = ٤ع$$

$$(٥) \quad \{ (٣, ٢), (٠, ١), (٠, ٠), (٥, ٠), (٢, -٠), (١, -١) \} = ٥ع$$

تمرين (٢) : جد مجال ومدى الاقتران ق = $\{ (٠, -٤), (٠, ٩), (٥\sqrt{\quad}, ٠), (٢, -١, ٣), (١, -١) \}$

تمرين (٣) : هل العلاقة التي تربط كل عدد بمربعه تمثل اقتران؟

تمرين (٤) : اكتب علاقة تمثل اقتراناً.

مدرسة :

الاسم :

الصف العاشر ()

التاريخ: / / ٢٠

ورقة عمل ٨/

المعادلة الخطية

تذكير: • لحل المعادلة الخطية نجعل المتغير وحده في طرف و عدد في الطرف الآخر.

• حل المعادلات الآتية وتأكد من صحة الحل :

$$(١) \quad ١١ = ٨ - س$$

$$(٢) \quad ٣ - = ٨ + س$$

$$(٣) \quad ٥ - = س + ٤$$

$$(٤) \quad ٤ - س = ١٠$$

$$(٥) \quad ٦ = س + ٣ -$$

$$(٦) \quad ٦ - س = ٦$$

$$(٧) \quad ٣ + س = ٧ -$$

$$(٨) \quad ١٢ = س - ٩$$

$$(٩) \quad ١٨ = س٣$$

$$(١٠) \quad ٨ - = س٢$$

$$(١١) \quad ٤ = س \frac{٢}{٣}$$

$$(١٢) \quad ٢ = س \frac{١}{٣} -$$

$$(١٣) \quad ١١ = س٣$$

$$(١٤) \quad ١٢ = س٥ -$$

$$(١٥) \quad ٦ - = س$$

$$(١٦) \quad \frac{٢}{٣} = س -$$

مدرسة :

الاسم :

الصف العاشر ()

التاريخ: / / ٢٠

تابع/ورقة عمل/٨

المعادلة الخطية

تذكير: • لحل المعادلة الخطية نجعل المتغير وحده في طرف و عدد في الطرف الآخر.

• حل المعادلات الآتية وتأكد من صحة الحل :

$$(٢) \quad ٣ - ٢س = \text{صفر}$$

$$(٤) \quad ١٣ = ٥ + س -$$

$$(٦) \quad ٥ - = ١١ + س٤$$

$$(٨) \quad ١ - = س \frac{٣}{٥} - ٨$$

$$(١٠) \quad ٩ = (٥ - س)٣$$

$$(١) \quad ٨ = ٢ + س٥$$

$$(٣) \quad ١٥ = ٧ - س٢$$

$$(٥) \quad ٤ = س٣ - ١٩$$

$$(٧) \quad ٨ = ٣ + س \frac{٢}{٥}$$

$$(٩) \quad ٤ = (١ + س)٢$$

• ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة =

١- قيمة س في التي تحقق المعادلة : $١٢ - ٣س = ٩$ هي :

(أ) ١- (ب) ١ (ج) ٢ (د) ٢-

٢- قيمة س في التي تحقق المعادلة : $٤(١ - س) = ٣٦$ هي :

(أ) ٣ (ب) ٢- (ج) ٢ (د) ٤

مدرسة :

الاسم :

الصف العاشر ()

التاريخ: / / ٢٠

ورقة عمل ٩

الاقتران الخطي

تذكير: • الصورة العامة للاقتران الخطي هي $ق(س) = أس + ب$ حيث أ ، ب أعداد حقيقية.

• ميّز الاقتران الخطي من غيره :

- | | |
|------------------------------------|---|
| (٢) هـ $(س) = ٢ - س$ | (١) ق $(س) = ٢س - ٤$ |
| (٤) ل $(س) = ٠, ٢$ | (٣) م $(س) = س$ |
| (٦) ك $(س) = \frac{١}{٣+س٢}$ | (٥) ن $(س) = \frac{١}{٣} + \frac{٥}{٩}$ |
| (٨) ي $(س) = \sqrt[٣]{٨ - س}$ | (٧) و $(س) = \sqrt{١ - س}$ |
| (١٠) ط $(س) = ٢س^٢ - ٦$ | (٩) ف $(س) = (٢ + س)^٢$ |
| (١٢) ع $(س) = \sqrt[٢]{٠, ٢٣ - س}$ | (١١) د $(س) = -٣س - ١٢$ |

• إذا كان $ق(س) = ٣س - ٦$ جد :

(١) ق (٣)

(٢) ق (٠)

(٣) ق (-١)

(٤) ق (٢)

• إذا كان $ق(س) = ٨ - ٢س$ جد

(١) ق (٠)

(٢) قيمة س التي تجعل ق(س) = صفر

• إذا كان $ق(س) = ٣ + ٢س$ جد

(١) ق (٠)

(٢) قيمة س التي تجعل ق(س) = صفر

تابع/ ورقة عمل/٩

تمثيل الاقتران الخطي

- لتمثيل الاقتران الخطي بيانياً نحدد نقطتين عليه في المستوى الاحداثي ثم نصل بينهما بخط مستقيم بالمسطره.
- ملاحظة : من الأفضل أن تكون النقطتين هما المقطعين السيني والصادي.
- لايجاد المقطع الصادي نعوض $s = \text{صفر}$
- لايجاد المقطع السيني نعوض $q(s) = \text{صفر}$

- تدريب : إذا كان $q(s) = 3s - 3$ أجب عما يلي:

(١) هل الاقتران $q(s)$ اقتران خطي؟


(٢) جد المقطع السيني.

(٣) جد المقطع الصادي.

(٤) اكمل الجدول التالي:

س	ص = $q(s)$	(س ، ص)
صفر		
صفر		

(٥) عيّن النقاط في الجدول السابق في المستوى المجاور ثم صل بينها بخط مستقيم.



- تمارين : مثل الاقترانات الخطية التالية بيانياً.

(١) $q(s) = 4 - s$

(٢) $l(s) = s$

(٣) $h(s) = 6 - 2s$

(٤) $و(s) = 1 + 2s$

(٥) $م(s) = 2s$

(٦) $ط(s) = 2 - 3s$

(٧) $ي(s) = 1 + s$

(٨) $د(s) = 2 - s$

ورقة عمل / ١١

حل المعادلة التربيعية

تذكير: • خطوات حل المعادلة التربيعية بالتحليل :

حل المعادلة $س^٢ + ٥س = ٦$

الخطوة	التطبيق على المثال
(١) الترتيب (بجعل المعادلة على الصورة $أس^٢ + بس + ج = صفر$)	$س^٢ + ٥س - ٦ = صفر$
(٢) تحليل العبارة التربيعية	$(س + ٦)(س - ١) = صفر$
(٣) استخدام التعميم ($أ \times ب = ٠$ فإن $أ = صفر$ أو $ب = صفر$)	$س + ٦ = صفر$ أو $س - ١ = صفر$
(٤) نحل كل معادلة خطية ناتجة لوحدها	$س = -٦$ أو $س = ١$
(٥) نكتب مجموعة الحل	مجموعة الحل = $\{-٦, ١\}$

• حل المعادلات التربيعية التالية على دفترك:

(٢) $س^٢ - ٥س - ٥٠ = صفر$

(٤) $س^٢ + ٥س = ٦$

(٦) $٨س^٢ + ٦س - ٩ = صفر$

(٨) $٥س + ٣س^٢ - ٨ = صفر$

(١٠) $٤س^٢ - ٣ = س$

(١٢) $١٢س^٢ + ٥ = ٣٢$

(١٤) $٩س^٢ - ٦س + ١ = صفر$

(١٦) $٢س^٢ = ٣٥س + ١٠٠$

(١٨) $١٢س = س^٢ - ١٣$

(٢٠) $س^٢ - ١٦ = صفر$

(٢٢) $٢٥ - ٩س^٢ = صفر$

(١) $س^٢ + ١٢س = ٢٠$

(٣) $س^٢ - ١٢س + ٣٥ = صفر$

(٥) $س^٢ - ١٠س + ٢٤ = صفر$

(٧) $ج + ج^٢ = ٣$

(٩) $١٢س^٢ - ٢س = ٢$

(١١) $٣س^٢ + ٨س + ٤ = صفر$

(١٣) $١٣س^٢ - ١٢س - ١ = صفر$

(١٥) $س^٢ = ٢٣س + ١٠٠$

(١٧) $س^٢ + ٢س = ١$

(١٩) $س^٢ - ٤ = صفر$

(٢١) $١٠٠ - ٤س^٢ = صفر$

ورقة عمل / ١٢

الاقتران التربيعي

تذكير: • الصورة العامة للاقتران التربيعي هي $ق(س) = أس^٢ + بس + ج$ ، $أ \neq صفر$
 أ : معامل $س^٢$
 ب : معامل $س$
 ج : الحد الثابت (المطلق)

• ميّز الاقتران التربيعي من غيره و حدد قيم أ ، ب ، ج إذا كان الاقتران تربيعياً:

- | | |
|---|--|
| (١) $ق(س) = ٥س^٢ + ٤س + ٥$ | (٢) $هـ(س) = ٤س^٢ - ٧س - ٢٥$ |
| (٣) $م(س) = ٣س^٢ + ٣س - ١$ | (٤) $ل(س) = ١س^٢ - ٣س + ١$ |
| (٥) $ن(س) = \frac{١}{٢}س^٢ + \frac{٥}{٩}$ | (٦) $ك(س) = \frac{١}{٣}س + \frac{١}{٣}س + ٣$ |
| (٧) $و(س) = \sqrt{٢س^٢ + ٢س - ٢}$ | (٨) $ي(س) = \sqrt[٣]{٨س^٢ - ٣س}$ |
| (٩) $ف(س) = ١س^٢ - ١$ | (١٠) $ط(س) = ٢س^٢ - ٦$ |
| (١١) $د(س) = -٣س^٢ - ١٢س + ١$ | (١٢) $ع(س) = \sqrt{٢٣س - ١٠س^٢} + ١٢$ |
| (١٣) $ر(س) = ٤س^٢ + ٤$ | (١٤) $ح(س) = -٢س + ٣$ |

• إذا كان $ق(س) = ٣س^٢ - ٤س + ١$ جد :

(١) $ق(٣) =$

(٢) $ق(٠) =$

(٣) $ق(-١) =$

(٤) $ق(٢) =$

(٥) $ق(١) =$

• إذا كان $ق(س) = ٨س^٢ - ٢س$ جد :

(١) $ق(٠) =$

(٢) $ق(٢) =$

(٣) $ق(-٣) =$

تابع/ ورقة عمل/ ١٢

تمثيل الاقتران التربيعي

• يسمى منحنى الاقتران التربيعي قطعاً مكافئاً (قطع مكافئ)

• نقطة رأس القطع المكافئ هي $(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac-b^2}{4a})$ ، $(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac-b^2}{4a})$

• يكون القطع المكافئ مفتوح للإعلى $a > 0$ إذا كان معامل s^2 موجب ، ولالإسفل $a < 0$ إذا كان معامل s^2 سالب.

• تدریب : إذا كان $ق(س) = ٢س^٢ - ٤س + ١$ أجب عما يلي:

(١) هل الاقتران $ق(س)$ اقتران تربيعي؟

(٢) جد قيم $أ$ ، $ب$ ، $ج$ (المعاملات).

(٣) جد قيمة $-\frac{b}{2a}$

(٤) جد قيمة $ق(-\frac{b}{2a})$

(٥) كوّن جدولاً بقيم $س$ وجد قيم $ص$ المقابلة ثم مثلها على المستوى الديكارتي.

س	ص = ق(س)

(٦) مثل الاقتران $ق(س)$ بيانياً على المستوى الديكارتي المجاور.

• تمارين : مثل الاقترانات التربيعية التالية بيانياً.

(٨) د(س) = $٢س^٢ + ٣س - ٤$

(٩) ك(س) = $٢س^٢ - ٢س + ٥$

(١٠) ن(س) = $٢س^٢$

(١١) ر(س) = $٢س^٢ + ٢س + ١$

(١) ق(س) = $٣س^٢ + ٦س + ٤$

(٢) ل(س) = $٨س^٢ - ٢س$

(٣) هـ(س) = $٢س^٢ + ٤$

(٤) و(س) = $٢س^٢ - ٢س$

(٥) م(س) = $٩س^٢ - ٩$

(٦) ط(س) = $٢س^٢ - ١$

(٧) ي(س) = $٢س^٣ - ٢س$

ملاحظة : إن ايجاد اصفار الاقتران التربيعي يساعد كثيراً في تمثيله.

ورقة عمل/١٣

المتباينة الخطية بمتغير واحد

- تذكير:** • لا نقلب (لا تتأثر) اتجاه المتباينة عند الإضافة أو الطرح.
• لا نقلب (لا تتأثر) اتجاه المتباينة عند الضرب أو القسمة بعدد موجب.
• نقلب اتجاه المتباينة عند الضرب أو القسمة في عدد سالب.
مثال: جد مجموعة حل المتباينة $3s - 8 \leq 4$

التطبيق على المثال	الخطوة	
$3s - 12 \leq 4$ (بإضافة ٨ إلى الطرفين)	نجعل المتغير مع معامل في طرف والعدد الثابت في الطرف الآخر	(١)
$\frac{3s - 12}{3} \geq \frac{4}{3} \iff s - 4 \geq \frac{4}{3}$	نقسم الطرفين على معامل س (عند القسمة على عدد سالب نقلب اتجاه المتباينة)	(٢)

- جد مجموعة حل المتباينات الخطية التالية:

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| (٢) $35 \geq 7s - 7$ | (١) $28 \leq 7s$ |
| (٤) $15 > s + 8$ | (٣) $s - 5 > \text{صفر}$ |
| (٦) $38 < 5s - 18$ | (٥) $21 < 2s + 9$ |
| (٨) $14 \geq s + 2$ | (٧) $3 - s - 21 \leq \text{صفر}$ |
| (١٠) $15 > s - 8$ | (٩) $35 \geq 14 + 7s - 7$ |
| (١٢) $12 < 2s - 14$ | (١١) $15 > 9 + 8s$ |
| (١٤) $14 \geq s + 2$ | (١٣) $27 < 5s - 2$ |
| (١٦) $18 - s < 15 + 3s$ | (١٥) $28 - 2s - 2 \geq 12 + 6s$ |


ورقة عمل / ١٤

نظرية فيثاغورس

تذكير: • مربع طول الوتر في المثلث قائم الزاوية يساوي مجموع مربعي الضلعين الآخرين


• إذا كان الوتر مجهول نستخدم القاعدة:

$$(\text{الوتر المجهول})^2 = (\text{الوتر})^2 - (\text{الضلع المعلوم})^2$$





• إذا كان الوتر مجهول نستخدم القاعدة:


$$(\text{الوتر})^2 = (\text{الضلع الأول})^2 + (\text{الضلع الثاني})^2$$




• جد طول الضلع المجهول (س) في كل مما يلي:




(٤)




(٣)



• جد طول الضلع س ص في المثلث التالي:



• جد طول الضلع ب ج في المثلث التالي:



• أ ب ج مثلث قائم الزاوية في ب فيه أ ب = ٨ سم ، أ ج = ١٥ سم ، جد طول ب ج .

• س ص ع مثلث قائم الزاوية في ص فيه س ص = ١٢ سم ، ص ع = ٩ سم ، جد طول س ع .


• أ ب ج مثلث قائم الزاوية في ب فيه أ ب = ب ج = ١ سم ، جد طول الضلع أ ج .

ورقة عمل/١٥


تطابق المثلثات

- تذكير:** • حالات تطابق مثلثين : (١) ثلاثة اضلاع.
 (٢) ضلعين و زاوية محصورة بينهما.
 (٣) زاويتين و ضلع.
 (٤) وتر و ضلع (خاصة بالمثلثات قائمة الزاوية)


• بيّن حالة التطابق التي تم الإعتماد عليها في اثبات تطابق كل زوج من أزواج المثلثات التالية :



- ١ -
 ٢ -
 ٣ -
 حالة التطابق:





- ١ -
 ٢ -
 ٣ -
 حالة التطابق:



- ١ -
 ٢ -
 ٣ -
 حالة التطابق:



- ١ -
 ٢ -
 ٣ -
 حالة التطابق:



مدرسة:

الاسم:







الصف العاشر ()

التاريخ: / / ٢٠

تابع/ ورقة عمل/ ١٥

تطابق المثلثات

• حدد المثلثات المتطابقة في الأشكال التالية مع ذكر السبب:



مدرسة :

الاسم :

ورقة عمل / ١٦

الصف العاشر ()

التاريخ: / / ٢٠

الدائرة

- تذكير: الدائرة : مجموعة كل النقاط التي تبعد بعداً ثابتاً عن نقطة ثابتة ، يمثل البعد الثابت نصف قطر الدائرة و النقطة الثابتة تمثل مركز الدائرة.
- الوتر : قطعة مستقيمة تصل بين نقطتين على الدائرة ، وإذا مرّ الوتر في المركز يسمى قطراً
- نصف القطر (نق) : قطعة مستقيمة تصل بين مركز الدائرة و أي نقطة على الدائرة.


- اعتمد على الشكل المجاور الذي يمثل دائرة مركزها (م) للإجابة عما يلي:

(١) سمّ ثلاثة انصاف اقطار

(٢) سمّ قطراً

(٣) سمّ وترين مختلفين.

(٤) ارسم وتر ونصف قطر للدائرة.




- اعتمد الشكل المجاور الذي يمثل دائرة مركزها (م) للإجابة عما يلي :

(١) سمّ جميع انصاف الاقطار المبيّنة بالرسم.

(٢) سمّ جميع الأوتار المبيّنة بالرسم.

(٣) سمّ جميع الأقطار المبيّنة بالرسم.



- ارسم دائرة نصف قطرها ٣ سم ، وعين عليها وتر ، قطر ، ونصف قطر.

مدرسة :


الصف العاشر ()

الاسم:

التاريخ: / / ٢٠

ورقة عمل /١٧




مجموع زوايا المثلث



تذكير: • مجموع زوايا المثلث يساوي 180°

$$180^\circ = \angle A + \angle B + \angle C$$

(١) جد قياس الزاوية المجهولة في كل من المثلثات التالية:



(٢) أ ب ج مثلث فيه $\angle A = 55^\circ$ ، $\angle B = 65^\circ$ فما قياس $\angle C$ ؟


(٣) س ص ع مثلث فيه $\angle S = 20^\circ$ ، $\angle C = 100^\circ$ فما قياس $\angle V$ ؟

(٤) مثلث مجموع زاويتين فيه 90° ما قياس الزاوية الثالثة؟

(٥) مثلث زواياه متساوية . ما قياس كل زاوية فيه؟

ورقة عمل / ١٨

المثلث المتطابق الضلعين






تذكير: • المثلث المتطابق الضلعين : هو مثلث فيه ضلعين متطابقين

• زاويتي القاعدة في المثلث المتطابق الضلعين متساويتين

• العمود النازل من رأس المثلث المتساوي الساقين على القاعدة ينصفها

(١) جد قياس الزاوية المجهولة في كل من المثلثات التالية:




(٢) أ ب ج مثلث فيه $\angle B = \angle C$ ، $\angle S = 50^\circ$ ، فما قياس $\angle B$ ، $\angle C$ ، $\angle A$ ؟

(٣) س ص ع مثلث فيه $\angle S = \angle C = 50^\circ$ ، $\angle E = 60^\circ$ ، $\angle S = 30^\circ$ ، انزل عمود من رأس المثلث على القاعدة ولاقها في النقطة م ، جد :

(أ) طول ص م .

(ب) قياس $\angle E$.

(ج) قياس الزاوية ص س ع



مدرسة :

الاسم :



الصف العاشر ()

التاريخ: / / ٢٠


تابع/ورقة عمل/١٨

المثلث المتطابق الضلعين


٤) جد طول الضلع المجهول أو قياس الزاوية المجهولة فيما يلي:



٥) قطعة ورق على شكل المثلث المرسوم قص عند الخط المنقط ما نوع المثلث الأكبر الناتج؟



٦) قطعة ورق مستطيلة الشكل طولها ضعفا عرضها ، اثبتت من وسطها كما في الشكل المجاور ثم قصت على طول الخط المنقط ، ثم فتحت القطعة التي تم قصها ، ما شكل القطعة الناتجة؟



مدرسة:

الاسم:

الصف العاشر ()



التاريخ: / / ٢٠

ورقة عمل / ١٩

مجموع زوايا الشكل الرباعي

تذكير: • مجموع زوايا الشكل الرباعي ٣٦٠

• جد قياس المجهولة (س) في كل مما يلي:



• أ ب ج د شكل رباعي فيه $\angle ب = 50^\circ$ ، $\angle ج = 105^\circ$ ، $\angle د = 80^\circ$ ، فما قياس $\angle أ$ ؟

• أ ب ج د شكل رباعي فيه $\angle أ = 95^\circ$ ، $\angle د = 70^\circ$ ، فما قياس $\angle ب$ ؟

• س ص ع ل شكل رباعي فيه $\angle س = \angle ل = 100^\circ$ ، $\angle ص = \angle ع$ ، فما قياس $\angle ع$ ؟

• س ص ع ل شكل رباعي زواياه جميعها متساوية القياس ، ما قياس كل منها؟

مدرسة :

الاسم :

الصف العاشر ()

التاريخ: / / ٢٠

ورقة عمل / ٢٠

حل نظام مكون معادلتين خطيتين

تذكير: • حل النظام : ايجاد قيم المجاهيل الي تحقق المعادلتين معاً.

• لحل نظام مكون من معادلتين خطيتين هناك طريقتين الحذف أو التعويض

• حل النظام وتأكد من صحة الحل $2س - 3ص = 2$
 $5س + 3ص = 5$

• حل النظام وتأكد من صحة الحل $4س + 3ص = 5$
 $2س + 5ص = 1$

• حل النظام التالي وتأكد من صحة الحل $3س + 2ص = 2$
 $2س + 3ص = 2$

• حل النظام التالي وتأكد من صحة الحل $4س - 3ص = 5$
 $3س + 2ص = 6$

• حل النظام التالي وتأكد من صحة الحل $3س - 6ص = 9$
 $3ص - 4س = 2$

• حل النظام التالي وتأكد من صحة الحل $س - 5ص = 5$
 $3ص - 2س = 3$

• حل النظام التالي : $3س + 4ص = 1$
 $2س + 3ص = 3$

ورقة عمل / ٢١


النسب المثلثية

تذكير: • جيب الزاوية الحادة = $\frac{\text{طول الضلع المقابل للزاوية}}{\text{طول الوتر}}$

• جيب تمام الزاوية الحادة = $\frac{\text{طول الضلع المجاور للزاوية}}{\text{طول الوتر}}$

• ظل الزاوية الحادة = $\frac{\text{طول الضلع المقابل للزاوية}}{\text{طول الضلع المجاور للزاوية}}$

جاه = $\frac{\text{المقابل}}{\text{الوتر}}$ ، جتاه = $\frac{\text{المجاور}}{\text{الوتر}}$ ، ظاه = $\frac{\text{المقابل}}{\text{المجاور}}$



• بالاعتماد على الشكل المجاور جد:

(١) جاس =


(٢) جتاس =

(٣) ظاس =

(٤) جاع =

(٥) جتاع =

(٦) ظاع =



• بالاعتماد على الشكل المجاور جد:

(١) جا ج =


(٢) جتا ج =

(٣) ظا ج =

(٤) جا أ =


(٥) جتا أ =

(٦) ظا أ =




ورقة عمل/٢٢

النسب المثلثة للزاويا الخاصة




تذكير: • جاه = $\frac{\text{المقابل}}{\text{الوتر}}$ ، جتاه = $\frac{\text{المجاور}}{\text{الوتر}}$ ، ظاه = $\frac{\text{المقابل}}{\text{المجاور}}$

ملاحظة • إذا رسمنا مثلث زواياه 30° ، 60° ، 90° فإن الضلع المقابل للزاوية 30° طوله نصف طول الوتر ولو فرضنا أن طول الضلع المقابل للزاوية 30° يساوي ١ سم سيكون طول الوتر ٢ سم وحسب نظرية فيثاغورس سيكون طول الضلع الثالث $\sqrt{3}$ سم كما هو مبين في الشكل التالي.



• إذا رسمنا مثلث قائم الزاوية وفي نفس الوقت متساوي الساقين سينتج مثلث زواياه 45° ، 45° ، 90° ولو فرضنا أن طول أحد ضلعي القائمة ١ سم ، سيكون الضلع الآخر أيضا ١ سم لان المثلث متساوي الساقين ، وحسب نظرية فيثاغورس سيكون طول الوتر $\sqrt{2}$ سم . كما هو مبين في الشكل التالي:



• جد قيمة ما يلي :

(٣) ظا $30^\circ =$

(٢) جتا $30^\circ =$

(١) جا $30^\circ =$

(٦) ظا $60^\circ =$

(٥) جا $60^\circ =$


(٤) جا $60^\circ =$

(٩) ظا $45^\circ =$

(٨) جتاه $45^\circ =$


(٧) جا $45^\circ =$

• جد طول الضلع أ ج في الشكل المجاور:




ورقة عمل/٢٢

النسب المثلثة للزاويا الخاصة




تذكير: • جاه = $\frac{\text{المقابل}}{\text{الوتر}}$ ، جتاه = $\frac{\text{المجاور}}{\text{الوتر}}$ ، ظاه = $\frac{\text{المقابل}}{\text{المجاور}}$

ملاحظة • إذا رسمنا مثلث زواياه 30° ، 60° ، 90° فإن الضلع المقابل للزاوية 30° طوله نصف طول الوتر ولو فرضنا أن طول الضلع المقابل للزاوية 30° يساوي ١ سم سيكون طول الوتر ٢ سم وحسب نظرية فيثاغورس سيكون طول الضلع الثالث $\sqrt{3}$ سم كما هو مبين في الشكل التالي.



• إذا رسمنا مثلث قائم الزاوية وفي نفس الوقت متساوي الساقين سينتج مثلث زواياه 45° ، 45° ، 90° ولو فرضنا أن طول أحد ضلعي القائمة ١ سم ، سيكون الضلع الآخر أيضا ١ سم لان المثلث متساوي الساقين ، وحسب نظرية فيثاغورس سيكون طول الوتر $\sqrt{2}$ سم . كما هو مبين في الشكل التالي:



• جد قيمة ما يلي :

(٣) ظا $30^\circ =$

(٢) جتا $30^\circ =$

(١) جا $30^\circ =$

(٦) ظا $60^\circ =$

(٥) جتا $60^\circ =$


(٤) جا $60^\circ =$

(٩) ظا $45^\circ =$

(٨) جتا $45^\circ =$


(٧) جا $45^\circ =$

• جد طول الضلع أ ج في الشكل المجاور:




تابع/ ورقة عمل/ ٢٢

النسب المثلثة للزاويا الخاصة




تذكير: • جاه = $\frac{\text{المقابل}}{\text{الوتر}}$ ، جتاه = $\frac{\text{المجاور}}{\text{الوتر}}$ ، ظاه = $\frac{\text{المقابل}}{\text{المجاور}}$


- جد طول الضلع س ص في الشكل المجاور (علماً بأن $\text{ظا } 37^\circ = \frac{3}{4}$)




- جد طول الضلع أ ب في الشكل المجاور (علماً بأن $\text{جتا } 37^\circ = \frac{4}{5}$)



- جد طول الضلع أ ج في الشكل المجاور:



- جد طول الضلع أ ج في الشكل المجاور:



مدرسة :

الاسم :

الصف العاشر ()

ورقة عمل / ٢٣

التاريخ: / / ٢٠


الانعكاس

تذكير: • مفهوم الانعكاس : هو أن تكون النقطة صورة مرآة لنقطة اخرى .

- عند انعكاس نقطة احدائياتها (س ، ص) عن محور السينات تكون احدائيات نقطة الانعكاس (س ، -ص)
- عند انعكاس نقطة احدائياتها (س ، ص) عن محور الصادات تكون احدائيات نقطة الانعكاس (-س ، ص)

• أكمل الجدول التالي:

صورة النقطة بعد الانعكاس في محور السينات	صورة النقطة بعد الانعكاس في محور السينات	النقطة
		(٤ ، ٣)
		(٢ ، ٥-)
		(١- ، ٦)
		(٨- ، ٣-)
		(٦- ، ٠)
		(٠ ، ٩)
		(٤ ، ١، ٥-)
		(٠، ٥ - ، ١، ٢٥ -)



- (١) ارسم انعكاس المثلث أ ب ج
أولاً: عن محور السينات
ثانياً : عن محور الصادات

- (٢) ارسم انعكاس القطعة المستقيمة ول :
أولاً: عن محور السينات
ثانياً : عن محور الصادات

مدرسة:


الاسم:

الصف العاشر ()

التاريخ: / / ٢٠






ورقة عمل / ٢٤

مساحة المثلث



تذكير: • مساحة المثلث = $\frac{1}{2} \times \text{القاعدة} \times \text{الارتفاع}$

• جد مساحة المثلثات التالية :



• ما مساحة المثلث الذي ارتفاعه ٢٠ سم وطول قاعدته ١٤ سم؟


• ما مساحة المثلث الذي طول قاعدته ١٧ سم وارتفاعه ١٦ سم؟

• ما مساحة المثلث الذي فيه ارتفاعه = طول قاعدته = ١٠ سم؟


ورقة عمل / ٢٥

زوايا الارتفاع والانخفاض

- تذكير:** • زاوية الارتفاع : هي الزاوية المحصورة بين خط البصر والخط الأفقي لشخص ينظر للأعلى.
• زاوية الانخفاض : هي الزاوية المحصورة بين خط البصر والخط الأفقي لشخص ينظر للأسفل.




تدريبات وتمارين:



- (١) تم رصد قمة المنارة في الشكل المجاور من النقطة أ ، أي مما يأتي يعتبر زاوية ارتفاع المنذنة ؟

- (أ) س
(ب) ص
(ج) ع
(د) ل




- (٢) تم رصد القارب في الشكل المجاور من قمة المنارة ، أي مما يأتي يعتبر زاوية انخفاض القارب؟

- (أ) س
(ب) ص
(ج) ع
(د) ل

- (٣) ارسم شكلاً توضيحياً للمسألة التالية : " يرصد بسّام قمة منذنة تبعد عنه ٨٠٠ متر بزاوية ارتفاع ٤٥° ، ما ارتفاع المنذنة؟"

- (٤) ارسم شكلاً توضيحياً للمسألة التالية : " رصد بسّام سفينة في البحر من قمة منارة ترتفع ٣٠ متر عن سطح الماء بزاوية انخفاض ٩٠° ، ما بعد السفينة عن قاعدة المنارة؟"

- (٥) حدد رقم الزاوية ونوعها (انخفاض، ارتفاع) في الشكل المجاور مكماً الجدول :



رقم الزاوية	نوع الزاوية	
		انظر من هـ إلى د
		انظر من ج إلى هـ
		انظر من هـ إلى ج
		انظر من د إلى هـ

ورقة عمل/٢٦

ميل الخط المستقيم

تذكير: • يمكن ايجاد ميل الخط المستقيم من خلال :

(١) نقطتين عليه حيث : الميل = $\frac{ص٢ - ص١}{س٢ - س١}$ ، ويستخدم إذا اعطيت نقطتين على المستقيم.

(٢) معادلة الخط المستقيم حيث : الميل = $\frac{- \text{معامل س}}{\text{معامل ص}}$ ، ويستخدم إذا اعطيت معادلة الخط المستقيم

ويجب أن تكون بالصورة العامة (أس + ب ص + ج = صفر).

(٣) زاوية الميل (في منهاج الصف العاشر)

تدريبات وتمارين:

(١) جد ميل المستقيم المار بالنقطتين (٢ ، ٤) ، (٦ ، ١٤)

(٢) جد ميل المستقيم المار بالنقطتين (-٥ ، ٨) ، (٨ ، -١٨)

(٣) جد ميل المستقيم الذي معادلته $ص٥ + س٢ = ٧$

(٤) جد ميل المستقيم الذي معادلته $ص٨ - س٣ = ٨$

(٥) جد ميل المستقيم المار بالنقطتين (-١ ، ٥) ، (-٣ ، -٥)

(٦) جد ميل المستقيم الذي معادلته $ص٨ - س٤ = ١٧$

(٧) جد ميل المستقيم الذي معادلته $ص٥ + س١٥ = -٤$

(٨) جد ميل المستقيم الذي معادلته $ص٢ - س٣ + ٧ = صفر$

(٩) جد ميل المستقيم المار بالنقطتين (-٧ ، ٢) ، (-٨ ، -١٠)

مدرسة:

الاسم:

الصف العاشر ()

التاريخ: / / ٢٠

ورقة عمل/٢٧

معادلة الخط المستقيم

تذكير: • معادلة الخط المستقيم الذي ميله (م) ويمر بالنقطة (س١ ، ص١) هي ص - ص١ = م(س - س١)

تدريبات وتمارين:

(١) جد معادلة المستقيم الذي ميله (٣) ويمر بالنقطة (٢ ، ٤)

(٢) جد معادلة المستقيم الذي ميله (٢-) ويمر بالنقطة (٥- ، ٨)

(٣) جد معادلة المستقيم الذي ميله (٤) ويمر بالنقطة (٣- ، ١-)


(٤) جد معادلة المستقيم الذي ميله (٦-) ويمر بالنقطة (٢ ، ٠)

(٥) جد معادلة المستقيم الذي ميله (٧) ويمر بالنقطة (٠ ، ٩-)

(٦) جد معادلة المستقيم المار بالنقطتين (٢ ، ٥) ، (٨ ، ٢)

(٧) جد معادلة المستقيم المار بالنقطتين (٣- ، ٨) ، (٠ ، ١-)

(٨) جد معادلة المستقيم المبين في الشكل المجاور:



مدرسة :


الاسم :

ورقة عمل / ٢٨

الصف العاشر ()

التاريخ: / / ٢٠

الهندسة الإحداثية



تذكير: • إذا كانت أ(س١، ص١) ، ب(س٢، ص٢) فإن :

$$(١) \text{ طول القطعة المستقيمة } \overline{AB} = \sqrt{(١س-٢ص)^2 + (١ص-٢س)^2}$$

$$(٢) \text{ إحداثيات نقطة منتصف } \overline{AB} \text{ هي } \left(\frac{١ص+٢س}{٢}, \frac{١س+٢ص}{٢} \right)$$

تدريبات وتمارين:

(١) إذا كان أ(٣، ١٠) ، ب(٦، ١٤) جد :

أ) طول القطعة المستقيمة \overline{AB}

ب) إحداثيات نقطة منتصف القطعة المستقيمة \overline{AB}

(٢) أ ب ج مثلث رؤوسه أ(١، ٤) ، ب(٢، ٣) ، ج(٦، -٤) جد :

أ) أطول اضلاع المثلث.

ب) إحداثيات منتصفات اضلاع المثلث.

(٣) إذا كانت أ ب ج د تمثل رؤوس شكل رباعي حيث أ(٢، -٣) ، ب(٥، ٠) ، ج(٩، ٢) ، د(١، ٧)

أ) جد أطول اضلاع الشكل الرباعي أ ب ج د .

ب) جد إحداثيات منتصفات الأضلاع أ ب ، ج د ، ب د .





ورقة عمل / ٢٩

شبه المنحرف و متوازي الأضلاع


- تذكير:**
- شبه المنحرف : هو رباعي أضلاع يكون فيه على الأقل اثنان من الأضلاع المتقابلة متوازيان.
 - متوازي الأضلاع : رباعي الأضلاع فيه كل ضلعين متقابلين متوازيان.
 - من خصائص متوازي الأضلاع: (١) كل ضلعين متوازيين متساويين بالطول (٢) كل زاويتين متقابلتين متساويتين

تدريبات وتمارين:

(١) أي الأشكال التالية يعتبر شبه منحرف.



مستطيل




(٢) أي من الأشكال السابقة يعتبر متوازي أضلاع.

(٣) بالاعتماد على الشكل المجاور :

(أ) ما اسم الشكل الرباعي أ ب ج د ؟

(ب) ما طول د ج ؟ وضّح اجابتك

(ج) ما قياس الزاوية $\angle د ج ب >$ ؟



(٤) ما اسم الشكل الرباعي الذي فيه كل ضلعين متقابلين متوازيين؟

مدرسة :

الاسم :

الصف العاشر ()

التاريخ: / / ٢٠

ورقة عمل /٣٠

مقاييس النزعة المركزية

تذكير: • مقاييس النزعة المركزية هي الوسط الحسابي (س) ، و الوسيط ، المنوال

$$(١) \text{ الوسط الحسابي للمشاهدات المفردة} = \frac{\text{مجموع القيم}}{\text{عددها}}$$

(٢) الوسيط : القيمة التي تتوسط القيم بعد ترتيبها تصاعدياً أو تنازلياً ، و إذا كان عدد القيم زوجي فإن الوسيط يكون الوسط الحسابي للقيمتين اللتين تتوسطان القيم

(٣) المنوال : القيمة الأكثر تكراراً من بين القيم.

تدريبات وتمارين:

(١) إذا كان اعمار ٨ موظفين في أحد الشركات هي : ٢٤ ، ٤٥ ، ٣٨ ، ٣٨ ، ٣١ ، ٢٩ ، ٢٥ ، ٤٢ احسب:
(أ) الوسط الحسابي لأعمار الموظفين.

(ب) وسيط أعمار الموظفين.

(ج) منوال أعمار الموظفين

(٢) فيما يلي الدخل اليومي لعشر عائلات مختلفة : ٢٣ ، ٢٧ ، ٣٨ ، ٣٢ ، ١٩ ، ٢١ ، ٣٢ ، ٣٦ ، ٣٢ ، ٤٠

(أ) احسب الوسط الحسابي للدخل اليومي.

(ب) جد وسيط الدخل اليومي.

(ج) جد منوال الدخل اليومي.

(٣) احسب الوسط الحسابي و الوسيط و المنوال للقيم : ٣ ، ٨ ، ٧ ، ٢ ، ٦ ، ١٢ ، ١ ، ٠ ، ٥ ، ٣ ، ٩ ، ٣ ، ١٤

مدرسة :

الاسم :

الصف العاشر ()

التاريخ: / / ٢٠

ورقة عمل / ٣١

الوسط الحسابي للجداول التكرارية ذي الفئات

تذكير: • الوسط الحسابي للجداول التكرارية ذي الفئات = $\frac{\text{مجموع حواصل ضرب مراكز الفئات في تكراراتها}}{\text{مجموع التكرارات}}$

$$\text{حيث : مركز الفئة} = \frac{\text{الحد الأدنى للفئة} + \text{الحد الأعلى للفئة}}{2}$$

ملاحظة • لتسهيل حساب الوسط الحسابي نقوم بعمل جدول كما في التدريب الأول من ورقة العمل

تدريب (١)

الجدول التالي يمثل الدخل اليومي لخمسين عائلة

الدخل/الفئة	٦ - ٤	٩ - ٧	١٢ - ١٠	١٥ - ١٣
التكرار	٢	٥	٦	٣

• احسب الوسط الحسابي للدخل اليومي.

الفئات	التكرار	مركز الفئة	مركز الفئة × التكرار
٦ - ٤	٣	$٥ = \frac{٦+٤}{٢}$	$١٥ = ٥ \times ٣$
٩ - ٧	٢		
١٢ - ١٠	٤		
١٥ - ١٣	١		
المجموع		—	

تمرين (١) يمثل الجدول التالي توزيع لأعمار ٢٠ طفل في احد الإسكانات لأقرب سنة ، جد الوسط الحسابي لأعمار الأطفال.

فئات الأعمار	٣ - ١	٦ - ٤	٩ - ٧	١٢ - ١٠
التكرار	٢	٥	٦	٣

تمرين (٢) الجدول التالي يبين توزيع للدخل اليومي لخمسين عائلة ، جد الوسط الحسابي للدخل اليومي.

الدخل اليومي	٧ - ٣	١٢ - ٨	١٧ - ١٣	٢٢ - ١٨	٢٧ - ٢٣
التكرار	٥	٢٠	١٠	٣	٢

تمرين (٢) يبين الجدول التالي أوزان (٤٠) شخصاً لأقرب كيلو غرام ، جد الوسط الحسابي لأوزان الأشخاص.

فئات الأوزان	٥٤ - ٥٠	٥٩ - ٥٥	٦٤ - ٦٠	٦٩ - ٦٥	٧٤ - ٧٠	٧٩ - ٧٥	٨٤ - ٨٠
التكرار	٢	٥	٦	٣	١٠	٩	٥

مدرسة :

الاسم :

الصف العاشر ()

التاريخ: / / ٢٠

ورقة عمل / ٣٢

اثر التعديل على مقاييس النزعة المركزية

- تذكير:** • إذا تم تعديل المشاهدات s_1, s_2, \dots, s_n حسب العلاقة $s_r = s_r + b$ حيث:
- س : المشاهدة قبل التعديل ، ص : المشاهدة بعد التعديل فإن :
- (١) الوسط الحسابي بعد التعديل = أ \times الوسط الحسابي قبل التعديل + ب
- (٢) الوسيط بعد التعديل = أ \times الوسيط قبل التعديل + ب
- (٣) المنوال بعد التعديل = أ \times المنوال بعد التعديل + ب

تدريبات وتمارين:

- (١) إذا كان الوسط الحسابي لمجموعة من القيم يساوي (١٥) ، والوسيط لتلك القيم يساوي (١٢) ، والمنوال (١٠) عدلت القيم حسب العلاقة : ص = ٢س - ١٠ حيث س : القيمة قبل التعديل ، ص : القيمة بعد التعديل.
- (أ) جد الوسط الحسابي للقيم بعد التعديل.
- (ب) جد الوسيط للقيم بعد التعديل.
- (ج) جد المنوال للقيم بعد التعديل.

- (٢) مجموعة من القيم وسطها الحسابي (٦٠) ، ووسيطها (٦٥) عدلت القيم حسب العلاقة ص = ٣٠٠ - ٣س أحسب الوسط الحسابي والوسيط للقيم بعد التعديل.

- (٣) إذا كان متوسط علامات طلاب الصف العاشر في اختبار الرياضيات علامته العظمى (٢٠) يساوي (١١) :
- (أ) إذا اضاف المعلم علامتان لكل طالب كم يصبح الوسط الحسابي؟
- (ب) إذا اراد المعلم تحويل الاختبار من (١٠٠) بضرب كل علامة ب (٥) ، كم يصبح الوسط الحسابي؟

- (٣) ضع دائرة : إذا كان الوسط الحسابي لرواتب موظفي احدى الشركات ٢٠٠ دينار ، عدلت الشركة الرواتب حيث ضُرب الراتب في (٠,٩) و أُضيف إليه ٤٠ دينار ، فإن الوسط الحسابي للرواتب بعد التعديل يساوي:

(أ) ١٨٠ (ب) ٢٠٠ (ج) ٢٢٠ (د) ٢٤٠

مدرسة :

الاسم :

ورقة عمل / ٣٣

الصف العاشر ()

التاريخ: / / ٢٠

الفضاء العيني

تذكير: • الفضاء العيني : مجموعة جميع النواتج الممكنة للتجربة العشوائية ويرمز له بالرمز (Ω) يقرأ " أوميغا "

(١) اكتب عناصر الفضاء العيني لكل من التجارب التالية:

(أ) رمي قطعة نقد مرة واحدة.

(ب) لعب الفريق الوطني مباراة كرة قدم وتسجيل النتيجة.

(ج) رمي حجر نرد مرة واحدة.

(٢) اكتب الفضاء العيني لتجربة رمي قطعتي نقد مره واحدة وملاحظة الوجهين الظاهرين.

(٣) اكتب الفضاء العيني لتجربة رمي قطعة نقد ثلاث مرات وملاحظة الأوجه الظاهرة.

(٤) اكتب الفضاء العيني لتجربة القاء حجري نرد معاً مرة واحدة.

(٥) في تجربة سحب بطاقتين من مجموعة بطاقات مرقمة بالأرقام { ٢ ، ٣ ، ٦ } اكتب الفضاء العيني لهذه التجربة :

(أ) إذا كان السحب على التوالي مع إرجاع.

(ب) إذا كان السحب على التوالي بدون إرجاع.

(ج) إذا كان السحب دفعة واحدة

(٦) في تجربة سحب بطاقتين من مجموعة بطاقات مرقمة بالأرقام { ١ ، ١ ، ٤ ، ٨ } اكتب الفضاء العيني لهذه التجربة:

(أ) إذا كان السحب على التوالي مع إرجاع.

(ب) إذا كان السحب على التوالي بدون إرجاع.

(ج) إذا كان السحب دفعة واحدة

مدرسة :

الاسم :

الصف العاشر ()

التاريخ: / / ٢٠

ورقة عمل / ٣٤

مفهوم الحادث وأنواع الحوادث

تذكير: • الحادث : مجموعة جزئية من الفضاء العيني و يرمز له بالرمز (ح)

(١) في تجربة رمي حجر نرد مرة واحدة اكتب الحوادث التالية بذكر عناصرها:

(أ) ح١: ظهور عدد فردي

(ب) ح٢: ظهور عدد أقل من ٣

(ج) ح٣: ظهور عدد أكبر من ١

(د) ح٤: ظهور عدد يقبل القسمة على ٥

(هـ) ح٥: ظهور عدد أقل من ٧

(ز) ح٦: ظهور عدد أكبر من ٦

(٢) في تجربة عشوائية لاختيار عائلة مكونة من ثلاث أطفال ، وتسجيل الأطفال وفق تسلسل ولادتهم وجنسهم فإذا كان:

ح١: عند العائلة ولد واحد فقط

ح٢: عند العائلة ولدان على الأقل

ح٣: عند العائلة ولدان على الأكثر

(د) ح٢

(ج) ح٢

(ب) ح١

(أ) ح٣

(٣) في تجربة رمي حجر نرد مرتين اكتب الحوادث التالية بذكر عناصرها:

(أ) ح١: ظهور عددين مجموعهما ٨

(ب) ح٢: ظهور عددين مجموعهما ٢

(ج) ح٣: ظهور عددين مجموعهما ٣

(د) ح٤: ظهور عددين كلاهما زوجي

(هـ) ح٥: ظهور عددين مجموعهما ١٣

مدرسة :

الاسم :

الصف العاشر ()

التاريخ: / / ٢٠

تابع/ ورقة عمل/ ٣٤

مفهوم الحادث و أنواع الحوادث

- تذكير:**
- الحادث البسيط : الحادث الذي يحوي عنصر واحد من عناصر الفضاء العيني Ω
 - الحادث المركب: الحادث الذي يحوي عنصرين أو أكثر من عناصر الفضاء العيني Ω
 - الحادث الأكيد: الحادث الذي يحوي جميع عناصر الفضاء العيني Ω
 - الحادث المستحيل: الحادث الذي لا يحوي أي عنصر من عناصر الفضاء العيني Ω

٤) إذا كان الفضاء العيني لتجربة عشوائية ما هو $\Omega = \{ ١ ، ٢ ، ٤ ، ٦ ، ٩ ، ١٤ \}$ بيّن نوع كل من الحوادث التالية:

$$\{ ١٤ ، ٩ ، ٤ \} = ١ح$$

$$\{ ٤ \} = ٢ح$$

$$\{ \} = ٣ح$$

$$\{ ١٤ ، ٩ ، ٦ ، ٤ ، ٢ \} = ٤ح$$

$$\Omega = ٥ح$$

$$\{ ٦ \} = ٦ح$$

٥) في تدريب (١) من ورقة العمل بيّن نوع كل حادث من الحوادث ١ح ، ٢ح ، ٣ح ، ٤ح ، ٥ح ، ٦ح

٦) في تدريب (٣) من ورقة العمل بيّن نوع كل حادث من الحوادث ١ح ، ٢ح ، ٣ح ، ٤ح ، ٥ح ، ٦ح

٧) إذا كان الفضاء العيني لتجربة عشوائية ما هو $\Omega = \{ ٢ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٨ \}$ أكتب مجموعة تمثّل كل حادث مما يلي :

(أ) حادث بسيط

(ب) حادث مركب

(ج) حادث مستحيل

(د) حادث أكيد

مدرسة :

الاسم :

الصف العاشر ()

التاريخ: / / ٢٠

ورقة عمل/٣٥

احتمال الحادث

تذكير: • احتمال الحادث = $\frac{\text{عدد عناصر الحادث}}{\text{عدد عناصر الفضاء العيني}}$ ، بالرموز $L(H) = \frac{E(H)}{E(\Omega)}$

(١) إذا كان الفضاء العيني لتجربة عشوائية ما هو $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ وكان:
ح_١ = {٤، ٩، ١٤} ، ح_٢ = {٤} ، ح_٣ = {٢، ٤، ٦، ٩، ١٤} ، ح_٤ = Ω ، ح_٥ = { }
جد : ل(ح_١) ، ل(ح_٢) ، ل(ح_٣) ، ل(ح_٤) ، ل(ح_٥)

(٢) في تجربة رمي حجر نرد مره واحده جد :

(أ) احتمال ظهور عدد زوجي.

(ب) احتمال ظهور عدد أقل من ٥

(ج) احتمال ظهور عدد يقبل القسمة على ٤

(٣) إذا كانت $\Omega = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (4, 1), (4, 2), (4, 3)\}$ فضاء عيني لتجربة عشوائية ما
ح = $\{(1, 2), (2, 1), (3, 1), (4, 1)\}$ ، جد ل(ح)

(٤) في تجربة سحب كرة من صندوق يحوي اربع كرات صفراء وثلاث كرات حمراء وكره بيضاء ، ما احتمال :
(أ) سحب كرة صفراء.

(ب) سحب كرة بيضاء

(٥) في تجربة رمي قطعتي نقد معاً ، ما احتمال ظهور وجهين متشابهين؟

(٦) في تجربة رمي حجري نرد معاً : ما احتمال :

(أ) ظهور عددين مجموعها ٧

(ب) ظهور عددين مجموعهما ١٢

مدرسة:

الاسم:

الصف العاشر ()

التاريخ: / / ٢٠

ورقة عمل/٣٦

العمليات على الحوادث

تذكير: إذا كان C_1, C_2 حادثين في Ω فإن:

- متممة الحادث C_1 يرمز لها بالرمز $\overline{C_1}$ وتعني العناصر الموجودة في Ω وليست موجودة في C_1
- $C_1 - C_2$: العناصر الموجودة في C_1 وغير موجودة في C_2
- $C_1 \cap C_2$: العناصر الموجودة في C_1 و C_2 معاً (C_1 تقاطع C_2)
- $C_1 \cup C_2$: العناصر الموجودة في C_1 أو C_2 (C_1 اتحاد C_2)

تمرين (١) إذا كان الفضاء العيني لتجربة عشوائية ما هو $\Omega = \{1, 2, 4, 6, 9, 14\}$ وكان:

$$C_1 = \{4, 9, 14\}, C_2 = \{4, 6\}, C_3 = \{2, 4, 6, 9, 14\}, C_4 = \{14\}, \Omega = C_4, C_5 = \{\}$$

جد: (١) $\overline{C_1}$

(٢) $C_2 - C_1$

(٣) $C_1 \cap C_2$

(٤) $C_1 \cup C_2$

(٥) $C_3 \cup C_4$

(٦) $C_1 - C_2$

(٧) $C_2 - C_3$

(٨) $C_3 \cap C_4$

(٩) $\overline{C_2}$

(١٠) $\overline{C_4}$

(١١) $\overline{C_5}$

(١٢) $C_4 - C_2$

(١٣) $C_1 \cup C_3$

(١٤) $C_1 \cap C_3$

(١٥) $C_2 \cap C_3$

تمرين (٢) في تجربة رمي حجر نرد إذا كان C_1 : ظهور عدد فردي ، C_2 : ظهور عدد أكبر من ٢ ، ما هي عناصر:

(١) $\overline{C_1}$ (٢) $C_1 - C_2$ (٣) $C_2 - C_1$ (٤) $C_1 \cap C_2$ (٥) $C_1 \cup C_2$

مدرسة :

الاسم :

الصف العاشر ()

التاريخ: / / ٢٠

ورقة عمل/٣٧

الحادثين المنفصلين

تذكير: نقول أن ح_١ ، ح_٢ حادثين منفصلين إذا كان تقاطعهما \emptyset أي أن الحادثين المنفصلين لا يمكن وقوعهما معاً.
ح_١ ، ح_٢ منفصلين \Leftrightarrow ح_١ ∩ ح_٢ = \emptyset ، أي أن الحادثين المنفصلين لا يمكن وقوعهما معاً.

تمرين(١) إذا كان الفضاء العيني لتجربة عشوائية ما هو $\Omega = \{1, 2, 3, 8, 9, 12, 14\}$ وكان :

$$ح_١ = \{1, 2, 3\} ، ح_٢ = \{8, 9\} ، ح_٣ = \{1, 8, 12, 14\} ، ح_٤ = \{2, 9\}$$

(١) هل الحادثين ح_١ ، ح_٢ حادثين منفصلين؟

(٢) هل الحادثين ح_١ ، ح_٣ حادثين منفصلين؟

(٣) هل الحادثين ح_١ ، ح_٤ حادثين منفصلين؟

(٤) هل الحادثين ح_٢ ، ح_٣ حادثين منفصلين؟

(٥) هل الحادثين ح_٢ ، ح_٤ حادثين منفصلين؟

(٦) هل الحادثين ح_٣ ، ح_٤ حادثين منفصلين؟

تمرين(٢) في تجربة رمي حجر نرد إذا كان ح_١ : ظهور عدد فردي ، ح_٢ : ظهور عدد أكبر من ٢ ، هل الحادثين ح_١ ، ح_٢ حادثين منفصلين؟

تمرين(٣) في تجربة لعب فرق كرة قدم مباراة واحدة عُرِّفت الحوادث :

ح_١ : أن يفوز الفريق في المباراة ، ح_٢ : أن يخسر الفريق في المباراة ، هل ح_١ ، ح_٢ حادثين منفصلين؟ فسّر؟

تمرين(٣) في تجربة سحب كرتين على التوالي مع الارجاع من صندوق يحوي ٣ كرات حمراء و ٤ كرات بيضاء
ح_١ : سحب كرتين حمراوتين ، ح_٢ : سحب كرتين بيضاوتين هل ح_١ ، ح_٢ حادثين منفصلين؟ فسّر اجابتك.

مدرسة:

الاسم:

ورقة عمل/٣٨

الصف العاشر ()

التاريخ: / / ٢٠

النسبة المئوية

تذكير: • النسبة المئوية هي نسبة عادية تاليها ١٠٠ ورمزها % فمثلاً $٩٠ : ١٠٠ = ٩٠\%$

• يمكن كتابة النسبة المئوية بصورة كسر عادي مقامه ١٠٠ فمثلاً $\frac{٩٠}{١٠٠} = ٩٠\%$ ، $\frac{١٢}{١٠٠} = ١٢\%$

• كذلك يمكن تحويل النسبة المئوية إلى كسر عشري فمثلاً $٩٠\% = \frac{٩٠}{١٠٠} = ٠,٩٠$

تمرين (١) حوّل النسب المئوية التالية إلى كسور عادية

(١) ٣٦% (٥) $٧,٥\%$

(٢) ٨% (٦) $١٩,٥\%$

(٣) ٦٠% (٧) ٩٧%

(٤) ١٥٠% (٨) ١%

تمرين (٢) حوّل النسب المئوية التالية إلى كسور عشرية

(١) ٦٧% (٥) ٣٣%

(٢) ٣% (٧) ٢%

(٣) ٨٠% (٨) ٥٠%

(٤) ١٥٠%

تمرين (٣) (١) ما هو الكسر العشري المكافئ للنسبة المئوية ١٥%

(٢) ما هو الكسر العادي المكافئ للنسبة المئوية ١٨٠%

(٣) ما هو الكسر العشري المكافئ للنسبة المئوية ٧%

(٤) ما هو الكسر العشري المكافئ للنسبة المئوية ٧٠%

الصلصة

السؤال 1/1

لتجهيز خليط تتبيل السلطة الخاص بك .

فيما يلي وصفة ل 100 مليلتر (ml) من الخليط .

60 ml	زيت السلطة:
30 ml	خل :
10 ml	صلصة الصويا:

ارجع إلى نص " الصلصة " على اليسار .

استخدم لوحة المفاتيح لكتابة الإجابة الصحيحة للسؤال .

كم مليلتر (مل) من زيت السلطة تحتاجه لعمل 150 مل من هذا التتبيل؟

ml

بين باستخدام العمليات الحسابية خطوات الحل:

$\frac{x}{y}$ $\sqrt{\quad}$ x^y π \leq \geq \times \div

الصلصة

السؤال 1/1

لتجهيز خليط تتبيل السلطة الخاص بك .

فيما يلي وصفة ل 100 مليلتر (ml) من الخليط .

60 ml	زيت السلطة:
30 ml	خل :
10 ml	صلصة الصويا:

ارجع الى نص " الصلصة " على اليسار

استخدم لوحة المفاتيح لكتابة الإجابة الصحيحة للسؤال .

كم مليلتر (مل) من زيت السلطة تحتاجه لعمل 150 مل من هذا التتبيل؟

90 ml

بين باستخدام العمليات الحسابية خطوات الحل:

نحتاج 90 ml لتجهيز خليط السلطة.

$$\frac{150 \times 60}{100} = 90 \text{ ml}$$

المسافة بين البيت والعمل

السؤال 2/1

في أحد الأيام غادر محمد بيته ماشياً إلى مكان عمله بمعدل سرعة 70m/min فوصل إلى عمله متأخراً دقيقة واحدة، وفي اليوم التالي غادر بيته في نفس الوقت وسار بنفس الطريق ولكن بسرعة قدرها 75m/min فوصل عمله مبكراً دقيقة واحدة.



ارجع إلى نص " المسافة بين البيت والعمل " على اليسار.
استخدم لوحة المفاتيح لكتابة الإجابة الصحيحة للسؤال .
ما هو الزمن اللازم ليصل عمله دون تأخير في كل مرة؟
بين خطوات حلك:

$\frac{x}{y}$	$\sqrt{\quad}$	x^y	π	\leq	\geq	\times	\div

المسافة بين البيت والعمل

السؤال 2/2

في أحد الأيام غادر محمد بيته ماشياً الى مكان عمله بمعدل سرعة $70\text{m}/\text{min}$ فوصل إلى عمله متأخراً دقيقة واحدة, وفي اليوم التالي غادر بيته في نفس الوقت وسار بنفس الطريق ولكن بسرعة قدرها $75\text{m}/\text{min}$ فوصل عمله مبكراً دقيقة واحدة .



ارجع إلى نص " المسافة بين البيت والعمل " على اليسار .

استخدم لوحة المفاتيح لكتابة الإجابة الصحيحة للسؤال .

تساءل محمد هل يمكنه ايجاد المسافة بين بيته ومكان عمله بناءً على هذه المعلومات, ساعد محمد في الإجابة على تساؤله في احتساب المسافة بين بيته وعمله؟

المسافة بين بيته وعمله=

.....m

المسافة بين البيت والعمل

السؤال 2/1

في أحد الأيام غادر محمد بيته ماشياً الى مكان عمله بمعدل سرعة 70m/min فوصل إلى عمله متأخراً دقيقة واحدة, وفي اليوم التالي غادر بيته في نفس الوقت وسار بنفس الطريق ولكن بسرعة قدرها 75m/min فوصل عمله مبكراً دقيقة واحدة .



ارجع إلى نص " المسافة بين البيت والعمل " على اليسار .
استخدم لوحة المفاتيح لكتابة الإجابة الصحيحة للسؤال .
ما الزمن اللازم ليصل عمله دون تأخير في كل مرة؟
بين خطوات حلك :

$$d = s \times t$$

$$\text{عند } s = 70 \rightarrow , t = t + 1 \rightarrow d = 70(t + 1)$$

$$\text{وعند } s = 75 \rightarrow , t = t - 1 \rightarrow d = 75(t - 1)$$

$$70(t + 1) = 75(t - 1)$$

$$145 = 5t$$

$$t = 29 \text{ min}$$

المسافة بين البيت والعمل

السؤال 2/2

ارجع إلى نص " المسافة بين البيت والعمل " على اليسار .

استخدم لوحة المفاتيح لكتابة الإجابة الصحيحة للسؤال .

تساءل محمد هل يمكنه إيجاد المسافة بين بيته ومكان عمله بناءً على هذه المعلومات . ساعد محمد في الإجابة عن تساؤله في احتساب المسافة بين بيته وعمله؟

في أحد الأيام غادر محمد بيته ماشياً الى مكان عمله بمعدل سرعة 70m/min فوصل إلى عمله متأخراً دقيقة واحدة , وفي اليوم التالي غادر بيته في نفس الوقت وسار بنفس الطريق ولكن بسرعة قدرها 75m/min فوصل عمله مبكراً دقيقة واحدة .



المسافة بين بيته وعمله =

.....m

تأجير اسطوانات DVD

السؤال 2/1



تعمل نورا في محل يقوم بتأجير اسطوانات DVD وألعاب

الكمبيوتر . ورسوم العضوية السنوية لهذا المحل تكلف 10

زد. رسوم تأجير أسطوانات DVD للأعضاء تقل عن الرسوم لغير الأعضاء كما هو

مبين في الجدول الآتي:

رسوم تأجير اسطوانة DVD واحدة للأعضاء	رسوم تأجير اسطوانة DVD واحدة لغير الأعضاء
2.5 زد	3.20 زد

ارجع إلى نص " تأجير اسطوانات DVD " على اليسار .

استخدم لوحة المفاتيح لكتابة الإجابة الصحيحة للسؤال .

كان شريف عضواً في هذا المحل العام الماضي. وكان مجموع ما أنفقه

العام الماضي 52.50 زد بما فيها رسوم عضويته.

كم كان ما سينفقه شريف لو لم يكن عضواً لتأجير نفس العدد من

اسطوانات DVD ؟

تأجير اسطوانات DVD

السؤال 2/2



تعمل نورا في محل يقوم بتأجير اسطوانات DVD وألعاب الكمبيوتر . ورسوم العضوية السنوية لهذا المحل تكلف 10 زد. رسوم تأجير أسطوانات DVD للأعضاء تقل عن الرسوم لغير الأعضاء كما هو مبين في الجدول الآتي:

رسوم تأجير اسطوانة DVD واحدة للأعضاء	رسوم تأجير اسطوانة DVD واحدة لغير الأعضاء
2.5 زد	3.20 زد

ارجع الى نص " تأجير اسطوانات DVD " على اليسار .
استخدم لوحة المفاتيح لكتابة الإجابة الصحيحة للسؤال .
ما هو أقل عدد من اسطوانات DVD التي يحتاج العضو إلى تأجيرها كي يغطي تكاليف رسوم العضوية
موضحاً خطوات الحل؟

$\frac{x}{y}$ $\sqrt{\quad}$ x^y π \leq \geq \times \div

تأجير اسطوانات DVD

السؤال 2/1



تعمل نورا في محل يقوم بتأجير اسطوانات DVD وألعاب الكمبيوتر . ورسوم العضوية السنوية لهذا المحل تكلف 10 زد. رسوم تأجير أسطوانات DVD للأعضاء تقل عن الرسوم لغير الأعضاء كما هو مبين في الجدول الآتي:

رسوم تأجير اسطوانة DVD واحدة للأعضاء	رسوم تأجير اسطوانة DVD واحدة لغير الأعضاء
2.5 زد	3.20 زد

ارجع إلى نص " تأجير اسطوانات DVD " على اليسار .
استخدم لوحة المفاتيح لكتابة الإجابة الصحيحة للسؤال .
كان شريف عضواً في هذا المحل العام الماضي . وكان مجموع ما أنفقه العام الماضي 52.50 زد بما فيها رسوم عضويته .
كم كان ما سينفقه شريف لو لم يكن عضواً لتأجير نفس العدد من اسطوانات DVD ؟

$52.50 - 10 = 42.50$
 $42.50 \div 2.5 = 17$
 $17 \times 3.20 = 54.4$



تعمل نورا في محل يقوم بتأجير اسطوانات DVD وألعاب

الكمبيوتر . ورسوم العضوية السنوية لهذا المحل تكلف 10

زد. رسوم تأجير أسطوانات DVD للأعضاء تقل عن الرسوم لغير الأعضاء كما هو

مبين في الجدول الآتي:

رسوم تأجير اسطوانة DVD واحدة للأعضاء	رسوم تأجير اسطوانة DVD واحدة لغير الأعضاء
2.5 زد	3.20 زد

ارجع الى نص " تأجير اسطوانات DVD " على اليسار .

استخدم لوحة المفاتيح لكتابة الإجابة الصحيحة للسؤال .

ما هو أقل عدد من اسطوانات DVD التي يحتاج العضو إلى تأجيرها كي

يغطي تكاليف رسوم العضوية

موضحاً خطوات الحل؟

$\frac{x}{y}$
 $\sqrt{\quad}$
 x^y
 π
 \leq
 \geq
 \times
 \div

$3.20x = 2.50x + 10$
 $0.70x = 10, x = 10 / 0.70 = 14.2$ approximately
but whole number solution is required: 15
DVDs

تزايد السكان

السؤال 2/1



التمثيل البياني التالي يبين النمو السكاني لدولة قطر من عام 2004 حتى عام 2009.



Source: Qatar Statistics Authority

ارجع إلى نص "تزايد السكان" على اليسار.

استخدم لوحة المفاتيح لكتابة الإجابة الصحيحة للسؤال .

اعتماداً على البيانات الواردة في التمثيل البياني أجب عن الآتي:

أوجد النسبة المئوية للزيادة في التعداد بين عامي 2004 و 2009

(مقرباً إجابتك لأقرب منزلة عشرية واحدة).

بين خطوات الحل:

تزايد السكان

السؤال 2/2



التمثيل البياني التالي يبين النمو السكاني لدولة قطر من عام 2004 حتى عام 2009.



ارجع إلى نص "تزايد السكان" على اليسار.

استخدم لوحة المفاتيح لكتابة الإجابة الصحيحة للسؤال .

إذا كانت النسبة بين عدد الرجال العاملين إلى عدد النساء العاملات هي 1:3

إذا اعتبرنا إن الفئة العمرية بين 20 سنة و 44 سنة هي فئة العاملين .

ما العدد الفعلي للنساء العاملات من عام 2004 حتى عام 2009 ؟

بين خطوات الحل:

تزايد السكان

السؤال 2/1



التمثيل البياني التالي يبين النمو السكاني لدولة قطر من عام 2004 حتى عام 2009.



Source: Qatar Statistics Authority

ارجع إلى نص " تزايد السكان " على اليسار.

استخدم لوحة المفاتيح لكتابة الإجابة الصحيحة للسؤال .

اعتماداً على البيانات الواردة في التمثيل البياني أجب عن الآتي:

أوجد النسبة المئوية للزيادة في التعداد بين عامي 2004 و 2009


(مقرباً إجابتك لأقرب منزلة عشرية واحدة).

بين خطوات الحل:

$$\frac{1,663,351 - 744,029}{744,029} \times 100 \% = 123.6\%$$



التمثيل البياني التالي يبين النمو السكاني لدولة قطر من عام 2004 حتى عام 2009.



ارجع إلى نص "تزايد السكان" على اليسار.

استخدم لوحة المفاتيح لكتابة الإجابة الصحيحة للسؤال .

إذا كانت النسبة بين عدد الرجال العاملين إلى عدد النساء العاملات هي 1:3

إذا اعتبرنا أن الفئة العمرية بين 20 سنة و 44 سنة هي فئة العاملين.

ما العدد الفعلي للنساء العاملات من عام 2004 حتى عام 2009 ؟
بين خطوات الحل:


$$\text{عدد العاملين} = 0.64 \times 744029 + 0.57 \times 834754$$

$$+ 0.67 \times 1663351 = 2066433.51$$

$$\text{العاملات} = \frac{1}{4} \times 2066433.51 = 516608$$

خزان الزيت

السؤال 2/1



في الشكل أعلاه وعاء اسطواني الشكل يعطوه مخروط مملوء بالزيت.
إذا كان طول قطر قاعدة المخروط مساوياً لقطر قاعدة الاسطوانة
وتم فتح الصمام بين الوعائين.

ارجع إلى نص " خزان الزيت " على اليسار.

استخدم لوحة المفاتيح لكتابة الإجابة الصحيحة للسؤال.

أوجد أقصى ارتفاع يمكن أن يصل إليه مستوى الزيت في الاسطوانة إذا علمت أن


ارتفاع المخروط 12 cm.

بين خطوات الحل:

$\frac{x}{y}$	$\sqrt{\quad}$	x^y	π	\leq	\geq	\times	\div

خزان الزيت

السؤال 2/2



في الشكل أعلاه وعاء اسطواني الشكل يعلوه مخروط مملوء بالزيت.
إذا كان طول قطر قاعدة المخروط مساوياً لقطر قاعدة الاسطوانة
وتم فتح الصمام بين الوعائين.

ارجع إلى نص " خزان الزيت " على اليسار.

استخدم لوحة المفاتيح لكتابة الإجابة الصحيحة للسؤال .

إذا علمت أن طول قطر قاعدة الاسطوانة 28 cm ؛ ما حجم الزيت في الوعاء
المخروطي باللترات مقرباً إجابتك إلى أقرب لتر ؟


اعتبر : $\pi = 3.14$

بين خطوات الحل:

$\frac{x}{y}$	$\sqrt{\quad}$	x^y	π	\leq	\geq	\times	\div

خزان الزيت

السؤال 2/1



في الشكل أعلاه وعاء اسطواني الشكل يعلوه مخروط مملوء بالزيت.
إذا كان طول قطر قاعدة المخروط مساوياً لقطر قاعدة الاسطوانة
وتم فتح الصمام بين الوعائين.

ارجع إلى نص " خزان الزيت " على اليسار.

استخدم لوحة المفاتيح لكتابة الإجابة الصحيحة للسؤال .

أوجد أقصى ارتفاع يمكن أن يصل إليه مستوى الزيت في الاسطوانة إذا علمت أن

ارتفاع المخروط 12 cm.

بين خطوات الحل:

$$\text{حجم المخروط} = \frac{1}{3} \times \pi \times r^2 \times 12 =$$

$$4 \pi r^2 =$$

$$\text{حجم الاسطوانة} = \pi r^2 h =$$


$$4\pi r^2 = \pi r^2 h$$

$$h = 4 \text{ cm}$$

أو أية طريقة حل أخرى صحيحة .

خزان الزيت

السؤال 2/2



في الشكل أعلاه وعاء اسطواني الشكل يعلوه مخروط مملوء بالزيت
إذا كان طول قطر قاعدة المخروط مساوياً لقطر قاعدة الاسطوانة
وتم فتح الصمام بين الوعائين .

ارجع إلى نص " خزان الزيت " على اليسار.

استخدم لوحة المفاتيح لكتابة الإجابة الصحيحة للسؤال.

إذا علمت أن طول قطر قاعدة الاسطوانة 28 cm ما حجم الزيت في الوعاء
المخروطي باللترات مقرباً إجابتك إلى أقرب لتر ؟

اعتبر : $\pi = 3.14$

بين خطوات الحل:

بما أن طول قطر قاعدة الاسطوانة يساوي طول قطر قاعدة
المخروط . فإن طول نصف قطر المخروط = 14 cm

حجم المخروط =

$$\frac{1}{3} \times \pi \times r^2 \times h$$

$$\frac{1}{3} \times 3.14 \times (14)^2 \times 12$$

$$= 2461.76 \text{ cm}^3$$

$$= \frac{2461.76}{1000} = 2.461.76 \text{ L} \approx 2 \text{ L}$$

أو أية طريقة حل أخرى صحيحة .


السؤال الثالث: الحفلة والبث الإعلاني

تنظّم لجنة طلاب الصف السابع في إحدى المدارس حفلاً رياضياً وثقافياً من أجل تمويل تكاليف الاحتفال في نهاية السنة الدراسية من أرباح هذا الحفل.

أراد أعضاء اللجنة أن يبثوا إعلاناً في محطة الراديو المحلية، وهم يفكرون في قيمة المبلغ الذي يجب استثماره في ذلك. ومن المعلوم (حتى حد معين) أنه كلما ازداد عدد مرات بث الإعلان، فإن عدد المشتركين في الحفلة يزداد، وفي أعقاب ذلك يزداد الدخل من بيع التذاكر، لكن من ناحية ثانية، فإنَّ ازدياد عدد مرات البث يؤدي إلى زيادة تكاليف الإعلان. علماً بأن سعر بث

الإعلان لمرة واحدة هو 100 ريال، وكل نشاط آخر يتم بتطوع، لذا لا توجد تكاليف إضافية.

أمامكم خطان بيانيان:



يصف الخط البياني 1 العلاقة بين عدد مرات البث، وبين الدخل من بيع التذاكر.

ويصف الخط البياني 2 العلاقة بين عدد مرات البث وبين تكاليف الإعلان.

أ. إذا قرر أعضاء لجنة الصفوف أن يبثوا الإعلان 20 مرة، فكم يكون - بالتقريب - الربح المتوقع الذي يُستثمر في تمويل الاحتفال في نهاية السنة الدراسية؟

ب. اكتبوا "صحيح" أو "غير صحيح" بجانب كل بند، ثم عللوا إجاباتكم.

(1) إذا لم تُبث الإعلان، لن يكون هناك دخل من بيع التذاكر.

(2) كلما ازداد عدد مرات البث، يزداد الدخل من بيع التذاكر.

(3) كلما ازداد عدد مرات البث، يزداد الربح المتحقق للاحتفال في نهاية السنة الدراسية.

(4) البث الـ 40 لا يساهم في الربح.

ت. ما عدد مرات البث - بالتقريب - الذي من الأفضل أن يتفق عليه أعضاء لجنة الصفوف، لكي يجنوا الربح الأكبر؟ صف طريقة الحل.

الحفلة والبث الدعائي

ينظّم لجنة طلاب الصف السابع في ا حد المدارس حفلاً رياضياً وثقافياً من أجل تمويل تكاليف الاحتفال في نهاية السنة الدراسية من أرباح هذا الحفل.



أراد أعضاء اللجنة أن يبثوا دعاية في محطة الراديو المحلية، وهم يفحصون المبلغ الذي يجب استثماره في ذلك. من المعلوم (حتى حد معين) أنه كلما ازداد عدد مرات بث الدعاية، فإن عدد المشتركين في الحفلة يزداد وفي أعقاب ذلك يزداد الدخل من بيع التذاكر، لكن من ناحية ثانية، إنَّ ازدياد عدد مرات البث يؤدي إلى زيادة تكاليف الدعاية. سعر بث دعاية لمرة واحدة هو 100 ريال ، وكل نشاط آخر يتم بتطوع، لذا لا توجد تكاليف إضافية.

أمامكم خطان بيانيان:



يصف الخط البياني 1 العلاقة بين عدد مرات البث وبين الدخل من بيع التذاكر.

ويصف الخط البياني 2 العلاقة بين عدد مرات البث وبين تكاليف الدعاية.

أ. إذا قرر أعضاء لجنة الصفوف أن يبثوا الدعاية 20 مرة، فكم يكون - بالتقريب - الربح المتوقع ؟

الحل : الربح = الكلفة - الدخل

$$P = 7000 - 2000 = QR 5000$$

ب. اكتب "صحيح" أو "غير صحيح" بجانب كل بند.

(1) إذا لم تُبث الدعاية، فإنه لا يوجد دخل من بيع التذاكر. (فسر اجابتك).

الحل : غير صحيح يوجد دخل قيمته QR 2000 موضح من الرسم البياني

(2) كلما ازداد عدد مرات البث، يزداد الدخل من بيع التذاكر. (فسر اجابتك).

الحل : صحيح من خلال تزايد الخط البياني الخاص بالدخل

(3) كلما ازداد عدد مرات البث، يزداد الربح المعد للاحتفال في نهاية السنة الدراسية.

الحل : صحيح

(4) إذا كان عدد مرات البث الدعائي للحفل هو 40 , فإنه لا يوجد ربح للحفل . (فسر اجابتك).

الحل : غير صحيح , حيث انه عند 40 مرة بث يكون الربح قيمته

$$= 10000 - 4000 = QR 6000$$

ت. ما هو عدد مرات البث – بالتقريب – الذي من الأفضل أن ينفق عليه أعضاء لجنة

الصفوف، لكي يجنوا الربح الأكبر؟ وضح اجابتك.

الحل :

عدد مرات البث	الدخل التقريبي	التكاليف	الربح
0	2000	0	2000
5	2100	500	1600
10	3000	1000	2000
15	4500	1500	3000
20	7000	2000	5000
25	8600	2600	6000
30	9600	3000	6600
35	9950	3500	6450
40	10000	4000	6000

افضل ربح عند عدد مرات بث 30 مرة

السؤال الثاني : الطاولة المستديرة




خالد مدير عام إحدى الشركات الكبرى، أراد عقد اجتماع لمديري الفروع والأقسام المختلفة لهذه الشركة .


يوجد في قاعة الاجتماعات طاولة دائرية كبيرة نصف قطرها هو 2.75 m مفرغة من الداخل. كل فرد يحتاج إلى 45 cm من محيط الدائرة ليجلس حول الطاولة.

1- توقع خالد ان يجلس 50 شخصاً حول الطاولة.
بين باستخدام العمليات الحسابية فيما إذا كان توقع خالد صحيحاً أم لا ؟

2- افترض أن الاشخاص حول الطاولة يمكن أن يصلوا إلى عمق 1.5 m من الطاولة.
أوجد المساحة الكلية من الطاولة التي يمكن ان يستفيد منها جميع الاشخاص حول الطاولة



الطاولة المستديرة



خالد مدير عام احدى الشركات الكبرى اراد عقد اجتماع لمدراء الفروع والاقسام المختلفة لهذه الشركة .

يوجد في قاعة الاجتماعات طاولة دائرية كبيرة نصف قطرها هو 2.75 m مفرغة من الداخل

. كل فرد يحتاج الى 45 cm من محيط الدائرة ليجلس حول الطاولة.

1- يقول خالد انه يمكن ان يجلس 50 فرد حول الطاولة.


بين باستخدام العمليات الحسابية فيما اذا كان قول خالد صحيح ام لا ؟

$$r=2.75m=275cm$$

$$c = 2\pi r$$

$$c = 2 \times 3.14 \times 275 = 1725 \text{ cm}$$

$$\text{شخص} \approx 38.4 = 1725 \div 45 = \text{عدد الاشخاص}$$



2- افترض ان الاشخاص حول الطاولة ممكن ان يصلوا الى عمق 1.5 m من الطاولة اوجد المساحة الكلية من الطاولة التي يمكن ان يستفيد منها جميع الاشخاص حول الطاولة .

$$A_1 = \pi r^2$$

$$A_1 = 3.14 \times (2.75)^2 = 23.74625 \text{ cm}^2$$


$$A_2 = \pi r^2$$

$$A_2 = 3.14 \times (1.25)^2 = 4.90625 \text{ cm}^2$$

= المساحة الكلية من الطاولة التي يمكن ان يستفيد منها جميع الاشخاص $= A_1 - A_2$

$$= 23.74625 - 4.90625 = 18.8 \text{ cm}^2$$

السؤال الخامس : تحويل العملة



يريد أحمد أن يسافر من الدوحة إلى بريطانيا لمدة شهر بهدف السياحة، وكان بحاجة إلى تحويل العملة من الريال القطري إلى الجنيه البريطاني.

عندما ذهب أحمد إلى محل الصرافة وجد أن نسبة التحويل بين الريال القطري والجنيه البريطاني: الجنيه البريطاني = 5.8 ريالاً قطرياً.

قام أحمد بتحويل 20000 ريال قطري إلى جنيهات بريطانية بهذه النسبة.


أولاً : كم المبلغ الذي سيحصل عليه أحمد عند تحويله للمبلغ الذي معه لأقرب جنيه؟

ثانياً : عند عودته من بريطانيا إلى الدوحة بعد شهر، وجد أحمد أنه تبقى معه 400 جنيهاً. فقام بتحويلها إلى الريال القطري حيث كانت نسبة التحويل بين الريال القطري والجنيه البريطاني هي:

الجنيه البريطاني = 6.75 ريالاً قطرياً.

احسب المبلغ الذي سيحصل عليه أحمد عند تحويله للمبلغ المتبقي معه.

تحويل العملة



يريد أحمد أن يسافر من الدوحة الى بريطانيا لمدة شهر بهدف السياحة. وكان بحاجة الى تحويل العملة من الريال القطري الى الباوند البريطاني.

عندما ذهب أحمد الى محل الصرافة وجد أن نسبة التحويل بين الريال القطري والباوند البريطاني هي:

الباوند البريطاني = 5.8 ريال قطري.

قام أحمد بتحويل 20000 ريال قطري الى باوند بريطاني بهذه النسبة.

اولاً : كم المبلغ الذي سيحصل عليه أحمد عند تحويله للمبلغ الذي معه لأقرب جنية؟

الحل :

ريال قطري	باوند
5.8	1
20000	x

$$x = \frac{20000}{5.8} = 3448.3$$

=3448 bound

ثانياً :

عند عودته من بريطانيا الى الدوحة بعد شهر، وجد أحمد انه تبقى معه 400 باوند. فقام بتحويلها الى الريال القطري حيث كانت نسبة التحويل بين الريال القطري والباوند البريطاني هي:

الباوند البريطاني = 5.76 ريال قطري.

. أحسب المبلغ الذي سيحصل عليه عند تحويله للمبلغ المتبقي معه.

ريال قطري	باوند
5.76	1
x	400

$$X=400 \times 5.76=2304QR$$

ثالثاً: احسب قيمة خسارته عند تحويل ما تبقى معه من باوند بريطاني الى ريال قطري؟

: الحل

$$400 \times 5.8 - 2304 = 16 QR$$

السؤال الرابع: مجموعات جوائز حبيبات الحلوى



لدى عمر مجموعة من حبوب الحلوى قام بترتيبها على حسب النمط الموضح في الشكل الآتي ليقوم بتوزيعها على مجموعة من المتسابقين مكونة من 13 متسابقاً على أن يأخذ المتسابق في المركز الأول المجموعة التي تحوي أكبر عدد من الحبوب، والمتسابق في المركز الثاني المجموعة الأقل منها وهكذا حتى المتسابق في المركز الأخير يأخذ المجموعة التي تحوي 3 حبيبات .

			,
عدد حبيبات المتسابق في المركز الاخير	عدد حبيبات المتسابق في المركز قبل الاخير		

(أ) اكمل الجدول التالي:

عدد الحبيبات	مركز المتسابق
	الأول
	الثاني
	الثالث
	الرابع

ب) كم عدد الحبيبات في مجموع المتسابق في المركز العاشر؟

ج) ما مركز المتسابق الذي يأخذ في مجموعته 27 حبيبة حلوى؟

د) اكتب تعبيراً جبرياً يمثل عدد الحبيبات في مجموعة متسابق مركزه (N)

مجموعات جوائز حبيبات الحلوى



لدى عمر مجموعة من حبوب الحلوى واقام بترتيبها على حسب النمط التالي ليقوم بتوزيعها على مجموعة من المتسابقين مكونة من 13 متسابق على ان يأخذ المتسابق في المركز الأول المجموعة التي تحوي اكبر عدد من الحبوب والمتسابق في المركز الثاني المجموعة الاقل منها وهكذا حتى المتسابق في المركز الأخير يأخذ المجموعة التي تحوي 3 حبيبات



الحل :

رقم المتسابق	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
عدد الحبيبات	39	36	33	30	27	24	21	18	15	12	9	6	3

أ) اكمل الجدول التالي:

عدد الحبيبات	مركز المتسابق
39	الاول
36	الثاني
33	الثالث
30	الرابع

ب) كم عدد الحبيبات في مجموع المتسابق في المركز العاشر ؟ 12

ج) ما مركز المتسابق الذي يأخذ في مجموعته 27 حبيبة حلوى ؟ الخامس

د) اكتب تعبير جبري يمثل عدد الحبيبات في مجموعة متسابق مركزه n حيث ان $1 \leq n \leq 13$

39 , 36 , 33 , 30 , 27 , 24 ,

التعبير الجبري : $T_n = 42 - 3n$

مسائل PISA

بطولات رياضية



شاركت خمسة فرق في بطولة الدوري لكرة القدم في أحد الأعوام ، وكانت انجازات هذه الفرق مبينة بالجدول أدناه ، أي هذه الفرق أفضل انجازا ؟ ولماذا ؟

الفريق	عدد مرات الفوز	عدد المباريات التي أجريت
أ	١٣	٢٠
ب	١٤	٢٠
ج	١٦	٢١
د	١٥	١٨
هـ	١٢	١٧

الكثافة السكانية



تقاس الكثافة السكانية بعدد الأفراد الذين يعيشون في مساحة معينة ، فإذا كان عدد الأفراد الذين يعيشون في مدينة ما يبلغ ١٥٠٠٠٠٠ نسمة لكل كيلو متر مربع .

السؤال ١

ما عدد الأفراد الذين يعيشون في ٢,٢٥ كيلو متر مربع ؟

السؤال ٢

إذا كان عدد سكان مدينة ما ٣٧٥٠٠٠٠٠ نسمة ، كم تكون مساحة هذه المدينة ؟

دهان سور المنزل




يستطيع حسن دهان ١٢ م^٢ من سور بيته في ٤ دقائق ، إذا كانت مساحة السور ٣٨٤ م^٢ ، فبعد كم دقيقة سيبقى عليه دهان ٩٦ م^٢ فقط .



أرض

أرض مستوية مستطيلة الشكل محيطها ٤٠ مترا ، يراد زراعتها بالقمح ، فما أكبر مساحة يمكن زراعتها ؟



القرص الدوار

يلعب حسن وزيد لعبة القرص الدوار المبين في الشكل المجاور ، بحيث يربح حسن الجائزة اذا وقف المؤشر على عدد فردي ، ويربح زيد الجائزة اذا وقف المؤشر على عدد زوجي ، من برأيك فرصته أكبر للفوز؟ ولماذا؟

خزان زيوت

خزان مكعب الشكل في مصنع لتعبئة الزيوت طول حرفه ٨ أمتار ، يراد تعبئة عبوات من الزيوت مكعبة الشكل طول حرف كل منها س مترا ، فاذا ملأ العمال ١٢٥ عبوة من الزيت ، ما المقدار الذي يمثل حجم الزيت المتبقي من الخزان ؟

قطارات

غادر قطار محطة بسرعة ٨٠ كلم / س ، وبعد ساعتين غادر قطار ثان المحطة نفسها وبالاتجاه نفسه بسرعة ١٠٠ كلم / س ، بعد كم ساعة يلحق القطار الثاني بالقطار الأول ؟

حاوية نقل بضائع


حاوية على شكل متوازي مستطيلات لنقل بضائع أبعادها من الداخل هي ٣م ، ١,٥م ، ٢م ، يراد تعبئتها بصناديق من الكرتون على شكل متوازي مستطيلات أبعاد الصندوق من الخارج هي ٤٠سم ، ٢٥سم ، ٢٥سم .

السؤال ١

ما هو أكبر عدد ممكن من الصناديق يمكن تعبئتها في الحاوية ؟


السؤال ٢

احسب تكلفة النقل إذا كان تكلفة نقل الكرتون الواحد ٠,٧٥ ديناراً .



شواء

يبين الشكل المجاور شبكة للشواء ، يراد تقويتها بإضافة القطعتين المعدنيتين أ ب ، ج د ، احسب طول القطعتين إذا كان طول نصف قطر اطار الشبكة ٢١ سم وان كلا من القطعتين تبعد ١٢ سم عن المركز



نفق

نفق مدخله على شكل نصف دائرة قطرها ١٦ متراً ، ما هو أقصى ارتفاع مسموح به لمرور عربة على شكل متوازي مستطيلات عرضها يساوي ارتفاعها ؟

ضريبة الدخل

إذا علمت أن الضريبة على الدخل الخاضع للضريبة تحسب كما في الجدول التالي

مقدار الضريبة	الدخل السنوي بالدينار
٥٠ فلسا على كل دينار	أقل من ٢٠٠٠
١٠٠ دينار + ١٠٠ فلس عن كل دينار يزيد عن ٢٠٠٠	من ٢٠٠٠ إلى أقل من ٦٠٠٠
٥٠٠ دينار + ٢٠٠ فلس عن كل دينار يزيد عن ٦٠٠٠	من ٦٠٠٠ إلى أقل من ١٤٠٠٠
٢٠٠٠ دينار + ٢٥٠ فلسا عن كل دينار يزيد عن ١٤٠٠٠	أكثر من أو يساوي ١٤٠٠٠

السؤال ١

احسب ضريبة الدخل الواجبة على تاجرين أحدهما قدر دخله السنوي بعشرة آلاف دينار والآخر قدر دخله بخمسة الاف دينار

السؤال ٢

اكتب قاعدة الاقتران الذي يمثل ما يدفعه المواطن الخاضع للضريبة .

السؤال ٣

إذا كانت ضريبة الدخل ١٧٠٠ ديناراً ، احسب الدخل السنوي الذي خضع لتلك الضريبة .
موضحا اجابتك .

البطاريات الجافة


يريد تاجر استيراد كمية من البطاريات الجافة من نوعين من البطاريات النوع (أ) ، والنوع (ب) ،
إذا قدمت له نتائج اختبار العينتين ، فكانت كما في الجدول أدناه

العينة	(أ)	(ب)
عدد البطاريات الصالحة	٩	١١
عدد البطاريات غير الصالحة	٣	٤

أي البطاريات يختار التاجر ؟ برر اجابتك

مخبز

يقدم أحد المخابز عرضاً لحجمين من الكعك ، في العرض الأول : يبيع الكعكة الواحدة من الحجم الكبير بـ ٤ دنانير ، وفي العرض الثاني : يبيع ثلاثة كعكات من الحجم الصغير بـ ٤ دنانير ، أي العرضين أفضل ؟ برر اجابتك .



الاجابات

بطولات رياضية

الجواب : د ، له أكثر معدل فوز $15 \div 18 = 0,83$

الكثافة السكانية

السؤال ١

الجواب : ٣٣٧٥٠٠ نسمة

السؤال ٢

الجواب : ٢٥ كيلو متر مربع

دهان سور المنزل

الجواب : ٩٦ دقيقة

أرض

الجواب : ١٠٠ متر مربع

القرص الدوار

الجواب : متساوية ، لان لهما نفس العدد .

خزان زيوت

الجواب : ٥١٢ - ١٢٥ س^٣

قطارات

الجواب : ٤ ساعات

حاوية نقل بضائع

السؤال ١

الجواب : ٣٦٠ كرتونة

السؤال ٢

الجواب : ٢٧٠ ديناراً

شواء

الجواب : تقريبا ١٨ سم

نفق

الجواب : ١٤,٣ م

ضريبة الدخل

السؤال ١

الجواب : ١٣٠٠ ، ٤٠٠

السؤال ٢

الجواب :

$$\left. \begin{array}{l} ٢٠٠٠٠ > س > ٠ ، \\ ٦٠٠٠٠ > س \geq ٢٠٠٠٠ ، \\ ١٤٠٠٠٠ > س \geq ٦٠٠٠٠ ، \\ ١٤٠٠٠٠ \leq س ، \end{array} \right\} \begin{array}{l} ٠,٥٠ س \\ ٠,١ + ١٠٠ (س - ٢٠٠٠٠) \\ ٠,٢ + ٥٠٠ (س - ٦٠٠٠٠) \\ ٠,٢٥ + ٢٠٠٠ (س - ١٤٠٠٠٠) \end{array} = \text{ق(س)}$$

السؤال ٣

الجواب : ١٢٠٠٠٠ ديناراً

البطاريات الجافة

الجواب : أ ، لأن احتمال الصالح في (أ) أكبر منه في (ب)

مخبز

الجواب : العرض الثاني ، لأن ثلاث كعكات صغيرات = ٢٤ بوصة ، بينما كعكة واحدة كبيرة = ١٢ بوصة

السؤال الأول : نكهات الآيس كريم



(الصورة ليست متطابقة مع الدلائل المتوفرة في السؤال)

اشترت ريم من محل الآيس كريم 5 كرات من الآيس كريم بنكهات مختلفة ، والنكهات الخمس هي :
التوت الأزرق ، الشوكولاتة ، الفراولة ، الفانيليا ، والعلكة .

احتارت ريم في ترتيب نكهات الآيس كريم من الأعلى إلى الأسفل ، فهي لا تعرف الترتيب الحقيقي للنكهات المختلفة .

ومع ذلك هناك بعض الدلائل التي تشير إلى ترتيب النكهات من الأعلى إلى الأسفل وهي :

- النكهة السفلية مكونة من 8 حروف.
- كرة نكهة الفانيليا تلامس كلاً من كرة الشوكولاتة و كرة التوت الأزرق.
- الفانيليا أسفل كرة الشوكولاتة، ولكنها فوق كرة العلكة.

بإمكانك استخدام المنطق لمساعدة ريم في ترتيب الكرات من خلال النكهة موضحاً إجابتك في الرسم.



مستعيناً بما سبق، إذا انتهت ريم من أكل الكورتين العلويتين فاحسب عدد السرعات الحرارية لهما ، كما هو موضح بالجدول الآتي :

السرعات الحرارية	النكهة
270	التوت الأزرق
220	الفراولة
330	الشوكولاتة
260	العلكة
280	الفانيليا

السؤال الأول : نكهات الآيس كريم



(الصورة ليست متطابقة مع الدلائل المتوفرة في السؤال)

اشترت ريم من محل الآيس كريم 5 كرات من الآيس كريم بنكهات مختلفة ، والنكهات الخمس هي :
التوت الأزرق ، الشوكولاتة ، الفراولة ، الفانيليا ، والعلكة .


احتارت ريم في ترتيب نكهات الآيس كريم من الأعلى إلى الأسفل ، فهي لا تعرف الترتيب الحقيقي للنكهات المختلفة .

ومع ذلك هناك بعض الدلائل التي تشير إلى ترتيب النكهات من الأعلى إلى الأسفل وهي :

- النكهة السفلية مكونة من 8 حروف.
- كرة نكهة الفانيليا تلامس كلاً من كرة الشوكولاتة و كرة التوت الأزرق.
- الفانيليا أسفل كرة الشوكولاتة، ولكنها فوق كرة العلكة.

بإمكانك استخدام المنطق لمساعدة ريم في ترتيب الكرات من خلال النكهة موضحاً إجابتك في الرسم .

الحل :



مستعيناً بما سبق، إذا انتهت ريم من أكل الكورتين العلويتين فاحسب عدد السعرات الحرارية لهما ، كما هو موضح بالجدول الآتي :

السعرات الحرارية	النكهة
270	التوت الأزرق
220	الفراولة
330	الشوكولاتة
260	العلكة
280	الفانيليا

$$330 + 280 = 610 = \text{عدد السعرات الحرارية في الكرتين العلويتين}$$






قارّات

قَدِّر مساحة القارة المتجمدة الجنوبية من الخارطة الآتية، مستخدماً مقياس رسم الخارطة.
بيِّن خطوات الحل ووضح كيف قمت بالتقدير .
(يمكنك الرسم على الخارطة إن كان ذلك يساعدك في التقدير)




مثلثات

ضع دائرة حول رمز الشكل الذي يحقق الوصف الآتي :
 المثلث أب ج قائم الزاوية في ج .
 القطعة ج د أقصر من القطعة أ ج ، م منتصف القطعة أ ب ،
 ن منتصف القطعة ب ج . د نقطة داخل المثلث بحيث أن
 القطعة م ن أطول من القطعة م د .



مشي



تبين الصورة آثار قدمي رجل ماش . طول الخطوة خ يساوي المسافة بين نهايتي أثري قدم متتاليتين.
بالنسبة للرجال تحدد العلاقة التقريبية بين ع (عدد الخطوات في الدقيقة) و طول الخطوة بالأمتار خ بالقانون :


$$140 = \frac{ع}{خ}$$

سؤال ١: مشي
إذا انطبق هذا القانون على مشي هشام وكان هشام يمشي ٧٠ خطوة في الدقيقة فما طول خطوة هشام؟ بيّن الحل .


سؤال ٢: مشي
يعلم بشير أن طول خطوته يساوي ٠.٨٠ من المتر وينطبق هذا القانون على مشي بشير، احسب سرعة مشي بشير بالمتر/الدقيقة و بالكيلومتر / الساعة. بيّن الحل .

النَّجَار


لدى نجار ٣٢ متراً من الخشب ، يريد أن يحيط بها حوضاً في حديقته.
و هو يفكر في التصاميم الآتية لهذا الحوض :




التصميم ب



التصميم أ



التصميم د




التصميم ج

ضع دائرة حول " نعم " أو " لا " مقابل كل تصميم في الجدول التالي لتبين ما إذا ممكناً عمل الحوض باستخدام ٣٢ متراً من الخشب .


هل يمكن عمل الحوض بهذا التصميم باستخدام ٣٢ متراً من الخشب؟	تصميم الحوض
نعم / لا	التصميم أ
نعم / لا	التصميم ب
نعم / لا	التصميم ج
نعم / لا	التصميم د

دردشة على الإنترنت

يقوم مارك (من سيدني في استراليا) أحياناً بالدردشة على الإنترنت مع صديقه هانز (من برلين في ألمانيا). وعليهما أن يشبكا مع الإنترنت في نفس الوقت ليتمكنا من إجراء الدردشة. بحث مارك في جدول التوقيت العالمي لايجاد الوقت المناسب للدردشة فوجد الآتي:



غرينتش
١٢ منتصف الليل



برلين
١ : ٠٠ صباحاً



سيدني
١٠ : ٠٠ صباحاً

سؤال ١ : دردشة
ماذا تكون الساعة في برلين عند الساعة ٧ : ٠٠ مساءً في سيدني ؟

سؤال ٢ : دردشة
لا يستطيع مارك و هانز الدردشة بين ٩ : ٠٠ صباحاً و ٣ : ٠٠ مساءً بالتوقيت المحلي في بلديهما بسبب ذهابهما للمدرسة .
كذلك لا يمكنهما الدردشة من ١١ : ٠٠ مساءً وحتى ٧ : ٠٠ صباحاً بالتوقيت المحلي في بلديهما لأنهما سيكونا نائمين .
متى يكون الوقت مناسباً لمارك و هانز لإجراء الدردشة؟ دَوِّن الوقت المحلي في الجدول .

المكان	الوقت
سيدني	
برلين	

الطاقة

حاجة الجسم اليومية من الطاقة بالنسبة للبالغين

النساء	الرجال	مستوى النشاط	العمر (بالسنوات)
كمية الطاقة اللازمة (كيلو جول)	كمية الطاقة اللازمة (كيلو جول)		
٨٣٦٠	١٠٦٦٠	خفيف	من ١٨ إلى ٢٩
٨٧٨٠	١١٠٨٠	متوسط	
٩٨٢٠	١٤٤٢٠	ثقيل	
٨٥٧٠	١٠٤٥٠	خفيف	من ٣٠ إلى ٥٩
٨٩٩٠	١٢١٢٠	متوسط	
٩٧٩٠	١٤٢١٠	ثقيل	
٧٥٠٠	٨٧٨٠	خفيف	٦٠ فأكثر
٧٩٤٠	١٠٢٤٠	متوسط	
٨٧٨٠	١١٩١٠	ثقيل	

مستوى النشاط حسب المهنة

خفيف:	متوسط:	ثقيل:
بائع في محل	مدرس	عامل إنشاءات
موظف في مكتب	بائع متجول	عامل كادح
ربة بيت	ممرض	رياضي

الطاقة في كل طبق (كيلو جول) بتقدير جمانة	قائمة الأطعمة
٣٥٥	شوربة الطماطم
٥٨٥	شوربة الفطر
٩٦٠	دجاج مكسيكي
٧٩٥	دجاج بالخل
٩٢٠	كباب
٧٥٠	سلطة البطاطا
٣٣٥	سلطة اسبانية
٤٨٠	سلطة مغربية
١٣٨٠	سلطة فواكه
١٠٠٥	كعك الجبن
٥٦٥	كعكة الجزر
١٥٩٠	بالشوكولاته
١٤٧٠	بالفانيليا

كما أن المطعم يقدم وجبة خاصة بسعر ثابت

وجبة السعر الثابت

(٥٠ زد)

شوربة الطماطم

دجاج بالخل

كعكة الجزر

تتعلق المسائل الآتية باختيار الطعام المناسب لتلبية حاجة الجسم من الطاقة في دولة تدعى زدلاندا. ويبين الجدول الأول حاجة الجسم اليومية من الطاقة بالكيلوجول لأناس مختلفين. (الكيلوجول وحدة مترية لقياس الطاقة مماثلة للكالوري)

سؤال ١ : الطاقة

السيد داود السعيد مدرس عمره ٤٥ عاماً. ما حاجته اليومية من الطاقة بالكيلوجول ؟

سؤال ٢ : الطاقة

عمر لاعبة القفز العالي جمانة جبران ١٩ عاماً. دعاها بعض أصدقائها ذات ليلة لتناول طعام العشاء في المطعم الذي يقدم الأطعمة المذكورة في القائمة في الصفحة السابقة. تسجل جمانة بالعادة ماتأكله كل يوم. إذا كان مجموع الطاقة في الطعام الذي تناولته جمانة قبل العشاء ذلك اليوم يساوي ٧٥٢٠ كيلوجول ولا تريد أن تزيد أو تقل الطاقة التي تأخذها عن حاجة جسمها للطاقة بأكثر من ٥٠٠ كيلوجول فهل تسمح وجبة السعر الثابت بتحقيق رغبة جمانة في بقاء الطاقة التي تأخذها ضمن حدود زائد أو ناقص ٥٠٠ كيلوجول عن حاجتها من الطاقة ؟
بين الحل .

أفلام

مسرح سينما تيفولي

هاتف الحجز المسبق: ٥٢٣٤ ٨٩٢٢

هاتف على مدار ٢٤ ساعة: ٥٢٣ ٨٩٢٣

يوم الصفقة الثلاثاء : كافة الأفلام ٥ دنانير

تعرض الأفلام الآتية ابتداءً من يوم الجمعة ٢٣ آذار ولمدة اسبوعين

أطفال في الشبكة ١٣ دقيقة	بوكامن ١٠٥ دقائق	الغز ١٤٤ دقيقة	المفترس ١٤٨ دقيقة
٢ : ٠٠ مساءً (الاثنين-الجمعة) ٩ : ٣٥ مساءً (السبت/ الاحد)	١ : ٤٠ مساءً (يومياً) ٤ : ٣٥ مساءً (يومياً)	٣ : ٠٠ مساءً (الاثنين-الجمعة) ٦ : ٠٠ مساءً (السبت/ الاحد)	٦ : ٣٠ مساءً (يومياً)
مناسب للأشخاص من عمر ١٢ سنة فما فوق	مناسب للأشخاص من عمر ١٨ سنة فما فوق	مناسب للأشخاص من عمر ١٢ سنة فما فوق	مناسب للأشخاص من عمر ١٨ سنة فما فوق
مناسب لجميع الأعمار	مناسب للأشخاص من عمر ١٢ سنة فما فوق	مناسب للأشخاص من عمر ١٢ سنة فما فوق	مناسب لجميع الأعمار

يدور السؤال حول ايجاد الوقت و التاريخ المناسبين للذهاب إلى السينما .
يريد اسحق البالغ من العمر ١٥ عاماً أن يرتب موعداً للذهاب إلى السينما مع اثنين من أصدقائه المماثلين له في العمر خلال عطلة مدرسية مدتها اسبوع واحد تبدأ يوم السبت ٢٤ آذار وتنتهي يوم الأحد الأول من نيسان . سأل اسحق صديقيه عن التاريخ و الوقت المناسبين وتلقى منهما المعلومات الآتية:
قال فريد : " عليّ البقاء في البيت يومي الاثنين و الثلاثاء بين ٣ : ٠٠ و ٣ : ٣٠ مساءً لأن لديّ تمرين موسيقي "
وقال سليم : " سأزور جدتي أيام الأحد فلا يمكننا الذهاب أيام الأحد ، ولا أريد مشاهدة فيلم بوكامن فقد شاهدته سابقاً "

يصر والدا اسحق على أن بإمكانه فقط مشاهدة الأفلام المناسبة لعمره وأن لا يعود للبيت ماشياً ،
وأنهما سيعيدا الأولاد من المسرح بسيارتهما في أي وقت قبل العاشرة مساءً .
تفحص اسحق مواعيد عرض الأفلام في فترة العطلة فوجد المعلومات في الجدول أعلاه .


سؤال ١ : أفلام

بنا على المعلومات التي وجدها اسحق حول الأفلام و المعلومات التي تلقاها من صديقيه،
أي الأفلام الستة يمكنهم مشاهدتها؟ ضع دائرة حول " نعم " أو " لا " مقابل كل فيلم .

الفيلم	هل بإمكان الأولاد مشاهدته ؟
أطفال في الشبكة	نعم / لا
وحوش من الأعماق	نعم / لا
المفترس	نعم / لا
بوكامن	نعم / لا
الغز	نعم / لا
ملك البرية	نعم / لا

سؤال ٢ : أفلام

إذا قرر الأولاد الثلاثة حضور فيلم " أطفال في الشبكة " فأي المواعيد الآتية يناسبهم ؟
أ) الاثنين ٢٦ آذار . ب) الأربعاء ٢٨ آذار . ج) الجمعة ٣٠ آذار .
د) السبت ٣١ آذار . هـ) الأحد الأول من نيسان .





يمثل المخطط أعلاه جزءاً من شبكة مواصلات إحدى مدن دولة زلاند مكوناً من ثلاثة خطوط للسكك الحديدية. كما يظهر في الرسم مكانك الحالي و المكان الذي عليك أن تذهب إليه . تعتمد الأجرة على عدد المحطات التي تمر بها (لا تحتسب المحطة التي تبدأ منها الرحلة) تكلف كل محطة تمر بها ١ زد . زمن الرحلة بين كل محطتين متتاليتين يساوي دقيقتين تقريباً . الزمن المستغرق في الإنتقال من خط إلى آخر عند التقاطع يساوي ٥ دقائق تقريباً .

سؤال ١ : مواصلات


يبين الرسم المحطة التي أنت فيها حالياً " من هنا " و تلك التي تريد الذهاب إليها " إلى هنا " . حدد على الرسم الطريق الأفضل من حيث الكلفة و الزمن ، واكتب أدناه الأجرة التي ستدفعها و الزمن التقريبي للرحلة .

منظر غرفة


أي مخطط يعد أفضل تمثيل لرسم الغرفة؟




(أ)



(ب)



(ج)



(د)


جولة بالسيارة

ذهبت ليلي في جولة بسيارتها، مرت قطة مسرعة أمام السيارة أثناء الجولة، داست ليلي الفرامل بقوة ولم تصب القطة.

انزعجت ليلي وقررت العودة إلى البيت.

يمثل الرسم البياني التالي سجلاً مبسطاً لسرعة السيارة في الرحلة.

جولة ليلي



(١) كم كانت أقصى سرعة للسيارة أثناء الجولة؟

الجواب : أقصى سرعة..... كم/س

(٢) كم كان الوقت عندما داست ليلي الفرامل بقوة لتجنب القطة؟

الجواب :

(٣) هل كانت الطريق التي سلكتها ليلي في عودتها للبيت أقصر من المسافة التي قطعتها من البيت إلى المكان الذي صادفت فيه القطة؟ اعط تفسيراً لإجابتك .

الأشن

تذوب بعض الجبال الجليدية نتيجة ارتفاع الحرارة في الكون بشكل عام، وبعد مضي اثني عشر عاماً على اختفاء الجليد تبدأ نباتات صغيرة تدعى الأشنات بالنمو فوق الصخور. ينمو الأشن على شكل دائرة تقريباً. وتحدد العلاقة التقريبية بين قطر الدائرة وعمر الأشن بالقانون التالي:

$$ق = ٧ \times \sqrt{١٢ - ن} ، ن \leq ١٢$$

حيث ق : قطر الدائرة بالمليمترات ، ن عدد السنوات بعد اختفاء الجليد.

سؤال ١ : الأشن


مستخدماً القانون ، احسب طول قطر الأشن بعد ١٦ سنة من اختفاء الجليد. بين الحسابات.

سؤال ٢ : الأشن

قاست سلوى طول قطر أحد نباتات الأشن فكان ٣٥ مليمترًا ، كم سنة مضت على اختفاء الجليد في هذا الموقع ؟ بين الحسابات.

قطع النقد

طلب منك أن تصمم مجموعة جديدة من قطع النقد. ستكون جميع القطع دائرية ولونها فضي ولكن بأطوال أقطار مختلفة.




وجد الباحثون أن نظام قطع النقد النموذجي يلبي المتطلبات الآتية:

- يجب أن لا يقل طول قطر قطعة النقد عن ١٥ مم ولا يزيد عن ٤٥ مم .
- يجب أن يكون طول قطر أي قطعة أكبر من طول قطر القطعة الأصغر منها مباشرة بمقدار ٣٠ ٪ على الأقل .
- تنتج آلات سك النقود قطعاً طول قطر كل منها عدداً صحيحاً من المليمترات (على سبيل المثال يقبل ١٧ مم ولكن لا يقبل ١٧.٣ مم)

سؤال ١ : قطع النقود

صمم مجموعة من قطع النقود تلي المتطلبات السابقة. إبدأ بقطعة طول قطرها ١٥ مم، وبحيث تحتوي المجموعة على أكبر عدد ممكن من القطع .

أشكال



أ ب ج

سؤال ١ : أي الأشكال أعلاه له أكبر مساحة ؟ علل إجابتك .

سؤال ٢ : صف طريقة لتقدير مساحة الشكل أ .

سؤال ٣ : صف طريقة لتقدير محيط الشكل أ .

فناء

يريد نامق أن يرصف فناء بيته ، إذا كان هذا الفناء مستطيل الشكل بعرض ٣ أمتار وطول ٥.٢٥ من المتر ويلزم ٨١ حجراً للمتر المربع الواحد، فما عدد الأحجار التي يحتاجها نامق لرصف الفناء كاملاً ؟

نوم الفقمة

تتنفس الفقمة حتى عند النوم في الماء . راقب ممدوح فقمة لمدة ساعة. في البداية كانت الفقمة على سطح الماء و أخذت نفساً ثم غاصت إلى قاع البحر و بدأت نومها . ثم ارتفعت إلى السطح ببطء في ٨ دقائق و أخذت نفساً مرة ثانية وعادت إلى قاع البحر في ثلاث دقائق . لاحظ ممدوح أن هذه العملية كانت منتظمة جداً .

سؤال ١ : بعد ساعة تكون الفقمة


- أ) في قاع البحر .
ب) في طريق الصعود إلى السطح .
ج) تتنفس .
د) في طريق النزول إلى القاع .

الفرملة

تتكون المسافة اللازمة لإيقاف سيارة متحركة من مجموع :

- المسافة المقطوعة أثناء الوقت الذي يبدأ فيه السائق بالدوس على الفرامل (مسافة ردة الفعل).
- المسافة المقطوعة أثناء الدوس على الفرامل (مسافة الفرملة).

يبين الشكل الحلزوني أدناه المسافة النظرية اللازمة لإيقاف سيارة في ظروف فرملة مثالية (سائق منتبه ، فرامل و إطارات جيدة ، طريق جاف و سطحه جيد) وكم تعتمد هذه المسافة على سرعة السيارة.



سؤال ١: ما المسافة التي تقطعها سيارة سرعتها ١١٠ كم/س أثناء زمن ردة فعل السائق؟

سؤال ٢: ما المسافة الكلية التي تقطعها سيارة سرعتها ١١٠ كم/س حتى تتوقف؟

سؤال ٣: ما الزمن اللازم لإيقاف سيارة سرعتها ١١٠ كم/س؟

سؤال ٤: ما المسافة التي تقطعها سيارة سرعتها ١١٠ كم/س أثناء الدوس على الفرامل؟


سؤال ٥ : إذا تمكن سائق يقود سيارته في ظروف جيدة من إيقافها في مسافة ٧ م و ٧ متراً ، فماذا كانت سرعة السيارة قبل الدوس على الفرامل ؟

البيتزا

يقدم محل بيتزا قطعتي بيتزا دائريتي الشكل مختلفتي الحجم ولكن لهما السمك نفسه.
طول قطرالصغرى ٣٠ سم وثمنها ٣٠ زد ، طول قطر الكبرى ٤٠ سم وثمنها ٤٠ زد.
أي القطعتين تعد قيمة أفضل للمال ؟ قدم تبريراً لإجابتك .

سرعة سيارة السباق

يبين الرسم البياني التالي كيف تتغير سرعة سيارة سباق في حلبة مستوية طولها ٣ كيلومترات أثناء دورتها الثانية:




سؤال ١ : أين كانت أدنى سرعة للسيارة خلال الدورة الثانية ؟

- (أ) عند خط البداية
- (ب) عند ٠,٨ كم تقريباً
- (ج) عند ١,٣ كم تقريباً
- (د) في منتصف المسافة حول الحلبة

سؤال ٢ : ماذا يمكن أن تقول عن سرعة السيارة بين علامتي ١,٦ كم ، ١,٨ كم ؟

- (أ) بقيت سرعة السيارة ثابتة
- (ب) تتزايد سرعة السيارة
- (ج) تتناقص سرعة السيارة
- (د) لا يمكن تحديد سرعة السيارة من الرسم

سؤال ٣: هذه صور لخمس حلبات سباق،
على أي هذه الحلبات كانت تقاد السيارة لتعطي
الرسم البياني للسرعة المبين سابقاً؟



0 : نقطة البداية

التفاح

يزرع مزارع أشجار التفاح في نمط مربع ، ولحمايتها من الرياح يحيطها بشجر السرو، تبين
الأشكال الآتية نمط أشجار التفاح و السرو لأي عدد من صفوف أشجار التفاح (ن):

× شجرة سرو

● شجرة مثمرة

```

X X X X X X X X X
X ● ● ● ● X
X
X ● ● ● ● X
X
X ● ● ● ● X
X
X ● ● ● ● X
X
X X X X X X X X X

```

$$ن = ٤$$

```

X X X X X X X
X ● ● ● X
X
X ● ● ● X
X
X ● ● ● X
X
X X X X X X X

```

$$ن = ٣$$

```

X X X X X
X ● ● X
X
X X X
X ● ● X
X X X

```

$$ن = ٢$$

$$ن = ١$$

سؤال ١ :
أكمل الجدول الآتي :

ن	عدد أشجار التفاح	عدد أشجار السرو
١	١	٨
٢	٤	
٣		
٤		
٥		

سؤال ٢ : يمكن حساب عدد أشجار التفاح و عدد أشجار السرو بالقوانين الآتية :

$$\text{عدد أشجار التفاح} = \text{ن}^2$$

عدد أشجار السرو = ٨ ن ، حيث ن هو عدد صفوف أشجار التفاح
جد قيمة ن التي يكون عندها عدد أشجار التفاح يساوي عدد أشجار السرو ، وبيّن طريقة الحل .

سؤال ٣ :

افرض أنّ المزارع يريد أن يزرع بستتين أكبر بزيادة عدد صفوف أشجار التفاح ، فأيهما يزيد
بسرعة أكبر عند توسيع البستان : عدد أشجار التفاح أم عدد أشجار السرو ؟ فسّر إجابتك .

سؤال ١ : زلزال

عُرض فيلم وثائقي عن الزلازل و عدد مرات وقوعها . واشتمل العرض على نقاش حول
إمكانية التنبؤ بوقوع الزلازل .

وقد قال أحد الجيولوجيين : " إن فرصة وقوع زلزال في مدينة زد خلال السنوات العشرين
القادمة تساوي اثنين من ثلاثة "

أي واحد مما يأتي يظهر بشكل أفضل معنى مقولة هذا الجيولوجي ؟

(أ) $\frac{2}{3} \times 20 = 13,3$ ، لذلك سيقع زلزال في مدينة زد بعد ١٣ إلى ١٤ سنة .


(ب) $\frac{2}{3}$ أكبر من $\frac{1}{2}$ ، لذلك من المؤكد أن يقع زلزال في مدينة زد خلال السنوات

العشرين القادمة

(ج) إمكانية وقوع زلزال في مدينة زد في وقت ما خلال العشرين سنة القادمة أكبر من إمكانية
عدم وقوع زلزال .

(د) لا يمكن معرفة ماذا سيحدث ، لأنه لا يستطيع أحد أن يكون متأكداً من موعد وقوع الزلزال .


خزان الماء




خزان ماء

يوضح الرسم المجاور شكل وأبعاد خزان ماء .
كان الخزان فارغاً في البداية، ثم صبّ فيه
الماء بمعدل لترواحد في الثانية.
أيّ الرسومات البيانية الآتية توضح التغير
في ارتفاع سطح الماء مع مرور الزمن ؟


الارتفاع




الارتفاع




الارتفاع



الارتفاع



الارتفاع



الإجابات

(١) قارّات

ليأخذ الطالب علامة كاملة يجب أن يعطي الإجابة الصحيحة بين 12000000 كم^٢ و 18000000 كم^٢ (الوحدات غير ضرورية) ويمكن أن يعطي دليلاً على استخدام طريقة سليمة للحل مثل رسم مربع أو دائرة لتقدير المساحة.

(٢) مثلثات

الإجابة الصحيحة (ج).

(٣) مشي

السؤال ١

الإجابة الصحيحة : ٥, ٥ متر أو ٥٠ سم أو $\frac{1}{2}$ (الوحدات غير ضرورية)

السؤال ٢

$112 = 0,8 \times 140 =$ ن
السرعة في الدقيقة $= 0,8 \times 112 = 89,6$ متراً في الدقيقة
وتساوي ٥,٣٨ كيلو متراً في الساعة تقريباً.

(٤) النجار

الإجابة الصحيحة : التصميم أ نعم
التصميم ب لا
التصميم ج نعم
التصميم د نعم

(٥) دردشة

دردشة ١

الإجابة الصحيحة : العاشرة صباحاً أو ١٠:٠٠

دردشة ٢

أي وقت أو فترة زمنية من الفترات الآتية سيدني : ٣:٠٠ مساءً – ٦:٠٠ مساءً
برلين : ٧:٣٠ صباحاً – ٩:٠٠ صباحاً .

(٦) الطاقة

سؤال ١ : 12120 كيلوجول

سؤال ٢ : وجبة السعر الثابت لا تحقق المطلوب

الحل يبين حساب الطاقة في الوجبة الثابتة تساوي 1715

الفارق بين ($1715 + 7520$) و 9820 أكثر من 500


(٧) أفلام

سؤال ١ : نعم ، لا ، لا ، لا ، نعم ، نعم ، بهذا الترتيب

سؤال ٢ : (ج) الجمعة ٣٠ آذار.

٨) مواصلات

الإجابة الصحيحة موضحة في الرسم التالي:



الأجرة ٨ زد و الزمن التقريبي للرحلة ٢١ دقيقة .