

# الكيمياء

الصف الحادي عشر - كتاب الأنشطة والتجارب العملية

الفصل الدراسي الثاني

11

فريق التأليف

موسى عطا الله الطراونة (رئيساً)

تيسير أحمد الصبيحات

بلال فارس محمود

سمير سالم عيد

جميلة محمود عطية

روناهي محمد صالح الكردي (منسقاً)

الناشر: المركز الوطني لتطوير المناهج

يسر المركز الوطني لتطوير المناهج، استقبال آرائكم وملحوظاتكم على هذا الكتاب عن طريق العناوين الآتية:

☎ 06-5376262 / 237 ☎ 06-5376266 ☎ P.O.Box: 2088 Amman 11941

📧 @nccdjor 📧 feedback@nccd.gov.jo 🌐 www.nccd.gov.jo

قررت وزارة التربية والتعليم تدرّس هذا الكتاب في مدارس المملكة الأردنية الهاشمية جميعها، بناءً على قرار المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج في جلسته رقم (2021/5)، تاريخ 2021/12/7 م، وقرار مجلس التربية والتعليم رقم (2021/174) تاريخ 2021/12/21 م بدءاً من العام الدراسي 2021 / 2022 م.

© Harper Collins Publishers Limited 2021.

- Prepared Originally in English for the National Center for Curriculum Development. Amman - Jordan  
- Translated to Arabic, adapted, customised and published by the National Center for Curriculum Development. Amman - Jordan

**ISBN: 978 - 9923 - 41 - 208 - 4**

المملكة الأردنية الهاشمية  
رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية  
(2021/6/3439)

الأردن. المركز الوطني لتطوير المناهج  
كيمياء الصف الحادي عشر الفرع العلمي: كتاب الأنشطة والتجارب العلمية الفصل الثاني / المركز الوطني لتطوير  
المناهج - عمان: المركز، 2021  
ج2 (44) ص.  
ر.إ.: 2021/6/3439  
الواصفات: / الكيمياء / المناهج // التعليم الثانوي /  
يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه ولا يعبر هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة الوطنية.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, sorted in retrieval system, or transmitted in any form by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the publisher or a license permitting restricted copying in the United Kingdom issued by the Copyright Licensing Agency Ltd, Barnard's Inn, 86 Fetter Lane, London, EC4A 1EN.

British Library Cataloguing -in- Publication Data

A catalogue record for this publication is available from the Library.

1442 هـ / 2021 م

الطبعة الأولى (التجريبية)

# قائمة المحتويات

رقم الصفحة	الموضوع
الوحدة الرابعة: الحسابات والتفاعلات الكيميائية	
5	تجربة استهلاكية: التفاعل الكيميائي
7	تفاعل الترسيب
9	تفاعل التعادل
11	التجربة الإثرائية: المادة المحددة للتفاعل
13	أسئلة تفكير
الوحدة الخامسة: الاتزان الكيميائي	
15	تجربة استهلاكية: تسامي اليود
17	أثر التركيز على موضع الاتزان
19	أثر درجة الحرارة على الاتزان
21	التجربة الإثرائية: تغيير موضع الاتزان
23	أسئلة تفكير

# قائمة المحتويات

رقم الصفحة	الموضوع
الوحدة السادسة: المركبات الهيدروكربونية	
25	تجربة استهلاكية: بناء المركبات الهيدروكربونية
27	تحضير الميثان في المختبر
29	تفاعل أكسدة الألكينات
30	تجربة إثرائية: تحضير الإيثان في المختبر
32	أسئلة تفكير
الوحدة السابعة: مشتقات المركبات الهيدروكربونية	
34	تجربة استهلاكية: التصاوغ الوظيفي
36	اختبار ذوبان بعض المركبات العضوية في الماء
39	بناء نموذج لمبلمر متعدد الإيثين
41	تجربة إثرائية: قياس درجة غليان بعض المركبات العضوية
43	أسئلة تفكير

### الخلفية العلمية:

تحدث كثير من التفاعلات الكيميائية في حياتنا في المصانع أو في المختبرات، ويتضمن التفاعل الكيميائي تكسير روابط بين الذرات المتفاعلة، وإعادة ترتيب للذرات، وتكوين روابط جديدة؛ وبهذا تنتج مواد جديدة ذات خصائص تختلف عن خصائص المواد المتفاعلة. ومن أنواع التفاعلات الكيميائية: الاتحاد، والتحلل، والإحلال الأحادي، والإحلال المزدوج بأنواعه (الترسيب، والتعادل، وإطلاق الغاز).

### الهدف: أتنبأ بنوع التفاعل الكيميائي.

#### المواد والأدوات:

محلول كلوريد الحديد (III)  $FeCl_3$ ؛ تركيزه 0.1M، محلول هيدروكسيد الصوديوم NaOH؛ تركيزه 0.1M، كأس زجاجية سعة 100mL، مخبراً مدرج (عدد 2).

#### إرشادات السلامة:

- أتبع إرشادات السلامة العامة في المختبر.
- أحرص عند التعامل مع المواد الكيميائية.
- ارتدي معطف المختبر والنظارات الواقية والقفازات.

#### خطوات العمل:

1. أقيس: أستخدم المخبر المدرج الأول في قياس 5 mL من محلول  $FeCl_3$ ، والمخبر المدرج الثاني في قياس 5 mL من محلول NaOH.
2. ألاحظ: أسكب محتويات المخبرين تدريجياً في الكأس الزجاجية، وألاحظ ما يحدث، وأسجل ملاحظاتي.

## التحليل والاستنتاج:



1. أصفُ التغيُّر الذي يطرأُ على الخليط في الكأس الزجاجية.

.....

.....

.....

2. أكتبُ معادلةً كيميائيةً موزونةً تصفُ التفاعل الحاصل.

.....

.....

.....

3. أستنتجُ نوعَ التفاعل الذي حدث.

.....

.....

.....

### الخلفية العلمية:


ينتج عن مزج بعض المحاليل المائية للمواد الأيونية - أحياناً - مركب غير ذائب أو شحيح الذوبان في الماء، يترسب في وعاء التفاعل. ويمكن توقع تكوّن راسب عن التفاعل عن طريق معرفة صيغة المركب الأيوني الناتج وذائبيته في الماء. أنظر الجدول الآتي الذي يوضح قواعد عامة لذائبيّة الأملاح:

الأملاح	الذائبيّة	الاستثناء
الصوديوم، والبوتاسيوم، والأمونيوم	ذائبة	بعض مركبات الليثيوم
النترات	ذائبة	---
الكبريتات	ذائبة	مركبات كل من: الرصاص، الفضة، الزئبق، الباريوم، الكالسيوم، السترونشيوم
الكلوريدات، البروميديات، الأيودات	ذائبة	مركبات الفضة وبعض مركبات الرصاص والزرنيق
الكربونات، الفوسفات، الكرومات، الكبريتيدات، الهيدروكسيدات	أغلبها غير ذائبة	مركبات الصوديوم والبوتاسيوم، والأمونيوم

ومثال ذلك؛ خلط محلولي كربونات الصوديوم  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  و نترات الباريوم  $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ ، فهل يمكن توقع تكوّن راسب؟ توضح المعادلة الآتية الأيونات المتفاعلة في المحلول المائي:



يلاحظ أن الأيونين الموجبين (أو السالبين) سيتبادلان مواقعهما؛ فنتج نترات الصوديوم وهي ملح ذائب كما هو موضح في الجدول، في حين تتكوّن كربونات الباريوم وهي غير ذائبة، وبذلك يمكن كتابة المعادلة الأيونية النهائية كما يأتي:



**الهدف:** أستقصي تفاعلاً كيميائياً ينتج عنه راسب.

### المواد والأدوات:



كأس زجاجية سعة 200mL (عدد 3)، محلول كبريتات النحاس (II)  $\text{CuSO}_4$ ، تركيزه 1M، محلول هيدروكسيد الصوديوم NaOH، تركيزه 1M، مخبار مدرّج سعة 100mL عدد (2).

## إرشادات السلامة:



- اتَّبِعْ إرشادات السلامة العامة في المختبر.
- أحذِرْ عند التعامل مع المواد الكيميائية.
- أرْتدي معطفَ المختبرِ والنظارات الواقية والقفازات.

## خطوات العمل:



1. أقيس 10mL من محلول كبريتات النحاس (II)  $\text{CuSO}_4$ ؛ باستخدام المِخْبَار المُدْرَج، وأضعُها في كأسٍ زجاجيةٍ.
2. أنظف المِخْبَارَ بالماء المُقَطَّر، ثم أكرِّر الخطوة (1) باستخدام محلول هيدروكسيد الصوديوم  $\text{NaOH}$ ، وأضعُها في كأسٍ زجاجيةٍ أخرى.
3. ألاحظ: أسكبُ محتويات الكأسين في الكأس الثالثة. وأحرِّكه بشكلٍ دائريٍّ بلطفٍ. وأُسجِّل ملاحظاتي.

## التحليل والاستنتاج:



1. أصفُ التغيُّر الذي يطرأ على الخليط في الكأس الزجاجية.

.....

.....

.....

2. أكتبُ معادلةً كيميائيةً موزونةً للتفاعل الحاصل مُتضمِّنةً الحالة الفيزيائية لكلِّ مادَّة.


.....

.....


.....

### الخلفية العلمية:

تُعدُّ تفاعلات التعادل نوعاً من أنواع تفاعلات الإحلال المزدوج، وتفاعل التعادل هو تفاعل محلول الحمض القوي مع محلول القاعدة القويّة، فيتكوّن محلولاً من الملح والماء، ويكون المحلول متعادلاً، كما هو موضح في المعادلتين الآتيتين:



وفي تفاعل الحمض مع القاعدة؛ فإنّ التفاعل يحدث بين أيونات الهيدروجين  $\text{H}^+$  وأيونات الهيدروكسيد  $\text{OH}^-$  لتكوين الماء، كما يأتي:



### الهدف: أستقصي تفاعل التعادل.

### المواد والأدوات:



محلول حمض النيتريك  $\text{HNO}_3$ ؛ تركيزه (0.01M)، محلول هيدروكسيد البوتاسيوم KOH؛ تركيزه (0.01M)، ماءً مُقطّر، كأس زجاجية (عدد 3)، ساق زجاجية، مخبر مدرج، مقياس الرقم الهيدروجيني pH. (أو أوراق الكاشف العام).

### إرشادات السلامة:



- اتّبع إرشادات السلامة العامة في المختبر.
- أحذر عند التعامل مع المواد الكيميائية.
- ارتدي معطف المختبر والنظارات الواقية والقفازات.

### خطوات العمل:



1. أقيس 10mL من محلول حمض النيتريك  $\text{HNO}_3$  باستخدام المخبر المدرج، وأضعها في كأس زجاجية.
2. أقيس: أستخدم مقياس الرقم الهيدروجيني أو أوراق الكاشف العام لقياس قيمة pH للمحلول، وأسجلها.



3. أُكْرِرُ الخطوتين (1) و(2) لمحلول هيدروكسيد البوتاسيوم KOH.
4. أخلطُ المحلولين في كأس زجاجيةٍ ثالثةٍ، ثم أُحرِّكُ بساقٍ زجاجيةٍ مُدَّةَ دقيقتين.
5. أقيسُ: أستخدمُ مقياسَ الرقم الهيدروجينيِّ أو أوراق الكاشف العامِّ لقياسِ قيمة pH للخليطِ. وأُسجِّلُ ملاحظاتي.

### التحليل والاستنتاج:



1. أقرنُ بين قيم pH قبلَ خلطِ المحلولين وبعدهُ.

.....

.....

.....

2. أكتبُ معادلةً كيميائيةً موزونةً للتفاعل.

.....

.....

.....

### الخلفية العلميّة:

عند خلط كميتين مختلفتين من مادتين أو أكثر؛ فإنهما تتفاعلان معًا حتى نفاذ كمية إحداهما كليًا؛ فيتوقّف التفاعل عندئذٍ، وتُسمّى هذه المادّة المادّة المُحدّدة للتفاعل، في حين تُسمى المادّة الأخرى المُتبقّية في وسط التفاعل مادّةً فائضة. وللمادّة المُحدّدة أهميّةً في التحكّم بالتفاعل، وكذلك في حساب كمية مادة متفاعلة (فائضة).

### الهدف: أستنتج المادّة المحددة للتفاعل.

### الموادُّ والأدوات:



محلول حمض الهيدروكلوريك HCl؛ تركيزه (0.1M)، كربونات الكالسيوم  $\text{CaCO}_3$ ، ورقٌ مخروطيٌّ، سحّاحة، مخبرٌ مُدرج، قطّارةٌ مُدرجة، ميزان حسّاس.

### إرشادات السلامة:



- اتّبِعْ إرشادات السلامة العامة في المختبر.
- أحذِرْ عند التعامل مع المواد الكيميائية.
- أرْتدِ معطفَ المختبر والنظارات الواقية والقفازات.

### خطوات العمل:



1. أركّبْ الجهازَ كما في الشكل.
2. أقيسْ 10mL من محلول حمض الهيدروكلوريك باستخدام المخبر المُدرّج، وأضعها في الدورق.
3. أقيسْ 30g من كربونات الكالسيوم، وأضعها في الدورق المخروطي.
4. أغلقْ فُوّهة الدورق بسدّادة من الفلين كما في الشكل، وأسجلْ ملاحظاتي.



## التحليل والاستنتاج:



5. أستنتج المادة المُحددة للتفاعل

.....

.....


.....

6. أكتب معادلةً كيميائيةً موزونةً للتفاعل

.....


.....

.....



# أسئلة تفكير

السؤال الأول: يُمثّل الشكل الآتي تفاعلاً كيميائياً لمحاليل مختلفة. أجب عن الأسئلة التي تليه:



1. أستنتج المعادلة الكيميائية الموزونة لهذا التفاعل.

.....  
.....


2. أتوقع اسم هذا النوع من التفاعلات.

.....  
.....

3. أكتب معادلة أيونية نهائية للتفاعل.

.....  
.....

السؤال الثاني: في الشكل الآتي تمثل المثلثات عنصر X والدوائر عنصر Y أجب عن الأسئلة التي تليه:



1. أستنتج المعادلة الكيميائية الموزونة لهذا التفاعل.

.....

.....

2. أستنتج المادة المُحددة للتفاعل، والمادة الفائضة عنه.

.....

.....

### الخلفية العلمية:

تتحوّل المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية دون المرور بالحالة السائلة بعملية تُعرف بعملية التسامي Sublimation؛ وهي عملية ماصة للحرارة، تحدث لعددٍ قليلٍ من المواد الصلبة مثل الجليد، وثنائي أكسيد الكربون، واليود، والزرنيخ، وغيرها، فمثلاً؛ عند تسخين بلّورات اليود في وعاءٍ مُغلقٍ فإنّه يتحوّل إلى الحالة الغازية مباشرة، ويظهر بخارُ اليود باللّون البنفسجي في الوعاء، وبمرور الوقت يبردُ بخار اليود ويترسّب على جدران الوعاء الموجود فيه على شكل بلّورات صلبة، في عملية تُسمّى عملية الترسيب Precipitation، وهي عملية تتحوّل فيها المادة من الحالة الغازية إلى الحالة الصلبة أيضاً دون المرور بالحالة السائلة، ويحدث اتزانٌ بين عملية التسامي وعملية الترسيب، عندها تستقرُّ كميةُ بخار اليود وتثبت شدّة لونه في الوعاء.

**الهدف:** أتعرف مفهوم الاتزان الديناميكي.

### المواد والأدوات:



بلّورات من اليود الصّلب، كأس زجاجية سعة 200mL، حوض زجاجي، زجاجة ساعة، ملعقة، ميزان حساس، ماء ساخن، قطع من الجليد.

### إرشادات السلامة:



- أطبق إرشادات السلامة العامة في المختبر.
- ارتدي معطف المختبر والنظارات الواقية والقفازات.
- أجري التجربة في خزّانة الأبخرة، وتجنّب استنشاق أبخرة اليود.

### خطوات العمل:



1. أقيس 10g من اليود الصّلب باستخدام الميزان الحساس، وأضعها في الكأس الزجاجية.
2. أملأ الحوض الزجاجي مقدار ثلثه ماءً ساخناً (حمام مائي ساخن).
3. أضع قطعاً من الجليد في زجاجة الساعة، وأضعها على فوهة الكأس الزجاجية.
4. ألاحظ: أضع الكأس المحتوية على اليود في الحمام المائي الساخن، وألاحظ التغيّر الذي يطرأ على بلورات اليود بمرور الوقت، أسجّل ملاحظاتي

5. ألاحظُ: أنتظرُ مدةَ عشرِ دقائق، وألاحظُ التغيُّرَ الذي يطرأُ على لون بخار اليود في الدورق، أُسجِّلُ ملاحظاتي.

### التحليلُ والاستنتاج:



1. أوضِّحُ التغيُّرات التي تطرأُ على بلورات اليود الصَّلب، وأسمِّي هذه العملية.

.....  
.....  
.....

2. أحدِّدُ لون بخار اليود المتصاعد.

.....  
.....  
.....

3. أوضِّحُ التغيُّرات التي طرأت على بخار اليود بمرور الوقت، وأسمِّي هذه العملية.

.....  
.....  
.....

4. أفسِّرُ ثبات لون بخار اليود في الكأس الزجاجية.


.....  
.....  
.....

5. أستنتجُ العلاقة بين ما يحدث لبلورات اليود، وما يحدث لبخاره عند ثبات اللون في الكأس الزجاجية.

.....  
.....  
.....

### الخلفية العلمية:

يتأثر موضع الاتزان بتراكيز المواد المتفاعلة والنتيجة في وعاء التفاعل، فعند تغيير تركيز إحدى المواد في التفاعل؛ فإنه وفقاً لمبدأ لوتشاتلييه يعمل الاتزان على تغيير موضعه للتقليل من أثر هذا التغيير، ويمكن التحكم في موضع الاتزان عن طريق تغيير تراكيز المواد في وعاء التفاعل، وذلك بإضافة كمية من إحدى المواد إلى وعاء التفاعل، أو سحب كمية من إحدى المواد من وعاء التفاعل. ولنتعرف ذلك عملياً؛ يمكن دراسة تفاعل ثيوسينات الأمونيوم  $NH_4SCN$  مع محلول كلوريد الحديد  $FeCl_3$  الذي يحدث كما في المعادلة الآتية:



**الهدف:** أستكشف أثر تراكيز المواد على موضع الاتزان.

### المواد والأدوات:




محلول ثيوسينات الأمونيوم  $NH_4SCN$ ، محلول كلوريد الحديد (III)  $FeCl_3$ ، محلول كلوريد الأمونيوم  $NH_4Cl$ ، أنابيب اختبار عدد (3)، ماصة عدد (3)، حامل أنابيب.

### إرشادات السلامة:



- اتبع إرشادات السلامة العامة في المختبر.
- ارتدي معطف المختبر والنظارات الواقية والقفازات.

### خطوات العمل:



1. أقيس: أضع 3mL من محلول ثيوسينات الأمونيوم في أنبوب اختبار.
2. ألاحظ: أضيف ثلاث قطرات من محلول كلوريد الحديد إلى الأنبوب السابق، ثم أرج المحلول وألاحظ لون المحلول الناتج. وأسجل ملاحظاتي.
3. أجرب: أنقل نصف كمية المحلول السابق إلى أنبوب اختبار آخر، وأضع الأنبوبين على حامل الأنابيب.



4. ألاحظُ: أضيفُ باستخدام الماصّة بضع قطرات من محلول كلوريد الأمونيوم إلى أحد الأنبوبين وأرُجُ المحلول، وألاحظُ التغيّر الذي يطرأ على لون المحلول الناتج، وأسجّل ملاحظاتي.
5. ألاحظُ: أضيفُ باستخدام الماصّة قطرتين من محلول كلوريد الحديد إلى الأنبوب الآخر، وأرُجُ المحلول، وألاحظُ التغيّر الذي يطرأ على لون المحلول الناتج، وأسجّل ملاحظاتي.


### التحليل والاستنتاج:



1. أُحدّد لون المحلول الناتج من إضافة محلول كلوريد الحديد إلى محلول ثيوسينات الأمونيوم.  
.....  
.....
2. أُحدّد المادة التي أدت إلى تغيير لون المحلول عند إضافة قطرات من محلول كلوريد الأمونيوم إلى الأنبوب الأول، وقطرات من محلول كلوريد الحديد إلى الأنبوب الثاني.  
.....  
.....
3. أفسّر أثر تغيير تراكيز المواد على موضع الاتزان وفق مبدأ لوتشاتلييه.  
.....  
.....
4. أستنتج العلاقة بين تغيّر لون المحلول وتراكيز المواد في وعاء التفاعل.  
.....  
.....

### الخلفية العلمية:

يتأثر كلٌّ من ثابت الاتزان وموضعه للتفاعل المُتزن بتغيُّر درجة الحرارة، ويختلف هذا الأثر تبعاً لطبيعة التفاعل؛ إن كان ماصّاً للحرارة أم طارداً لها، ولتسهيل دراسة أثر درجة الحرارة على موضع الاتزان؛ يمكنُ معاملة الطاقة الحرارية المرافقة للتفاعل كمادة متفاعلة في التفاعل الماصّ للحرارة، وكمادة ناتجة في التفاعل الطارد لها، ولاستقصاء أثر تغيير درجة الحرارة عملياً على موضع الاتزان؛ سوف ندرس الاتزان في خليطٍ من غازي ثنائي أكسيد النيتروجين ورباعي أكسيد ثنائي النيتروجين. حيث يُحضّر غاز ثنائي أكسيد النيتروجين من تفاعل النحاس مع محلول حمض النيتريك المُركّز  $\text{HNO}_3$  كما في المعادلة:



يتكاثفُ غاز ثنائي أكسيد النيتروجين، وينتجُ غاز رباعي أكسيد ثنائي النيتروجين  $\text{N}_2\text{O}_4$ ، ويرافق ذلك انبعاثُ طاقةٍ حراريّةٍ في كما في المعادلة:



يحتوي وعاء التفاعل على خليطٍ من غازي ثنائي أكسيد النيتروجين ورباعي أكسيد ثنائي النيتروجين، ويصلُ التفاعل إلى حالة الاتزان ويستقرُّ لون الغاز في وعاء التفاعل.

**الهدف:** أستقصي أثر درجة الحرارة على حالة الاتزان.

### الموادُّ والأدواتُ:



برادةُ النحاس، محلول حمض النيتريك  $\text{HNO}_3$ ؛ تركيزه 0.1M، دورقٌ مخروطيٌّ؛ سعته 500mL عدد (3)، سداة مطايطية عدد (3)، حوضٌ زجاجيٌّ عدد (2)، ماء ساخن، قطع من الجليد.

### إرشادات السلامة:



- اتَّبِعْ إرشاداتِ السلامةِ العامّةِ في المختبرِ.
- أرْتدي معطفَ المختبرِ والنظاراتِ الواقيةَ والقفازاتِ.
- أحذر عند التعامل مع حمض النيتريك.

## خطوات العمل:

1. أقيس: أضع 50mL من محلول حمض النيتريك في كل دورقٍ مخروطي.
2. ألاحظ: أحضر الدوارق المخروطية الثلاثة وأرقمها، ثم أضع في كل منها 1g من برادة النحاس وأغلقها بإحكام، وألاحظ لون الغاز المتكوّن في كل منها.
3. أضبط المتغيرات: أحضر الحوضين الزجاجيين، وأضع في أحدهما إلى منتصفه ماءً ساخنًا، وفي الآخر ماءً وجليدًا.

4. أجرب: أترك الدورق رقم (1) جانبًا، ثم أضع الدورق (2) في الحوض المحتوي على الماء الساخن، والدورق (3) في حوض الماء البارد.



ماء بارد      ماء عند درجة حرارة الغرفة      ماء ساخن

5. أقرن: أنتظر دقيقتين، ثم أقرن لون الغاز في الدورقين (2,3) بلون الغاز في الدورق (1)، أسجل لون الغاز في كل دورق.

## التحليل والاستنتاج:

1. أستنتج أثر زيادة درجة الحرارة على تراكيز كل من الغازين في الدورق.

.....

.....

2. أفسر تغيير لون الغاز في الدورق الموضوع في الماء الساخن، والموضوع في الماء البارد مقارنةً بالدورق رقم (1).

.....

.....

3. أفسر أثر درجة الحرارة على كل من التفاعلين الأمامي والعكسي.

.....

.....


4. أستنتج أثر درجة الحرارة على الاتزان للتفاعل الماص للحرارة والتفاعل الطارد لها.

.....

.....

الخلفية العلمية:

يستخدم محلول كلوريد الكوبلت المائي  $\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6\text{Cl}_2$  في صناعة الحبر السري، وذلك لأن لون المحلول زهري باهت، وعند تعريضه للحرارة؛ فإنه يتحول إلى كلوريد الكوبلت اللامائي ذي اللون الأزرق، والمعادلة الآتية توضح ذلك:



زهري أزرق

يمكن التأثير على موضع اتزان التفاعل، وتغيير لون المحلول بسحب إحدى المواد من التفاعل، أو إضافة مادة إليه، أو تسخين المحلول أو تبريده.

الهدف: أستكشف موضع الاتزان لتفاعل كلوريد الكوبلت المائي.

المواد والأدوات:



محلول كلوريد الكوبلت المائي  $\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6\text{Cl}_2$ ؛ تركيزه 0.1M، محلول حمض الهيدروكلوريك HCl؛ تركيزه 0.1M، محلول نترات الفضة  $\text{AgNO}_3$ ؛ تركيزه 0.1M، ماء مُقَطَّر، أنابيب اختبار عدد (3)، حامل أنابيب، كأس زجاجية عدد (2)، مخبرٌ مخبار مدرج.

إرشادات السلامة:



- اتَّبِعْ إرشادات السلامة العامة في المختبر.
- ارتدي معطف المختبر والنظارات الواقية والقفازات.
- أحذر عند التعامل مع محلول كلوريد الكوبلت ومحلول حمض الهيدروكلوريك.

خطوات العمل:



1. أقيس: أضع 2mL من محلول كلوريد الأمونيوم المائي في أنبوب اختبار، وأرقمه بالرقم (1)، وأسجل لون المحلول.
2. ألاحظ: أضيف 2mL من محلول حمض الهيدروكلوريك إلى المحلول في أنبوب الاختبار رقم (1). وألاحظ لون المحلول الناتج وأسجله.
3. ألاحظ: أضيف 2mL من الماء إلى المحلول في أنبوب الاختبار رقم (1). وألاحظ لون المحلول الناتج وأسجله.

4. أضعُ ثلثَ كميّةِ المحلولِ الموجودِ في الأنبوبِ رقم (1) في أنبوبِ الاختبارِ رقم (2)، وأضعُ نصفَ الكميّةِ المُتبقيةِ في الأنبوبِ رقم (3)، وأضعُ الأنابيبِ الثلاثةَ على حاملِ الأنابيبِ.
5. أجربُ: أضيفُ قطراتٍ من محلولِ نتراتِ الفضةِ إلى الأنبوبِ رقم (1)، وأُسجّلُ التغيّرَ الذي طرأَ على لونِ المحلولِ.
6. أضبطُ المتغيّراتِ: أجهّزُ كأسينِ زجاجيّتينِ، أضعُ في إحداهما ماءً ساخنًا درجةً حرارته  $70^{\circ}\text{C}$ ، وفي الأخرى ماءً باردًا درجةً حرارته  $5^{\circ}\text{C}$ .
7. أجربُ: أضعُ الأنبوبِ (2) في كأسِ الماءِ الساخنِ، والأنبوبِ (3) في كأسِ الماءِ الباردِ، وأُسجّلُ لونَ المحلولِ في كلِّ أنبوبِ.

### التحليلُ والاستنتاجُ:




1. أوضّحُ أثرَ إضافةِ محلولِ حمضِ الهيدروكلوريكِ على تراكيزِ الأيوناتِ في المحلولِ وموضعِ الاتّزانِ.
- .....
- .....
2. أتوقّعُ موضعَ الاتّزانِ الناتجِ عن إضافةِ الماءِ إلى المحلولِ.
- .....
- .....
3. أفسّرُ التغيّرَ في لونِ المحلولِ نتيجةَ إضافةِ نتراتِ الفضةِ إلى المحلولِ.
- .....
- .....
4. أقارنُ موضعَ الاتّزانِ في المحلولِ الساخنِ والمحلّولِ الباردِ.
- .....
- .....
5. أستنتجُ نوعَ التفاعلِ؛ إذا كان ماصًّا للحرارةٍ أم طاردًا لها.
- .....
- .....

# أسئلة تفكير

## السؤال الأول:

أجرى مجموعة من الطلبة تجارب لدراسة موضع الاتزان لثلاثة تفاعلات، تُعبّر المنحنيات الثلاثة الآتية عن النتائج التي جرى التوصل إليها، أدرس هذه المنحنيات، ثم أجب عن الأسئلة التي تليها:



1. أتوقع الجهة التي يُزاح نحوها الاتزان لكل من التفاعلين (2,1).

.....

.....

2. أُنَبِّأُ بِقِيمٍ تَقْرِيبِيَّةٍ لِثَابِتِ الاتزان لكل من التفاعلات الثلاثة؛ مُدَعِّمًا تَبْؤَاتِي بِالْبَرَاهِينِ.

.....


.....

3. أقترح بعض الإجراءات لزيادة كمية المواد الناتجة في التفاعل (2).

.....


.....

## السؤال الثاني:



أقارنُ: المُنحنيان المُجاوران يُمثَّلان تغيُّرات الطاقة لتفاعلين مختلفين، أدرُسهما وأقارن -وفقاً لمبدأ لوتشاتيليه- أثر زيادة درجة الحرارة على المردود المئويِّ لكلِّ من التفاعلين.

## السؤال الثالث:



يبيِّن الشكلُ المُجاور مُنحنياتِ تغيُّر تراكيز الموادِّ في تفاعلٍ ما إلى حين وصوله إلى حالة الاتزان، أدرُس المنحنياتِ ثم أجبُ عن الأسئلة الآتية:

1. أصنِّفُ التفاعلَ (اتِّحادٌ، تحلُّلٌ، إحلالٌ)، وأدعمُ إجابتي باستخدام البيانات في المُنحني البيانيِّ.

2. أصفُ تغيُّر تراكيز الموادِّ من بداية التفاعل إلى حين وصول التفاعل إلى حالة الاتزان.


3. أفسرُ: بعد بدء التفاعل لا تصبح تراكيز أيِّ من المواد في التفاعل تساوي صفراً.

4. أكتبُ تعبيرَ ثابت الاتزان للتفاعل؛ بناءً على فرضية مفادها أن المواد جميعها في الحالة الغازية.

### الخلفية العلمية:

تتكون المركبات الهيدروكربونية من الكربون والهيدروجين فقط، والمصدر الأساسي للحصول عليها هو النفط. وبسبب قدرة ذرة الكربون على عمل أربع روابط مع نفسها أو مع الهيدروجين؛ فإنها تكون جزيئات كثيرة من المركبات الهيدروكربونية تختلف في أشكالها؛ فقد تكون على صورة سلاسل مستمرة من ذرات الكربون أو سلاسل متفرعة أو حلقات.

### الهدف: أستقصي الأشكال البنائية للمركبات الهيدروكربونية.



### المواد والأدوات:



مجموعة نماذج الجزيئات (الكرات والوصلات).

### إرشادات السلامة:



- اتبع إرشادات السلامة العامة في المختبر.

- ارتدي المعطف والنظارات الواقية والقفازات.

### خطوات العمل:



1. اختار (4) كرات تحتوي كل منها على (4) ثقب تمثل ذرات الكربون.
2. أجرب: أستخدم الوصلات في توصيل الكرات الخمس.
3. أطبق: أختار عددًا من الكرات متشابهة اللون التي تحتوي على ثقب واحد تمثل ذرات الهيدروجين، وأصلها مع ذرات الكربون، وأرسم الشكل الناتج وأكتب صيغته الجزيئية.
4. أصمم نموذجًا آخر باستخدام (4) كرات تمثل ذرات الكربون؛ أصلها معًا في سلسلة. أمّا الكرة الخامسة فأصلها مع إحدى كرتي ذرتي الكربون الموجودة في الوسط، ثم أصل كرات الكربون جميعها بكرات الهيدروجين. وأرسم الشكل الناتج وأكتب صيغته الجزيئية.
5. أصمم: نموذجًا أصل به (3) كرات تمثل ذرات الكربون في سلسلة ثم أصل الكرتين المتبقيتين مع ذرة الكربون التي تقع في الوسط، وبعد ذلك أصل الكرات التي تمثل ذرات الكربون جميعها مع الهيدروجين. وأرسم الشكل الناتج وأكتب صيغته الجزيئية.

## التحليلُ والاستنتاجُ

1. أقرنُ بين الصيغ الجزيئية للمركبات الثلاثة السابقة؛ من حيث عدد ذرات الكربون.


.....  
.....  
.....

2. أستنتجُ العلاقةَ بينَ عدد ذرات الكربون وعدد ذرات الهيدروجين.

.....  
.....  
.....

### الخلفية العلمية:

يعدُّ غاز الميثان من أشهر الألكانات التي يستخدمها الانسان، بوصفه مصدرًا للطاقة أو لتحضير مركّباتٍ كيميائيةٍ أخرى، ويُطلق على غاز الميثان الغاز الحيوي أو غاز المستنقعات؛ لأنه ينتج عن تحلُّل المواد العضويّة بواسطة البكتيريا اللاهوائية، والمعادلة الآتية تُمثِّل تفاعلَ تحضير الميثان في المختبر؛ حيثُ يتفاعلُ إيثانوات الصوديوم  $\text{CH}_3\text{COONa}$  الصّلب مع هيدروكسيد الصوديوم  $\text{NaOH}$ ، ويُضاف إليهما أكسيد الكالسيوم  $\text{CaO}$  الذي يُعدُّ عاملاً مساعداً يعمل على تقليل درجة الانصهار، ويحدث ذلك بوجود الحرارة.



### الهدف: أحضّر غاز الميثان في المختبر.

### الموادُّ والأدوات:



إيثانوات الصوديوم اللامائيّة الجافّة  $\text{CH}_3\text{COONa}$ ، هيدروكسيد الصوديوم  $\text{NaOH}$  الصّلب، أكسيد الكالسيوم  $\text{CaO}$ ، سدّادة مطّاطيّة مثقوبةٌ من المنتصف، أنبوبٌ اختبار، أنبوب زجاجيٌّ، لهب بنسن، حامل فلزي، ميزان، ملعقة، ورق نشاف، ماء، كأس زجاجية طويلة، حوض زجاجي.

### إرشادات السلامة:



- اتّبع إرشادات السلامة العامة في المختبر.
- ارتدي المعطف والنظارات الواقية والقفّازات.

### خطوات العمل:



1. أقيس: أضع ورقة نشاف على الميزان؛ ثم أزن 10g من إيثانوات الصوديوم اللامائيّة الجافّة، وأضع هذه الكمية في أنبوب الاختبار.
2. أطبق: أكرّر العملية نفسها لقياس 10g من هيدروكسيد الصوديوم الصلب، و10g من أكسيد الكالسيوم، وأضيفهما الى إيثانوات الصوديوم في الأنبوب.

3. أركب الجهاز كما هو موضح في الشكل؛ بحيث يكون طرف الأنبوب الزجاجي مغمورًا في الماء تحت الكأس الزجاجية الطويلة المملوءة إلى ثلثها بالماء.



4. ألاحظ: أشعل لهب بنسن تحت أنبوب الاختبار كما في الشكل مع تحريك اللهب على طول أنبوب الاختبار لتوزيع الحرارة على الخليط كله. وألاحظ ظهور فقاعات غازية في الكأس الزجاجية، وأسجل ملاحظاتي.

5. ألاحظ تغيير مستوى الماء داخل الكأس الزجاجية الطويلة، وأسجل ملاحظاتي.

## التحليل والاستنتاج:

1. أفسر تغيير مستوى الماء في الكأس الزجاجية الطويلة.

.....

.....

2. أتوقع نوع الغاز الناتج من التفاعل.

.....

.....

# أكسدة الألكينات باستخدام محلول بيرمنغنات البوتاسيوم

## التجربة 2

### الخلفية العلمية:

توصف عملية زيادة ذرات الأكسجين في المركب العضوي بالأكسدة، وتتأكسد المركبات العضوية باستخدام عوامل مساعدة كثيرة منها محلول البيرمنغنات الذي يؤكسد الألكينات.

### الهدف: أستقصي تفاعل أكسدة الألكينات.

### المواد والأدوات:



هكسان، 2- هكسين، أنبوب اختبار عدد (2)، ماصة، قطارة، محلول بيرمنغنات البوتاسيوم  $KMnO_4$ ؛ تركيزه % 0.5، محلول هيدروكسيد البوتاسيوم KOH.

### إرشادات السلامة:



- اتبع إرشادات الأمن والسلامة في المختبر.
- ارتدي المعطف والقفازات والنظارات الواقية.
- أحذر أن يلامس محلول البيرمنغنات يدي أو ثيابي، وفي حالة حدوث ذلك اغسل يدي بالماء.

### خطوات العمل:



1. أقيس 1mL من الماء المقطر باستخدام الماصة؛ وأضعها في أنبوب الاختبار وأرقمه (1).
2. أضيف 5-7 نقاط من الهكسان باستخدام القطارة إلى الماء في الأنبوب رقم (1).
3. ألاحظ: أضيف 5 قطرات من كل من محلول بيرمنغنات البوتاسيوم ومحلول هيدروكسيد البوتاسيوم إلى الأنبوب (1)، وأستمّر في الرجّ مدة دقيقة، أسجل ملاحظاتي.
4. أطبق: أكرّر الخطوات (1-3) باستخدام 2- هكسين في الأنبوب الثاني وأرقمه (2)، وأسجل ملاحظاتي.

### التحليل والاستنتاج:



1. أحدد الأنبوب الذي يتكون فيه الراسب البني المحمّر

2. أفسر اختفاء اللون البنفسجي وتكوين الراسب البني المحمّر.

## تحضير الإيثانين في المختبر

### الخلفية العلمية:

يُستخدم الإيثانين في لحام الفلزّات وإصلاح هياكل السيارات؛ لأنّ احتراقه يُنتج كميةً كبيرةً من الطاقة، حيث تبلغ درجة حرارة اللهب حوالي  $3330^{\circ}\text{C}$ ؛ إذ تكفي لقصّ القطع المصنوعة من الفلزّات ولحام أجزائها معاً، كما أنّه يدخل في صناعات كيميائية عدّة مثل صناعة البلاستيك

### الهدف: أستقصي تحضير غاز الإيثانين.

### الموادُّ والأدواتُ:



ماءٌ مقطّرٌ، كربيد الكالسيوم  $\text{CaC}_2$ ، مَلقَط، ساق تحريك، كأس زجاجية سعة 150mL، مخبر مُدرّج، سائل تنظيف الصحون، مسطرة طولها 30cm، قطعة مطّاط، عود شواء خشبي، ولّاعة أو لهب بنسن.

### إرشادات السلامة:



- اتَّبِعْ إرشاداتِ الأمان والسلامة في المختبر
- أرْتدي المعطفَ والقفازات والنظارات الواقية
- أحذر أن يلامس كربيد الكالسيوم يديّ وثيابي، وفي حالة حدوث ذلك أغسل يديّ بالماء جيّداً.

### خطوات العمل:



1. أستخدمُ قطعة المطاط في تثبيت عود الشواء الخشبي على المسطرة؛ بحيث يكون جزء منه مُمتدّاً خارج المسطرة على الأقلّ مسافة 10cm .
2. أقيسُ: 120mL من الماء المقطر بالمخبر المُدرّج وأضعُها في الكأس الزجاجية، ثم أقيسُ 5mL من سائل تنظيف الصحون بالمخبر نفسه، وأضيفها إلى الماء في الكأس الزجاجية.
3. أُطبِّقُ: أستخدمُ المِلقَط لأخذ قطعة صغيرة من كربيد الكالسيوم لا يزيد حجمُها عن حبة البازيلاء، وأضعُها في المحلول الذي حضّرتُه في الكأس الزجاجية.
4. أستخدمُ الولاعة أو لهب بنسن في إشعال عود الشواء؛ مُمسكاً المسطرة من الطرف المقابل

5. ألاحظُ: أُقَرِّبُ عودَ الشواءِ المشتعل من الفُقاعاتِ الناتجة من التفاعل الحاصل في الكأس، وألاحظُ ماذا يحدث، ثم أُطفِئُ عودَ الشواء.

6. أستخدمُ ساقَ التحريك في تحريك المحلول في الكأس، وألاحظُ هل تطفو الفُقاعاتُ في الهواء أم تغرق في الكاس.


### التحليلُ والاستنتاج:



1. هل انطفأ عودُ الشواء أم زاد اشتعالُه عند تقريبه من الكأس؟

.....  
.....

2. أوازنُ معادلةَ التفاعل الحاصل.



.....  
.....

3. أستنتجُ: أيُّهما أعلى كثافة: الإيثانين أم الماء؟ أفسِّرُ إجابتي.

.....  
.....

# أسئلة تفكير

1. أذكر أسماء المُركّبات العُضويّة غير الصحيحة، ثمّ أصحّحها في ما يأتي:

أ ( 2-ايثيل-2-بيوتين

ب) 2-ميثيل-4-بنتين

2. أفسّر قدرة الألكانات السائلة مثل الأوكتان على إذابة الشحوم أو المواد الدهنيّة على العكس من الماء.

3. أستنتج عبارة تُفسّر العلاقة بين عدد ذرات الكربون ودرجة غليان الألكانات.

4. عند وضع 50mL من الماء في كأس زجاجيّة سعة 150mL، ثمّ وُضِعَ 50mL من الهكسان فوقها، ثمّ أُسْقِطَ في الكأس قرص بلاستيكيّ، كما في الشكل المجاور؛ فإنّ العبارة الصحيحة هي:

أ ( كثافة القرص أكبر من كثافة الماء.

ب ( كثافة القرص أقل من كثافة الهكسان.

ج ( كثافة الماء أقل من كثافة القرص.

د ( كثافة الهكسان أقل من كثافة الماء.

5. أفسّر: أيّ الصيغ الآتية تُمثّل متصاوغات بنائيّة، أفسّر إجابتي

أ ( 4-إيثيل-4-ميثيل هبتان و 4-بروبيل هبتان



ب ( 2-ميثيل بنتان و 2،2-ثنائي ميثيل بنتان

6. في أثناء العمل في مختبر العلوم في المدرسة؛ لوحظ أنّ هناك عبوتين لمادتين عُضويّتين هما الهبتان و-2 هبتين؛ قد سقطت الأوراق الدالة على مُحتويات كُلِّ منهما، ولم يعد مُمكنًا تحديدُ محتوياتِ كُلِّ عبوة عن طريق دراسة تفاعلات المُركّبات العضوية؛ كيف يمكن التعرف على محتويات كل عبوة وإعادة لصق كل ورقة تدلُّ على محتويات العبوة الخاصة بها.

7. أفكّر: ألكانٌ كتلته المولية 44g/mol؛ فما الصيغة الجزيئية والبنائية له؟

8. أفسّر فشلَ نظرية القوة الحيوية.

9. أحسبُ النسبة بين عدد الروابط  $\pi$  إلى عدد الروابط  $\sigma$  في مُركّب البنزين.

# التصاوغ الوظيفي

## الخلفية العلمية:

يُعرّف التصاوغ بأنه وجود مركبين أو أكثر يشتركان في الصيغة الجزيئية ويختلفان في الصيغة البنائية، وتُسمى الصيغ البنائية الناتجة متصاوغات. وتعدُّ ظاهرة التصاوغ مألوفةً في المركبات العضوية. وللتصاوغ أنواعٌ عدّةٌ منها البنائي والهندسي، ويظهر في مشتقات المركبات الهيدروكربونية نوعٌ آخر من التصاوغ يسمى التصاوغ الوظيفي، ويحدث عندما يتشابه المركبان في الصيغة الجزيئية ويختلفان في المجموعة الوظيفية، فمثلاً تشترك الكحولات والإثيرات في الصيغة العامة  $C_n H_{2n+2} O$ ، ولكنهما يختلفان في المجموعة الوظيفية فهي مجموعة هيدروكسيل (-OH) في الكحول ROH ومجموعة إيثر (-O-) في الإثيرات R-O-R، ومن ثمَّ اختلاف الخصائص الفيزيائية والكيميائية لكلٍّ منها.

الهدف: أستكشف متصاوغات الصيغة الجزيئية  $C_4H_{10}O$ .

## المواد والأدوات:



مجموعة نماذج الجزيئات (الكرات والوصلات).

## إرشادات السلامة:



- اتَّبِعْ إرشادات السلامة العامة في المختبر.

- أرْتدي معطف المختبر والنظارات الواقية والقفازات.


## خطوات العمل:



1. أختارُ (4) كراتٍ تحتوي كل منها (4) ثقبٍ تُمثّل ذرات الكربون، وكرةً واحدةً تحتوي على ثقبين تُمثّل ذرة الأكسجين، و(10) كراتٍ تحتوي كل منها ثقبًا واحدًا تُمثّل ذرات الهيدروجين.

2. أُجربُ: أصلُ الكرات معًا بالوصلات بطرائق مختلفة؛

بحيث أحصلُ على أكبر عدد من المتصاوغات للصيغة الجزيئية  $C_4H_{10}O$ . والشكل المجاور يُمثّل أحد هذه المتصاوغات:





3. أرسم صيغاً بنائيةً للمتصاوغات التي حصلتُ عليها.

.....

.....

.....

### التحليلُ والاستنتاج:



1. أحددُ عددَ المتصاوغات التي حصلتُ عليها.

.....

.....

2. أصنّفُ المتصاوغات حسب ارتباط ذرة الأكسجين مع باقي الذرات.

.....

.....

.....

3. أتوقّع المتصاوغاتِ المتشابهةً في خصائصها الفيزيائية والكيميائية. أبرّر توقُّعي.

.....

.....

### الخلفية العلمية:

تتميز المركبات الهيدروكربونية بأنها مركبات غير قطبية لا تذوب في الماء، ولكن لاحتواء مركبات المشتقات الهيدروكربونية على ذرة أو أكثر من الأكسجين، أو النيتروجين، أو الهالوجين، وهي ذرات ذات سالبية كهربائية عالية بشكل عام؛ فإنها تُكسب هذه المركبات خصائص قطبية، لذلك فإنها تختلف في خصائصها الفيزيائية ومنها ذوبانها في الماء، وتتفاوت المشتقات الهيدروكربونية في قابليتها للذوبان في الماء اعتماداً على المجموعة الوظيفية في المركب، وكتلته المولية، وشكله البنائي؛ فالمجموعات الوظيفية التي تُكوّن روابط هيدروجينية مع الماء تذوب فيه بنسبة أكبر، ولأن هذه المركبات تتكون من طرفين؛ قطبي وهو الذي يحتوي المجموعة الوظيفية، وغير قطبي يُمثل السلسلة الكربونية R للمركب، فإن ذائبية المركب في الماء تقلُّ بزيادة عدد ذرات الكربون فيه، وبالتالي فإن الذائبية في الماء لمركبات المشتقات الهيدروكربونية ناتجة عن عملية موازنة بين الجزء القطبي الذي يُكوّن روابط هيدروجينية مع الماء والجزء غير القطبي الذي لا يذوب فيه.

ملاحظة: عند تسجيل البيانات الخاصة بالذائبية يتم تصنيف المركبات كالتالي:

المواد إما أن تكون ذائبة أو ذائبة جزئياً أو غير ذائبة، فإذا امتزجت المادة مع الماء تُصنّف ذائبة، وإذا تكونت طبقتان منفصلتان وكانتا غير متساويتين في الحجم تُصنّف ذائبة جزئياً، وإذا تكونت طبقتان منفصلتان متساويتان في الحجم تُصنّف غير ذائبة.

**الهدف:** أستكشف ذوبان بعض المركبات العضوية في الماء.

### المواد والأدوات:



المركبات العضوية الآتية: كحول الإيثانول، ثنائي إيثيل إيثر، 1-هكسانول، إيثانال، أسيتون، حمض الإيثانويك، بروميد الإيثيل، ماء مُقطّر.

أنابيب اختبار عدد (7)؛ وأرقامها بحيث تشير الأرقام إلى المركبات العضوية المستخدمة بالترتيب، قطارة مُدرّجة، حامل أنابيب اختبار.

## إرشادات السلامة:



- أتبع إرشادات السلامة العامة في المختبر.
- ارتدي معطف المختبر والنظارات الواقية و القفازات والكمامة.
- أبعد المركبات العضوية عن مصدر اللهب.
- أحذر من استنشاق المواد العضوية بشكل مباشر بالأنف.

## خطوات العمل:



1. أقيس (1 mL) من الماء المُقطَّر باستخدام القطارة وأضعها في أنبوب الاختبار رقم (1).
2. أقيس (1 mL) من كحول الإيثانول باستخدام القطارة، وأضيفها إلى الماء في أنبوب الاختبار رقم (1) قطرة بعد قطرة، وأطرق بطرف السبابة على الجزء السفلي من الأنبوب بهدف التحريك.
3. ألاحظ: هل يمتزج كحول الإيثانول مع الماء، أم تتكوّن طبقتان منفصلتان؟ وإذا تكوّنتا؛ فهل هما متساويتان في الحجم أم لا؟
4. أسجّل بياناتي كالاتي: يمتزج كلياً، يمتزج جزئياً، لا يمتزج.
5. أكّرر الخطوات السابقة باستخدام المركبات العضوية المتبقية وأسجّل ملاحظاتي.
6. أنظّم البيانات: أسجّل ملاحظاتي حول ذوبان كل مركب في الجدول الآتي:

المركب العضوي	الحالة	صفة الذوبان في الماء
إيثانول	يمتزج كلياً، يمتزج جزئياً، لا يمتزج	ذائب، ذائب جزئياً، لا يذوب
ثنائي إيثيل إيثر		
1-هكسانول		
إيثانال		
أسيتون		
حمض الإيثانويك		
بروميد الإيثيل		

## التحليل والاستنتاج:

1. أصنّف المركّبات العضوية حسب ذوبانها في الماء.

.....  
.....

2. أميّز نوع قوى التجاذب بين جزيئات كلّ مركّب.

.....  
.....

3. استنتج العلاقة بين نوع قوى التجاذب بين جزيئات السائل وذوبانه في الماء.

.....  
.....

4. استنتج العلاقة بين عدد ذرات الكربون في المركّب وذوبانه في الماء.

.....  
.....

5. أفسّر: يذوب الإيثانول تمامًا في الماء، في حين لا يذوب 1- هكسانول تمامًا فيه.

.....  
.....

### الخلفية العلمية:

تُعرَّف المبلِمِرات بأنَّها جزيئاتٌ ضخمةٌ ناتجةٌ عن تفاعلٍ عددٍ كبيرٍ من جزيئاتٍ صغيرةٍ تُسمَّى مونومراتٍ ضمنَ ظروفٍ مُناسبةٍ من: الضغط، ودرجة الحرارة، ووجود عوامل مساعدة، وقد تمكَّن العلماء من تحضير أول مُبلِمِرٍ صناعيٍّ متعدد الإِيثِين عن طريق تفاعلٍ إضافةٍ بين جزيئات الإِيثِين  $CH_2=CH_2$  تحتَ ضغطٍ كبيرٍ بوجود عاملٍ مُساعدٍ مُناسبٍ، ممَّا يُؤدِّي إلى كسر الرابطة  $\pi$  بين ذرتي الكربون في الإِيثِين، وتترابط الجزيئاتُ معًا مُكوِّنةً سلسلةً طويلةً من المُبلِمِر، وتُسمَّى هذه العملية بلمرة الإضافة.

**الهدف:** أبني نموذجًا لمُبلِمِرٍ مُتَعَدِّدٍ الإِيثِين.



### الموادُّ والأدوات:



مجموعة نماذج الجزيئات (الكرات والوصلات).

### إرشادات السلامة:




- اتَّبِعْ إرشادات السلامة العامة في المختبر.

- ارتدي معطف المختبر والنظارات الواقية والقفازات والكمامة.

### خطوات العمل:



1. أُجَرِّب: أصمم 3 نماذج لجزيء الإِيثِين  $C_2H_4$  مستخدمًا الكرات والوصلات كما في الشكل.
2. أُجَرِّب: أفكِّ الرابطة الشائئية في كلِّ نموذج، وأربط إحدى ذرتي كربون من كلِّ نموذج مع ذرة كربون من نموذجٍ آخر.
3. ألاحظ: تكونت لدي سلسلة من 6 ذرات كربون تمثل جزءًا من مُبلِمِرٍ متعدد الإِيثِين كما في الشكل الآتي:



بناء نموذج لمُبلِمِرٍ مُتَعَدِّدٍ الإِيثِين

## التحليل والاستنتاج

1. ألاحظُ: هل اكتمل عدد الروابط حول ذرتي الكربون في طرفي السلسلة؟

.....  
.....

2. أستنتجُ: هل يُمكن إضافة جزيئات إيثين جديدة إلى هذه السلسلة؟ أفسّر إجابتي.

.....  
.....

### الخلفية العلمية:

تُعرّف درجة الغليان بأنها درجة الحرارة التي يتساوى عندها الضغط البخاري للسائل مع الضغط الواقع على سطحه، وتعتمد درجة الغليان على قوى التجاذب بين الجزيئات وتزداد بزيادتها، وهي خاصية فيزيائية مميزة للمادة؛ فلكل مادة درجة غليان مختلفة عن بقية المواد. وتتميز مركبات المشتقات الهيدروكربونية بارتفاع درجة غليانها مقارنةً بالمركبات الهيدروكربونية المقاربة لها في الكتلة المولية، وتتفاوت في ما بينها في درجات غليانها؛ اعتماداً على طبيعة المجموعة الوظيفية في المركب، وكتلته المولية، والشكل البنائي له.

### الهدف: أكتشف درجة غليان بعض المركبات العضوية.

#### المواد والأدوات:

كحول الإيثانول 25mL، أسيتون 25mL.


مخبراً مدرّج (50mL) عدد 2، جهاز التقطير، قطع بورسلان، دورق مخروطي سعة 100mL عدد 2.

#### إرشادات السلامة:

- اتّبع إرشادات السلامة العامة في المختبر.
- ارتدي معطف المختبر والنظارات الواقية والقفازات والكمامة.
- أبعد المركبات العضوية عن مصدر اللهب.
- أحذر من استنشاق المواد العضوية بشكل مباشر بالأنف.

#### خطوات العمل:

1. أقيس (25 mL) من كحول الإيثانول باستخدام المخبر المدرّج وأضعها في دورق التقطير.
2. أضع (3) قطع بورسلان Boiling Chips في الدورق.
3. أجرب: أركب جهاز التقطير كما في الشكل.
4. أسخن الدورق على نار هادئة.



5. أسجّل البيانات: أسجّل درجة الحرارة التي يبدأ عندها الإيثانول بالغليان، وأستمّر في مراقبة درجة الحرارة حتى يقطر معظم السائل (تكون درجة الحرارة ثابتة خلال التقطير؛ وهي درجة الغليان).
6. أظنّ: أكرّر الخطوات السابقة باستخدام الأسيتون.
7. أنظّم البيانات: أسجّل النتائج في الجدول:

اسم المادة	الصيغة البنائية	درجة الغليان
الإيثانول		
الأسيتون		

## التحليل والاستنتاج

1. أفسّر إضافة قطع البورسلان إلى دورق التقطير قبل بدء التسخين.

.....

.....

2. أقرن درجة الغليان التي حصلت عليها ودرجة الغليان العادية لكلا المركبين، وأفسّر الاختلاف إن وجد.

.....

.....


3. أقرن: أيهما أعلى درجة غليان: كحول الإيثانول أم الأسيتون؟ أبرر إجابتي.

.....

.....

# أسئلة تفكير


## السؤال الأول:



يُمثّل الشكل المجاور تغيّر درجة الغليان مع الكتلة المولية لعدد من الكحولات وكلورو ألكانات ذات السلاسل المُستمرّة المكونة من عدد من ذرات الكربون من 2-10 من 1-الكانول و1-كلورو ألكان، اعتمادًا عليه أجبُ عما يأتي:

أ. أفسّر ارتفاع درجة غليان الكحولات مقارنة مع الكلورو ألكانات المقاربة لها في الكتلة المولية.

ب. أفسّر تناقص الاختلاف في درجة الغليان بين الكحولات والكلورو ألكانات بزيادة عدد ذرات الكربون في السلسلة.



## السؤال الثاني:

أفسّر: لا يصفُ الأطباءُ دواءً الأسبرينَ لمرضى قُرحة المعدة.

### السؤال الثالث:

يتضمن الجدول المجاور درجة غليان كل من حمض الإيثانويك وجلايكول الإيثيلين.

الصيغة البنائية	درجة الغليان °C
CH <sub>3</sub> COOH	118
HOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> OH	197

أفسر: ارتفاع درجة غليان جلايكول الإيثيلين مقارنةً بحمض الإيثانويك رغم تقارب كتلتها المولية.

.....

.....

### السؤال الرابع:

مركب غير معروف الصيغة الجزيئية له C<sub>5</sub>H<sub>10</sub>O<sub>2</sub>، فإذا علمت أن المجموعة الوظيفية له طرفية، وأنه لا يحتوي حلقات هيدروكربونية، وأنه يُغيّر لون ورقة تباع الشمس من الأزرق إلى الأحمر؛ أكتب الصيغ البنائية المحتملة له جميعها.

.....

.....

.....

.....