



# الرياضيات

الفصل الدراسي الأول

كتاب الطالب

الفرع العلمي

11

فريق التأليف

الناشر: المركز الوطني لتطوير المناهج

يسر المركز الوطني لتطوير المناهج استقبال آرائكم وملحوظاتكم على هذا الكتاب عن طريق العناوين الآتية:



06-5376262 / 237



06-5376266



P.O.Box: 2088 Amman 11941



@nccdjor



feedback@nccd.gov.jo



www.nccd.gov.jo



## المقدمة

انطلاقاً من إيمان المملكة الأردنية الهاشمية الراسخ بأهمية تنمية قدرات الإنسان الأردني، وتسليحه بالعلم والمعرفة؛ سعى المركز الوطني لتطوير المناهج، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، إلى تحديث المناهج الدراسية وتطويرها، لتكون معيّنًا للطلبة على الارتقاء بمستواهم المعرفي، ومجاراة أقرانهم في الدول المتقدمة. ولما كانت الرياضيات إحدى أهمّ المواد الدراسية التي تنمّي لدى الطلبة مهارات التفكير وحلّ المشكلات، فقد أولى المركز هذا المبحث عنايةً كبيرةً، وحرص على إعداد كتب الرياضيات وفق أفضل الطرائق المُتبَّعة عالمياً على يد خبراء أردنيين؛ لضمان انسجامها مع القيم الوطنية الراسخة، وتلبّيتها لاحتياجات أبنائنا الطلبة والمُعَلِّمين.

روعي في إعداد كتب الرياضيات تقديم المحتوى بصورة سلسلة، ضمن سياقات حياتية شائعة، تزيد رغبة الطلبة في التعلّم، ووظّفت فيها التكنولوجيا لتُسهّل في جعل الطلبة أكثر تفاعلاً مع المفاهيم المُقدّمة لهم. وقد احتوت الكتب على مشروع لكل وحدة؛ لتعزيز تعلّم الطلبة للمفاهيم والمهارات الواردة فيها وإثرائها. ولأنّ التدرّب المكثّف على حلّ المسائل يُعدّ إحدى أهمّ طرائق ترسيخ المفاهيم الرياضية وزيادة الطلاقة الإجرائية لدى الطلبة؛ فقد أُعدّ كتاب التمارين على نحوٍ يُقدّم للطلبة ورقة عمل في كل درس، تُحلّ بوصفها واجباً منزلياً، أو داخل الغرفة الصفية إن توافر الوقت الكافي. ولأنّنا ندرك جيداً حرص المعلّم الأردني على تقديم أفضل ما لديه للطلبة؛ فقد جاء كتاب التمارين أداةً مساعدة تُوفّر عليه جهد إعداد أوراق العمل وطباعتها.

من المعلوم أنّ الأرقام العربية تُستخدم في معظم مصادر تعليم الرياضيات العالمية، ولا سيّما على شبكة الإنترنت، التي أصبحت أداةً تعليميةً مهمّةً؛ لما تزخر به من صفحات تُقدّم محتوىً تعليمياً تفاعلياً ذا فائدة كبيرة. وحرصاً منا على ألا يفوت أبنائنا الطلبة أيّ فرصة، فقد استعملنا في هذا الكتاب الأرقام العربية؛ لجسر الهوة بين طلبتنا والمحتوى الرقمي العلمي، الذي ينمو بتسارع في عالم يخطو نحو التعليم الرقمي بوتيرة متسارعة.

ونحن إذ نُقدّم هذا الكتاب، نأمل أن ينال إعجاب أبنائنا الطلبة ومعلّميهم، ويجعل تعليم الرياضيات وتعلّمها أكثر متعةً وسهولةً، ونعدهم بأنّ نستمرّ في تحسين هذا الكتاب في ضوء ما يصلنا من ملاحظات.

المركز الوطني لتطوير المناهج

# قائمة المحتويات

|    |                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------|
| 6  | <b>الوحدة 1</b> الاقتران المتشعبة والمتباينات               |
| 8  | الدرس 1 الاقتران المتشعب واقتران القيمة المطلقة             |
| 15 | الدرس 2 حلّ معادلات ومتباينات القيمة المطلقة                |
| 25 | الدرس 3 حلّ نظام مُكوّن من متباينات خطيّة بمتغيّرين بيانياً |
| 25 | الدرس 4 البرمجة الخطيّة                                     |
| 33 | اختبارُ نهايةِ الوحدة                                       |

|    |                                                        |
|----|--------------------------------------------------------|
| 60 | <b>الوحدة 2</b> الاقتران الأسية والاقتران اللوغاريتمية |
| 62 | الدرس 1 الاقتران الأسية                                |
| 70 | الدرس 2 الاقتران اللوغاريتمية                          |
| 79 | الدرس 3 قوانين اللوغاريتمات                            |
| 86 | اختبارُ نهايةِ الوحدة                                  |

## قائمة المحتويات

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| الوحدة 3 تحليل الاقترانات             | 88  |
| الدرس 1 نظريتنا الباقي والعوامل       | 90  |
| الدرس 2 الكسور الجزئية                | 96  |
| الدرس 3 التحويلات الهندسية للاقترانات | 106 |
| الدرس 4 النهايات والاتصال             | 112 |
| اختبار نهاية الوحدة                   | 118 |

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| الوحدة 3 المشتقات                           | 120 |
| الدرس 1 اشتقاق اقتران القوة                 | 124 |
| الدرس 2 قاعدة السلسلة                       | 133 |
| الدرس 3 رسم منحنى الاقتران باستعمال المشتقة | 140 |
| الدرس 4 تطبيقات عملية على الاشتقاق          | 158 |
| اختبار نهاية الوحدة                         | 172 |

# الاقتارات المتشعبة والمتباينات

## Piecewise Functions and Inequalities

الوحدة

1

### ما أهمية هذه الوحدة؟

تُستعمل الاقتارات المتشعبة واقتارات القيمة المطلقة؛ لنمذجة مواقف حياتية كثيرة، مثل حساب أثمان المياه والكهرباء وفق شرائح الاستهلاك المختلفة، أو حساب ضريبة الدخل تبعاً لشرائح الدخل المتعددة. وتُستعمل المتباينات والبرمجة الخطية في نواحٍ اقتصادية كثيرة؛ لخفض التكاليف وزيادة الإنتاجية وتحقيق أكبر ربح ممكن.

### سأتعلّم في هذه الوحدة:

- ◀ الاقتران المتشعب و اقتران القيمة المطلقة وتمثيلهما بيانياً.
- ◀ حل معادلات ومتباينات القيمة المطلقة.
- ◀ تمثيل منطقة حل أنظمة متباينات خطية بمتغيّرين.
- ◀ إيجاد الحلّ الأمثل في مسائل حياتية؛ باستعمال البرمجة الخطية.

### تعلّمتُ سابقاً:

- ✓ تمثيل اقترانات كثيرات الحدود والاقترانات النسبية بيانياً.
- ✓ حل معادلات خطية وتربيعية بمتغيّر واحد.
- ✓ حل أنظمة معادلات خطية وغير خطية بمتغيّرين.
- ✓ حل متباينات خطية بمتغيّر واحد.

## الاقتارات المتشعبة Piecewise functions

تعرف الاقتارات المتشعبة واقتارات القيمة المطلقة وتمثيلهما بيانياً، وتحديد مجال كل منهما ومداها.

فكرة الدرس



المصطلحات



مسألة اليوم



الاقتارات المتشعبة، اقتارات القيمة المطلقة، رأس.

يُبين الجدول المجاور تعرفه  
ثمن المياه للاستهلاك المنزلي  
في الدورة الواحدة لبعض  
شرائح الاستهلاك. كم تدفع أسرة  
استهكت  $42 \text{ m}^3$  من الماء؟

| شرائح الاستهلاك<br>مقربة إلى أقرب $\text{m}^3$ | التعرفة<br>$\text{JOD/m}^3$ |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| 0 – 18                                         | 0.361                       |
| 19 – 36                                        | 0.450                       |
| 37 – 54                                        | 0.550                       |
| 55 – 72                                        | 1.000                       |



ألاحظ في المسألة السابقة، أنه لا يمكن كتابة معادلة واحدة بدلالة كمية المياه المستهلكة  $x$  نستطيع عن طريقها حساب ثمن المياه لقيم  $x$  جميعها من  $(0 - 72)$ ، وسنحتاج إلى معادلة خاصة بكل واحدة من شرائح الاستهلاك.

يُسمى الاقتارات الذي يُعرف بمعادلات مختلفة لأجزاء مختلفة من مجاله **اقتاراً متشعباً** (Piecewise function).

### مثال 1

$$f(x) = \begin{cases} -2x + 1, & -3 \leq x < 1 \\ x^2, & x \geq 1 \end{cases}$$

1 أحدد مجال  $f(x)$

ألاحظ أن مجال هذا الاقتارات  $f(x)$  هو الفترة  $[-3, \infty)$ ، وأنه معرف بمعادلتين (أو قاعدتين)؛ الأولى  $f(x) = 2x + 1$  وتُستعمل لحساب قيم الاقتارات عندما تكون  $-3 \leq x < 1$ ، والثانية  $f(x) = x^2$  وتُستعمل لحساب قيم الاقتارات عندما تكون  $x \geq 1$ .

2 أجد قيمة كلٍّ من  $f(-2)$  و  $f(1)$

$f(1)$   
بما أن  $1 \leq 1$ ؛ إذن: أستخدم القاعدة الثانية.

$f(x) = x^2$  القاعدة الثانية  
 $f(1) = (1)^2$  بتعويض  $x = 1$   
 $= 1$  بالتبسيط

$f(-2)$   
بما أن  $-3 < -2 < 1$ ؛ إذن: أستخدم القاعدة الأولى.

$f(x) = -2x + 1$  القاعدة الأولى  
 $f(-2) = -2(-2) + 1$  بتعويض  $x = -2$   
 $= 5$  بالتبسيط

3 أمثل الاقتران  $f(x)$  بيانيًا، وأحدد مداه.


**الخطوة 1:** أمثل  $f(x) = -2x + 1$  عندما  $-3 \leq x < 1$   
أجد قيمة الاقتران  $f(x) = -2x + 1$  عندما  $x = 1$ ، وعندما  $x = -3$  كما في الجدول الآتي:

|                      |           |           |
|----------------------|-----------|-----------|
| $x$                  | -3        | 1         |
| $y = f(x) = -2x + 1$ | 7         | -1        |
| $(x, y)$             | $(-3, 7)$ | $(1, -1)$ |

أعین النقطتين  $(-3, 7)$ ،  $(1, -1)$  في المستوى الإحداثي وأصل بينهما، وبما أن العدد -3 يُحقّق المتباينة؛ أبدأ التمثيل بدائرة مغلقة عند النقطة  $(-3, 7)$ ، أما العدد 1 فهو لا يُحقّق المتباينة؛ لذا، أنهي التمثيل بدائرة مفرّغة عند النقطة  $(1, -1)$ .

**الخطوة 2:** أمثل  $f(x) = x^2$  عندما  $x \geq 1$

الاقتران  $f(x) = x^2$  قطع مكافئ مفتوح إلى الأعلى؛ لأن  $a > 0$ . إحداثيات رأس الاقتران  $(0, 0)$  وهو لا ينتمي إلى مجال الاقتران؛ لذا، لا أستطيع تعويضه في قاعدة الاقتران، وأكتفي بإنشاء جدول قيم لبعض قيم  $x$  الأكبر من أو تساوي 1



|                  |          |          |          |
|------------------|----------|----------|----------|
| $x$              | 1        | 2        | 3        |
| $y = f(x) = x^2$ | 1        | 4        | 9        |
| $(x, y)$         | $(1, 1)$ | $(2, 4)$ | $(3, 9)$ |

أعین النقاط  $(1, 1)$ ،  $(2, 4)$ ،  $(3, 9)$  في المستوى الإحداثي، ثم أصل بينها بخط منحنٍ، وبما أن العدد 1 يُحقّق المتباينة، إذن: أبدأ التمثيل بدائرة مغلقة عند  $(1, 1)$ .

إنّ مدى هذا الاقتران هو  $y > -1$  ويمكن التعبير عنه بالفترة  $(-1, \infty)$ .

أتذكّر

بما أن  $f(x) = -2x + 1$  اقتران خطّي؛ لذا، يكفي نقطتان لتمثيله بيانيًا.

### أتحقق من فهمي


$$f(x) = \begin{cases} 3x + 2, & x < 2 \\ 5, & x = 2 \\ 2x - 1, & x > 2 \end{cases} \quad \text{إذا كان}$$

(a) أحدّد مجال  $f(x)$  (b) أحسب قيمة كلّ من  $f(5)$  و  $f(2)$

(c) أمثل الاقتران  $f(x)$  بيانيًا، وأحدّد مجاله ومداه.

يُمكنني أيضًا أن أجد قاعدة الاقتران المتشعب؛ إذا أُعطيت تمثيله البياني، كما يتّضح من المثال الآتي.

### مثال 2



أكتب قاعدة الاقتران المتشعب الممثل بيانيًا في الشكل المجاور.

أكتب الاقتران الذي يُمثل كلّ جزء في التمثيل البياني.

### أتذكر

ميل المستقيم المار بالنقطتين

$(x_1, y_1)$ ،  $(x_2, y_2)$  هو:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

ومعادلته بصيغة الميل

والمقطع:

$$y = mx + b$$

**الخطوة 1:** أكتب القاعدة التي يُمثلها الجزء الأيسر من التمثيل البياني، وهو شعاع يمرّ بالنقطتين:

$(-1, 0)$ ،  $(0, -1)$ . ميله  $-1$  ومعادلته بصيغة الميل والمقطع هي:  $y = -x - 1$ ، ووجود دائرة مظلّلة عند النقطة  $(0, -1)$ ، يعني أنّ هذه القاعدة تقابل الفترة  $(-\infty, 0]$  من مجال الاقتران  $f(x)$ .

**الخطوة 2:** أكتب القاعدة التي يُمثلها الجزء الأوسط، وهو قطعة مستقيمة توازي المحور  $x$  وطرفاها النقطتان  $(0, 2)$ ،  $(2, 2)$ ، فتُمثل الاقتران الثابت:


$f(x) = 2$ ، ولوجود دائرة مظلّلة عند  $(2, 2)$ ، ودائرة مفرّغة عند  $(0, 2)$ ، فهذه القاعدة تقابل الفترة  $(0, 2]$  من مجال الاقتران  $f(x)$ .

**الخطوة 3:** أكتب القاعدة التي يُمثلها الجزء الأيمن، وهو شعاع يمرّ بالنقطتين  $(3, 3.5)$ ، و  $(4, 4)$ . ميله 0.5 ومعادلته بصيغة الميل ونقطة هي:  $y - 4 = 0.5(x - 4)$ ، ويمكن إعادة كتابتها على صورة الميل والمقطع:  $y = 0.5x + 2$ ، ولوجود دائرة مفرغة عند  $(2, 3)$ ، يعني أن هذه القاعدة تقابل الفترة  $(2, \infty)$  من مجال الاقتران  $f(x)$ . إذن: تكون قاعدة هذا الاقتران على النحو الآتي:

$$f(x) = \begin{cases} -x - 1, & x \leq 0 \\ 2, & 0 < x \leq 2 \\ 0.5x + 2, & x > 2 \end{cases}$$

**أتحقق من فهمي**

أكتب قاعدة الاقتران المتشعب الممثل بيانياً في الشكل المجاور.



يوجد نوع خاص من الاقترانات المتشعبة يُسمّى **اقتران القيمة المطلقة** (absolute value function) وهو اقتران يحتوي على قيمة مطلقة لمقدار جبري، ومن أمثلته:

$$f(x) = |x + 2|, \text{ و } f(x) = 2|x| + 3, \text{ و } f(x) = |x^2 - 2x - 3|, \text{ و } f(x) = \left| \frac{x+2}{2x-6} \right|$$

تعلمت سابقاً أن القيمة المطلقة لأيّ عدد حقيقي  $x$  والتي يُرمز لها بالرمز  $|x|$  تساوي بعده عن الصفر على خط الأعداد، وبما أن البعد لا يكون سالباً، فإن  $|x| \geq 0$ ؛ لذا، يُمكن كتابة  $|x|$  بصورة اقتران متشعب كما يأتي:

$$|x| = \begin{cases} -x, & x < 0 \\ x, & x \geq 0 \end{cases}$$

ويُمكن إعادة كتابة أيّ اقتران قيمة مطلقة على صورة اقتران متشعب، من دون استعمال رمز القيمة المطلقة، وهو ما يُسمّى إعادة تعريف اقتران القيمة المطلقة.

**أتذكّر**

القيمة المطلقة لأيّ عدد حقيقي  $x$  والتي يُرمز لها بالرمز  $|x|$  تساوي بعده عن الصفر على خط الأعداد.

$$|x| = x, x \geq 0$$

$$|x| = -x, x < 0$$

مثال:

$$\left| -\frac{1}{2} \right| = \left| +\frac{1}{2} \right| = \frac{1}{2}$$

### مثال 3

أعيد تعريف كل من الاقترانات الآتية:

1  $f(x) = |2x + 4|$

**الخطوة 1:** أجعل ما بداخل القيمة المطلقة يساوي صفرًا، ثم أحل المعادلة الناتجة:

$$2x + 4 = 0$$

بجعل ما في داخل القيمة المطلقة يساوي صفرًا

$$2x + 4 - 4 = 0 - 4$$

بطرح 4

$$\frac{-2x}{-2} = \frac{-4}{-2}$$


بالقسمة على -2

$$x = -2$$

بالتبسيط


**الخطوة 2:** أعيّن صفر المعادلة على خط الأعداد، ثم أحدد الإشارة على جانبيه.

أعيّن صفر المعادلة على خط الأعداد. ولتحديد الإشارة على جانبيه؛ أعرّض أيّ قيمة أقل من -2 في  $2x + 4$  لأجد أنّ ناتج التعويض سالب دائمًا، ما يعني أنّ الإشارة يسار -2 سالبة. وأعرّض أيّ قيمة أكبر من -2 في  $2x + 4$  لأجد أنّ ناتج التعويض موجب دائمًا، ما يعني أنّ الإشارة يمين -2 موجبة.



**الخطوة 3:** أكتب قاعدة الاقتران حسب إشارة يمين صفر المعادلة ويساره.

أكتب ما في داخل القيمة المطلقة كما هو في الجزء الموجب، وأكتب في الجزء السالب ما في داخل القيمة المطلقة مضروبًا في -1



**الخطوة 4:** أكتب قاعدة الاقتران المتشعب.

$$f(x) = \begin{cases} -2x - 4, & x < -2 \\ 2x + 4, & x \geq -2 \end{cases}$$

### أتعلم

يأخذ الاقتران الخطّي يمين صفه إشارة معامل  $x$  نفسها، ويسار صفه عكس إشارة معامل  $x$ .

2  $f(x) = |2x^2 + 5x - 3|$

**الخطوة 1:** أجعل ما في داخل القيمة المطلقة يساوي صفرًا، ثم أحل المعادلة الناتجة:

$$2x^2 + 5x - 3 = 0 \quad \text{بجعل ما في داخل القيمة المطلقة يساوي صفرًا}$$

$$(2x - 1)(x + 3) = 0 \quad \text{بتحليل العبارة التربيعية إلى عواملها الأولية}$$

$$2x - 1 = 0 \text{ or } x + 3 = 0 \quad \text{بجعل كل عامل يساوي صفرًا}$$


$$x = \frac{1}{2} \text{ or } x = -3 \quad \text{بحل كل معادلة}$$

**الخطوة 2:** أعيّن صفري المعادلة على خط الأعداد، ثم أحدد الإشارة على جانبيهما.

أعيّن صفري المعادلة على خط الأعداد. ولتحديد الإشارة على جانبيهما، أختار قيمة من كل منطقة وأعوّضها لأجد أن إشارة المعادلة يسار  $-3$  ويمين  $\frac{1}{2}$  موجبة، والإشارة بينهما سالبة.



**الخطوة 3:** أكتب قاعدة الاقتران حسب إشارة يمين أصفار المعادلة ويسارها.



**الخطوة 4:** أكتب قاعدة الاقتران المتشعب.

$$f(x) = \begin{cases} 2x^2 + 5x - 3, & x < -3 \text{ and } x > \frac{1}{2} \\ -2x^2 - 5x + 3, & -3 \leq x \leq \frac{1}{2} \end{cases}$$

أتحقق من فهمي 

أعيد تعريف كل من الاقترانات الآتية:

a)  $f(x) = |-5x + 15|$

b)  $f(x) = |5x^2 + x - 3|$

يتكوّن التمثيل البياني لاقتران القيمة المطلقة على الصورة  $f(x) = a|mx+b|+c$  ،  $m \neq 0$  من شعاعين على شكل V متماثلين حول المحور  $x = -\frac{b}{m}$  ، ورأس (vertex) الاقتران هو النقطة التي يصل عندها الاقتران إلى أعلى قيمة أو أقل قيمة وإحداثياتها  $(-\frac{b}{m}, c)$  ، ويمكن تمثيله بعدة طرائق منها: الانعكاس حول المحور  $x$  ، واستعمال محور التماثل والرأس.

#### مثال 4


أمثل بيانيًا كل اقتران مما يأتي، محدّدًا مجاله ومداه:

1  $f(x) = |x|$

**الطريقة الأولى:** الانعكاس حول محور السينات.

**الخطوة 1:** أمثل المعادلة داخل اقتران القيمة المطلقة بيانيًا.

أمثل المعادلة  $y = x$ ؛ باختيار نقطتين لتمثيله.



**الخطوة 2:** أعكس الجزء الواقع تحت

المحور  $x$  حول المحور  $x$ .

بما أنّ القيمة المطلقة لأيّ عدد لا يمكن

أن تكون سالبة؛ لذا، فإنّه عند أخذ القيمة

المطلقة للاقتران، فهذا يعني عكس الجزء

الواقع تحت المحور  $x$  حول المحور  $x$ .

**الطريقة الثانية:** استعمال محور التماثل والرأس.

**الخطوة 1:** أجد إحداثيّ نقطة رأس الاقتران، ومعادلة محور التماثل.


إحداثيّ نقطة الرأس  $(0, 0)$ ، ومعادلة محور التماثل  $x = 0$

**الخطوة 2:** أجد نقطتين حول محور التماثل.

بما أنّ محور التماثل  $x = 0$ ، أختار قيمة لـ  $x$  أكبر من 0 (مثلاً 1) وقيمة لـ  $x$  أقل من 0

(مثلاً -1)، ثم أجد صورتيهما في الاقتران.

|              |           |          |
|--------------|-----------|----------|
| $x$          | -1        | 1        |
| $f(x) =  x $ | 1         | 1        |
| $(x, y)$     | $(-1, 1)$ | $(1, 1)$ |



**الخطوة 3:** أمثل النقطتين والرأس بيانيًا.

أمثل الرأس والنقطتين في المستوى الإحداثي، وأصل بين النقاط الثلاثة بشكل V.

يلاحظ من الرسم أنّ المجال هو مجموعة الأعداد الحقيقية، وأن المدى  $[0, \infty)$

**2**  $f(x) = -|x + 2| + 3$


**الخطوة 1:** أجد إحداثيي نقطة رأس الاقتران، ومعادلة محور التماثل.

إحداثيا نقطة الرأس  $(-2, 3)$ ، ومعادلة محور التماثل  $x = -2$

**الخطوة 2:** أجد نقطتين حول محور التماثل.

بما أنّ محور التماثل  $x = -2$ ، أختار قيمة لـ  $x$  أكبر من  $-2$  (مثلاً  $-1$ ) وقيمة لـ  $x$  أقل من  $-2$  (مثلاً  $-3$ )، ثم أجد صورتيهما في الاقتران.

|                       |           |           |
|-----------------------|-----------|-----------|
| $x$                   | $-3$      | $-1$      |
| $f(x) = - x + 2  + 3$ | $2$       | $2$       |
| $(x, y)$              | $(-3, 2)$ | $(-1, 2)$ |



**الخطوة 3:** أمثل النقطتين والرأس بيانيًا.

أمثل الرأس والنقطتين في المستوى الإحداثي، وأصل بين النقاط الثلاثة بشكل V.

ألاحظ من الرسم أنّ المجال هو مجموعة الأعداد الحقيقية، وأن المدى  $(-\infty, 3]$ .

## أتعلم

يكون اقتران القيمة المطلقة على الصورة  $f(x) = a|mx + b| + c$ ،  $m \neq 0$  مفتوحًا إلى الأعلى إذا كانت  $a > 0$  ومفتوحًا إلى الأسفل إذا كانت  $a < 0$

## أتحقق من فهمي

أمثل بيانيًا كلّ اقتران ممّا يأتي، محدّدًا مجاله ومداه:

a)  $f(x) = |2x|$

b)  $f(x) = |2 - \frac{1}{2}x|$

وَيُمْكِنُنِي أَيْضًا تَمَثِيل اقتران القيمة المطلقة لمقدار تربيعي؛ باستعمال مفهوم الانعكاس.

**مثال 5** أمثل الاقتران  $f(x) = |x^2 - 4x - 5|$  بيانيًا.

**الخطوة 1:** أجد النقاط المهمة لتمثيل المعادلة داخل اقتران القيمة المطلقة.

أجد النقاط المهمة لتمثيل منحنى المعادلة التربيعية  $y = x^2 - 4x - 5$ ، وهي: المقطع  $y$ ، وجذور المعادلة، ورأس القطع المكافئ.

• المقطع  $y$ : عندما  $x = 0$ ؛ فإن قيمة  $y = -5$

• جذور المعادلة: أجد جذور المعادلة عندما  $y = 0$

$$x^2 - 4x - 5 = 0$$

$$(x + 1)(x - 5) = 0$$

$$x + 1 = 0 \text{ or } x - 5 = 0$$

$$x = -1 \text{ or } x = 5$$

بجعل ما في داخل القيمة المطلقة يساوي صفرًا

بتحليل العبارة التربيعية إلى عواملها الأولية

بجعل كل عامل يساوي صفرًا

بحل كل معادلة

• أجد إحداثيي رأس القطع المكافئ:

$$\text{vertex} = \left( \frac{-b}{2a}, f\left(\frac{-b}{2a}\right) \right) \quad \text{رأس القطع المكافئ}$$


$$= \left( \frac{-(-4)}{2}, f\left(\frac{-(-4)}{2}\right) \right) \quad \text{بتعويض } b = -4, a = 1$$

$$= (2, -9) \quad \text{بالتبسيط}$$

**الخطوة 2:** أمثل المعادلة داخل اقتران

القيمة المطلقة بيانيًا، ثم أعكس الجزء

الواقع تحت المحور  $x$  حول المحور  $x$ .



**أتدقق من فهمي**

أمثل الاقتران  $f(x) = |x^2 - 2x - 8|$  بيانيًا.

**أتذكر**

يُسمَّى منحنى المعادلة التربيعية قطعًا مكافئًا.

**أتذكر**

يُمثِّل الاقتران

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

قطعًا مكافئًا مفتوحًا إلى

الأعلى إذا كانت قيمة

$a > 0$ ، ومفتوحًا إلى

الأسفل إذا كانت قيمة

$a < 0$ ، ويُمكن إيجاد

إحداثيي رأس القطع

المكافئ على النحو

الآتي:

$$\text{vertex} = \left( \frac{-b}{2a}, f\left(\frac{-b}{2a}\right) \right)$$


يُمكن إيجاد قاعدة اقتران القيمة المطلقة لمقدار خطّي؛ إذا أُعطي تمثيله البياني.

مثال 6

اكتب قاعدة اقتران القيمة المطلقة الممثل بيانياً في الشكل المجاور.

**الخطوة 1:** أجد ميل المعادلة الخطية داخل المطلق.

يظهر من الشكل أن التمثيل البياني هو لاقتران قيمة مطلقة خطي؛ لأنه على شكل V؛ لذا، يمكن كتابة قاعدته على الصورة  $f(x) = a|mx + b| + c$ . حيث  $m$  ميل المستقيم  $y = mx + b$  وإحداثيا الرأس  $(-\frac{b}{m}, c)$ .



ألاحظ من الرسم أن الشعاع الأيمن يمرّ بالنقطتين (5, 4) و (3, 0)، إذن: فإن ميله يساوي:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{4 - 0}{5 - 3} = \frac{4}{2} = 2$$

**الخطوة 2:** أجد إحداثيي الرأس، ثم أعوض الميل وإحداثيي الرأس في قاعدة الاقتران.

يظهر من التمثيل البياني أيضاً أن الرأس (3, 0)، إذن: يمكن إيجاد قيمة  $b$  من الإحداثي  $x$  للرأس والميل حيث:

$$x = -\frac{b}{m}$$

الإحداثي  $x$  للرأس

$$3 = -\frac{b}{2}$$

بتعويض  $m = 2$  و  $x = 3$

$$-b = 6$$

بالضرب التبادلي

$$b = -6$$

بالقسمة على -1

وبتعويض الرأس والميل وقيمة  $b$  في قاعدة الاقتران؛ فإن:

$$f(x) = a|2x - 6| + 0 \longrightarrow f(x) = a|2x - 6|$$

**الخطوة 3:** أجد قيمة  $a$ .

ولإيجاد قيمة  $a$ ؛ أعوض في قاعدة الاقتران إحداثيي نقطة تقع على منحنى الاقتران، وأحلّ المعادلة الناتجة.

$$f(x) = a|2x - 6|$$

قاعدة الاقتران

$$6 = a|2(0) - 6|$$

بتعويض (0, 6)

$$6 = 6a$$

بالتبسيط

$$a = 1$$

بالقسمة على 6


إذن: قاعدة هذا الاقتران هي:  $f(x) = |2x - 6|$ .

أتعلم

يسهل تعويض نقطة تقاطع الاقتران مع المحور  $y$  لإيجاد قيمة  $a$ ؛ لأن قيمة  $x$  فيها تساوي صفراً.

### أتحقق من فهمي

أكتب قاعدة اقتران القيمة المطلقة الممثل بيانيًا في الشكل المجاور.



يُمكن نمذجة الكثير من المواقف الحياتية؛ باستعمال الاقترانات المتشعبة.

### مثال 7: من الحياة



تُحسب شركة الأجرة الأسبوعية لعمّالها في الساعة. أجرة ساعة العمل الواحدة 4 دنانير في أوقات العمل النظامية المعتادة ضمن 40 ساعة عمل في الأسبوع. وتدفع لكل ساعة عمل إضافي فوق ذلك أجرة ساعة ونصف من ساعات العمل المعتاد. أكتبُ اقترانًا لحساب الأجرة الأسبوعية لعامل اشغل  $x$  ساعة في أسبوع.

يوجد في المسألة قاعدتان لحساب الأجرة؛ تبعًا لعدد ساعات العمل.

| عدد الساعات        | الأجرة              |
|--------------------|---------------------|
| $0 \leq x \leq 40$ | $4x$                |
| $x > 40$           | $4(40) + 6(x - 40)$ |

إذن: اقتران الأجرة هو:

$$f(x) = \begin{cases} 4x, & 0 \leq x \leq 40 \\ 4(40) + 6(x-40), & x > 40 \end{cases} = \begin{cases} 4x, & 0 \leq x \leq 40 \\ 6x - 80, & x > 40 \end{cases}$$

### أتحقق من فهمي

زادت شركة رواتب موظفيها الشهرية وفق الأسس الآتية: الرواتب التي تقلّ عن 400 دينار زادت بنسبة 20%، والرواتب من 400 دينار إلى أقلّ من 600 دينار زادت بنسبة 10%، والرواتب من 600 دينار وأكثر زادت 50 دينارًا. أكتبُ اقترانًا متشعبًا لحساب الراتب الجديد لموظفي الشركة.



إذا كان  $f(x) = \begin{cases} 3x^2, & x < -1 \\ 4x - 3, & -1 \leq x \leq 4 \\ 2, & x > 4 \end{cases}$  و  $h(x) = \begin{cases} 3x - 1, & x \neq 1 \\ 5, & x = 1 \end{cases}$  فأجد كلاً من:

1)  $f(-2)$

2)  $f(-1)$

3)  $f(0)$

4)  $f(4)$

5)  $f(8)$

6)  $h(0)$

7)  $h(3)$

8)  $h(1)$

9)  $h(-2)$

10) أجد أصفار الاقتران  $f(x)$  أعلاه.

أعيد تعريف كل من الاقترانات الآتية:

11)  $f(x) = |7x - 5| + 3$

12)  $f(x) = |5x^2 + 13x - 6| - 2$

أمثل كلاً من الاقترانات الآتية بيانياً، وأحدّد مجالها ومداهما:

13)  $f(x) = \begin{cases} x + 3, & x < -2 \\ -2x - 3, & x \geq -2 \end{cases}$

14)  $f(x) = \begin{cases} 2x + 5, & x < 4 \\ x + 1, & 4 \leq x \leq 6 \\ -3, & x > 6 \end{cases}$

15)  $f(x) = \begin{cases} |x|, & x < 3 \\ x + 2, & x \geq 3 \end{cases}$

16)  $f(x) = \begin{cases} 3 - 2x, & x < -1 \\ 6, & -1 \leq x \leq 3 \\ x^2, & x > 3 \end{cases}$

17)  $f(x) = 2|x| + 3$

18)  $f(x) = |3x - 12|$



19)  $f(x) = |x^2 - 4|$

20)  $f(x) = |2x + 4| + 3$

21)  $f(x) = -|2x - 4|$


22)  $f(x) = |2 - 3x| - 2$

أكتب قاعدة الاقتران المتشعب الممثل في كل من الشكلين الآتيين:




أكتب قاعدة اقتران القيمة المطلقة الممثل في كل الشكلين الآتين:

25



26



| التعرفة<br>JOD/m <sup>3</sup> | سرائح الاستهلاك<br>مقربة إلى أقرب m <sup>3</sup> |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1.200                         | 73 – 90                                          |
| 1.620                         | 91 – 126                                         |
| 1.920                         | $x \geq 127$                                     |

27 **ترشيده استهلاك المياه:** أستخدم الجدول المجاور مع الجدول الوارد في بداية الدرس؛ لكتابة اقتران متشعب يُمكنني استعماله لحساب ثمن المياه لأي كمية مستهلكة  $x \text{ m}^3$ .



**خيمة:** يُمثل الاقتران  $f(x) = -1.4|x - 2.5| + 3.5$  الوجه الأمامي لخيمة، حيث  $x$  و  $y$  تقاسان بالقدم، والمحور  $x$  يُمثل الأرض.

28 أُمثل الاقتران بيانياً. 29 أجد مجال الاقتران ومداه.

30 **أعمال:** يتقاضى مندوب مبيعات راتباً شهرياً مقداره 500 دينار، وعمولة بنسبة 1% لأول 20000 دينار من مبيعاته الشهرية، وإذا زادت مبيعاته على 20000 دينار يأخذ عمولة بنسبة 1.5% ممّا يزيد على 20000 دينار. أكتب اقتراناً متشعباً لحساب الدخل الشهري لهذا المندوب.



**عاصفة:** تبدأ العاصفة المطرية بالهطل على شكل رذاذ ثم يزداد معدل الهطل، ثم تعود ثانية للهطل على شكل رذاذ، ويُمثل الاقتران  $r = -0.5|t - 1| + 0.5$ ، حيث  $t$  الزمن بالساعات منذ بداية الهطل. معدل الهطل  $r$  (بالإنش لكل ساعة).





31 أُمثل اقتران معدل العطل بيانياً.

32 أجد كم ساعة استمر الهطل.

33 بعد كم ساعة كان أعلى معدل هطل؟ أبرر إجابتي.



34 **تبرير:** أيّ التمثيلات الآتية تُمثّل الاقتران  $f(x) = |2x-5|$ ؟ أبرّر إجابتي:



35 **تبرير:** هل تُمثّل العلاقة المتشعبة الآتية اقترانًا؟ أبرّر إجابتي.

$$f(x) = \begin{cases} 3x-5, & x \leq 2 \\ -x+2, & x \geq 1 \end{cases}$$

36 **مسألة مفتوحة:** أكتبُ اقتران قيمة مطلقة  $f(x)$  بحيث يكون  $f(4) = -5$ .

**تحذّر:** يُمكن كتابة المقدار  $x^2 + px - q$  على الصورة  $(x-2.5)^2 - 0.25$

37 أجد قيمة كلٍّ من  $p$ ، و  $q$ .

38 أجد إحداثيّ كلٍّ من نقطتي تقاطع منحنى  $f(x) = |x^2 + px - q|$  مع محور  $x$ ، والنقطة التي يكون ميل هذا المنحنى عندها صفرًا.

## حل معادلات ومتباينات القيمة المطلقة Solving Absolute Value Equations and Inequalities

- حل معادلات تتضمن قيمة مطلقة لتعابير جبرية خطية.
- حل متباينات تتضمن قيمة مطلقة لتعابير جبرية خطية.

فكرة الدرس



المصطلحات



مسألة اليوم



تُنتج آلة مسامير فولاذية طولها 5 cm، ويُسمح أن يزيد طول المسمار على الطول المحدد أو يقل عنه بمقدار 0.02 cm. أكتب معادلة وأحلّها لإيجاد الحدّين الأدنى والأعلى لطول المسمار الذي تُنتجه هذه الآلة.

**معادلة القيمة المطلقة** (absolute value equation) هي المعادلة التي تحتوي على قيمة مطلقة لمقدار جبري.

تعلّمت سابقاً أنّ القيمة المطلقة للمتغيّر  $x$  يُمكن إعادة تعريفها على صورة اقتران متشعب:

$$|x| = \begin{cases} -x, & x < 0 \\ x, & x \geq 0 \end{cases}$$


ويُمكن الاستفادة من هذه الحقيقة في حل المعادلة  $|x| = c$  حيث  $c > 0$ ؛ إذ أنّه يوجد للمتغيّر  $x$  قيمتان محتملتان: قيمة موجبة وهي  $c$ ، وقيمة سالبة وهي  $-c$ ، فإذا كان  $|x| = 4$ ، فإن  $x = 4$ ، أو  $x = -4$ ، ففي الحالتين  $|x| = 4$  ويُمكن تعميم هذه القاعدة لحل أيّ معادلة تحتوي على قيمة مطلقة في أحد طرفيها.

### مثال 1

أحلّ كلّاً من المعادلات الآتية، وأتحرّق من صحّة الحلّ:

1  $|4x - 6| = 4$

يُمكنني حلّ معادلة القيمة المطلقة بتمثيل المعادلتين  $y = |4x - 6|$ ، و  $y = 4$  في المستوى الإحداثي نفسه، كما في التمثيل البياني المجاور. ومنه ألاحظ أن منحنَي المعادلتين يتقاطعان عندما  $x = 0.5$  وعندما  $x = 2.5$ ، وهما حلا المعادلة ويُمكنني التحقق من ذلك جبرياً.



$$|4x - 6| = 4$$

المعادلة الأصلية

$$4x - 6 = 4 \text{ or } 4x - 6 = -4$$

تعريف القيمة المطلقة

$$4x = 10 \text{ or } 4x = -2$$

بجمع 6 إلى طرفي كل معادلة

$$x = 2.5 \text{ or } x = 0.5$$

بقسمة طرفي كل معادلة على 4

للتحقق؛ أَعوّض قيمتي  $x$  في المعادلة الأصلية:

عندما  $x = 0.5$

$$4(0.5) - 6 = 4$$

$$|2 - 6| = 4$$

$$|-4| = 4 \checkmark$$

عندما  $x = 2.5$

$$4(2.5) - 6 = 4$$

$$|10 - 6| = 4$$

$$|4| = 4 \checkmark$$

2  $|2x + 2| + 1 = 3 - x$

يمكنني حل معادلة القيمة المطلقة بتمثيل المعادلتين  $y = |2x + 2| + 1$  و  $y = 3 - x$  في المستوى الإحداثي نفسه، كما في التمثيل البياني المجاور. ومنه ألاحظ أن منحنَي المعادلتين يتقاطعان عندما  $x = 0$  وعندما  $x = -4$ ، ويمكنني التحقق من ذلك جبريًا.

$$|2x + 2| + 1 = 3 - x$$

المعادلة الأصلية

$$|2x + 2| + 1 - 1 = 3 - x - 1$$

بطرح 1 من كلا الطرفين

$$|2x + 2| = 2 - x$$

بالتبسيط

$$2x + 2 = 2 - x \text{ or } 2x + 2 = -(2 - x)$$

تعريف القيمة المطلقة

$$2x + 2 = 2 - x \text{ or } 2x + 2 = x - 2$$

أبسط كل معادلة

$$3x = 0 \text{ or } x = -4$$

بإعادة ترتيب المعادلتين

$$x = 0 \text{ or } x = -4$$

بقسمة طرفي المعادلة الأولى على 3

للتحقق؛ أَعوّض قيمتي  $x$  في المعادلة الأصلية:

عندما  $x = 0$

$$|2(0) + 2| + 1 = 3 - (0)$$

$$|2| + 1 = 3$$


$$3 = 3 \checkmark$$

عندما  $x = -4$

$$|2(-4) + 2| + 1 = 3 - (-4)$$


$$|-6| + 1 = 3 + 4$$

$$7 = 7 \checkmark$$



3  $\left| \frac{1}{x} \right| = 2$

يُمكنني حلّ معادلة القيمة المطلقة بتمثيل المعادلتين  $y = \left| \frac{1}{x} \right|$ ،  $y = 2$  في المستوى الإحداثي نفسه، كما في التمثيل البياني المجاور. ومنه ألاحظ أنّ منحنَيي المعادلتين يتقاطعان عندما  $x = 0.5$  وعندما  $x = -0.5$ ، ويُمكنني التحقق من ذلك جبريًا.



$$\left| \frac{1}{x} \right| = 2$$

المعادلة الأصلية

$$\frac{1}{x} = 2 \text{ or } \frac{1}{x} = -2$$

تعريف القيمة المطلقة

$$2x = 1 \text{ or } -2x = 1$$

خاصية الضرب التبادلي

$$x = 0.5 \text{ or } x = -0.5$$

بقسمة طرفي كلّ معادلة على معامل  $x$

للتحقق؛ أعوّض قيمتي  $x$  في المعادلة الأصلية:

عندما  $x = 0.5$

$$\left| \frac{1}{0.5} \right| = 2$$

$$2 = 2 \quad \checkmark$$

عندما  $x = -0.5$

$$\left| \frac{1}{-0.5} \right| = 2$$

$$|2| = 2 \quad \checkmark$$

4  $|x^2 - 9| = x + 3$

يُمكنني حلّ هذه المعادلة بتمثيل المعادلتين  $y = |x^2 - 9|$ ،  $y = x + 3$  في المستوى الإحداثي نفسه، كما في التمثيل البياني المجاور. ومنه ألاحظ أنّ منحنَيي المعادلتين يتقاطعان عندما  $x = -3$ ، وعندما  $x = 2$ ، وعندما  $x = 4$ . أي أن لها ثلاثة حلول هي:  $-3$ ،  $2$ ،  $4$ ، ويُمكنني التحقق من ذلك جبريًا.


$$|x^2 - 9| = x + 3$$

المعادلة الأصلية

$$x^2 - 9 = x + 3 \text{ or } x^2 - 9 = -(x + 3)$$

تعريف القيمة المطلقة

أحلّ كلّ معادلة على حدة:



## المعادلة الأولى:

$$x^2 - 9 = x + 3$$

المعادلة الأولى

$$x^2 - x - 12 = 0$$

إعادة ترتيب المعادلة

$$(x + 3)(x - 4) = 0$$

بتحليل العبارة التربيعية إلى عواملها الأولية

$$x + 3 = 0 \text{ or } x - 4 = 0$$

بجعل كل عامل يساوي صفرًا

$$x = -3 \text{ or } x = 4$$

بحل كل معادلة

## المعادلة الثانية:

$$x^2 - 9 = -(x + 3)$$

المعادلة الثانية

$$x^2 + x - 6 = 0$$

إعادة ترتيب المعادلة

$$(x - 2)(x + 3) = 0$$

بتحليل العبارة التربيعية إلى عواملها الأولية

$$x - 2 = 0 \text{ or } x + 3 = 0$$

بجعل كل عامل يساوي صفرًا

$$x = 2 \text{ or } x = -3$$

بحل كل معادلة

إذن: حلول هذه المعادلة هي:  $x = -3 \text{ or } x = 2 \text{ or } x = 4$

للتحقق؛ أَعوض قيم  $x$  في المعادلة الأصلية:

عندما  $x = -3$

$$|(-3)^2 - 9| = (-3) + 3$$

$$0 = 0 \quad \checkmark$$

عندما  $x = 2$

$$|(2)^2 - 9| = (2) + 3$$

$$5 = 5 \quad \checkmark$$

عندما  $x = 4$

$$|(4)^2 - 9| = (4) + 3$$

$$7 = 7 \quad \checkmark$$

أتحقق من فهمي  أحل كلاً من المعادلات الآتية، وأتحقق من صحة الحل:

a)  $|4x + 8| = 4$

b)  $2|x + 1| - x = 3x - 4$

c)  $\left| \frac{1}{2x - 7} \right| = 2$

d)  $|x^2 - 2| = x$

تعلمت في المثال السابق حل معادلات تحوي قيمة مطلقة في أحد طرفي المعادلة، أما إذا كانت المعادلة تحوي قيمة مطلقة على طرفي المساواة مثل  $|A| = |B|$ ، فإنه يوجد 4 حلول ممكنة لهذه المعادلة:

$$(1) A = B \quad (2) A = -B \quad (3) -A = B \quad (4) -A = -B$$

وبتطبيق خصائص المساواة؛ فإن المعادلتين (1) و (4) متكافئتان، وكذلك بالنسبة إلى المعادلتين (2) و (3)، ما يعني أن الحلول جميعها يمكن إيجادها من المعادلتين (1) و (2).

## مثال 2

أحلّ المعادلة  $|2x + 4| = |3x + 1|$  :

$$2x + 4 = 3x + 1$$

الحالة الأولى  
 $A = B$

$$2x = 3x - 3$$

بطرح 4 من طرفي  
المعادلة

$$-x = -3$$

بطرح  $3x$  من طرفي  
المعادلة

$$x = 3$$

بضرب الطرفين  
في -1

$$2x + 4 = -(3x + 1)$$

الحالة الثانية  
 $A = -B$

$$2x + 4 = -3x - 1$$

خاصية توزيع  
الضرب على الجمع

$$2x = -3x - 5$$

بطرح 4 من طرفي  
المعادلة

$$5x = -5$$

بجمع  $3x$  إلى طرفي  
المعادلة

$$x = -1$$


بقسمة طرفي  
المعادلة على 5

### أتذكر

أستعمل خصائص  
المساواة لحل معادلة  
تحتوي على متغير على  
طرفي المساواة.

إذن: لهذه المعادلة حلان، هما -1 و 3

ويمكنني حلّ المعادلة السابقة؛ بتمثيل المعادلتين  
 $y = |2x + 4|$ ،  $y = |3x + 1|$  في المستوى  
الإحداثي نفسه، كما في التمثيل البياني  
المجاور. ومنه ألاحظ أنّ منحنَي المعادلتين  
يتقاطعان عندما  $x = 3$  وعندما  $x = -1$ .



### أتحقق من فهمي

$$\text{أحلّ المعادلة } 2|x-1| = \frac{|2x+4|}{2}$$

توجد مواقف حياتية تُستعمل فيها معادلات القيمة المطلقة.

### مثال 3 : من الحياة



درجة حرارة الجسم الطبيعية: تكون درجة حرارة جسم الإنسان  
المقاسة من تحت لسانه طبيعية إذا كان الفرق المطلق بينها وبين  
 $36.8^\circ \text{C}$  يساوي  $0.5^\circ$ ، أكتبُ معادلة أجدُ عن طريقها الحدّين  
الأعلى والأدنى لدرجة حرارة جسم الإنسان الطبيعية.

الدرجة المتوسطة هي  $36.8^\circ$ ، والفرق هو  $0.5^\circ$ ، فإذا دلّ المتغير  $x$  على درجة حرارة الجسم تكون المعادلة المطلوبة  $|x - 36.8| = 0.5$

$$|x - 36.8| = 0.5$$

المعادلة الأصلية

$$x - 36.8 = 0.5 \text{ or } x - 36.8 = -0.5$$

تعريف القيمة المطلقة

$$x = 36.8 + 0.5 \text{ or } x = 36.8 - 0.5$$

بجمع  $36.8^\circ$  لطرفي كل معادلة

$$x = 37.3 \text{ or } x = 36.3$$

بالتبسيط

إذن: الحد الأدنى لدرجة جسم الإنسان الطبيعية هي  $36.3^\circ \text{C}$  والحد الأعلى  $37.3^\circ \text{C}$

أتحقق من فهمي



**طعام:** لصنع مسحوق الكاكاو؛ تُحمّص بذوره على درجة حرارة لا تزيد على  $300^\circ \text{F}$  أو تقلّ عنها بأكثر من  $25^\circ \text{F}$ ، أكتبُ معادلة قيمة مطلقة وأجد عن طريقها الحدين الأعلى والأدنى لدرجة حرارة تحميص بذور الكاكاو.


## معلومة

تُقاس درجة الحرارة باستعمال مقياس حرارة زجاجي يحتوي على الزئبق، أو موازين الحرارة الإلكترونية. ويمكن قياس درجة الحرارة في الفم (تحت اللسان)، أو تحت الإبط أو في فتحة الشرج، ولكن القياس الأكثر دقة هو في الفم.

## معلومة

نحتاج إلى 400 حبة كاكاو تقريباً؛ لإنتاج أقل من نصف كيلو شوكولاتة؛ لذا، تمتاز الشوكولاتة الخالصة بسعرها الغالي نسبياً.

تعلمتُ سابقاً أنّ المتباينة جملة رياضية تحوي الرمز  $\geq$ ، أو  $\leq$ ، أو  $<$ ، أو  $>$ ، وتسمى المتباينة التي تحتوي على قيمة مطلقة لمقدار جبري متباينة القيمة المطلقة (absolute value inequality)؛ ولحلّ متباينة قيمة مطلقة أستعمل المفاهيم الأساسية لحلّ معادلة القيمة المطلقة، فمثلاً، لحلّ المعادلة  $|x| = 4$ ، فإنني أبحث عن الأعداد جميعها التي تبعد عن العدد 0 بمقدار 4. ومنه، فإنّه لحلّ المتباينة  $|x| \leq 4$  فإنني أبحث عن الأعداد جميعها التي بعدها عن 0 أقل من 4 أو يساويها، ويُمكنني تمثيل مجموعة الحلّ على خط الأعداد كالآتي:



وبالاستعانة بخط الأعداد أعلاه؛ ألاحظ أنّ مجموعة حلّ المتباينة  $|x| \leq 4$  هي  $x \geq -4$  و  $x \leq 4$  ويُمكنني التعبير عنها باستعمال المتباينة المركبة  $-4 \leq x \leq 4$  أو يُمكنني التعبير عنها بالفترة  $[-4, 4]$ .

## متباينة القيمة المطلقة ( أقل من )

### مفهوم أساسي

إذا كان  $X$  يُمثل مقداراً جبرياً وكان  $k$  عدداً حقيقياً موجباً؛ فإن:

$$|X| < k \Leftrightarrow -k < X < k$$

والقاعدة صحيحة أيضاً إذا كانت إشارة المتباينة  $\leq$

### مثال 4

أحلّ كلّاً من المتباينات الآتية، وأمثّل مجموعة الحلّ على خط الأعداد:

1  $|2x - 3| \leq 4$

$$|2x - 3| \leq 4$$

المتباينة الأصلية

$$-4 \leq 2x - 3 \leq 4$$

حلّ متباينة القيمة المطلقة ( $\leq$ )


$$-1 \leq 2x \leq 7$$

بجمع 3 إلى حدود المتباينة جميعها

$$-0.5 \leq x \leq 3.5$$

بقسمة حدود المتباينة جميعها على 2

إذن: مجموعة الحلّ هي  $[-0.5, 3.5]$ ، وُتمثّل على خط الأعداد كما يأتي:



2  $|3x + 7| < -5$

بما أنّ القيمة المطلقة لأيّ قيمة تساوي عدداً موجباً؛ فإنّ مجموعة حلّ المتباينة هي

المجموعة الخالية  $\{ \}$  أو  $\Phi$

أتحقق من فهمي

أحلّ كلّاً من المتباينات الآتية، وأمثّل مجموعة الحلّ على خط الأعداد (إن أمكن):

a)  $|3x - 4| < 5$

b)  $|0.5x - 1| + 2 \leq 2.5$

c)  $|x - 4| < -1$

### أتذكّر


أستعملُ رمز الفترة المغلقة للتعبير عن المتباينة التي تحوي مساواة، وأستعملُ رمز الفترة المفتوحة للتعبير عن المتباينة التي لا تحوي مساواة.

### أتذكّر

يُرمز إلى المجموعة الخالية بالرمز  $\{ \}$ ، أو الرمز  $\Phi$  (تقرأ: فاي)؛ وهي مجموعة لا يوجد فيها عناصر.

# الوحدة 1

تعلمت في المثال السابق حلّ متباينة القيمة المطلقة (أقل من)، ولحلّ متباينة القيمة المطلقة (أكبر من) مثل  $|x| > 4$ ، فإنني أبحث عن الأعداد جميعها التي بعدها عن 0 أكبر من 4، وهي تُمثل الأعداد الأقل من -4 أو الأعداد الأكبر من 4، ويُمكنني تمثيل مجموعة الحلّ على خط الأعداد كالآتي:



ألاحظ من التمثيل أعلاه، أنه يوجد مجموعتا حلّ منفصلتان، وعندها تكون مجموعة الحلّ هي:  $x > 4$  أو  $x < -4$  أو يُمكنني التعبير عنها باتحاد فترتين منفصلتين  $(-\infty, 4) \cup (4, \infty)$

## متباينة القيمة المطلقة (أكبر من)

### مفهوم أساسي

إذا كان  $X$  يُمثل مقداراً جبرياً وكان  $k$  عدداً حقيقياً موجباً؛ فإنّ

$$|X| > k \Leftrightarrow X < -k \text{ or } X > k$$

والقاعدة صحيحة أيضاً إذا كانت إشارة المتباينة  $\geq$

### مثال 5

أحلّ كلّاً من المتباينات الآتية، وأُمثل مجموعة الحلّ على خط الأعداد:

1  $|3x + 5| > 7$

$$|5x + 5| > 7$$

المتباينة الأصلية

$$3x + 5 < -7 \text{ or } 3x + 5 > 7$$

حلّ متباينة القيمة المطلقة ( $>$ )


$$3x < -12 \text{ or } 3x > 2$$

بطرح 5 من طرفي كل متباينة

$$x < -4 \text{ or } x > 0.67$$

بقسمة طرفي كل متباينة على 3

إذن: مجموعة الحلّ هي:  $(-\infty, -4) \cup (0.67, \infty)$ ، وتُمثل على خط الأعداد كما يأتي:



### أُتذَكَّر

يتغير اتجاه إشارة المتباينة عند ضرب طرفيها في عدد سالب، أو قسمتهما عليه. فمثلاً،  $-x > a$  تصبح  $x < -a$  بعد ضرب طرفيها في العدد  $-1$ ، حيث  $a$  عدد حقيقي.

2  $-\frac{1}{3} |3 + \frac{x}{2}| \leq -2$

$$-\frac{1}{3} |3 + \frac{x}{2}| \leq -2$$

$$|3 + \frac{x}{2}| \geq 6$$

$$3 + \frac{x}{2} \leq -6 \text{ or } 3 + \frac{x}{2} \geq 6$$

$$\frac{x}{2} \leq -9 \text{ or } \frac{x}{2} \geq 3$$

$$x \leq -18 \text{ or } x \geq 6$$

المتباينة الأصلية

بضرب طرفي المتباينة في  $-3$ ، عكس


اتجاه المتباينة

حلّ متباينة القيمة المطلقة ( $>$ )

ب طرح 3 من طرفي كلّ المتباينة

بضرب طرفي كلّ متباينة في 2

إذن: مجموعة الحلّ هي  $(-\infty, -18] \cup [6, \infty)$ ، وتُمثّل على خط الأعداد كما يأتي:



3  $|2x - 1| > x$

$$2x - 1 < -x \text{ or } 2x - 1 > x$$

$$3x < 1 \text{ or } x > 1$$


$$x < 0.33 \text{ or } x > 1$$

حلّ متباينة القيمة المطلقة ( $>$ )

بإعادة ترتيب المتباينتين

بقسمة طرفي المتباينة الأولى على 3

إذن: مجموعة الحلّ هي  $(-\infty, 0.33) \cup (1, \infty)$ ، وتُمثّل على خط الأعداد كما يأتي:



أتحقق من فهمي

أحلّ كلّاً من المتباينات الآتية، وأُمثّل مجموعة الحلّ على خط الأعداد:

a)  $\frac{1}{3} |2x + 4| > 2$

b)  $\frac{|2x + 3|}{2} \geq 2x$

c)  $-2 |3x + 4| < -8$

تعلّمتُ في المثالين السابقين حلّ متباينة تحوي قيمة مطلقة في أحد طرفيها، ويُمكن أن تحوي

المتباينة قيمة مطلقة في طرفيها، عندئذ يُمكن حلّها باتّباع الإجراءات الآتية:

- مساواة المقدارين داخل القيمة المطلقة ببعضهما، وحلّ المعادلة الناتجة.
- مساواة أحد المقدارين داخل القيمة المطلقة بمعكوس المقدار الآخر، وحلّ المعادلة الناتجة.
- اختيار عدد بين الحلين وتعويضه في المتباينة، فإذا كانت الجملة صحيحة تكون مجموعة حلّ المتباينة الأصلية هي مجموعة الأعداد الواقعة بين الحلين، وإلا كانت مجموعة الأعداد الواقعة خارج الحلين.

مثال 6

أحلّ كلّاً من المتباينات الآتية:

1  $|2x + 1| > |3x - 2|$

**الخطوة 2:** مساواة أحد المقدارين داخل القيمة المطلقة بمعكوس المقدار الآخر، وحلّ المعادلة الناتجة.

$2x + 1 = -(3x - 2)$  بمساواة أحد المقدارين بمعكوس الآخر

$2x + 1 = -3x + 2$  خاصية توزيع الضرب على الجمع

$2x + 3x + 1 = 2$  بجمع  $3x$  إلى طرفي المعادلة

$5x = 1$  بطرح 1 من طرفي المعادلة

$x = \frac{1}{5}$  بقسمة طرفي المعادلة على 5

**الخطوة 1:** مساواة المقدارين داخل القيمة المطلقة ببعضهما، وحلّ المعادلة الناتجة.

$2x + 1 = 3x - 2$  بمساواة المقدارين داخل القيمة المطلقة

$2x - 3x + 1 = -2$  بطرح  $3x$  من كلا الطرفين

$-x = -3$  بطرح 1 من طرفي المعادلة

$x = 3$  بقسمة طرفي المعادلة على -1

إذن: الحلان الناتجان  $x = \frac{1}{5}$  و  $x = 3$

**الخطوة 3:** تحديد مجموعة الحلّ.

أختار عدداً بين الحلين وليكن  $x = 2$ ، ثم أعوّضه في المتباينة  $|2x + 1| > |3x - 2|$

$|2(2) + 1| > |3(2) - 2|$

$|5| > |4|$

$5 > 4$  ✓

بما أنّ العدد 2 حقّق المتباينة؛ فإنّ مجموعة حلّ المتباينة تقع بين العددين  $x = \frac{1}{5}$  و  $x = 3$

إذن: مجموعة حلّ هذه المتباينة هي:  $\frac{1}{5} < x < 3$  أو الفترة  $(\frac{1}{5}, 3)$

2  $|3x - 2| \geq |2x + 5|$

**الخطوة 2:** مساواة أحد المقدارين داخل القيمة المطلقة بمعكوس المقدار الآخر، وحلّ المعادلة الناتجة.

بمساواة أحد المقدارين بمعكوس الآخر  
 $3x - 2 = -(2x + 5)$

خاصية توزيع الضرب على الجمع  
 $3x - 2 = -2x - 5$

بجمع  $2x$  إلى طرفي المعادلة  
 $3x + 2x - 2 = -5$

بجمع 2 إلى طرفي المعادلة  
 $5x = -3$

بقسمة طرفي المعادلة على 5  
 $x = \frac{-3}{5}$

**الخطوة 1:** مساواة المقدارين داخل القيمة المطلقة ببعضهما، وحلّ المعادلة الناتجة.

بمساواة المقدارين داخل القيمة المطلقة  
 $3x - 2 = 2x + 5$

بطرح  $2x$  من كلا الطرفين  
 $3x - 2x - 2 = 5$

بجمع 2 إلى طرفي المعادلة  
 $x = 7$

إذن: الحلان الناتجان  $x = \frac{-3}{5}$  و  $x = 7$

**الخطوة 3:** تحديد مجموعة الحلّ.

أختار عددًا بين الحلين وليكن  $x = 0$ ، وأعوّضه في المتباينة  $|3x - 2| \geq |2x + 5|$

$$|3(0) - 2| \geq |2(0) + 5|$$

$$|-2| \geq |5|$$

$$2 \geq 5 \quad \text{X}$$

بما أنّ العدد 0 لم يُحقّق المتباينة؛ فإنّ مجموعة حلّ المتباينة تقع خارج العددين  $x = \frac{-3}{5}$  و  $x = 7$

إذن: مجموعة حلّ هذه المتباينة هي:  $x \leq -\frac{3}{5}$  or  $x \geq 7$  أو الفترتين  $(-\infty, -\frac{3}{5}] \cup [7, \infty)$

**أتحقق من فهمي**

أحلّ كلّاً من المتباينات الآتية:

a)  $|3x + 5| > |x - 1|$

b)  $|2 - 3x| \leq |4x + 3|$

مثال 7: من الحياة



معدّل كتلة التفّاحة في صندوق تفّاح هو 200 g، وقد تختلف الكتلة الفعلية للتفّاحة بما لا يتجاوز 4% من هذا المعدّل. أكتب متباينة قيمة مطلقة أجد عن طريقها مدى الكتلة الفعلية للتفّاحة الواحدة في هذا الصندوق. اختلاف 4% من 200 g يساوي:

$$4\% \times 200 = \frac{4}{100} (200) = 8$$

أي إنّ كتلة التفّاحة قد تزيد على المعدل أو تقلّ عنه بمقدار 8 g على الأكثر. فإذا رمزنا لكتلة التفّاحة بالرمز  $x$ ؛ فإنّ  $|x - 200| \leq 8$  هي المتباينة التي تُعبّر عن هذه المسألة. ولإيجاد مدى كتلة التفّاحة أحلّ هذه المتباينة.

$$-8 \leq x - 200 \leq 8$$

حلّ متباينة القيمة المطلقة ( $\leq$ )

$$192 \leq x \leq 208$$

بجمع 200 لحدود المتباينة جميعها

إذن: مجموعة الحلّ هي:  $192 \leq x \leq 208$

وهذا يعني أنّ مدى كتلة التفّاحة الواحدة هو من 192 g إلى 208 g

أتحقق من فهمي



صحة: يصل مستوى السكر في دم الانسان إلى مستوى حرج وخطير؛ إذا زاد مستوى السكر في الدم أو انخفض بأكثر من 38 mg عن المعدل الطبيعي البالغ 88 mg. أكتب متباينة قيمة مطلقة أجد عن طريقها مستويات سكر الدم الخطرة.

أدرب وأحل المسائل



أحلّ كلّاً من المعادلات الآتية، وأتحقق من صحة الحلّ:

1  $|3x - 4| = 2$

2  $\left| \frac{x-4}{2} \right| = 7$

3  $3|2x - 3| - 7 = 2$

4  $-4|5x - 1| = -12$

5  $8b = |6b - 4|$

6  $|x - 2| = 3x + 2$

7  $0.5|x - 2| = 3|0.5x - 2|$

8  $|2x^2 - 3| = 5x$

9  $|2x^2 + 9x + 5| = 9 + 2x$

10  $\left| \frac{2x+1}{2} \right| = \left| \frac{3x-2}{4} \right|$

11  $\left| \frac{3x+3}{2x-5} \right| - 4 = 6$

12  $3|0.5x + 2| = 0$

أحلّ كلّاً من المتباينات الآتية، وأمّثل مجموعة الحلّ على خط الأعداد:

13  $|2x + 6| < 5$

14  $|4x - 3| > 4$

15  $|3x + 1| - 3 \leq 4$

16  $\left| \frac{2x-3}{2} \right| \geq 6$

17  $|x + 2| > -3$

18  $|3x + 5| < -7$

19  $|-4x - 6| < 14$

20  $-2|2x - 1| \geq -3$

21  $2|3x - 2| + 4 \geq 9$

22  $|3-7x| > 2x$

23  $|x + 1| > 2x + 5$

24  $4-x < |2x-7|$

أحلّ كلّاً من المتباينات الآتية:

25  $|x + 1| \geq 2x + 5$

26  $|5-x| > |x + 4|$



27  $|2x + 3| \geq |x - 2|$

28  $|5x-1| > |2x + 3|$

29  $|3x + 2| < |x - 5|$

30  $|2x - 7| \leq |x + 2|$

أكتب متباينة قيمة مطلقة تُمثّل مجموعة حلّها بالرسم الآتي:



33 إذا كان  $a$ ، و  $b$ ، و  $c$  أعداداً حقيقية حيث  $a \neq 0$ ، فما عدد الحلول الممكنة للمعادلة  $|ax + b| = c$ ؟



34 **مطالعة:** اتفق أعضاء نادي مطالعة أن يقرؤوا في أحد فصول كتاب وأن

يتوقفوا عن القراءة ضمن 10 صفحات قبل نهاية الفصل أو بعدها. إذا كان

عدد صفحات الكتاب 400 صفحة، وكان الفصل ينتهي في الصفحة 304،

فأكتب معادلة قيمة مطلقة يُمكنني من حلّها إيجاد أول صفحة وآخر صفحة يُمكن أن يتوقف الأعضاء عن

القراءة عندها.

### معلومة

الثعابين ليس لديها جفون. في حين أنّ لديها شيئاً يُسمّى بريل، وهو طبقة شفافة مثل (النظارة)، وعلى شكل المجلد وتُغطي العينين للحماية.



35 أحلّ المسألة الواردة في بداية الدرس.

36 أمّثل الاقتران  $f(x) = |(x-2)(x+6)|$  بيانياً.

37 أجد قيمة  $k$  التي يكون عندها للمعادلة  $|(x-2)(x+6)| = k$  ثلاثة حلول.

38 **أفاعي:** تعيش معظم الأفاعي في بيئة تتراوح درجة حرارتها من  $75^\circ\text{F}$  إلى  $90^\circ\text{F}$ .

أكتب متباينة قيمة مطلقة تُمثّل درجات حرارة البيئات التي لا تعيش فيها الأفاعي.

39 **إيجارات:** يبحث سعيد عن شقة للإيجار في أحد الأحياء، وقد وجد أن معدل الإيجار الشهري لشقة متوسطة في ذلك الحي هو 250 ديناراً. ولكن الإيجار الفعلي للشقة قد يزيد أو ينقص عن ذلك بمقدار 55 ديناراً على الأكثر. أكتب متباينة قيمة مطلقة أجد عن طريقها مدى الإيجار الشهري لشقة متوسطة في هذا الحي.



40 **جيولوجيا:** قد تزيد كتلة 20 قدم مكعب من الرخام أو تقل عن 3400 رطل، بما لا يزيد على 100 رطل. أكتب متباينة قيمة مطلقة تُعبّر عن هذه المعلومات، وأجد مدى الكتل الممكنة لقدم مكعب واحد من الرخام.

## مهارات التفكير العليا

41 **تبرير:** إذا كان  $a \neq 0$ ، فهل للمعادلتين  $|x| + a = b$ ،  $|x + a| = b$ ، الحل نفسه؟ أبرر إجابتي.

42 **أكتشف الخطأ:** حلّت كل من غادة ومها المعادلة  $|2x + 9| = 4x$

إجابة مها

$$\begin{aligned} 2x+9 &= 4x & \text{أو} & & 2x+9 &= -4x \\ 9 &= 2x & & & 6x &= -9 \\ x &= 4.5 & & & x &= -1.5 \end{aligned}$$

لهذه المعادلة حل واحد هو 4.5

إجابة غادة

$$\begin{aligned} 2x+9 &= 4x & \text{أو} & & 2x+9 &= -4x \\ 9 &= 2x & & & 6x &= -9 \\ x &= 4.5 & & & x &= -1.5 \end{aligned}$$

لهذه المعادلة حلان هما 4.5 و -1.5

أيّهما كانت إجابتها صحيحة؟ أبرر إجابتي.

43 **تحذّر:** أحلّ المعادلة  $|2x + 1| + 5 = |7 - 3x|$

44 **أيها لا ينتمي:** أحدّد المتباينة التي تختلف عن المتباينات الثلاث الأخرى. أبرر إجابتي.


$$|2x+1| > 3$$

$$5 - |4x+1| \leq 8$$

$$2 + |-3x+2| \geq 5$$

$$|2-x| < 6$$

45 **أكتشف الخطأ:** مثلّت مريم مجموعة حلّ المتباينة  $|2x - 3| > 5$  على خط الأعداد على النحو الآتي:



هل كانت إجابتها صحيحة؟ أبرر إجابتي.

46 **تحذّر:** أحلّ المتباينة  $|x - 3| + 2 < -|x + 4| + 8$

## حلّ نظام مُكوّن من متباينات خطّية بمتغيّرين بيانيّاً Solving system of linear inequalities in two variables

### فكرة الدرس



### المصطلحات



### مسألة اليوم



- تمثيل متباينة خطّية بمتغيّرين بيانيّاً.
- حلّ نظام مُكوّن من متباينات خطّية بمتغيّرين بيانيّاً.

منطقة الحلول الممكنة، المستقيم الحدودي، نظام المتباينات الخطّية، مجموعة الحلّ.



يوجد في إحدى قاعات الطعام طاولات مستديرة، يوضع حول الواحدة منها 8 مقاعد، وأخرى مستطيلة يوضع حول الواحدة منها 6 مقاعد. ما المتباينة التي تُبيّن عدد الطاولات اللازمة من كل نوع؛ إذا كان عدد الحضور في مأدبة غداء 264 شخصاً على الأقلّ؟ وما عدد الطاولات المستطيلة اللازمة؛ إذا استُعملت في هذا المأدبة 18 طاولة مستديرة؟

تعلّمتُ سابقاً أنّ المتباينة الخطّية جملة رياضية قد تحتوي على متغيّر واحد أو متغيّرين.

ومن أمثلة المتباينات الخطّية بمتغيّرين:

$$2x + 3y \geq 12$$

$$y \leq 2x - 5$$

$$y \leq x$$

تُسمّى مجموعة الأزواج  $(a, b)$  التي تُحقّق المتباينة مجموعة حلّ المتباينة، أي إذا عوّض  $a$  بدل  $x$ ، و  $b$  بدل  $y$  نتجت عبارة عددية صحيحة.

عند تمثيل المتباينة الخطّية بيانيّاً في المستوى الإحداثي، فإنّ النقاط التي تُمثّل حلولها الممكنة جميعها تُسمّى: **منطقة الحلول المُمكنة** (feasible region). ولتمثيل المتباينة بيانيّاً، أبدأ

برسم منحنى المعادلة المرتبطة بالمتباينة بعد استعمال رمز المساواة (=) بدلاً من رمز

المتباينة ( $\leq$ ،  $\geq$ ،  $<$ ،  $>$ )، حيث تُمثّل المعادلة الناتجة مستقيماً يُسمّى: **المستقيم الحدودي**

(boundary line)؛ وهو مستقيم يُقسّم المستوى الإحداثي إلى جزأين، أحدهما منطقة

الحلول الممكنة.

### أتذكّر

لتحديد إذا كان الزوج

المرتّب  $(1, 2)$  يُمثّل

حلاً للمتباينة  $x - y \leq 3$ ،

أعوّضه في المتباينة:

$$x - y \leq 3$$

$$1 - 2 \leq 3$$

$$-1 \leq 3$$

ألاحظ أنّ ناتج التعويض

حقّق المتباينة. إذن:

$(1, 2)$  يُمثّل حلاً للمتباينة.

### أنعلّم


لكلّ متباينة خطّية معادلة

خطّية مرتبطة بها، فمثلاً


$3x + 2y > 2$  هي متباينة

خطّية، و  $3x + 2y = 2$  هي

المعادلة الخطّية المرتبطة بها.



قد يكون المستقيم الحدودي جزءاً من منطقة الحلول الممكنة؛ إذا تضمنت المتباينة الرمز  $\leq$  أو الرمز  $\geq$ ، عندئذٍ يُرسم المستقيم الحدودي متصلاً، كما في الشكل المجاور.



وقد لا يكون المستقيم الحدودي جزءاً من منطقة الحلول الممكنة إذا تضمنت المتباينة الرمز  $<$  أو الرمز  $>$ ، عندئذٍ يُرسم المستقيم الحدودي مُتقطعاً، كما في الشكل المجاور.

لتحديد أيّ المنطقتين على جانبي المستقيم الحدودي هي منطقة الحلول الممكنة، أختار النقطة  $(a, b)$  التي لا تقع على المستقيم الحدودي، ثم أعوضها في المتباينة الخطية، فإذا كانت تُحقّقها (أي ينجم عنها نتيجة صحيحة)، أُظلل الجزء من المستوى الإحداثي الذي تقع فيه تلك النقطة، وإلا فأُظلل الجزء الآخر الذي لا تقع فيه تلك النقطة.

أمثل كلاً من المتباينات الآتية بيانياً:


## مثال 1

1  $2x + 3y \geq 12$

**الخطوة 1:** أمثل المستقيم الحدودي بيانياً.

أنشئ جدول قيم لإيجاد نقطتي تقاطع المستقيم الحدودي  $2x + 3y = 12$  مع المحورين الإحداثيين.


|          |        |        |
|----------|--------|--------|
| $x$      | 0      | 6      |
| $y$      | 4      | 0      |
| $(x, y)$ | (0, 4) | (6, 0) |




أعيّن النقطتين  $(0, 4)$ ،  $(6, 0)$  في المستوى الإحداثي، ثم أرسم مستقيماً يمرّ بهما، وبما أنّه توجد مساواة في رمز المتباينة؛ فإنّه يُرسم متصلاً كما في الشكل المجاور.

## أُتَذَكَّر

تُمثِّل المتباينة الخطيَّة ذات المتغيِّر الواحد، مثل  $x \geq 5$  كما في الشكل الآتي:



في حين تُمثِّل المتباينة الخطيَّة ذات المتغيِّر الواحد، مثل  $y < -2$ ، كما في الشكل الآتي:



## أُتَذَكَّر

إنَّ أسهل طريقة لتمثيل المعادلة الخطيَّة بمتغيَّرين، هي إيجاد نقطتي تقاطع المستقيم مع المحورين الإحداثيين، ولكن هذا غير ممكن في المستقيمات على الصورة  $Ax = By$

## الخطوة 2: أُحدِّد منطقة الحلول الممكنة.

أختار نقطة لا تقع على المستقيم الحدودي ولتكن  $(0, 0)$ ، ثم أتحقِّق إذا كان ناتج تعويضها في المتباينة صحيحاً أم لا.

$$\begin{aligned} 2x + 3y &\geq 12 \\ 2(0) + 3(0) &\stackrel{?}{\geq} 12 \\ 0 &\geq 12 \quad \times \end{aligned}$$

المتباينة الأصلية


بتعويض  $x = 0, y = 0$

العبارة غير صحيحة

إذن: النقطة  $(0, 0)$  لم تحقِّق المتباينة.


## الخطوة 3: أظلل منطقة الحلول الممكنة.

بما أنَّ النقطة  $(0, 0)$  لم تحقِّق المتباينة، إذن: فهي لا تقع في منطقة الحلول الممكنة؛ لذا، فإنني أظلل الجزء من المستوى الذي لا تقع فيه هذه النقطة، كما في الشكل المجاور.



## 2 $y < 3x$

|          |        |        |
|----------|--------|--------|
| $x$      | 1      | 0      |
| $y$      | 3      | 0      |
| $(x, y)$ | (1, 3) | (0, 0) |



## الخطوة 1: أمثِّل المستقيم الحدودي.

أنشئ جدول قيم لإيجاد نقطتين تقعان على المستقيم الحدودي  $y = 3x$

أعيِّن النقطتين  $(0, 0)$ ،  $(1, 3)$  في المستوى الإحداثي، ثم أرسم مستقيماً يمرّ بهما، وبما أنَّه لا توجد مساواة في رمز المتباينة؛ فإنَّه يُرسم متقطعاً كما في الشكل المجاور.

## الخطوة 2: أحدد منطقة الحلول الممكنة.

أختار نقطة لا تقع على المستقيم الحدودي ولتكن (2, 1)، ثم أتأكد إذا كان ناتج تعويضها في المتباينة صحيحاً أم لا.

$$y < 3x$$

$$1 < 3(2)$$

$$1 < 6 \quad \checkmark$$

المتباينة الأصلية


$$x = 2, y = 1 \text{ بتعويض}$$

العبارة صحيحة

إذن: النقطة (2, 1) تُحقق المتباينة.

## إرشاد

يُفضل اختيار النقطة (0, 0) لفحص المتباينة بسهولة إجراء الحسابات. ولكن، إذا وقعت على المستقيم الحدودي فيجب اختيار نقطة غيرها.



## الخطوة 3: أظلل منطقة الحلول الممكنة.

بما أن النقطة (2, 1) حققت المتباينة، إذن: فهي تقع في منطقة الحلول الممكنة؛ لذا، فإنني أظلل الجزء من المستوى الذي تقع فيه هذه النقطة، كما في الشكل المجاور.

## أتحقق من فهمي

أمثل كلاً من المتباينات الآتية بيانياً:

- a)  $y \geq -1$       b)  $x < 3$       c)  $y \geq 0.5x$       d)  $2x - y < 8$

إنّ تمثيل متباينة القيمة المطلقة بمتغيرين بيانياً مشابه لتمثيل المتباينة الخطية بمتغيرين. أمثل أولاً معادلة القيمة المطلقة المرتبطة بالمتباينة، ثم أحدد إذا كانت المستقيمات الحدودية متصلة أم متقطعة، ثم أحدد المنطقة المراد تظليلها باختبار نقطة ما.

## مثال 2

أمثل المتباينة  $y \geq |x-3|$  بيانياً.

## الخطوة 1: أمثل المعادلة المرتبطة بالمتباينة بيانياً.



أمثل المعادلة المرتبطة  $y = |x-3|$ ، وبما أنه توجد مساواة في رمز المتباينة؛ فإنّ المستقيمين الحدوديين يُرسمان متّصلين كما في الشكل المجاور.

## أتذكر

يمكن تمثيل معادلة القيمة المطلقة بمتغيرين بعدة طرائق منها: الانعكاس حول المحور x، واستعمال محور التماثل والرأس.

## الخطوة 2: أُلحِّد منطقة الحلول الممكنة.

أختار نقطة لا تقع على المستقيمين الحدوديين ولتكن  $(0, 0)$ ، ثم أتحقق إذا كان ناتج تعويضها في المتباينة صحيحاً أم لا.

$$y \stackrel{?}{\geq} |3 - x|$$

المتباينة الأصلية

$$0 \stackrel{?}{\geq} |3 - 0|$$


بتعويض  $x = 0, y = 0$

$$0 \geq 3 \quad \times$$

العبارة غير صحيحة

إذن: النقطة  $(0, 0)$  لم تحقق المتباينة.

## الخطوة 3: أظلل منطقة الحلول الممكنة.



بما أن النقطة  $(0, 0)$  لم تحقق المتباينة، إذن: فهي لا تقع في منطقة الحلول الممكنة؛ لذا، فإنني أظلل الجزء من المستوى الذي لا تقع فيه هذه النقطة كما في الشكل المجاور.

**أتحقق من فهمي** أمثل كلاً من المتباينات الآتية بياناً:

a)  $y > -\frac{1}{2}|x|$

b)  $y \leq |x - 4| + 1$

c)  $y \geq |x| - 2$

يتكوّن نظام المتباينات الخطية (system of linear inequalities) من متباينتين خطيتين أو أكثر. ويُطلق على مجموعة الأزواج المُرتّبة التي تُحقق المتباينات جميعها اسم **مجموعة الحل** (solution set). فمثلاً، يتكوّن النظام الآتي من 3 متباينات:

$$x + y < 2$$

المتباينة الأولى

$$-2x + y > -1$$

المتباينة الثانية

$$x - 3y \leq -2$$

المتباينة الثالثة

يُمثل الزوج المُرتّب  $(-1, 2)$  أحد حلول هذا النظام؛ لأنّه يُحقق المتباينات جميعها.

$$-1 + 2 = 1 < 2$$

الزوج المُرتّب يُحقق المتباينة الأولى

$$-2(-1) + 2 = 4 > -1$$

الزوج المُرتّب يُحقق المتباينة الثانية

$$-1 - 3(2) = -7 \leq -2$$

الزوج المُرتّب يُحقق المتباينة الثالثة

## لغة الرياضيات

تدل عبارة (الزوج المُرتّب يُحقق متباينة) على أن الناتج يكون صحيحاً عند تعويض هذا الزوج في المتباينة.

## أتعلّم

يوجد عدد لانهائي من الأزواج المُرتّبة التي تُحقق هذا النظام، وليس  $(-1, 2)$  فقط.


لحلّ نظام متباينات، أمثل كل متباينة فيه بياناً في المستوى الإحداثي نفسه، ثم أظلل المنطقة المشتركة بين مناطق حلّ المتباينات جميعها التي تُمثّل حلّ النظام.

## مثال 3

أمثل منطقة حلّ نظام المتباينات الآتي، ثم أتحرّق من صحة الحلّ:

$$4x + 3y \leq 12$$

$$y - 2x < 0$$



**الخطوة 1:** أمثل المستقيمين الحدوديين.

أمثل بياناً المستقيمين الحدوديين  $y - 2x = 0$ ،  $4x + 3y = 12$  في المستوى الإحداثي نفسه، وأستعمل لونين مختلفين لتظليل منطقتي الحلّ كما في الشكل المجاور.

**الخطوة 2:** أحدد منطقة التقاطع بين حلّي المتباينتين.

ألاحظ أنّ حلّ المتباينة:  $4x + 3y \leq 12$  هو المنطقتان A و B، وأنّ حلّ المتباينة:  $y - 2x < 0$  هو المنطقتان B و C. إذن: المنطقة B المشتركة بين منطقتي حلّ المتباينتين هي منطقة حلّ نظام المتباينات.

**الخطوة 3:** التحقّق من صحة الحلّ.

أتحرّق من صحّة الحلّ باختيار زوج مُرتّب يقع في منطقة حلّ النظام (المنطقة B)، مثل  $(2, -1)$ ، ثم أعوّضه في متباينات النظام جميعها:

$$4x + 3y \leq 12$$

$$4(2) + 3(-1) \stackrel{?}{\leq} 12$$

$$5 \leq 12 \quad \checkmark$$

$$y - 2x < 0$$

$$-1 - 2(2) \stackrel{?}{<} 0$$

$$-5 < 0 \quad \checkmark$$

المتباينة الأولى

بالتعويض

العبارة صحيحة

المتباينة الثانية

بالتعويض

العبارة صحيحة

### أتحقق من فهمي

أمثل بياناً منطقة حلّ نظام المتباينات الآتي، ثم أتحقق من صحّة الحلّ:

a)  $y < x + 5$

$3x + 2y \geq 6$

b)  $x + y \leq 2$

$x + y \geq 0$

يُمكن أحياناً ألا تتداخل منطقتا حلّ المتباينتين فلا يكون لنظام المتباينتين حلّ، وتكون مجموعة حلّ النظام هي المجموعة الخالية  $\{\}$  أو  $\Phi$ .

### مثال 4

أمثل بياناً منطقة حلّ نظام المتباينات الآتي:

$3x + y \leq 3$

$3x + y \geq 6$


**الخطوة 1:** أمثل المستقيمين الحدوديين.

أمثل المستقيمين الحدوديين  $3x + y = 3$ ،

$3x + y = 6$  في المستوى الإحداثي نفسه بياناً،

وأستعمل لونين مختلفين لتظليل منطقتي الحلّ،

كما في الشكل المجاور.



### أتعلّم

ألاحظ في المثال 3 عدم وجود منطقة حلّ مشتركة؛ لأنّ المستقيمين الحدوديين متوازيان.

**الخطوة 2:** تحديد منطقة التقاطع بين حلّي المتباينتين.

ألاحظ أنّ حلّ المتباينة:  $3x + y \leq 3$  هو المنطقة A، وأنّ حلّ المتباينة:  $3x + y \geq 6$  هو المنطقة B، وأنّه لا يوجد تقاطع بين منطقتي حلّ المتباينتين. إذن: حلّ النظام هو المجموعة الخالية  $\Phi$ .

### أتحقق من فهمي

أمثل بياناً منطقة حلّ نظام المتباينات الآتي:

a)  $x + 3y \leq 6$

$x + 3y > 9$

b)  $2x - y \geq 4$

$2x - y \leq 0$

قد يحوي النظام أكثر من متباينتين، عندئذ تكون منطقة الحل هي المنطقة المشتركة بين مناطق حل المتباينات جميعها.

## مثال 5

أمثل بيانيًا منطقة حلّ نظام المتباينات الآتي:

$$x - y \geq 0$$

$$x + y < 8$$

$$x > 2$$


**الخطوة 1:** أمثل بيانيًا المستقيمات الحدودية.

أمثل بيانيًا المستقيمات الحدودية  $x - y = 0$ ،  $x + y = 8$ ،  $x = 2$  في المستوى الإحداثي نفسه.

**الخطوة 2:** أحدد منطقة الحلّ.

## أتعلم

للتحقّق من أن الزوج المرتّب يُمثّل حلاً لنظام المتباينات، يجب تعويضه في المتباينات جميعها.



• أظلل منطقة حلّ المتباينة:

$x + y < 8$  باللون الأزرق، وهي

المناطق:  $F, A, B, C$ .

• أظلل منطقة حلّ المتباينة:

$x - y \geq 0$  باللون الأخضر، وهي

المناطق:  $D, B, C$ .

• أظلل منطقة حلّ المتباينة:  $x > 2$

باللون الأحمر، وهي المناطق:  $F, C, D, E$ .

ألاحظ أنّ المنطقة  $C$  هي المنطقة المشتركة بين مناطق حلّ المتباينات الثلاث. إذن: هي منطقة حلّ النظام.

**أتحقق من فهمي** أمثل بيانيًا منطقة حلّ نظام المتباينات الآتي:

$$-3x + 4y \geq 9$$

$$x - 5y > 6$$

$$2x - 5y < -3$$

تُستعمل أنظمة المتباينات الخطية في العديد من المجالات والتطبيقات الحياتية، ويُمكن بها تحديد القيم الممكنة للمتغيّرات وفق شروط محدّدة.

## مثال 6 : من الحياة



**نجارة:** يريد نجّار شراء نوعين من المسامير، ووجد أنّ ثمن الكيلو جرام الواحد من النوع الأول JD 4، ومن النوع الثاني JD 6. إذا أراد شراء ما لا يقلّ عن 10 kg من النوعين، ولا يزيد ثمنه الكلي على JD 48، فأجد مقدار ما يمكنه شراؤه من كل نوع.

يوجد في هذه المسألة متغيّران مجهولان هما كمّية المسامير من النوع الأول وكمّية المسامير من النوع الثاني، وتوجد قيود على هذين المتغيّرين محدّدة بحدّ أدنى للكتلة الكلية لما يشتريه من النوعين، والحد الأعلى لمقدار ما يدفعه للكمّيتين من النوعين.

**الخطوة 1:** أُعبر عن المسألة جبريّاً بنظام من المتباينات الخطيّة.

أفرض أنّ كتلة المسامير من النوع الأول هي  $x$ ، ومن النوع الثاني هي  $y$ ، ثم أكتبُ نظام المتباينات الخطيّة المرتبط بالشروط الواردة في نص المسألة.

$$x + y \geq 10$$

لا تقلّ الكتلة الكلية لنوعَي المسامير عن 10 kg

$$4x + 6y \leq 48$$

لا يزيد الثمن الكليّ لنوعَي المسامير عن JD 48

$$x \geq 0$$

لا يُمكن أن تكون كتلة النوع الأول سالبة

$$y \geq 0$$

لا يُمكن أن تكون كتلة النوع الثاني سالبة

وبعد تبسيط المتباينة  $4x + 6y \leq 48$  بالقسمة على 2؛ فإنّ نظام المتباينات الذي يُمثّل هذه المسألة هو:

$$\begin{cases} x + y \geq 10 \\ 2x + 3y \leq 24 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

**الخطوة 2:** أمثّل نظام المتباينات الخطيّة بيانيّاً.

أمثّل بيانيّاً المستقيمات الحدودية  $x + y = 10$ ،  $2x + 3y = 24$  في المستوى الإحداثي نفسه، مقتصرًا الرسم على الربع الأول؛ لأن  $x \geq 0$ ،  $y \geq 0$ ، ثم أظلل منطقة الحلّ لكلّ متباينة.

### أتعلّم

نحتاج في بعض المسائل الحياتية إلى إضافة الشرطين  $x \geq 0$ ،  $y \geq 0$  لأنّ قيم المتغيّرات فيها لا يُمكن أن تكون سالبة، مثل الكتلة والمسافة.


### لغة الرياضيات

$a$  على الأكثر تُكافئ  $x \leq a$ ، و  $b$  على الأقلّ تُكافئ  $x \geq b$ .

## أفكر

أكتب قائمة تحوي النقاط جميعها التي يمكن أن تكون حلولاً ممكنة لنظام المتباينات الخطية.

## الخطوة 3: أحدد منطقة الحل.



ألاحظ أن مناطق الحل تتقاطع في منطقة مغلقة على شكل مثلث هي منطقة حل النظام، وأن النقاط  $(9, 2)$ ,  $(9, 1)$ ,  $(8, 2)$ ,  $(6, 4)$  وغيرها الكثير واقعة في منطقة الحل. فمثلاً، يُمكن للنجار شراء 6 kg من النوع الأول و 4 kg من النوع الثاني؛ أو 9 kg من النوع الأول و 1 kg من النوع الثاني، وهكذا لبقية النقاط الواقعة في منطقة الحل.

## أتحقق من فهمي



**خياطة:** أراد خياط شراء نوعين من الأقمشة، ووجد أن ثمن المتر المربع الواحد من الكتان 5 دنانير، ومن الصوف 8 دنانير. إذا أراد شراء ما لا يزيد على  $30 \text{ m}^2$  من النوعين ولا يقل ثمنه عن 200 دينار، فأجد أكبر كمية كتان يمكنه شراؤها.

## أدرب وأحل المسائل



أمثل المتباينات الآتية بيانياً:

1  $y < 2x - 1$

2  $3x - 4y \leq 12$

3  $y \geq 0.5x + 3$

4  $-2 \leq x \leq 1$

5  $-2x + 3y \geq 12$

6  $-1 \leq y \leq 4$

7  $y < |x + 3|$

8  $y > |x - 1| - 2$

9  $y \geq |x| + 4$

أمثل منطقة حل كل من أنظمة المتباينات الآتية:

10  $y < -3x + 4$

11  $2x + 5y \leq 5$

12  $2x + 3y \geq 6$

$x + 3y > -6$

$3x - y < 6$

$2x + 3y \leq 0$

13  $y \leq |x + 4| + 4$

14  $y \leq |x + 4| - 4$

15  $y \leq 3$

$y < x$

$2x - 3y > -6$

$y \geq |x - 1|$

16  $y \geq x$

$2x + y < 6$

$2x + 5 > 10$

17  $y > x - 3$

$4x + 3y < 24$

$x \geq 2$

18  $y \geq x - 4$




$y \leq 0.5x$

$y \geq -x$



19 **ورق زينة:** تريد تغريد شراء ورق زينة لتزين قاعة في منزلها للاحتفال بتخرجها. وقد كان سعر اللقمة من ورق الزينة الذهبي 3 دنانير، ومن ورق الزينة الأزرق دنانيرين. وتريد تغريد الشراء من النوعين بما لا يزيد على 15 ديناراً، وألا يقل عدد لقات ورق الزينة التي تشتريها عن 6 لقات. أكتب نظام متباينات يصف هذا الموقف وأمثله بيانياً، وأجد من الرسم 4 حلول ممكنة لعدد لقات ورق الزينة التي يمكنها شراؤها من كل نوع.

أكتب المتباينة الخطية بمتغيرين التي تمثل كلاً من التمثيلات البيانية الآتية:



23 **رحلات:** ذهب رافع وعاهد في زيارة لعدد من المعالم السياحية في الأردن، وقد اتفقا على أن يتناوبا قيادة سيارتهما، بحيث لا تقل مدة قيادة رافع للسيارة على نحو متواصل في اليوم عن 3 ساعات ولا تزيد على 6 ساعات، ولا تقل مدة قيادة عاهد للسيارة على نحو متواصل عن ساعتين ولا تزيد على 5 ساعات، وألا يزيد زمن قيادة كليهما للسيارة يومياً على 10 ساعات. أكتب نظام متباينات يصف هذا الموقف، وأمثله بيانياً.

24 **أحل المسألة الواردة في بداية الدرس.**

**هندسة:** أمثل بيانياً منطقة حل نظام المتباينات الآتي، ثم أجب عن الأسئلة التي تليه:

$x \geq 2$


$y \geq -3$

$x + y \leq 4$

25 أصف الشكل الهندسي الذي يمثل منطقة الحل نظام المتباينات.

26 أجد مساحة المنطقة المغلقة التي تمثل حل النظام.

المنطقة  $R$  في الرسم المجاور محدودة بالمستقيمات  $x + y = 3$ ,  $y = \frac{1}{2}x + 3$ ,  $y = 5x - 15$



27 ما المتباينات الثلاث التي تُمثّل حلّها المنطقة  $R$ ؟

28 ما أكبر قيمة للمقدار  $x + y$  في المنطقة  $R$ ؟

29 ما أكبر قيمة للمقدار  $x - y$  في المنطقة  $R$ ؟

## مهارات التفكير العليا

مسألة مفتوحة: أكتب نظامًا من متباينتين خطيتين بحيث يكون حله:

30 خطًا مستقيمًا.

31 واقعًا في الربع الثالث.

32 تبرير: هل العبارة الآتية: صحيحة دائمًا، أم صحيحة أحيانًا، أم غير صحيحة إطلاقًا؟


"نظام المتباينتين الذي مستقيماه الحدوديان متوازيان ليس له حل". أبرّر إجابتني بتقديم مثال أو مثال مضاد.

33 تبرير: إذا كانت النقطة  $(3, 2)$  تُمثّل حلًّا للمتباينة  $y > mx + b$ ، في حين أنّ النقطة  $(1, 2)$  لا تُمثّل حلًّا لها. هل ميل


المستقيم الحدودي سالب أم موجب أم صفر أم غير معرّف؟ أبرّر إجابتني.

تحدّد: أكتب نظام المتباينات الذي منطقة حله هي المنطقة المظللة، في كلّ من التمثيلات البيانية الآتية:

34



35



## تمثيل نظام متباينات خطية بمتغيرين بيانياً

### Graphing system of linear inequalities in two variables

يُمكنني استعمال برمجية جيو جبرا؛ لتمثيل نظام المتباينات الخطية بيانياً على المستوى الإحداثي، وإيجاد منطقة الحل.

#### مثال 1

أمثل نظام المتباينات الخطية الآتي بيانياً؛ باستعمال برمجية جيو جبرا، ثم أُحدّد منطقة الحل:

$$3x + 5y \leq 2$$


$$x + 5y > 4$$

**الخطوة 1:** تمثيل المتباينة الأولى بيانياً باتّباع الآتي:

أكتب المتباينة الأولى في شريط الإدخال بنقر المفاتيح الآتية:

3 x + 5 y ≤ 2


ألاحظ أنّ برمجية جيو جبرا قد حدّدت منطقة باللون الأزرق. ماذا تعني هذه المنطقة بالنسبة إلى المتباينة؟



**الخطوة 2:** تمثيل المتباينة الثانية بيانياً باتّباع الآتي:

أكتب المتباينة الثانية في شريط الإدخال؛ بنقر المفاتيح الآتية:

x + 5 y > 4




**الخطوة 3:** تغيير اللون الأزرق الذي حدّدته برمجية جيوجبرا لمنطقة أخرى؛ لتمييزها عن منطقة الحلّ الأولى.

أنقر المتباينة المراد تغيير لونها على يسار الشاشة، ولتكن المتباينة الثانية، ثم أنقر الرمز الذي بجانبها، وأختار (settings) ثم (color) من القائمة التي ظهرت يمين الشاشة، ومنها أختار لوناً آخر مثل الأخضر.

**الخطوة 4:** تفسير المناطق الظاهرة.

ألاحظ وجود 4 مناطق: الأولى باللون الأزرق، والثانية باللون الأخضر، والثالثة مزيج من اللونين معاً، والرابعة باللون الأبيض. ماذا تعني كلّ منطقة؟



**الخطوة 5:** تحديد منطقة الحلّ بشكل منفصل.

يمكنني تحديد منطقة الحلّ بشكل منفصل عن المناطق الأخرى، وذلك بالضغط على زر اللون المجاور لكلّ معادلة؛ ليختفي بذلك تظليل المناطق، ثم كتابة الصيغة الآتية في شريط الادخال:  $a \& b$  حيث تُمثل  $a$  و  $b$  اسمي المنطقتين الممثلتين للمتباينتين؛ لتظهر منطقة الحلّ بشكل منفصل كما في الشكل المجاور.

أتدرب



أمثل كلاً من أنظمة المتباينات الخطية الآتية بيانياً؛ باستعمال برمجية جيوجبرا، ثم أُحدّد منطقة الحلّ:

1  $-5x - 2y \geq 3$   
 $x + y < -3$

2  $0.5x + 7y > -2$   
 $x < y$

3  $x - y \geq 0$   
 $x + y \leq 0$

4  $9x - 6y > 8$   
 $27x - 18y < 1$

## البرمجة الخطية Linear Programming

إيجاد الحل الأمثل لمسألة برمجة خطية.

فكرة الدرس



البرمجة الخطية، اقتران الهدف، الحل الأمثل.

المصطلحات



يُمكن لطائرة أن تحمل 200 راكب حدًا أقصى في الدرجتين الاقتصادية ورجال الأعمال، وتُحقق الشركة ربحًا قدره JD 60 عن كل تذكرة من الدرجة الاقتصادية،

مسألة اليوم



و JD 100 عن كل تذكرة من درجة رجال الأعمال. إذا كان عدد المقاعد في درجة رجال الأعمال لا يقل عن 20 مقعدًا، وفي كل رحلة يكون عدد الركاب الدرجة الاقتصادية على الأقل 4 أمثال عدد ركاب درجة رجال الأعمال، فأجد عدد التذاكر التي يجب على شركة الطيران بيعها من كل درجة للحصول على أكبر ربح ممكن؟

**البرمجة الخطية** (linear programming) طريقة تعتمد التمثيل البياني على المستوى

الإحداثي؛ لإيجاد أكبر قيمة ممكنة (قيمة عظمى)، أو أصغر قيمة ممكنة (قيمة صغرى) لاقتران يُسمى **الاقتران الهدف** (objective function)، ضمن **مجموعة قيود** (constraints)، يُمثل كل منها متباينة خطية. بتمثيل المتباينات الخطية (القيود) تتحدد منطقة حلّ مشتركة لها تُسمى **منطقة الحلول الممكنة** (feasible region)، وفيها تتحقق أكبر قيمة ممكنة، أو أصغر قيمة ممكنة للاقتران الهدف عند رؤوس المضلع الذي يُحدد منطقة الحلول الممكنة.

تُعرف البرمجة الخطية أيضًا بأنها طريقة البحث عن **الحل الأمثل** (optimal solution)، وتتكوّن مسألتها من:

1 **الاقتران الهدف**: يكون في صورة:

$$P = ax + by, \text{ حيث:}$$


$P$ : اسم الاقتران (مثل الربح).

$a, b$ : عدنان حقيقيان.  $x$  و  $y$  متغيران.

2 **القيود**: نظام من المتباينات الخطية، تُكتب

بدلالة المتغيرين  $x, y$ ، وتُحدد منطقة الحلول

الممكنة كما في الشكل المجاور.



## مفهوم أساسي

إذا وُجدت قيمة عظمى أو قيمة صغرى للاقتران الهدف، فإنّها تكون عند واحد أو أكثر من رؤوس منطقة الحلول الممكنة.


### مثال 1

أجد إحداثيي النقطة  $(x, y)$  التي تجعل الاقتران  $P = 2x + 2y$  أكبر ما يُمكن ضمن القيود الآتية:

$$\begin{aligned} x + y &\leq 1 \\ x + 2y &\leq 4 \\ x \geq 0, y &\geq 0 \end{aligned}$$

### أتذكّر

المستقيم  $x = 0$  هو المحور  $y$  نفسه، والمستقيم  $y = 0$  هو المحور  $x$  نفسه.



**الخطوة 1:** أمثل القيود بيانياً.

أمثل نظام المتباينات الخطية (القيود) بيانياً، ثم أحدد منطقة الحلول الممكنة، كما في الشكل المجاور.

**الخطوة 2:** أحدد رؤوس منطقة الحلول الممكنة.

| رؤوس منطقة<br>الحلول الممكنة | $P = 3x + 2y$         |
|------------------------------|-----------------------|
| $A(0, 0)$                    | $P = 3(0) + 2(0) = 0$ |
| $B(0, 2)$                    | $P = 3(0) + 2(2) = 4$ |
| $C(2, 1)$                    | $P = 3(2) + 2(1) = 8$ |
| $D(1, 0)$                    | $P = 3(1) + 2(0) = 3$ |

القيمة العظمى

أعيّن إحداثيي كلّ من نقاط رؤوس منطقة الحلول الممكنة، وهي:  $A, B, C, D$ ، ثم أضعها في جدول، وأحسب فيه قيمة الاقتران الهدف عند كلّ منها.

**الخطوة 3:** تحديد القيمة العظمى

أو القيمة الصغرى.

ألاحظ أنّ أكبر قيمة للاقتران  $P$  هي 8، وأنّها تتحقّق عندما  $x = 2, y = 1$

أتحقق من فهمي

أجد إحداثيي النقطة  $(x, y)$  التي تجعل الاقتران  $T = 4x + 5y$  أكبر ما يُمكن ضمن القيود الآتية:

$$\begin{aligned} x + 2y &\leq 16 \\ 3x + 2y &\leq 24 \\ x \geq 0, y &\geq 0 \end{aligned}$$

يسعى القائلون على الشركات الصناعية والتجارية وفي الأعمال كافة، إلى تخفيض الكلفة وزيادة الإنتاجية وتحقيق أكبر ربح. ويخضع هذا لقيود ومحددات مثل التمويل والأيدي العاملة وعدد ساعات العمل وتوافر المواد الأولية وعوامل العرض والطلب وغير ذلك من المتغيرات. ولحلّ مثل هذا النوع من المسائل نستعمل البرمجة الخطية، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

### الخطوة 1:

صياغة الفرضيات وكتابة اقتران الهدف الذي يُراد إيجاد قيمته العظمى أو الصغرى، ثم تحديد القيود.

### الخطوة 2:

تمثيل نظام المتباينات بيانياً، وتظليل منطقة الحلول الممكنة.

### الخطوة 3:

تحديد إحداثيات رؤوس منطقة الحلول الممكنة.

### الخطوة 4:

اختيار القيمة العظمى أو الصغرى وفقاً لما هو مطلوب في المسألة.

## مثال 2 : من الحياة



يبيع متجر للأجهزة الإلكترونية نوعين من أجهزة الكمبيوتر المحمولة، تكلفة النوع الأول JD 250، وتكلفة النوع الثاني JD 400 على التوالي. ويُحقّق النوع الأول ربحاً قدره JD 45، في ما يُحقّق النوع الثاني ربحاً قدره JD 50. ويُقدّر المتجر أنّ إجمالي الطلب الشهري على الأجهزة لا يتجاوز 250 جهازاً، وأنّه لا يمكنه استثمار أكثر من JD 70000 في ذلك. كم جهاز كمبيوتر يجب على المتجر توفيرها للزبائن من كل نوع؛ لتحقيق أكبر ربح ممكن؟


### الخطوة 1: أصيغ الفرضيات.

أفرض أنّ عدد أجهزة الكمبيوتر التي سيوفّرها المتجر من النوع الأول هو  $x$ ، وأنّ عدد الأجهزة التي سيوفّرها من النوع الثاني هو  $y$ . إذا افترضنا أنّ المحل سيبيع كلّ الأجهزة المخزّنة لديه؛ فإنّ الربح المتوقّع هو:  $P = 45x + 50y$

$$250x + 400y \leq 70000, \quad x + y \leq 250, \quad x \geq 0, \quad y \geq 0$$

### أتعلّم

تُسمّى المتباينتان  $x \geq 0, y \geq 0$  قيود أو شروط عدم السالبة، وهما توجدان في مسائل البرمجة الخطية الحياتية بصورة ضمنية.



**الخطوة 2:** أمثل القيود بيانيًا.

أمثل نظام المتباينات، ثم أظلل منطقة الحلول الممكنة كما في الشكل المجاور.

**الخطوة 3:** أحدد رؤوس منطقة الحلول الممكنة.

أحدد إحداثيي كل من النقاط:  $A, B, C, D$ ، ثم أجد قيمة الربح  $P$  عند كل منها كما في الجدول الآتي:

| رؤوس منطقة<br>الحلول الممكنة | $P = 45x + 50y$                |
|------------------------------|--------------------------------|
| $A(0, 175)$                  | $P = 45(0) + 50(175) = 8750$   |
| $B(200, 50)$                 | $P = 45(200) + 50(50) = 11500$ |
| $C(250, 0)$                  | $P = 45(250) + 50(0) = 11250$  |
| $D(0, 0)$                    | $P = 45(0) + 50(0) = 0$        |

القيمة العظمى

**أتذكر**

لإيجاد إحداثيي النقطة  $B$ ، أحل المعادلتين معًا بطريقة الحذف والتعويض، ويمكنني أيضًا استعمال برمجة جبراً لإيجاد إحداثيي نقطة تقاطع المستقيمين.

**أتذكر**

تمثل النقطة  $A$  المقطع  $y$  للمعادلة  $250x + 400y = 70000$

**الخطوة 4:** أحدد القيمة العظمى أو القيمة الصغرى.

ألاحظ من الجدول أن أكبر ربح ممكن هو 11500 JD، وأنه يتحقق عند بيع 200 جهاز من النوع الأول، و 50 جهازًا من النوع الثاني.

**أتحقق من فهمي**

يُنتج مشغل صغير للأثاث المعدني 36 خزانة على الأكثر في الأسبوع من نوعين مختلفين  $A$ ، و  $B$ . وربحه في الخزانة الواحدة من النوع  $A$  هو 35 دينارًا، ومن النوع  $B$  هو 45 دينارًا، وكان ما يُباع من النوع  $A$  لا يقلّ عن 3 أمثال ما يُباع من النوع  $B$ . أجد عدد الخزائن التي ينتجها المشغل من كل نوع ليحقق أكبر ربح ممكن.

ألاحظ من المثالين السابقين أن منطقة الحل الممكنة التي تُحددها القيود كانت مغلقة؛ لأنّ هذه القيود فرضت ذلك، ولكنّ بعض المسائل الحياتية تتضمن إيجاد أقلّ تكلفة ممكنة، أو أقلّ كمية مُستهلكة وغير ذلك، فتكون منطقة الحلّ عندئذٍ مفتوحة؛ لأنّ قيودها تفرض ذلك.

### مثال 3 : من الحياة

|                      | النوع 1 | النوع 2 |
|----------------------|---------|---------|
| سعر العلبة الواحدة   | JD 0.3  | JD 0.4  |
| عدد السرعات الحرارية | 60      | 60      |
| عدد وحدات فيتامين A  | 12      | 6       |
| عدد وحدات فيتامين C  | 10      | 30      |

**حمية غذائية:** يشترط نظام الحمية الغذائية الذي يتبعه بعض الرياضيين أن يتوافر ما لا يقل عن 300 سرعة حرارية، و36 وحدة من فيتامين A، و90 وحدة من فيتامين C، ضمن

الجزء السائل من وجبتهم الغذائية. يُبين الجدول المجاور تكلفة العلبة الواحدة من نوعين مختلفين من المكملات الغذائية، وعدد السرعات الحرارية، ووحدات فيتامين A وفيتامين C التي تحويها العلبة الواحدة. كم علبة من كل نوع يُمكن أن يستهلكها يومياً لاعب يتبع نظام الحمية الغذائية، ويُريد تحقيق شروطها بأقل تكلفة مالية ممكنة؟

**الخطوة 1:** أصيغ الفرضيات.

أفرض أن عدد العلب التي سيستهلكها اللاعب يومياً من النوع الأول هو  $x$ ، أن عدد العلب التي سيستهلكها من النوع الثاني هو  $y$ . إذا افترضت أن اللاعب سيحصل على حاجته اليومية من السرعات الحرارية والفيتامينات من النوعين معاً؛ فإن التكلفة المتوقعة هي:


$$C = 0.3x + 0.4y$$

المطلوب أن تكون التكلفة أقل ما يُمكن ضمن القيود الآتية:

$$60x + 60y \geq 300, \quad 12x + 6y \geq 36, \quad 10x + 30y \geq 90, \quad x \geq 0, \quad y \geq 0$$

ويُمكن كتابة الشروط في أبسط صورة كما يأتي:

$$x + y \geq 5, \quad 2x + y \geq 6, \quad x + 3y \geq 9, \quad x \geq 0, \quad y \geq 0$$



**الخطوة 2:** أمثل القيود بيانياً.

أمثل نظام المتباينات الخطية، ثم أظلل منطقة الحلول الممكنة كما في الشكل المجاور.



#### معلومة

إنّ الحد الأدنى من السرعات الحرارية التي يحتاج إليها الشخص البالغ هي 1800 سرعة حرارية يومياً؛ ليستطيع الدماغ وبقية أجزاء الجسم القيام بوظائفها بشكل سليم.

#### أتذكّر

كتابة المتباينات في أبسط صورة يُسهّل عملية تمثيلها بيانياً.

**الخطوة 3:** أحدد رؤوس منطقة الحلول الممكنة.

| رؤوس منطقة<br>الحلول الممكنة | $C = 0.3x + 0.4y$           |
|------------------------------|-----------------------------|
| $A(0, 6)$                    | $C = 0.3(0) + 0.4(6) = 2.4$ |
| $B(1, 4)$                    | $C = 0.3(1) + 0.4(4) = 1.9$ |
| $C(3, 2)$                    | $C = 0.3(3) + 0.4(2) = 1.7$ |
| $D(9, 0)$                    | $C = 0.3(9) + 0.4(0) = 2.7$ |

القيمة الصغرى

**الخطوة 4:** تحديد القيمة العظمى أو القيمة الصغرى.

ألاحظ من الجدول أنّ أقلّ تكلفة ممكنة تساوي JD 1.7، وأنّ اللاعب يستهلك وقتاً 3 علب من النوع الأول من المكمل الغذائي، وعلبتين من النوع الثاني من المكملات الغذائية، وهو الحد الأدنى الذي يحتاج إليه من الأسعار الحرارية والفيتامينات ضمن الجزء السائل من وجبته الغذائية.

أتحقق من فهمي



**رحلات:** تُخطط مدرسة ثانوية أن تأخذ ما لا يقلّ عن

400 طالب في رحلة لمدينة البترا. ولدى شركة نقل ركاب

10 حافلات كبيرة سعة الواحدة 50 راكباً، و8 حافلات صغيرة

سعة الواحدة 40 راكباً، ولديها 9 سائقين فقط. إذا كانت أجرة الحافلة الكبيرة JD 560،

والصغيرة JD 420، فما أقلّ تكلفة ممكنة لاستئجار الحافلات لهذه الرحلة؟

أدرب وأحل المسائل



أجد إحداثيي النقطة  $(x, y)$  التي تجعل اقتران الهدف أصغر ما يُمكن ضمن القيود المعطاة في كلّ ممّا يأتي:

1  $T = 5x + 2y$

$y \geq 4$

$x \leq 5$

$y \leq 2x$

2  $P = 2x + 4y$

$3x + y \geq 3$

$x + y \leq 5$

$y \geq 0$

3  $Z = 3x + 2y$

$x + y \leq 8$

$y \geq 3$

$x \geq 0$

أجد إحداثيي النقطة  $(x, y)$  التي تجعل اقتران الهدف أكبر ما يُمكن ضمن القيود المعطاة في كلٍّ مما يأتي:

4  $T = 5x - 2y$

$$x + 2y \leq 8$$

$$2x - y \leq 2$$

$$x \geq 0, y \geq 0$$

5  $Q = 3x + y$

$$5x + 3y \geq 15$$

$$x \leq 6$$

$$0 \leq y \leq 5$$

6  $K = x + 2y$

$$2x + y \leq 6$$

$$x + 2y \leq 6$$

$$x \geq 0, y \geq 0$$

لدى شركة لنقل الركاب حافلات كبيرة وحافلات متوسطة، لا يزيد عددها الكلي على 15 ولا يقل عن 8 حافلات. وكان عدد الحافلات المتوسطة لا يقل عن نصف عدد الحافلات الكبيرة، ولا يزيد على عدد الحافلات الكبيرة بأكثر من حافلتين. 7 أكتب نظام متباينات يصف هذه المعلومات وأمثله بيانياً.

8 إذا كان لدى الشركة 6 حافلات كبيرة، فكم لديها من الحافلات الصغيرة؟ أكتب القيم الممكنة جميعها.



9 إذا كانت أجرة رحلة بالقارب للواحد من الكبار JD 20، وللواحد من الأطفال JD 10. ويحمل القارب ما لا يزيد على 30 شخصاً، ويجب ألا تقل الأجرة الكلية عن JD 480 فما أقل عدد ممكن للكبار الذين يحملهم القارب؟

خزائن الكتب: يريد المسؤول عن مخزن لبيع الكتب شراء خزائن جديدة؛ إذ يحتاج المخزن إلى  $30 \text{ m}^2$  من الرفوف. مساحة رفوف الخزانة من النوع A هي  $3\text{m}^2$ ، ومن النوع B هي  $2\text{m}^2$ ، ويمكن أن يستوعب المخزن 8 خزائن على الأكثر من النوع A، و12 خزانة على الأكثر من النوع B.

10 إذا كان ثمن الخزانة من النوع A JD 90، ومن النوع B JD 75، فأكتب اقتران تكلفة شراء الخزائن ونظام متباينات يصف هذا الموقف.

11 أمثل منطقة حل نظام المتباينات، وأجد إحداثيات رؤوسها.

12 أجد عدد الخزائن من كل نوع التي يجب أن يشتريها المسؤول عن المخزن، لتحقيق حاجته من الخزائن بأقل تكلفة ممكنة.

13 يُنتج مصنع نوعين من الدراجات الهوائية، وتبلغ طاقة الإنتاج القصوى من كلا النوعين 420 دراجة أسبوعياً. فإذا



كان عليه أن ينتج ما لا يقل عن 100 دراجة من النوع الأول، وما لا يزيد على 200 دراجة من النوع الثاني في أحد الأسابيع، وكان ثمن بيع الدراجة من النوع الأول JD 60، ومن النوع الثاني JD 75، فكم دراجة يُنتج من كل نوع ليكون دخل المصنع أكبر ما يمكن في ذلك الأسبوع؟



| النوع | أمونيا<br>(وحدة) | نترات<br>(وحدة) | فوسفات<br>(وحدة) |
|-------|------------------|-----------------|------------------|
| A     | 3                | 3               | 6                |
| B     | 10               | 4               | 4                |

**زراعة:** يُباع في محل للوازم الزراعية نوعان من الأسمدة هما  $A, B$ . يُبين الجدول المجاور مكونات الكيلوغرام الواحد من هذين السمادين:


يُريد مزارع أن يكون مزيجاً من السمادين يحتوي على 36 وحدة على الأقل فوسفات، و 24 وحدة على الأقل نترات، و 30 وحدة على الأقل أمونيا.

14 إذا كان ثمن الكيلوجرام من النوع  $A$  ديناراً واحداً، ومن النوع  $B$  JD 1.5، فأكتب اقتران التكلفة ونظام متباينات يصف هذا الموقف.

15 أمثل منطقة حلّ نظام المتباينات، وأجد إحداثيات رؤوسها.

16 أجد عدد الكيلوغرامات التي يشتريها من كل نوع؛ ليحقق غايته بأقلّ تكلفة.

### مهارات التفكير العليا



17 **تبرير:** أجد أكبر قيمة ممكنة لاقتران الهدف  $P = 5x + 6y$  ضمن منطقة الحلول الممكنة المُمثلة في الشكل المجاور وأبرّر إجابتي، ثم أجد نقاطاً أخرى ضمن منطقة الحلّ يتحقق عندها أكبر قيمة لاقتران الهدف، وأبرّر إجابتي.

18 **مسألة مفتوحة:** أكتب مسألة حياتية يُمكنني حلّها باستعمال البرمجة الخطية التي تُستعمل فيها 4 متباينات على الأقل، وأكتب اقتران الهدف وأجد قيمته العظمى والصغرى.

19 **تبرير:** هل يكون لاقتران الهدف  $T = ax + by$  قيمة عظمى موجبة؛ إذا وقعت منطقة حلّ نظام المتباينات المرتبطة به في الربع الأول؟ أبرّر إجابتي.

20 **تحّد:** أمثل منطقة حلّ نظام المتباينات الآتي:

$$y \geq 4$$

$$-2x + 5y \leq 20$$

$$-7x + 5y \leq 35$$

$$x - y \leq 3$$

$$2x + y \leq 18$$

وأجد القيمة العظمى والقيمة الصغرى للاقتران  $T = -3x + 5y$  في منطقة حلّ هذا النظام.

أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة في ما يأتي:

1 إذا كان  $f(x) = \begin{cases} 3x^2 - 4x + 2, & x < 3 \\ -2x^2 + 5x + 7, & x \geq 3 \end{cases}$

فما قيمة  $f(-2)$ ؟

- a) -18      b) -11      c) 11      d) 22

2 ما قيمة:  $8 + |2(-2.5) - 3|$ ؟

- a) 0      b) 10      c) 16      d) 19

3 ما حل المعادلة:  $2|x-1| = 4$ ؟

- a) 3      b) 3, -3

- c) 1, 3      d) -1, 3

4 ما مجموعة حل  $|2x + 3| \leq 5$ ؟

- a)  $-4 \leq x \leq 1$       b)  $x \leq -4$  or  $x \geq 1$


- c)  $1 \leq x \leq 4$       d)  $x \leq 1$  or  $x \geq 4$

5 أي الأزواج الآتية حل للمتبينة  $2x - 3y \geq 6$ ؟

- a) (2, 3)      b) (1, 1)

- c) (4, 1)      d) (5, 0)

6 ما المتبينة الذي يُمثلها الرسم البياني المجاور؟



a)  $2x - y \leq 6$

b)  $2x + y \leq 6$

c)  $2x - y \geq 6$

d)  $2x + y \geq 6$

7 إذا كان لنظام متباينات خطية منطقة حل مغلقة رؤوسها

هي:  $P(0, 2)$ ,  $Q(2, 3)$ ,  $R(4, 2)$ ,  $S(3, 0)$ ، فعند أي

منها يأخذ اقتران الهدف  $T = 2x + y$  قيمته العظمى؟

- a) P      b) Q      c) R      d) S

8 أي أنظمة المتباينات الآتية ليس له حل؟

a)  $3x + 5y \geq 15$       b)  $x + 2y \geq 2$

$2x + 3y \geq 6$        $2x + 4y \leq 0$

c)  $4x + 3y \geq 6$       d)  $x + y \geq 6$

$4x + 3y \leq 10$        $x + y \geq 3$

أمثل كلاً من الاقترانين الآتين بيانياً:

9  $f(x) = \begin{cases} 2x + 1, & x < 0 \\ -1, & 0 \leq x \leq 3 \\ x^2 - 4, & x \geq 3 \end{cases}$

10  $f(x) = |3x - 12| + 2$

أحلّ كلاً من المعادلات والمتباينات الآتية:

11  $3|2x+3|-2 = 10$       12  $|5-3x| = |5x+7|$

13  $|2x-3| \geq 9$       14  $|x-3| \leq 4x$

15  $|6+3x| \geq |5x-10|$

أمثل أنظمة المتباينات الآتية بيانياً:

16  $x + 2y \leq 8$       17  $-1 \leq y \leq 4$


$3x + 2y \leq 12$        $y < 2x$

18  $y \geq -|x|$

$y < \frac{2}{5}x$

تدريب على الاختبارات الدولية

24 المتباينة التي تُمثّل التمثيل البياني المجاور، هي:



a)  $|x| < 5$       b)  $|x| \leq 5$


c)  $|x| > 5$       d)  $|x| \geq 5$

25 قيم  $x$  التي تحقق المعادلة  $|x + 5| = 2$ ، هي:

a)  $-3, 3$       b)  $-3, 7$

c)  $2, -2$       d)  $3, -7$

26 أي أنظمة المتباينات الآتية، يُمثّل التمثيل البياني المجاور؟



a)  $y \leq 2x + 2$       b)  $y \geq 2x + 2$

$y > -x - 1$        $y < -x - 1$

c)  $y < 2x + 2$       d)  $y > 2x + 2$

$y \leq -x - 1$        $y \leq -x - 1$

مسرح: ثمن التذكرة للمقاعد القريبة من منصّة مسرح JD 15، وللمقاعد الخلفية JD 10. بيعت في أحد العروض 100 تذكرة على الأكثر، وبلغت إيراداتها JD 1200 على الأقل.

19 أختار متغيرين، وأكتب نظام متباينات خطية يُمثّل هذه المعلومات.

20 أمثّل نظام المتباينات بيانياً.

21 أجد أكبر قيمة ممكنة لعدد تذاكر المقاعد الخلفية المباعة.



طرود الخير: يريد تاجر مواد تموينية تشغيل عدد من العمال ليوم واحد

لتجهيز طرود لبيعها في رمضان. أجره العامل الماهر في هذا اليوم 30 ديناراً، والعامل غير الماهر 20 ديناراً، ولا يريد هذا التاجر أن يُنفق أكثر من 630 ديناراً لتجهيز الطرود. وقد وجد 15 عاملاً ماهراً فقط، ويريد التاجر أن يُشغّل عاملاً ماهراً واحداً على الأقل مقابل كل 3 عمال غير مهرة. العامل الماهر يُجهّز 25 طرداً في الساعة، وغير الماهر يجهّز 18 طرداً في الساعة.

22 أكتب نظام متباينات يُمثّل هذه المعلومات وأمثله بيانياً.

23 أجد عدد العمال من النوعين الذين يجب تشغيلهم لتجهيز أكبر عدد ممكن من الطرود.

### ما أهمية هذه الوحدة؟

تُستعمل الاقتدرات الأسية واللوغارتمية، في نمذجة الكثير من التطبيقات الحياتية بصورة رياضية تُسهّل فهمها. فمثلاً، تُستعمل بعض أنواع الاقتدرات الأسية لوصف العلاقة بين عدد خلايا بكتيريا والزمن. وسأتعرّف في هذه الوحدة هذين النوعين من الاقتدرات، وتطبيقاتهما الحياتية الكثيرة.

### تعلّمتُ سابقًا:

- ✓ قوانين الأسس النسبية.
- ✓ حلّ المعادلة الأسّية.
- ✓ إيجاد الاقتران العكسي لاقتران واحد لواحد.
- ✓ تمثيل الاقترانات بيانياً.

### سأتعلّم في هذه الوحدة:

- ◀ الاقتران الأسّي وخصائصه وتمثيله البياني.
- ◀ الاقتران اللوغاريتمي وخصائصه وتمثيله البياني.
- ◀ قوانين اللوغاريتمات.
- ◀ حلّ المعادلة الأسّية واللوغاريتمية؛ باستعمال قوانين اللوغاريتمات.

# الاقتارات الأسية

## exponential functions

تعرف خصائص الاقتار الأسّي وتمثيله بيانيًا.

فكرة الدرس



الاقتار الأسّي، النمو الأسّي، عامل النمو، الاضمحلال الأسّي، عامل الاضمحلال، الأساس الطبيعي، الاقتار الأسّي الطبيعي.

المصطلحات



مسألة اليوم



الهيدرا حيوان صغير يعيش في الماء العذب، ويُمكنه مضاعفة عدده كل يومين. إذا افترضت أن خزائن الماء في مختبر يحوي في البداية 60 حيوان هيدرا، فأجد عدد حيوانات الهيدرا في الخزان بعد 8 أيام.

أتعلم

إذا كانت  $b < 0$  فإن  
الاقتار  $f(x) = ab^x$   
يكون غير معرف عند  
بعض القيم مثل  $x = \frac{1}{2}$ .  
إذا كانت  $b = 1$  فإن  
الاقتار  $f(x) = ab^x$   
يصبح على الصورة  
 $f(x) = a$  وهو اقتار  
ثابت.

الاقتار الأسّي (exponential function) اقتار على الصورة  $f(x) = ab^x$  حيث  $a, b$

عددان حقيقيان، و  $b > 0, b \neq 1, a \neq 0$ ، ومن أمثله:

$$f(x) = 4(3^x), \quad f(x) = \left(\frac{1}{4}\right)^x, \quad f(x) = (0.6)^x$$

يُمكنني تمثيل الاقتار الأسّي بتكوين جدول قيم، ثم تعيين الأزواج المرتبة الناتجة من الجدول في المستوى الإحداثي، والوصل بينها بخط منحني. سأتعلم في المثال الآتي التمثيل البياني للاقتار الأسّي على الصورة  $f(x) = ab^x$ ، حيث  $a > 0, b > 1$ ، وأستكشف خصائصه.

مثال 1 إذا كان  $f(x) = 2^x$

أُمثل الاقتار بيانيًا، ثم أجد مجاله ومداه وخطوط التقارب.

الخطوة 1: أنشئ جدول قيم.

أتذكر

- $a^0 = 1$
- $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$

| $x$ | $y = f(x)$                                 | $(x, y)$            |
|-----|--------------------------------------------|---------------------|
| -2  | $y = 2^{-2} = \frac{1}{2^2} = \frac{1}{4}$ | $(-2, \frac{1}{4})$ |
| -1  | $y = 2^{-1} = \frac{1}{2^1} = \frac{1}{2}$ | $(-1, \frac{1}{2})$ |
| 0   | $y = 2^0 = 1$                              | $(0, 1)$            |
| 1   | $y = 2^1 = 2$                              | $(1, 2)$            |
| 2   | $y = 2^2 = 4$                              | $(2, 4)$            |

أُنذّر

اقتارات القوة مثل  
 $f(x) = x^3$  و  $f(x) = x^2$   
ليست اقتارات أسية؛  
لأن المتغير موجود في  
الأساس وليس في الأس.

## أُتذَكَّر

خط التقارب خط مستقيم يقترب منه منحنى الاقتران ولكن لا يمسه ولا يقطعه، ويُشير خط التقارب الأفقي إلى سلوك الاقتران عندما تصبح القيمة المطلقة للمتغير  $x$  كبيرة جدًا.

## أُتذَكَّر


يسمى الاقتران الذي يرتبط كل عنصر في مداه بعنصر واحد فقط في مجاله اقتران واحد لواحد، ويمكن التحقق من أن الاقتران هو واحد لواحد، وذلك برسم أي خط أفقي، والتأكد أنه لا يقطع منحنى الاقتران في أكثر من نقطة.

**الخطوة 2:** أمثل الاقتران في المستوى الإحداثي.

أُعيّن النقاط التي تُمثّل الأزواج  $(x, y)$  في المستوى الإحداثي، وأصل بينها بخط منحنٍ متّصل، كما في الشكل المجاور.

ألاحظ أن مجال هذا الاقتران هو مجموعة الأعداد الحقيقية، ومداه الفترة  $(0, \infty)$ ، ويوجد للاقتران خط تقارب أفقي وهو المحور  $x$ .

يمتد هذا الجزء من المنحنى من دون حدود.



يقترب هذا الجزء من المنحنى من المحور  $x$  ولكنه لا يقطعه ولا يمسه.

2 أجد المقطعين الإحداثيين.

بما أن  $2^x$  موجبة دائمًا؛ فإنه لا يوجد للاقتران مقطع مع المحور  $x$  لأن  $y > 0$  دائمًا. المقطع  $y$  للاقتران هو 1، عندما  $x = 0$ .

3 هل  $f(x)$  متزايد أم متناقص؟

الاقتران  $f(x)$  متزايد؛ لأنه كلما ازدادت قيم  $x$ ؛ فإن قيم  $y$  تزداد.

4 هل  $f(x)$  هو اقتران واحد لواحد؟

نعم،  $f(x)$  هو اقتران واحد لواحد ويمكن التحقق من ذلك باستعمال اختبار الخط الأفقي.

**أُتَحَقَّق من فهمي** إذا كان  $f(x) = 3^x$ ، فأُجيب عما يأتي:

- (a) أمثل الاقتران بيانيًا، ثم أجد مجاله ومداه وخطوط التقارب.
- (b) أجد المقطعين الإحداثيين.
- (c) هل  $f(x)$  متزايد أم متناقص؟
- (d) هل  $f(x)$  هو اقتران واحد لواحد؟

ألاحظ من المثال 1 أن الاقتران  $f(x) = 2^x$  اقتران متزايد، مجاله مجموعة الأعداد الحقيقية، ومداه مجموعة الأعداد الحقيقية الموجبة، وله خط تقارب أفقي وهو المحور  $x$ ، وهو اقتران واحد لواحد. وبشكل عام، فإن أي اقتران على الصورة  $f(x) = ab^x$ ، حيث  $a > 0$ ،  $b > 1$  له الخصائص ذاتها.

والآن، سأتعلم في المثال الآتي التمثيل البياني للاقتران الأسّي على الصورة  $f(x) = ab^x$ ، حيث  $a > 0$ ،  $0 < b < 1$ ، وأستكشف خصائصه.

## مثال 2

إذا كان  $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ ، فأجب عما يأتي:

1 أمثل الاقتران بيانيًا، ثم أجد مجاله ومداه وخطوط التقارب.


**الخطوة 1:** أنشئ جدول قيم.

| $x$ | $y = f(x)$                                     | $(x, y)$                      |
|-----|------------------------------------------------|-------------------------------|
| -2  | $y = \left(\frac{1}{2}\right)^{-2} = 2^2 = 4$  | $(-2, 4)$                     |
| -1  | $y = \left(\frac{1}{2}\right)^{-1} = 2^1 = 2$  | $(-1, 2)$                     |
| 0   | $y = \left(\frac{1}{2}\right)^0 = 2^0 = 1$     | $(0, 1)$                      |
| 1   | $y = \left(\frac{1}{2}\right)^1 = \frac{1}{2}$ | $\left(1, \frac{1}{2}\right)$ |
| 2   | $y = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$ | $\left(2, \frac{1}{4}\right)$ |

### أذكر

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$$

يمتد هذا الجزء من المنحنى من دون حدود.



يقترّب هذا الجزء من المنحنى من المحور  $x$  ولكنه لا يقطعه ولا يمسه.

**الخطوة 2:** أمثل الاقتران في المستوى الإحداثي.

أعيّن النقاط التي تُمثّل الأزواج  $(x, y)$  في المستوى الإحداثي، وأصل بينها بخط منحنٍ متصل، كما في الشكل المجاور.

ألاحظ أنّ مجال هذا الاقتران مجموعة الأعداد الحقيقية، وأنّ مداه الفترة  $(0, \infty)$ ، ويوجد للاقتران خط تقارب أفقي وهو المحور  $x$ .

### أتعلّم

يُمكن كتابة الاقتران  $f(x) = \left(\frac{1}{b}\right)^x$  على الصورة  $f(x) = b^{-x}$  لأنّ  $\left(\frac{1}{b}\right)^x = b^{-x}$

2 أجد المقطعين الإحداثيين.

بما أنّ  $\left(\frac{1}{2}\right)^x$  موجبة دائمًا؛ فإنّه لا يوجد للاقتران مقطع مع المحور  $x$  لأنّ  $y > 0$  دائمًا.

المقطع  $y$  للاقتران هو 1، عندما  $x = 0$

3 هل  $f(x)$  متزايد أم متناقص؟

الاقتران  $f(x)$  متناقص؛ لأنّه كلّما ازدادت قيم  $x$ ؛ فإنّ قيم  $y$  تتناقص.

4 هل  $f(x)$  هو اقتران واحد لواحد؟

نعم،  $f(x)$  هو اقتران واحد لواحد ويمكن التحقق من ذلك باستعمال اختبار الخط الأفقي.

**أتحقق من فهمي** إذا كان  $f(x) = (\frac{1}{3})^x$ ، فأجب عما يأتي:


- (a) أمثل الاقتران بيانياً، ثم أجد مجاله ومداه وخطوط التقارب.  
 (b) أجد المقطعين الإحداثيين.  
 (c) هل  $f(x)$  متزايد أم متناقص؟  
 (d) هل  $f(x)$  هو اقتران واحد لواحد؟

ألاحظ من المثال 2 أن الاقتران  $f(x) = (\frac{1}{2})^x$  اقتران متناقص، مجاله مجموعة الأعداد الحقيقية، ومداه مجموعة الأعداد الحقيقية الموجبة، وله خط تقارب أفقي وهو المحور  $x$ ، وهو اقتران واحد لواحد. وبشكل عام، فإن أي اقتران على الصورة  $f(x) = ab^x$ ، حيث  $0 < b < 1, a > 0$  له الخصائص ذاتها.

## خصائص الاقتران الأسّي

### ملخص المفهوم

التمثيل البياني للاقتران الأسّي المعرف على الصورة  $f(x) = ab^x$  حيث  $a, b$  عدنان حقيقيان و  $a \neq 0, b \neq 1, b > 0$  له الخصائص الآتية:



- مجال الاقتران هو مجموعة الأعداد الحقيقية  $R$ .
- مدى الاقتران هو مجموعة الأعداد الحقيقية الموجبة  $R^+$  أي الفترة  $(0, \infty)$ .


• يكون الاقتران متزايداً إذا كانت  $b > 1$

• يكون الاقتران متناقصاً إذا كانت  $0 < b < 1$

• للاقتران خط تقارب أفقي هو المحور  $x$ .

يقطع الاقتران المحور  $y$  في نقطة واحدة هي  $(0, a)$ ، ولا يقطع المحور  $x$ .

• اقتران واحد لواحد.



للاقترانات الأسّية صور مختلفة، ويمكن تمثيلها بيانياً بإنشاء جدول قيم، وإيجاد مجالها ومداه وخط التقارب الأفقي لها.

### مثال 3

أجد خط التقارب الأفقي لكل اقتران مما يأتي، وأمثله بيانياً وأجد مجاله ومداه:


1  $f(x) = 2(3^{x+2}) - 1$

**الخطوة 1:** أجد خط التقارب الأفقي.

كلّما قلّت قيمة  $x + 2$  اقترب  $2(3^{x+2})$  من الصفر، واقتربت قيمة  $f(x)$  من  $-1$ ؛ أي إنّ خط التقارب الأفقي هو  $y = -1$

**الخطوة 2:** أنشئ جدول قيم.

| $x$        | -4            | -3            | -2        | -1        | 0         | 1         | 2          |
|------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| $y = f(x)$ | -0.78         | -0.33         | 1         | 5         | 17        | 53        | 161        |
| $(x, y)$   | $(-4, -0.78)$ | $(-3, -0.33)$ | $(-2, 1)$ | $(-1, 5)$ | $(0, 17)$ | $(1, 53)$ | $(2, 161)$ |



**الخطوة 3:** أمثل الاقتران في المستوى الإحداثي.

أعيّن النقاط التي تُمثّل الأزواج  $(x, y)$  في المستوى الإحداثي، وأصل بينها بخط منحنٍ متّصل، كما في الشكل المجاور.

مجال هذا الاقتران هو مجموعة الأعداد الحقيقية، ومداه الفترة  $(-1, \infty)$


**2**  $f(x) = 5(2^{-x}) + 3$

**الخطوة 1:** أجد خط التقارب الأفقي.

كلّما قلّت قيمة الأس  $(-x)$  اقترب  $5(2^{-x})$  من الصفر، واقتربت قيمة  $f(x)$  من 3؛ أي إنّ خط التقارب الأفقي هو  $y = 3$

**الخطوة 2:** أنشئ جدول قيم.

| $x$        | -3         | -2         | -1         | 0        | 1          | 2           | 3           | 4           |
|------------|------------|------------|------------|----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| $y = f(x)$ | 43         | 23         | 13         | 8        | 5.5        | 4.25        | 3.63        | 3.31        |
| $(x, y)$   | $(-3, 43)$ | $(-2, 23)$ | $(-1, 13)$ | $(0, 8)$ | $(1, 5.5)$ | $(2, 4.25)$ | $(3, 3.63)$ | $(4, 3.31)$ |



**الخطوة 3:** أمثل الاقتران في المستوى الإحداثي.

أعيّن النقاط التي تُمثّل الأزواج  $(x, y)$  في المستوى الإحداثي، وأصل بينها بخط منحنٍ متّصل، كما في الشكل المجاور.

مجال هذا الاقتران هو مجموعة الأعداد الحقيقية، ومداه الفترة  $(3, \infty)$ .

### إرشاد

يُمكنني استعمال الآلة الحاسبة لإيجاد قيم  $y$  في الجدول، وأختار منزلة لتقريب الأعداد الناتجة.

### إرشاد

يُمكنني استعمال برمجية جيو جيبرا لتمثيل الاقتران الأسّي بيانيّاً؛ وذلك بإدخال الاقتران في شريط المعادلة، ثم النقر على زرّ (Enter).

## أتحقق من فهمي

أجد خط التقارب الأفقي لكل اقتران مما يأتي، وأمثله بيانياً وأجد مجاله ومداه:

a)  $f(x) = 4(2^x) + 12$

b)  $h(x) = 6\left(\frac{1}{3}\right)^{2-x}$

للاقتربات الأسية الكثير من التطبيقات الحياتية، مثل حساب كمية المادة المتبقية من المواد المشعة.



## مثال 4 : من الحياة

مواد مشعة: تُمثل المعادلة  $A(t) = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{1620}}$  الكمية المتبقية  $A$  بالغرامات من عينة 1 g من الراديوم 226 حيث  $t$  الزمن بالسنوات.

### معلومة

الراديوم عنصر كيميائي مشع يُرمز له بالرمز Ra ورقمه الذري 88، لونه أبيض نقي تقريباً، وهو من المعادن القلوية الترابية ولكنه يتأكسد بسهولة عند تعرضه للهواء، فيصبح أسود اللون.

1 أجد كمية الراديوم 226 المتبقية بعد 3240 سنة.

$$\begin{aligned} A(t) &= \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{1620}} && \text{المعادلة الأصلية} \\ A(3240) &= \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{3240}{1620}} && \text{أعوّض } t=3240 \\ &= \left(\frac{1}{2}\right)^2 && \text{أبسط القوة} \\ &= 0.25 && \text{أبسط} \end{aligned}$$

إذن: بعد 3240 سنة، يبقى من كمية الراديوم 0.25 g

2 بعد كم سنة يبقى من كمية الراديوم 0.125 g؟

يمكنني إيجاد عدد السنوات اللازمة لبقى من الراديوم 0.125 عن طريق حلّ المعادلات الأسية.

$$\begin{aligned} A(t) &= \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{1620}} && \text{المعادلة الأصلية} \\ 0.125 &= \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{1620}} && \text{بتعويض } A(t) = 0.125 \\ \frac{1}{8} &= \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{1620}} && 0.125 = \frac{1}{8} \\ \left(\frac{1}{2}\right)^3 &= \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{1620}} && \text{الأساسان متساويان} \\ 3 &= \frac{t}{1620} && \text{بمساواة الأسس} \\ t &= 4860 && \text{بحلّ المعادلة} \end{aligned}$$

إذن: يبقى 0.125 g من كمية الراديوم بعد 4860 سنة.

### أتحقق من فهمي

تُمثل المعادلة  $A(t) = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{30}}$  الكمية المتبقية  $A$  بالغرامات من عينة  $1\text{ g}$  السيزيوم 137 حيث  $t$  الزمن بالسنوات.

(a) أجد كمية السيزيوم 137 المتبقية بعد 30 سنة.

(b) بعد كم سنة يبقى من كمية السيزيوم  $0.25\text{ g}$ .

عندما تزداد كمية بشكل أُسي؛ فإنها تزداد بنسبة مئوية ثابتة خلال فترات زمنية متساوية. ولايجاد مقدار هذه الكمية التي ازدادت بعد  $t$  من الزمن؛ يُمكن استعمال الاقتران الآتي:

$$A(t) = a(1 + r)^t$$

ويُسمى هذا الاقتران اقتران النمو الأسي (exponential growth) حيث  $t$  الفترة الزمنية، و  $a$  الكمية الابتدائية، و  $r$  النسبة المئوية للنمو في فترات زمنية محدّدة. ويُسمى أساس العبارة الأسية  $(1 + r)$  عامل النمو (growth factor).

### أتعلّم

اقتران النمو الأسي  $A(t) = a(1 + r)^t$  أحد صور الاقتران الأسي  $f(x) = ab^x$ ، حيث استعمل المقدار  $1 + r$  بدلاً من  $b$ ، و  $t$  بدلاً من  $x$ . ولقانون النمو الأسي الكثير من التطبيقات الحياتية، منها النمو السكاني.

### اقتران النمو الأسي

### مفهوم أساسي

**بالكلمات:** اقتران النمو الأسي هو كل اقتران أُسي يتزايد بنسبة مئوية ثابتة في فترات زمنية متساوية.

**بالرموز:**  $A(t) = a(1 + r)^t$    
  $a$  الكمية الابتدائية   
  $r$  النسبة المئوية للنمو   
  $t$  الفترة الزمنية للنمو   
  $1 + r$  عامل النمو

### مثال 5: من الحياة



**سكان:** بلغ عدد سكان المملكة الأردنية الهاشمية في عام 2020، 10.8 مليون نسمة تقريباً، فإذا كانت نسبة النمو السكاني 2.6% سنوياً تقريباً؛ فأجب عما يأتي:

1 أكتب اقتران النمو الأسي الذي يُمثّل عدد سكان المملكة بالمليون نسمة بعد  $t$  سنة.

$$A(t) = a(1 + r)^t \quad \text{اقتران النمو الأسي}$$

$$A(t) = 10.8 (1 + 0.026)^t \quad \text{بتعويض } a = 10.8, r = 0.026$$

$$A(t) = 10.8 (1.026)^t \quad \text{بالتبسيط}$$

إذن: اقتران النمو الأسي الذي يُمثّل عدد سكان المملكة بعد  $t$  من السنوات  $A(t) = 10.8(1.026)^t$

## 2 أجد عدد سكان المملكة التقريبي في عام 2030

بما أن عدد سكان المملكة الابتدائي (عندما  $t = 0$ ) يرتبط بالعام 2020، فإنه لإيجاد عدد سكان المملكة في عام 2030، أَعُوْض  $t = 10$  لأنّه يُمثّل الفرق الزمني بين العامين.

$$A(t) = 10.8 (1.026)^t$$

المعادلة الأصلية


$$A(10) = 10.8 (1.026)^{10}$$

بتعويض  $t = 10$

$$\approx 13.96$$

باستعمال الآلة الحاسبة

إذن: من المتوقع أن يكون عدد سكان الأردن في عام 2030، 96.13 مليون نسمة تقريباً.



## 3 أمثل اقتران النمو الأسّي بيانياً.

يُمكنني استعمال برمجة جيوجبرا لتمثيل  
الاقتران الأسّي بيانياً؛ وذلك بإدخال  
الصيغة الآتية في شريط الإدخال:

$$A(t) = 10.8(1.026)^t, t \geq 0$$

ثم انقر على زرّ (Enter).

## أتحقق من فهمي

بلغ عدد سكّان لواء الموقر في عام 2015، 84370 نسمة تقريباً، فإذا كانت نسبة النمو السكاني فيه 2.4% سنوياً، فأجيب عمّا يأتي:

(a) أكتبُ اقتران النمو الأسّي الذي يُمثّل عدد سكان لواء الموقر بالنسبة بعد  $t$  سنة.

(b) أجد عدد سكان اللواء التقريبي في عام 2030

(c) أمثل اقتران النمو الأسّي بيانياً.

وكما في النمو الأسّي؛ فإنه يُمكنني تمثيل النقص في كميّة ما، بنسبة مئوية ثابتة في فترات زمنية متساوية؛ باستعمال الاقتران الآتي:

$$A(t) = a(1-r)^t$$

ويُسمّى هذا الاقتران اقتران **الاضمحلال الأسّي** (exponential decay) حيث  $t$  الفترة

الزمنية، و  $a$  الكميّة الابتدائية، و  $r$  النسبة المئوية للاضمحلال في فترة زمنية محدّدة، ويُسمّى

أساس العبارة الأسية  $(1-r)$  **عامل الاضمحلال** (decay factor).

## معلومة

توجد العديد من الطرائق لرصد التعداد السكاني؛ إذ تتّبع بعض الدول منهجية المسح الميداني، كما أنّ بلداناً أخرى تستعمل التكنولوجيا الحديثة مثل الأجهزة المتنقّلة، ونظم المعلومات الجغرافية المكانية؛ إذ تُساعد هذه الطرائق الحديثة على تحسين نتائج التعداد، وسرعة الحصول عليها، وكفاية نوعيتها.

## أتعلّم

لا يُمكن للزمن أن يكون سالِباً؛ لذا، يُضاف شرط  $t \geq 0$ ، عند تمثيل اقتران النمو في برمجة جيوجبرا.

## اقتران الاضمحلال الأسّي

### مفهوم أساسي

**بالكلمات:** اقتران الاضمحلال الأسّي اقتران أسّي يتناقص بنسبة مئوية ثابتة في فترات زمنية متساوية.

### بالرموز:

$$A(t) = a(1 - r)^t$$

الكمية الابتدائية  $a$  النسبة المئوية للاضمحلال  $r$  الفترة الزمنية للاضمحلال  $t$  عامل الاضمحلال  $1 - r$

### مثال 6 : من الحياة



**تلوث:** بدأ العلماء دراسة على إحدى البحيرات؛ لتحديد مدى تأثير التلوث على عدد الأسماك فيها، فوجدوا أنّ عدد الأسماك في البحيرة يقل بنسبة 20% كل سنة.

### معلومة

يُعدّ موت الكائنات الحية البحرية في المصادر المائية، أحد الأسباب الرئيسة التي تؤدي إلى تلوث الماء، ومن الكائنات البحرية التي تتأثر بدرجة كبيرة بتلوث المياه: الأسماك والسرطانات والطيور والنوارس البحرية والدلافين، والعديد من الكائنات البحرية الأخرى.

أكتب اقتران الاضمحلال الأسّي الذي يُمثل عدد الأسماك في البحيرة بعد  $t$  سنة، علمًا بأنّ عدد الأسماك عند بدء الدراسة يساوي 12000 سمكة.

$$A(t) = a(1 - r)^t$$

اقتران الإضمحلال الأسّي

$$A(t) = 12000(1 - 0.2)^t$$

بتعويض  $a = 12000, r = 0.2$

$$A(t) = 12000(0.8)^t$$

بالتبسيط

إذن: اقتران الاضمحلال الأسّي الذي يُعبّر عن عدد الأسماك في البحيرة بعد  $t$  من السنوات

$$A(t) = 12000(0.8)^t$$

أجد عدد الأسماك في البحيرة بعد مرور 3 سنوات.

$$A(t) = 12000(0.8)^t$$

المعادلة الأصلية

$$A(t) = 12000(0.8)^3$$

بتعويض  $t = 3$

$$\approx 6144$$

باستعمال الآلة الحاسبة

إذن: يبقى في البحيرة 6144 سمكة تقريبًا بعد مرور 3 سنوات.

أتعلم

يمكن تمثيل الاقتران  $A(t) = 12(0.8)^3$  بدلاً من  $A(t) = 12000(0.8)^3$  لتسهيل ملاحظة التغيرات على شكل المنحنى، مع ضرورة الانتباه إلى ضرب أي قيمة ناتجة في 1000


3

أمثل اقتران الاضمحلال بيانياً.

يمكنني استعمال برمجية جيو جيرا لتمثيل الاقتران الأسّي بيانياً؛ وذلك بإدخال الصيغة الآتية في شريط الإدخال:

$$A(t) = 12000(0.8)^3, t \geq 0$$

ثم انقر على زرّ (Enter).



أتتحقق من فهمي

**سيارة:** اشترى أحمد سيارة تعمل على الشحن الكهربائي بمبلغ JD 25000. إذا كان ثمن السيارة يقلّ بنسبة 10% سنوياً؛ فأجب عما يأتي:

(a) أكتب اقتران الاضمحلال الأسّي لثمن السيارة بعد  $t$  سنة.

(b) أجد ثمن السيارة بعد 5 سنوات.

(c) أمثل اقتران الاضمحلال بيانياً.




في الكثير من التطبيقات الحياتية، يكون الاختيار الأمثل للأساس في الاقترانات الأسّيّة هو العدد غير النسبي.

$$e = 2.718281828.....$$

ويسمّى العدد  $e$  **الأساس الطبيعي** (natural base) أو العدد النيبيري، ويسمّى الاقتران  $f(x) = e^x$  **الاقتران الأسّي الطبيعي** (natural exponential function).

إنّ التمثيل البياني للاقتران الأسّي الطبيعي، له خصائص التمثيل البياني نفسها للاقتران  $f(x) = a^x$



## مثال 7: من الحياة



ذباب الفاكهة: وجد عالم بعد دراسة أجراها على تكاثر ذباب الفاكهة، أن العدد التقريبي للذباب يُمكن تمثيله بالاقتران  $Q(t) = 20e^{0.03t}$  حيث  $Q$  عدد الذباب بعد  $t$  ساعة.

أجد العدد الابتدائي للذباب الفاكهة عند بدء الدراسة.

1

$$\begin{aligned} Q(t) &= 20e^{0.03t} && \text{المعادلة الأصلية} \\ Q(0) &= 20e^{0.03(0)} && \text{بتعويض } t = 0 \\ &= 20e^0 && \text{أضرب} \\ &= 20(1) && e^0 = 1 \\ &= 20 && \text{أبسط} \end{aligned}$$

إذن: العدد الابتدائي للذباب عند بدء الدراسة 20 ذبابة.

أجد عدد ذبابات الفاكهة بعد مرور 72 ساعة من بدء الدراسة، مقرباً إجابتي إلى أقرب عدد صحيح.

2

$$\begin{aligned} Q(t) &= 20e^{0.03t} && \text{المعادلة الأصلية} \\ Q(72) &= 20e^{0.03(72)} && \text{بتعويض } t = 72 \\ &= 20e^{2.16} && \text{أضرب} \\ &\approx 173 && \text{أستعمل الآلة الحاسبة} \end{aligned}$$

إذن: عدد ذبابات الفاكهة بعد مرور 72 ساعة 173 ذبابة تقريباً.

أتحقق من فهمي

يُمثل الاقتران  $P(t) = 34.706e^{0.0097t}$  عدد سكان مدينة بالمليون نسمة، بعد  $t$  سنة منذ

المسح الإحصائي للمدينة في عام 2015

(a) أجد عدد سكان المدينة في عام 2015


(b) أجد عدد سكان المدينة في عام 2030؛ مقرباً إجابتي إلى أقرب عدد صحيح.

### معلومة

يُمكن لأنتى ذبابة الفاكهة أن تضع 100 بيضة يومياً، وتفقس هذه البيضات لتُصبح يرقات في أقل من 24 ساعة.

### أتعلم

لإيجاد القيمة  $20e^{2.16}$  باستعمال الآلة الحاسبة؛ أضغط على الأزرار:





أجد خط التقارب الأفقي لكل اقتران مما يأتي، وأمثله بيانياً وأجد مجاله ومداه:

1  $y = 4(3^x)$

2  $y = 10(4^{-x})$

3  $y = 4\left(\frac{3}{5}\right)^{x+4} + 3$

4  $y = 3\left(\frac{2}{5}\right)^{x-3} - 6$

5  $y = 3e^{x+2}$

6  $y = 8e^{-2x} - 3$




**أشجار:** يُمثّل الاقتران  $f(x) = 12(2)^{\frac{x}{5}}$  طول شجرة من التين الخائق  $y$  بالأقدام بعد  $x$  سنة.

7 أجد خط التقارب الأفقي للاقتران  $f(x)$ ، ثم أُمثله بيانياً، علماً بأن  $x = 0$  تُمثّل الوقت الحاضر.

### معلومة

ينبت التين الخائق من الأعلى نحو الأسفل؛ فالبذرة التي يتخلّص منها العصفور تستقر فوق الأشجار الاستوائية العالية، لتبدأ نموها نحو الأسفل وتصل إلى سطح الأرض وتتغلغل فيه؛ فتختنق الشجرة الحاملة لها إلى أن تقتلها تماماً وتأخذ مكانها.

8 أجد المقطع  $y$  للاقتران  $f(x)$  وأصف مدلوله.



يُبيّن التمثيل البياني العلاقة بين عدد خلايا بكتيريا والزمن بالساعات.

9 أجد عدد خلايا البكتيريا في البداية.

10 أجد النسبة المئوية للنمو في كلّ ساعة.

11 أكتب اقتران النمو الأسّي الذي يُمثّل عدد خلايا البكتيريا بعد  $h$  ساعة.


12 بعد كم ساعة يُصبح عدد خلايا البكتيريا 3 أضعاف عددها الأصلي.

يمرّ منحني الاقتران  $y = k(2^x) + c$  بالنقطتين  $(-1, 7)$ ،  $(0, 10)$ .

13 أجد قيمة كلّ من الثابتين  $k$  و  $c$ .

14 أجد قيمة  $y$  عندما  $x = 3$

يُمثّل التمثيل البياني المجاور العلاقة بين ثمن درّاجة نارية بالدينار والزمن بالسنوات.



15 أجد ثمن الدّراجة عند شرائها.

16 أجد النسبة المئوية للاضمحلال في ثمن الدّراجة.

17 أكتب اقتران الاضمحلال الأسّي الذي يُمثّل ثمن الدّراجة بعد

مرور  $(t)$  سنة.

يُقاس الضغط الجوي بوحدة تُسمّى الهيكثوباسكال ( $hPa$ )، ويكون الضغط الجوي عند سطح البحر  $1000 hPa$ ، ويتناقص بنسبة 12% لكل كيلومتر عن سطح البحر.

18 أكتبُ اقتران الاضمحلال الأسي للضغط الجوي عند ارتفاع ( $h$ ) كيلو متر.

19 أمثلُ اقتران الاضمحلال بيانيًا.



يُمثل الاقتران  $P(t) = 200e^t$  عدد أسماك السلمون في نهر  $P$  بعد  $t$  سنة.

20 أجد عدد أسماك السلمون في النهر بعد 3 سنوات.


21 أمثلُ الاقتران  $P(t)$  بيانيًا.

### معلومة

عندما تتعرض أسماك المياه المالحة للمياه العذبة يُمكن أن تنفجر خلاياها؛ بسبب عملية تعرف باسم التنظيم العضلي، أما السلمون فلديه بعض التعديلات الفسيولوجية والسلوكية المدهشة التي تسمح له بالبقاء في كلا البيئتين.

22 **طب:** حقن الطبيب مريضًا بمادّة علاجية، فإذا كان تركيز هذه المادة في جسم المريض يقلّ بنسبة 10% يوميًا؛ فأكتبُ

اقتران الاضمحلال الذي يُمثل تناقص تركيز المادة العلاجية  $M$  بعد  $t$  يوم.



### مهارات التفكير العليا

23 **اكتشف الخطأ:** تقول سميرة إنّ العلاقة بين ثمن عقار والزمن بالسنوات

الممثلة في الشكل المجاور، تُمثل اقتران نمو أسي لأنّ ثمن العقار يزداد مع الزمن. هل هي على صواب؟ أبرّر إجابتي.

24 إذا كانت  $P = e^{2x}$ ؛ فأكتبُ كلّاً من المقادير الآتية بدلالة  $P$ :

$$e^x$$

$$e^{3x}$$

$$e^{-2x}$$

$$e^{-x}$$

$$e^{2x+1}$$

$$e^{4x}$$

25 **تبرير:** متى يقطع الاقتران الأسي محور  $x$ ؟ أبرّر إجابتي بتقديم مثال داعم.

26 **تحّد:** أحدّد العلاقة بين الاقترانين  $f(x) = 4^{x-2}$  و  $g(x) = \frac{1}{16}(4^x)$ . أبرّر إجابتي.

# الدرس 2

## الاقتارات اللوغاريتمية Logarithmic Functions

تعرف خصائص الاقتار اللوغاريتمي وتمثيله بيانياً.

فكرة الدرس



الاقتار اللوغاريتمي للأساس  $b$ ، لوغاريتم، اللوغاريتم الاعتيادي، اقتار اللوغاريتم الطبيعي.

المصطلحات



يُمثل الاقتار  $B(t) = 100e^{0.693t}$  عدد خلايا البكتيريا في طبق بتري  $B$  بعد  $t$  ساعة.

مسألة اليوم



1 بعد كم ساعة يُصبح عدد خلايا البكتيريا في طبق بتري 200 خلية.


2 ما الاقتار العكسي للاقتار  $B(t)$ ؟



تعلمت سابقاً أن أي اقتار يجتاز اختبار الخط الأفقي يكون اقتار واحد لواحد، ويمكنني إيجاد اقتار عكسي له؛ لذا، فإنه يمكنني إيجاد اقتار عكسي للاقتار الأسّي الذي على الصورة  $f(x) = b^x$ .

يُسمى الاقتار العكسي للاقتار الأسّي  $f(x) = b^x$  الاقتار اللوغاريتمي للأساس  $b$  (logarithmic function with base  $b$ )، ويُرمز له بالرمز  $\log_b x$  ويُقرأ لوغاريتم  $x$  (logarithm) للأساس  $b$ .

وهذا يعني أنه إذا كان  $f(x) = b^x$  حيث  $x > 0$ ،  $b > 0$ ،  $b \neq 1$  فإن  $f^{-1}(x) = \log_b x$ ، ويُبين الشكل المجاور التمثيل البياني المجاور للاقتارين.



### العلاقة بين الصورتين الأسّية واللوغاريتمية

#### مفهوم أساسي

إذا كان  $x > 0$  و  $b > 0$ ،  $b \neq 1$  فإن:

الصورة الأسّية  $b^y = x$  الصورة اللوغاريتمية  $\log_b x = y$   
 الأس  $\uparrow$  الأس  $\uparrow$   
 الأساس  $\uparrow$  الأساس  $\uparrow$   
 إذا وفقط إذا

#### أتعلم

ألاحظ أن التمثيل البياني للاقتار  $f^{-1}(x)$  هو انعكاس للاقتار  $f(x)$  حول المستقيم  $y = x$

ويمكنني استعمال تعريف اللوغاريتمات؛ لكتابة المعادلات من الصورة اللوغاريتمية إلى الصورة الأسّية.

### مثال 1

أكتب كل معادلة لوغاريتمية مما يأتي، على الصورة الأسية:

1  $\log_2 16 = 4$

$$\log_2 16 = 4 \rightarrow 2^4 = 16$$

2  $\log_7 7 = 1$

$$\log_7 7 = 1 \rightarrow 7^1 = 7$$

3  $\log_{10} \left( \frac{1}{1000} \right) = -3$

$$\log_{10} \left( \frac{1}{1000} \right) = -3 \rightarrow (10)^{-3} = \frac{1}{1000}$$

4  $\log_5 1 = 0$

$$\log_5 1 = 0 \rightarrow 5^0 = 1$$

أتحقق من فهمي 

أكتب كل معادلة لوغاريتمية مما يأتي، على الصورة الأسية:

a)  $\log_3 9 = 2$     b)  $\log_5 5 = 1$     c)  $\log_4 \left( \frac{1}{256} \right) = -4$     d)  $\log_8 1 = 0$

ويمكنني استعمال تعريف اللوغاريتمات أيضًا؛ للتحويل من الصورة الأسية إلى الصورة اللوغاريتمية.

### مثال 2

أكتب كل معادلة أسية مما يأتي، على الصورة اللوغاريتمية:

1  $12^2 = 144$

$$12^2 = 144 \rightarrow \log_{12} 144 = 2$$

2  $36^{\frac{1}{2}} = 6$

$$36^{\frac{1}{2}} = 6 \rightarrow \log_{36} 6 = \frac{1}{2}$$

3  $(3)^{-4} = \frac{1}{81}$

$$(3)^{-4} = \frac{1}{81} \rightarrow \log_3 \left( \frac{1}{81} \right) = -4$$

4  $34^0 = 1$

$$34^0 = 1 \rightarrow \log_{34} 1 = 0$$

أتحقق من فهمي 

أكتب كل معادلة أسية مما يأتي، على الصورة اللوغاريتمية:

a)  $25^2 = 625$     b)  $81^{\frac{1}{2}} = 9$     c)  $(10)^{-4} = \frac{1}{10000}$     d)  $19^0 = 1$

### أتذكر

الصورة اللوغاريتمية  
 $\log_b x = y$  والصورة  
 الأسية  $b^y = x$  متكافئتان.

يُمكنني استنتاج - من العلاقة بين الصورتين الأسية واللوغاريتمية - أن اللوغاريتم هو أُس، وبما أنه كذلك فإنه يُمكنني إيجاد قيمة عبارات لوغاريتمية بسيطة باستعمال قوانين الأسس.

## مثال 3

أجد قيمة كلٍّ مما يأتي من دون استعمال الآلة الحاسبة:

### أتذكر

- $a^0 = 1$
- $a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$
- $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$

#### 1 $\log_2 8$

بافتراض أن العبارة  
اللوغاريتمية تساوي  $y$

$$\log_2 8 = y$$

الصيغة الأسية

$$2^y = 8$$

$$2^y = 2^3$$

$$y = 3$$

بمساواة الأسس

إذن: فإن  $\log_2 8 = 3$

#### 2 $\log_7 \sqrt{7}$

بافتراض أن العبارة  
اللوغاريتمية تساوي  $y$

$$\log_7 \sqrt{7} = y$$

الصيغة الأسية

$$7^y = \sqrt{7}$$

$$7^y = 7^{\frac{1}{2}}$$

$$y = \frac{1}{2}$$

بمساواة الأسس

إذن: فإن  $\log_7 \sqrt{7} = \frac{1}{2}$

#### 3 $\log_9 3$

بافتراض أن العبارة  
اللوغاريتمية تساوي  $y$

$$\log_9 3 = y$$

الصيغة الأسية

$$9^y = 3$$

$$(3^2)^y = 3$$

$$3^{2y} = 3^1$$

$$2y = 1$$

$$y = \frac{1}{2}$$

بمساواة الأسس

بحلّ المعادلة

إذن: فإن  $\log_9 3 = \frac{1}{2}$

#### 4 $\log_{10} 0.01$

بافتراض أن العبارة  
اللوغاريتمية تساوي  $y$

$$\log_{10} 0.01 = y$$

الصيغة الأسية

$$10^y = 0.01$$

$$10^y = \frac{1}{100}$$

$$10^y = 10^{-2}$$

$$y = -2$$

بمساواة الأسس

إذن: فإن  $\log_{10} 0.01 = -2$

### أتحقق من فهمي

أجد قيمة كلٍّ مما يأتي، من دون استعمال الآلة الحاسبة:

- a)  $\log_8 64$       b)  $\log_{11} \sqrt{11}$       c)  $\log_{25} 5$       d)  $\log_2 \frac{1}{8}$

يُمكنني استنتاج بعض الخصائص الأساسية للوغاريتمات؛ عن طريق ملاحظة الأمثلة السابقة.

## الخصائص الأساسية للوغاريتمات

### مفهوم أساسي

إذا كان  $x > 0$  و  $b > 0, b \neq 1$  فإن:

- $\log_b 1 = 0$  لأن  $b^0 = 1$
- $\log_b b = 1$  لأن  $b^1 = b$
- $\log_b b^x = x$  لأن  $b^x = b^x$
- $b^{\log_b x} = x, x > 0$  لأن  $\log_b x = \log_b x$

### أتعلم

$\log_b 0$  غير معرف؛ لأن  $b^x \neq 0$  لأي قيمة  $x$ .

### مثال 4

أجد قيمة كل مما يأتي، من دون استعمال الآلة الحاسبة:

1  $\log_3 81$

$$\begin{aligned} \log_3 81 &= \log_3 3^4 \\ &= 4 \end{aligned} \quad \begin{array}{l} 81 = 3^4 \\ \log_b b^x = x \end{array}$$

2  $\log_{23} \sqrt{23}$

$$\begin{aligned} &= \log_{23} 23^{\frac{1}{2}} \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned} \quad \begin{array}{l} \sqrt{23} = 23^{\frac{1}{2}} \\ \log_b b^x = x \end{array}$$

3  $\log_9 9$

$$\log_9 9 = 1 \quad \log_b b = 1$$

4  $6^{\log_6 11}$

$$6^{\log_6 11} = 11 \quad b^{\log_b x} = x$$

### أتحقق من فهمي

أجد قيمة كل مما يأتي، من دون استعمال الآلة الحاسبة:


a)  $\log_2 64$       b)  $\log_{19} \sqrt{19}$       c)  $\log_{18} 18$       d)  $4^{\log_4 15}$

يُسمى اللوغاريتم للأساس 10 أو  $\log_{10}$  اللوغاريتم الاعتيادي (common logarithm)

ويكتب عادة من دون أساس.

اقتران اللوغاريتم الاعتيادي  $y = \log x$  هو الاقتران العكسي للاقتران الأسّي  $y = 10^x$ ، أي إن:

$$y = \log x \quad \text{إذا وفقط إذا} \quad 10^y = x, x > 0$$



## لغة الرياضيات

يدلّ الرمز  $\ln$  على اللوغاريتم الطبيعي، حيث الحرف  $l$  من كلمة logarithmic والحرف  $n$  من كلمة natural.

أما اللوغاريتم للأساس  $e$  أو  $\log_e$  فيُسمّى اللوغاريتم الطبيعي (natural logarithmic) ويرمز له  $\ln$ .

اقتران اللوغاريتم الطبيعي  $y = \ln x$  هو الاقتران العكسي للاقتران الأسّي الطبيعي  $y = e^x$ ، أي إنّ:  $y = \ln x$  إذا وفقط إذا  $e^y = x, x > 0$



تصلح خصائص اللوغاريتمات أيضًا للوغاريتم الاعتيادي واللوغاريتم الطبيعي، ويمكن استعمالها لإيجاد قيمة كل منهما، ولكن توفر لنا الآلة الحاسبة زرًا خاصًا باللوغاريتم الاعتيادي وهو  $\log$  وزرًا خاصًا باللوغاريتم الطبيعي وهو  $\ln$  بحيث يُمكن استعمالهما لإيجاد القيمة التقريبية لكل من اللوغاريتم الاعتيادي أو اللوغاريتم الطبيعي، لأيّ عدد حقيقي موجب.

### مثال 5

أستعمل الآلة الحاسبة لإيجاد قيمة كلٍّ مما يأتي، مقربًا إجابتي إلى أقرب جزء من عشرة:

#### 1 $\log 5.3$

$$\log 5.3 = 0.7242758696$$

أستعمل الآلة الحاسبة:

$$\log 5.3 \approx 0.7$$

#### 2 $\log(8.2 \times 10^9)$

$$\log (8.2 \times 10^9) = 9.913813852$$

أستعمل الآلة الحاسبة:

$$\log(8.2 \times 10^9) \approx 9.9$$

#### 3 $\ln 80$

$$\ln 80 = 4.382026635$$

أستعمل الآلة الحاسبة:

$$\ln 80 \approx 4.4$$

## أتعلم

يتوفّر في بعض الآلات الحاسبة الزر  $\log$  الذي يُمكن عن طريقه إيجاد قيمة اللوغاريتم لأيّ أساس  $b$ ، حيث  $b > 0$

### أتحقق من فهمي

أستعمل الآلة الحاسبة لإيجاد قيمة كل مما يأتي، مقرباً إجابتي إلى أقرب جزء من عشرة:

- a)  $\log 1200$       b)  $\log(6.3 \times 10^5)$       c)  $\ln 0.00025$

يُمكنني استعمال العلاقة العكسية بين الاقتران الأسّي والاقتران اللوغارتمي؛ لتمثيل الاقتران اللوغارتمي الذي على الصورة  $y = \log_b x$

### مثال 6

أُمثّل كلاً من الاقترانات الآتية، وأحدّد مجاله ومداه ومقطعيه الإحداثيين وخطوط تقاربه، وإن كان متزايداً أم متناقصاً:

1  $f(x) = \log_2 x$

**الخطوة 1:** أنشئ جدول قيم.

بما أن المعادلة  $y = \log_2 x$  تكافئ المعادلة  $x = 2^y$ ، إذن: يُمكنني إيجاد الأزواج المرتبة اللازمة لتمثيل الاقتران  $f(x)$  باختيار قيم للمتغير  $y$  أولاً، ثم إيجاد قيم  $x$  المرتبطة بها عن طريق التعويض في المعادلة  $x = 2^y$ .

|           |                     |                     |        |        |        |
|-----------|---------------------|---------------------|--------|--------|--------|
| $x = 2^y$ | $\frac{1}{4}$       | $\frac{1}{2}$       | 1      | 2      | 4      |
| $y$       | -2                  | -1                  | 0      | 1      | 2      |
| $(x, y)$  | $(\frac{1}{4}, -2)$ | $(\frac{1}{2}, -1)$ | (1, 0) | (2, 1) | (4, 2) |

1

أختار قيماً لـ  $y$

2


أجد قيم  $x$

### أتعلم

يُمكن أيضاً إنشاء جدول القيم باختيار قيم للمتغير  $x$  تناسب مع الأساس  $b$  في الاقتران اللوغارتمي على الصورة  $f(x) = \log_2 x$ ، ويسهل عن طريقها استعمال الخصائص الأساسية للوغاريتمات.

**الخطوة 2:** أُمثّل الاقتران في المستوى الإحداثي.

أعيّن النقاط التي تُمثّل الأزواج  $(x, y)$  في المستوى الإحداثي، وأصل بينها بخط منحنٍ متصل، كما في الشكل المجاور.



ألاحظ من التمثيل البياني للاقتران  $f(x)$  أن:

- مجال الاقتران هو الفترة  $(0, \infty)$ .
- مدى الاقتران هو مجموعة الأعداد الحقيقية.
- المقطع  $x$  هو 1، ولا يوجد للاقتران مقطع مع المحور  $y$  لأن  $x > 0$  دائماً.
- يوجد للاقتران خط تقارب رأسي وهو المحور  $y$ .
- الاقتران متزايد.

2  $f(x) = \log_{\frac{1}{2}} x$

**الخطوة 1:** أنشئ جدول قيم.

بما أن المعادلة  $y = \log_{\frac{1}{2}} x$  تكافئ المعادلة  $x = (\frac{1}{2})^y$ ، إذن: يُمكنني إيجاد الأزواج المرتبة اللازمة لتمثيل الاقتران  $f(x)$  باختيار قيم للمتغير  $y$  أولاً، ثم إيجاد قيم  $x$  المرتبطة بها عن طريق التعويض في المعادلة  $x = (\frac{1}{2})^y$ .


|                       |         |         |        |                      |                      |
|-----------------------|---------|---------|--------|----------------------|----------------------|
| $x = (\frac{1}{2})^y$ | 4       | 2       | 1      | $\frac{1}{2}$        | $\frac{1}{4}$        |
| $y$                   | -2      | -1      | 0      | 1                    | 2                    |
| $(x, y)$              | (4, -2) | (2, -1) | (1, 0) | ( $\frac{1}{2}$ , 1) | ( $\frac{1}{4}$ , 2) |

1

أختار قيمة لـ  $y$

2

أجد قيم  $x$



**الخطوة 2:** أمثل الاقتران في المستوى الإحداثي.

أعین النقاط التي تُمثل الأزواج  $(y, x)$  في المستوى الإحداثي، وأصل بينها بخط منحنٍ متصل، كما في الشكل المجاور.

ألاحظ من التمثيل البياني للاقتران  $f(x)$  أن:

- مجال الاقتران هو الفترة  $(0, \infty)$ .
- مدى الاقتران هو مجموعة الأعداد الحقيقية.
- المقطع  $x$  هو 1، ولا يوجد للاقتران مقطع مع المحور  $y$  لأن  $x > 0$  دائماً.
- يوجد للاقتران خط تقارب رأسي وهو المحور  $y$ .
- الاقتران متناقص.

### أتحقق من فهمي

أمثل كلاً من الاقترانات الآتية، وأحدد مجاله ومداه ومقطعيه الإحداثيين وخطوط تقاربه، وإن كان متزايداً أم متناقصاً.

a)  $f(x) = \log_3 x$



b)  $f(x) = \log_{\frac{1}{2}} x$

ألاحظ من المثال 6 أن الاقتران اللوغاريتمي على الصورة  $f(x) = \log_b x$  له مجموعة من الخصائص يمكن تلخيصها كالآتي:

### خصائص الاقتران اللوغاريتمي

### ملخص المفهوم

التمثيل البياني للاقتران اللوغاريتمي على الصورة  $f(x) = \log_b x$  حيث  $b$  عدد حقيقي و  $b > 0, b \neq 1$  له الخصائص الآتية:



- مجال الاقتران هو الأعداد الحقيقية الموجبة  $R^+$  أي الفترة  $(0, \infty)$ .
- مدى الاقتران هو مجموعة الأعداد الحقيقية  $R$ .
- يكون الاقتران متزايداً إذا كانت  $b > 1$ .
- يكون الاقتران متناقصاً إذا كانت  $0 < b < 1$ .
- للاقتران خط تقارب رأسي هو المحور  $y$ .
- يقطع الاقتران المحور  $x$  في نقطة واحدة هي  $(1, 0)$ ، ولا يقطع المحور  $y$ .

لاقترانات اللوغاريتمية صور مختلفة، ويمكن تمثيلها بيانياً بإيجاد المجال وخط التقارب الرأسي أولاً، ثم إنشاء جدول قيم.

### مثال 7 أمثل كلاً من الاقترانات الآتية بيانياً:

1  $f(x) = \log_4 (x + 3)$

**الخطوة 1:** أجد مجال الاقتران وخط التقارب الرأسي له.

مجال الاقتران  $f(x)$  هي قيم  $x$  جميعها التي تجعل المقدار  $x + 3 > 0$ ، وبحل المتباينة ينتج أن  $x > -3$

إذن: مجال الاقتران  $(-3, \infty)$

أما خط التقارب الرأسي فهو  $x = -3$

**الخطوة 2:** أنشئ جدول قيم.

أختار قيمًا للمتغير  $x$ ، وأستعمل الخصائص الأساسية للوغاريتمات لإيجاد قيم  $y$ .

|                   |           |             |          |            |
|-------------------|-----------|-------------|----------|------------|
| $x$               | -2        | -1          | 1        | 5          |
| $y = \log_4(x+3)$ | 0         | 0.5         | 1        | 1.5        |
| $(x, y)$          | $(-2, 0)$ | $(-1, 0.5)$ | $(1, 1)$ | $(5, 1.5)$ |

## أتذكر

أختار قيمًا للمتغير  $x$   
تناسب مع الأساس  $b$   
في الاقتران اللوغاريتمي،  
ويسهل عن طريقها  
استعمال الخصائص  
الأساسية للوغاريتمات.

## أفكر


كيف أجد نقطة تقاطع  
الاقتران

$$f(x) = \log_4(x+3)$$

مع المحور  $x$ ؟

**الخطوة 3:** أمثل الاقتران في المستوى الإحداثي.

أعيّن النقاط التي تمثل الأزواج  $(x, y)$  في المستوى  
الإحداثي، وأصل بينها بخط منحن متصل، كما في  
الشكل المجاور.



## 2 $f(x) = \ln x - 1$

**الخطوة 1:** أجد مجال الاقتران وخط التقارب الرأسي له.

مجال الاقتران  $f(x)$  هي قيم  $x$  جميعها، التي تجعل المقدار  $x > 0$


إذن: مجال الاقتران  $(0, \infty)$ .

أما خط التقارب الرأسي فهو  $x = 0$  أي المحور  $y$ .

**الخطوة 2:** أنشئ جدول قيم.

أختار قيمًا للمتغير  $x$  وأستعمل الآلة الحاسبة لإيجاد قيم  $y$ ، وأختار منزلة لتقريب الأعداد  
النتيجة (مثلاً إلى أقرب جزء من عشرة).

|                 |           |             |            |            |
|-----------------|-----------|-------------|------------|------------|
| $x$             | 1         | 2           | 3          | 4          |
| $y = \ln x - 1$ | -1        | -0.3        | 0.1        | 0.4        |
| $(x, y)$        | $(1, -1)$ | $(2, -0.3)$ | $(3, 0.1)$ | $(4, 0.4)$ |



**الخطوة 3:** أمثل الاقتران في المستوى الإحداثي.

أعيّن النقاط التي تُمثّل الأزواج  $(x, y)$  في المستوى الإحداثي، وأصل بينها بخط منحنٍ متصل، كما في الشكل المجاور.

**3**  $f(x) = 3 \log(x-1)$

**الخطوة 1:** أجد مجال الاقتران وخط التقارب الرأسي له.

مجال الاقتران  $f(x)$  هي قيم  $x$  جميعها، التي تجعل المقدار  $x-1 > 0$ ، وبحلّ المتباينة ينتج أن  $x > 1$


إذن: مجال الاقتران  $(1, \infty)$ .

أمّا خط التقارب الرأسي فهو  $x = 1$

**الخطوة 2:** أنشئ جدول قيم.

أختار قيمًا للمتغير  $x$  وأستعمل الآلة الحاسبة لإيجاد قيم  $y$ ، وأختار منزلة لتقريب الأعداد الناتجة (مثلاً إلى أقرب جزء من عشرة).

|                   |        |          |          |         |
|-------------------|--------|----------|----------|---------|
| $x$               | 2      | 3        | 4        | 11      |
| $y = 3 \log(x-1)$ | 0      | 0.9      | 1.4      | 3       |
| $(x, y)$          | (2, 0) | (3, 0.9) | (4, 1.4) | (11, 3) |



**الخطوة 3:** أمثل الاقتران في المستوى الإحداثي.

أعيّن النقاط التي تُمثّل الأزواج  $(x, y)$  في المستوى الإحداثي، وأصل بينها بخط منحنٍ متصل، كما في الشكل المجاور.


**أتحقق من فهمي** أمثل كلّ من الاقترانات الآتية بيانيًا:

a)  $f(x) = \log_5(x-2)$

b)  $f(x) = \ln(x+3)$

c)  $f(x) = \log x + 4$

مثال 8: من الحياة



**علوم:** يُعرف الرمز pH باسم الرقم الهيدروجيني، وهو القياس الذي يُحدّد إذا كان السائل قاعدياً أم حمضياً أم متعادلاً، ويُمكن إيجاد الرقم الهيدروجيني (pH) للسوائل عن طريق المعادلة  $\text{pH} = -\log [\text{H}^+]$  حيث تُمثّل  $[\text{H}^+]$  تركيز أيونات الهيدروجين في المول لكل لتر (mol/L).

معلومة

للأمطار الحمضية تأثيرات مدمّرة على النباتات والحيوانات المائية، ومعظمها تتكوّن بسبب مركّبات النيتروجين والكبريت الناتجة عن الأنشطة البشرية، والتي تتفاعل في الجو لتكوّن الأحماض.

1

أجد الرقم الهيدروجيني (pH) لعينة مطر تركيز أيونات الهيدروجين فيها  $0.0002 \text{ mol/L}$ ، ثم أحدّد إذا كانت مياه الأمطار التي أخذت منها العينة حمضية أم لا، علماً بأنّ الرقم الهيدروجيني للأمطار الطبيعية 5.6 أو أكثر (أقرب إجابتي إلى الأقرب جزء من عشرة).

$$\text{pH} = -\log [\text{H}^+]$$

$$= -\log (0.0002)$$

$$\approx 3.7$$

المعادلة الأصلية

بتعويض  $[\text{H}^+] = 0.0002$

أستعمل الآلة الحاسبة

إذن: الرقم الهيدروجيني (pH) لعينة المطر 3.7 تقريباً، وبمقارنة الرقم الهيدروجيني لعينة المطر بالرقم الهيدروجيني للمياه الطبيعية، أجد أنّ مياه الأمطار التي أخذت منها العينة حمضية.

2

أجد الرقم الهيدروجيني (pH) لسائل تنظيف منزلي تركيز أيونات الهيدروجين فيه  $1.0 \times 10^{-11} \text{ mol/L}$ ، ثم أحدّد إذا كان السائل حمضياً أم قاعدياً.

$$\text{pH} = -\log [\text{H}^+]$$

$$= -\log (1.0 \times 10^{-11})$$

$$= -\log (10^{-11})$$

$$= -(-11)$$

$$= 11$$

المعادلة الأصلية

بتعويض  $[\text{H}^+] = 1.0 \times 10^{-11}$

بالتبسيط

$$\log_b b^x = x$$

بالضرب

إذن: الرقم الهيدروجيني (pH) لسائل التنظيف 11، ما يعني أنّه قاعدي.

أتحقق من فهمي



أجد الرقم الهيدروجيني (pH) لشامبو طبيعي تركيز أيونات الهيدروجين فيه  $5.88 \times 10^{-7} \text{ mol/L}$ ، ثم أحدّد إذا كان الشامبو حمضياً أم قاعدياً. (أقرب إجابتي إلى أقرب جزء من مئة).

أفكر

تُظهر الأبحاث أنّ مستويات الرقم الهيدروجيني القاعدية للشامبو تُطلق شحنات كهربائية سالبة، ما يؤدّي إلى تلف البشرة وتكسر ألياف الشعر. فهل الشامبو في سؤال أتحقّق من فهمي مناسب للشعر أم لا؟ أبرّر إجابتي.



أكتبُ كلَّ معادلة لوغاريتمية ممَّا يأتي، على الصورة الأسية:

1  $\log_4 1024 = 5$     2  $\log_3 729 = 6$     3  $\log_8 2 = \frac{1}{3}$     4  $\log_{25} 5 = 0.5$

أكتبُ كلَّ معادلة أُسية ممَّا يأتي، على الصورة اللوغاريتمية:

5  $6^3 = 216$     6  $3^{-2} = \frac{1}{9}$     7  $5^4 = 625$     8  $2^{-3} = 0.125$

أجد قيمة كلِّ ممَّا يأتي، من دون استعمال الآلة الحاسبة:

9  $\log_2 256$     10  $\log_9 27$     11  $\log 0.1$     12  $\log \frac{7}{2} 1$   
13  $e^{\ln \frac{1}{2}}$     14  $\log_y \sqrt[3]{y}$     15  $\log(1.0 \times 10^{-6})$     16  $6^{\log_6 2.8}$

أستعمل الآلة الحاسبة لإيجاد قيمة كلِّ ممَّا يأتي، مقربًا إجابتي إلى أقرب جزء من عشرة:

17  $\log \frac{1}{32}$     18  $\log(2.77 \times 10^{-4})$     19  $\ln 0.000062$     20  $\ln \pi$

أمثلُ كلًّا من الاقتارات الآتية، وأحدّد مجاله ومداه ومقطعيه الإحداثيين وخطوط تقاربه، وإن كان متزايدًا أم متناقصًا:

21  $f(x) = \log_5 x$     22  $h(x) = \log_8 x$     23  $g(x) = \log \frac{1}{4} x$     24  $r(x) = \log \frac{1}{6} x$   
25  $g(x) = \ln(x-1)$     26  $h(x) = 8 + 5 \ln(2x+3)$   
27  $f(x) = 3 - \log_4 \left( \frac{x}{2} - 5 \right)$     28  $w(x) = |\ln x|$



### معلومة

إنَّ فهم المعلومات أولاً وتنظيمها؛ يُسهِّل تذكرها واستعادتها، ويُساعد أيضًا تدوين المعلومات عدَّة مرَّات على تغذية الدماغ وتدريبه على تذكر المعلومات في ما بعد.

**النسيان:** في تجربة لتحديد مدى تأثير المدة الزمنية في مدى تذكُّر الطلبة للمعلومات، عُرِّضت مجموعة من الطلبة لاختبار في مادَّة معيَّنة، وأُعِيد تعريضهم لاختبارات مكافئة لذلك الاختبار على فترات شهرية بعد ذلك. فوجد أنَّ النسبة المئوية لمتوسَّط علامات


الطلبة  $S(t)$ ، بعد  $t$  شهرًا تُعطى بالاقتاران  $S(t) = 78 - 15 \log(t+1)$ ،  $t \geq 0$ .

29 أجد النسبة المئوية لمتوسَّط علامات الطلبة في بداية الدراسة.

30 أجد النسبة المئوية لعلامات الطلبة بعد 4 أشهر من بدء الدراسة؟

31 أجد قيمة  $a$  التي تجعل منحنى الاقتاران  $f(x) = \log_a x$  يمرُّ بالنقطة  $(2, 2)$

32 أجد قيمة  $c$  التي تجعل منحنى الاقتاران  $f(x) = \log_c x$  يمرُّ بالنقطة  $(\frac{1}{2}, -4)$



**ضوء:** تُمثّل المعادلة  $A = 2 - \log 100T$  كمية الضوء التي تمتصّها عيّنة من محلول  $A$  حيث  $T$  نسبة الضوء الذي ينتقل خلال المحلول ( $T$  نسبة شدة الضوء قبل اختراق المحلول  $I_0$  إلى شدّته بعد اختراق المحلول  $I$ ).


33 إذا كانت نسبة الضوء التي انتقلت خلال محلول 72%؛ فأجد مقدار الضوء الذي امتصه المحلول.

34 إذا كانت كمية الضوء التي امتصّها محلول 0.174؛ فأجد نسبة الضوء التي انتقلت خلاله.


### مهارات التفكير العليا

**تبرير:** أحدّد التمثيل البياني المناسب لكل اقتران ممّا يأتي، وأبرّر إجابتي:


35  $f(x) = \log_3(x-1)$



36  $g(x) = \log_3(x) - 1$



37  $h(x) = 1 - \log_3(x)$



38 **تحذّر:** أجد المقطع  $x$  للاقتران  $f(x) = \log(x-k)$ ، حيث  $k$  ثابت.

أحدّد إذا كانت الجمل الآتية صحيحة أم خطأ، وأبرّر إجابتي بمثال:

39 يوجد قيود على مجال الاقترانات اللوغاريتمية دائماً.

40 لا يوجد قيود على مدى الاقترانات اللوغاريتمية.

41 يوجد خط تقارب للتمثيل البياني للاقترانات اللوغاريتمية دائماً.


42 **تبرير:** من دون استعمال الآلة الحاسبة، أبين أيّ القيم الآتية أكبر. أبرّر إجابتي:

$\log_5 28$  ,  $\log_6 32$  ,  $\log_7 40$

## قوانين اللوغاريتمات Laws of logarithmes

- تعرّف قوانين اللوغاريتمات.
- حلّ معادلات أسية ولوغاريتمية باستعمال قوانين اللوغاريتمات.

خاصية المساواة اللوغاريتمية، معادلة لوغاريتمية



تمثّل المعادلة  $T = 2L^n$  الزمن  $T$  بالثواني اللازم لتأرجح البندول 10 مرّات، حيث  $L$  طول البندول بالأمتار و  $n$  عدد ثابت. إذا علمت أنّ بندولاً طوله 0.25 m تلزمه 12 ثانية ليتأرجح 10 مرّات. فما قيمة الثابت  $n$ ؟

فكرة الدرس



المصطلحات



مسألة اليوم



تعلمت سابقاً قوانين الأسس، ووظفتها في تبسيط مقادير أسية، وإيجاد قيمة مقادير عددية ومنها قوانين الضرب والقسمة وقوة القوة.

قانون ضرب القوى

$$(b^x)^y = b^{xy}$$

قانون قسمة القوى

$$\frac{b^x}{b^y} = b^{x-y}, b \neq 0$$

قانون ضرب القوى

$$b^x \times b^y = b^{x+y}$$

وبما أنّه توجد علاقة عكسية بين اللوغاريتمات والأسس، فيمكن اشتقاق قوانين لوغاريتمات مقابلة لهذه القوانين.

### قوانين اللوغاريتمات

#### مفهوم أساسي

إذا كانت  $b, x, y$  أعداداً حقيقية موجبة، وكان  $p$  عدداً حقيقياً، حيث  $b \neq 1$  فإن:

$$\log_b xy = \log_b x + \log_b y \quad \bullet \text{ قانون الضرب:}$$

$$\log_b \frac{x}{y} = \log_b x - \log_b y \quad \bullet \text{ قانون القسمة:}$$

$$\log_b x^p = p \log_b x \quad \bullet \text{ قانون القوة:}$$

ويمكنني إثبات صحّة قانون الضرب؛ باستعمال قوانين الأسس كالآتي:

$$\text{أفرض أن } m = \log_b x \text{ ومنه } b^m = x$$

$$\text{أفرض أن } n = \log_b y \text{ ومنه } b^n = y$$

$$\text{ومنّه فإن } xy = b^m b^n = b^{m+n}$$

وعند كتابة التعبير  $xy = b^{m+n}$  بالصورة اللوغاريتمية؛ فإن الناتج:

$$\log_b xy = m + n$$

$$\log_b xy = \log_b x + \log_b y \quad \checkmark$$

ويمكنني أيضًا إثبات صحّة قانوني القسمة والقوة؛ باستعمال قوانين الأسس.

يمكنني استعمال قوانين اللوغاريتمات في إيجاد قيم مقادير لوغاريتمية.

## مثال 1

إذا كان  $\log_a 2 \approx 0.301$  و  $\log_a 3 \approx 0.477$ ، فأجد كلاً ممّا يأتي:

### 1 $\log_a 6$

$$\begin{aligned} \log_a 6 &= \log_a (2 \times 3) \\ &= \log_a 2 + \log_a 3 \\ &\approx 0.301 + 0.477 \\ &\approx 0.778 \end{aligned}$$

$$6 = 2 \times 3$$

قانون الضرب في اللوغاريتمات

$$\log_a 2 \approx 0.301, \log_a 3 \approx 0.477$$

بالتعويض بالجمع

### 2 $\log_a \frac{2}{3}$

$$\begin{aligned} \log_a \frac{2}{3} &= \log_a 2 - \log_a 3 \\ &\approx 0.301 - 0.477 \\ &\approx -0.176 \end{aligned}$$

قانون القسمة في اللوغاريتمات

$$\log_a 2 \approx 0.301, \log_a 3 \approx 0.477$$

بالتعويض بالطرح

### 3 $\log_a 81$

$$\begin{aligned} \log_a 81 &= \log_a (3^4) \\ &= 4 \log_a 3 \\ &\approx 4 (0.477) \\ &\approx 1.908 \end{aligned}$$

$$81 = 3^4$$

قانون القوة في اللوغاريتمات

$$\log_a 3 \approx 0.477$$

بالتعويض بالضرب

### 4 $\log_a \frac{1}{4}$

$$\begin{aligned} \log_a \frac{1}{4} &= \log_a 1 - \log_a 4 \\ &= 0 - \log_a 2^2 \\ &= -2 \log_a 2 \\ &\approx -2(0.301) \\ &\approx -0.602 \end{aligned}$$

قانون القسمة في اللوغاريتمات

$$\log_a 1 = 0, 4 = 2^2$$

بالطرح، وقانون القوة في اللوغاريتمات

$$\log_a 2 \approx 0.301$$

## أتذكر

الصورة اللوغاريتمية  
 $\log_b x = y$  والصورة  
الأسية  $b^y = x$  متكافئتان.

## أفكر

هل يمكن إيجاد  $\log_a 5$   
عن طريق معطيات  
المثال 1 باستعمال قوانين  
اللوغاريتمات؟ أبرّر  
إجابتي.

## أفكر

هل يمكن استعمال قانون  
القسمة لإيجاد ناتج  
 $\frac{\log_a 3}{\log_a 2}$

### أتحقق من فهمي

إذا كان  $\log_b 4 \approx 0.86$  و  $\log_b 3 \approx 0.68$ ، فأجد كلاً مما يأتي:

- a)  $\log_b 12$       b)  $\log_b 9$       c)  $\log_b 0.75$       d)  $\log_b \frac{1}{3}$

أحتاج في بعض الأحيان إلى إعادة كتابة عبارات لوغاريتمية بصورة مطوّلة، ويمكنني ذلك باستعمال قوانين اللوغاريتمات.

### مثال 2

أكتب كل عبارة لوغاريتمية مما يأتي بالصورة المطوّلة؛ علماً بأن المتغيرات جميعها تُمثل أعداداً حقيقية موجبة:

1  $\log_4 5x^3 y$

$$\begin{aligned}\log_4 5x^3 y &= \log_4 5 + \log_4 x^3 + \log_4 y \\ &= \log_4 5 + 3 \log_4 x + \log_4 y\end{aligned}$$

قانون الضرب في اللوغاريتمات

قانون القوة في اللوغاريتمات

2  $\ln \frac{\sqrt{3x-5}}{7}$

$$\ln \frac{\sqrt{3x-5}}{7} = \ln \frac{(3x-5)^{\frac{1}{2}}}{7}$$

صورة الأس النسبي

$$= \ln (3x-5)^{\frac{1}{2}} - \ln 7$$

قانون القسمة في اللوغاريتمات

$$= \frac{1}{2} \ln (3x-5) - \ln 7$$

قانون القوة في اللوغاريتمات

3  $\log_a \frac{x^2 y^5}{z^4}$

$$\log_a \frac{x^2 y^5}{z^4} = \log_a x^2 y^5 - \log_a z^4$$

قانون القسمة في اللوغاريتمات

$$= \log_a x^2 + \log_a y^5 - \log_a z^4$$

قانون الضرب في اللوغاريتمات

$$= 2 \log_a x + 5 \log_a y - 4 \log_a z$$

قانون القوة في اللوغاريتمات

4  $\log_a \sqrt[3]{\frac{a^2 b}{c^5}}$

$$\log_a \sqrt[3]{\frac{a^2 b}{c^5}} = \log_a \left( \frac{a^2 b}{c^5} \right)^{\frac{1}{3}}$$

صورة الأس النسبي

$$= \frac{1}{3} \log_a \left( \frac{a^2 b}{c^5} \right)$$

قانون القوة في اللوغاريتمات

$$= \frac{1}{3} (\log_a a^2 b - \log_a c^5)$$

قانون القسمة في اللوغاريتمات

$$= \frac{1}{3} (\log_a a^2 + \log_a b - \log_a c^5)$$

قانون الضرب في اللوغاريتمات

$$= \frac{1}{3} (2 \log_a a + \log_a b - 5 \log_a c)$$

قانون القوة في اللوغاريتمات

$$= \frac{1}{3} (2 + \log_a b - 5 \log_a c)$$

$\log_b b = 1$

$$= \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \log_a b - \frac{5}{3} \log_a c$$

خاصية التوزيع

أتحقق من فهمي 

اكتب كل عبارة لوغاريتمية مما يأتي بالصورة المطوّلة؛ علمًا بأن المتغيرات جميعها تُمثل أعدادًا حقيقية موجبة:

a)  $\log_3 a^2 bc^3$

b)  $\ln(a^2 \sqrt{a-1})$

c)  $\log \left( \frac{x^2 - 1}{x^3} \right)$

d)  $\log_b \frac{x^2 y}{b^3}$

## توسّع

أستعمل برمجة جيو جيرا لتمثيل الاقترانين  $f(x) = \ln x - \ln(x-3)$  و  $g(x) = \ln \frac{x}{x-3}$  في المستوى الإحداثي نفسه. هل أظهرت البرمجة المجال نفسه للاقترانين؟ أبرر إجابتي.

تعلمت في المثال السابق كتابة العبارات اللوغاريتمية بالصورة المطوّلة، ولكن أحتاج أحيانًا إلى كتابة العبارات اللوغاريتمية من الصورة المطوّلة إلى الصورة المختصرة، وهذا يعني كتابة العبارة اللوغاريتمية على شكل لوغاريتم واحد.

### مثال 3

أكتب كل عبارة لوغاريتمية مما يأتي بالصورة المختصرة؛ علمًا بأن المتغيرات جميعها تمثل أعدادًا حقيقية موجبة:

1  $\frac{2}{3} \ln 8 - \ln (5^2 - 1)$

$$\frac{2}{3} \ln 8 - \ln (5^2 - 1) = \ln 8^{\frac{2}{3}} - \ln (25 - 1)$$

$$= \ln 4 - \ln 24$$

$$= \ln \frac{4}{24}$$

$$= \ln \frac{1}{6}$$

$$= \ln 1 - \ln 6$$

$$= -\ln 6$$

قانون القوة في اللوغاريتمات

$$8^{\frac{2}{3}} = (\sqrt[3]{8})^2 = 2^2 = 4$$

قانون القسمة في اللوغاريتمات

بالتبسيط

قانون القسمة في اللوغاريتمات

$$\ln 1 = 0$$

2  $\ln x^5 - 2 \ln (xy)$

$$\ln x^5 - 2 \ln (xy) = \ln x^5 - \ln (xy)^2$$

$$= \ln x^5 - \ln x^2 y^2$$

$$= \ln \frac{x^5}{x^2 y^2}$$

$$= \ln \frac{x^3}{y^2}$$

قانون القوة في اللوغاريتمات

قوة حاصل الضرب

قانون القسمة في اللوغاريتمات

بالتبسيط

3  $2 \log x - \frac{1}{2} \log y + 3 \log z$

$$2 \log x - \frac{1}{2} \log y + 3 \log z = \log x^2 - \log y^{\frac{1}{2}} + \log z^3$$

$$= \log x^2 + \log z^3 - \log y^{\frac{1}{2}}$$

$$= \log x^2 z^3 - \log y^{\frac{1}{2}}$$

$$= \log \left( \frac{x^2 z^3}{y^{\frac{1}{2}}} \right)$$

$$= \log \left( \frac{x^2 z^3}{\sqrt{y}} \right)$$

قانون القوة في

اللوغاريتمات

بإعادة تجميع الحدود  
ذات المعاملات الموجبة

قانون الضرب في

اللوغاريتمات

قانون القسمة في

اللوغاريتمات

الصورة الجذرية

### أتعلم

أتجنب هذه الأخطاء  
عند كتابة العبارات  
اللوغاريتمية بالصورة  
المطوّلة أو الصورة  
المختصرة:

$$\begin{aligned} \log_a \left( \frac{M}{N} \right) &= \log_a M - \log_a N \\ \log_a (M \cdot N) &= \log_a M + \log_a N \\ \log_a \left( \frac{M}{N} \right) &= \frac{\log_a M}{\log_a N} \\ \log_a \left( \frac{M}{N} \right) &= \log_a M - \log_a N \\ \log_a (M \cdot N^p) &= p \log_a (M \cdot N) \end{aligned}$$

4  $\frac{1}{2} (\log_5 (x^2 - y^2) - \log_5 (x + y))$

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} (\log_5 (x^2 - y^2) - \log_5 (x + y)) &= \frac{1}{2} \log_5 \left( \frac{x^2 - y^2}{x + y} \right) && \text{قانون القسمة في اللوغاريتمات} \\ &= \frac{1}{2} \log_5 \left( \frac{(x + y)(x - y)}{x + y} \right) && \text{بتحليل الفرق بين مربعين} \\ &= \frac{1}{2} \log_5 (x - y) && \text{بالاختصار} \\ &= \log_5 (x - y)^{\frac{1}{2}} && \text{قانون القوة في اللوغاريتمات} \\ &= \log_5 \sqrt{x - y} && \text{الصورة الجذرية} \end{aligned}$$

 **أتحقق من فهمي**

اكتب كل عبارة لوغاريتمية مما يأتي بالصورة المختصرة؛ علماً بأن المتغيرات جميعها تمثل أعداداً حقيقية موجبة:

- a)  $\ln 25 + \ln 4$       b)  $\ln (3x + 1) - \ln (3x^2 - 5x - 2)$   
c)  $\frac{1}{2} (\log_2 (a^2 + ab) - \log_2 a)$

تعلمت سابقاً أن معظم الآلات الحاسبة توفر زرّين للوغاريتمات هما **ln** و **log**. ولكن، كيف يُمكنني إيجاد  $\log_4 7$  باستعمال هذا النوع من الآلات؟

يُمكنني حلّ هذه المشكلة بتغيير الأساس غير المرغوب به (وهو في هذه الحالة الأساس 4) إلى حاصل قسمة لوغاريتمين للأساس نفسه، ويُمكنني التحقق من إمكانية ذلك جبرياً كما يأتي:

$$\begin{aligned} \log_4 7 &= y && \text{بافتراض أنّ العبارة اللوغاريتمية تساوي } y \\ 4^y &= 7 && \text{الصيغة الأسية} \\ \ln 4^y &= \ln 7 && \text{بأخذ } \ln \text{ للطرفين} \\ y \ln 4 &= \ln 7 && \text{قانون القوة في اللوغاريتمات} \\ y &= \frac{\ln 7}{\ln 4} && \text{قانون القسمة في اللوغاريتمات} \\ \log_4 7 &= \frac{\ln 7}{\ln 4} && y = \log_4 7 \end{aligned}$$

ألاحظ من الخطوات أعلاه أنه أمكن كتابة  $\log_4 7$  على صورة حاصل قسمة لوغاريتمين طبيعيين، ومنه أصبح بالإمكان استعمال الآلة الحاسبة لإيجاد قيمته.

$$\log_4 7 = \frac{\ln 7}{\ln 4} = 1.4036 \dots$$

ويمكن تعميم صيغة تغيير الأساس كما يأتي:

### صيغة تغيير الأساس

### مفهوم أساسي

إذا كانت  $a, b, x$  أعدادًا حقيقية موجبة، حيث  $a \neq 1, b \neq 1$  فإن:

$$\log_b x = \frac{\log_a x}{\log_a b}$$

### مثال 4

أجد قيمة كل مما يأتي، مقربًا إجابتي إلى أقرب جزء من مئة إن لزم الأمر:

1  $\log_3 16$

$$\log_3 16 = \frac{\ln 16}{\ln 3} \approx 2.52$$

صيغة تغيير الأساس  
أستعمل الآلة  
الحاسبة

2  $\log_4 25$

$$\log_4 25 = \frac{\log 25}{\log 4} \approx 2.32$$

صيغة تغيير الأساس  
أستعمل الآلة  
الحاسبة

3  $\log_{\frac{1}{2}} 2$

$$\begin{aligned} \log_{\frac{1}{2}} 2 &= \frac{\ln 2}{\ln \frac{1}{2}} \\ &= \frac{\ln 2}{\ln 1 - \ln 2} \\ &= \frac{\ln 2}{-\ln 2} \\ &= -1 \end{aligned}$$

صيغة تغيير الأساس  
قانون القسمة في  
اللوغاريتمات  
 $\ln 1 = 0$   
بالتبسيط

4  $\log_6 10$

$$\begin{aligned} \log_6 10 &= \frac{\log 10}{\log 6} \\ &= \frac{1}{\log 6} \\ &\approx 1.29 \end{aligned}$$

صيغة تغيير  
الأساس  
 $\log 10 = 1$   
أستعمل الآلة  
الحاسبة

### أفكر

هل سأحصل على النتيجة نفسها لو استعملت اللوغاريتم الاعتيادي بدلًا من استعمال اللوغاريتم الطبيعي في الفرع 1 من المثال؟ أبرر إجابتي.

### أفكر

هل يمكنني حلّ الفرع 3 من المثال بطريقة أخرى؟ أبرر إجابتي.

### أتحقق من فهمي

أجد قيمة كل مما يأتي، مقربًا إجابتي إلى أقرب جزء من مئة إن لزم الأمر:

a)  $\log_2 89$

b)  $\log_5 19$

c)  $\log_{\frac{1}{2}} 12$

d)  $\log_8 e^2$

## الوحدة 2

تعلمت سابقاً مفهوم المعادلة الأسية وهي معادلة تتضمن قوى أسسها متغيرات، ويتطلب حلها كتابة طرفي المعادلة بصورة قوة للأساس نفسه، ثم المقارنة بين أسّي الطرفين وفق القاعدة الآتية:

$$\text{إذا كان } a^x = a^y \text{ فإن } x = y \text{ حيث } a > 0, a \neq 1$$

فمثلاً، لحل المعادلة  $2^{3x} = 64$  اتبع الخطوات الآتية:

$$2^{3x} = 64$$

المعادلة الأصلية

$$2^{3x} = 2^6$$

الأساسان متساويان

$$3x = 6$$

بمساواة الأسس

$$x = 2$$

بحل المعادلة

ولكن، في بعض المعادلات الأسية لا يمكن كتابة طرفي المعادلة بصورة قوة للأساس نفسه، مثل المعادلة:  $4^x = 10$ ، وفي هذه الحالة يمكن استعمال **خاصية المساواة اللوغاريتمية** (property of logarithmic equality)

### خاصية المساواة اللوغاريتمية

#### مفهوم أساسي

إذا كان  $b > 1$  حيث  $b \neq 1$  فإن:

$$\log_b x = \log_b y \quad \text{إذا وفقط إذا} \quad x = y$$

#### أتعلم

نتجت خاصية المساواة اللوغاريتمية من أن الاقتران اللوغاريتمي اقتران واحد لواحد؛ إذ يرتبط كل عنصر في مداه بعنصر واحد فقط في مجاله.


ونتيجةً للخاصية أعلاه؛ يمكن حل المعادلات الأسية التي لا يمكن كتابتها بصورة قوة للأساس نفسه؛ بأخذ اللوغاريتم نفسه لطرفي المعادلة، ثم استعمال قانون القوة في اللوغاريتمات.

#### مثال 5

أحل المعادلات الأسية الآتية، مقرباً إجابتي إلى أقرب 4 منازل عشرية:

$$1 \quad 3^x = 20$$

يمكنني استعمال برمجية جيوجبرا (GeoGebra)، لتمثيل المعادلتين  $y = 20$ ،  $y = 3^x$  في المستوى الإحداثي نفسه، كما في التمثيل البياني المجاور. ألاحظ أن منحنَيي المعادلتين يتقاطعان في نقطة واحدة فقط، ما يعني أن للنظام حلاً واحداً فقط. أتأكد من ذلك جبرياً باستعمال خاصية المساواة اللوغاريتمية.



$$3^x = 20$$

المعادلة الأصلية

$$\log 3^x = \log 20$$

بأخذ اللوغاريتم الاعتيادي لكلا الطرفين

$$x \log 3 = \log 20$$

قانون القوة في اللوغاريتمات

$$x = \frac{\log 20}{\log 3}$$

بقسمة طرفي المعادلة على  $\log 3$

$$x \approx 2.7268$$

باستعمال الآلة الحاسبة

إذن: حلّ المعادلة هو  $x \approx 2.7268$

$$2 \quad 100 e^{0.08t} = 2500$$

أمثل المعادلتين  $y = 100 e^{0.08t}$ ،  $y = 2500$  في المستوى الإحداثي نفسه، كما في التمثيل البياني المجاور. ألاحظ أنّ منحنَي المعادلتين يتقاطعان في نقطة واحدة فقط، ما يعني أنّ للنظام حلًّا واحدًا فقط. أتحدّق من ذلك جبريًّا باستعمال خاصية المساواة اللوغاريتمية.

$$100 e^{0.08t} = 2500$$

المعادلة الأصلية

$$e^{0.08t} = 25$$

بالقسمة على 100

$$\ln e^{0.08t} = \ln 25$$

بأخذ اللوغاريتم الطبيعي لكلا الطرفين

$$0.08t = \ln 25$$

$\log_b b^x = x$


$$t = \frac{\ln 25}{0.08}$$

بقسمة طرفي المعادلة على 0.08

$$t \approx 40.2359$$


باستعمال الآلة الحاسبة

إذن: حلّ المعادلة هو  $t \approx 40.2359$



$$3 \quad 4^{x+3} = 3^{-x}$$

أمثل المعادلتين  $y = 4^{x+3}$ ،  $y = 3^{-x}$  في المستوى الإحداثي نفسه، كما في التمثيل البياني المجاور. ألاحظ أنّ منحنَي المعادلتين يتقاطعان في نقطة واحدة فقط، ما يعني أنّ للنظام حلًّا واحدًا فقط. أتحدّق من ذلك جبريًّا باستعمال خاصية المساواة اللوغاريتمية.



$$4^{x+3} = 3^{-x}$$

المعادلة الأصلية

$$\log 4^{x+3} = \log 3^{-x}$$

بأخذ اللوغاريتم الاعتيادي لكلا الطرفين

$$(x+3) \log 4 = -x \log 3$$

قانون القوة في اللوغاريتمات

$$x \log 4 + 3 \log 4 = -x \log 3$$

خاصية التوزيع

$$x \log 4 + x \log 3 = -3 \log 4$$

إعادة ترتيب المعادلة

$$x (\log 4 + \log 3) = -3 \log 4$$

إخراج  $x$  عاملاً مشتركاً

$$x = \frac{-3 \log 4}{\log 4 + \log 3}$$

بقسمة طرفي المعادلة على

$$\log 4 + \log 3$$

$$x \approx -1.6737$$

باستعمال الآلة الحاسبة

إذن: حل المعادلة هو  $x \approx -1.6737$

**4**  $4^x + 2^x - 12 = 0$

أمثل المعادلة  $y = 4^x + 2^x - 12$ ، في المستوى الإحداثي نفسه، كما في التمثيل البياني المجاور. ألاحظ أن منحنى المعادلة يقطع المحور  $x$  في نقطة واحدة فقط، ما يعني أن للنظام حلاً واحداً فقط. أتأكد من ذلك جبرياً باستعمال خاصية المساواة اللوغاريتمية.

$$4^x + 2^x - 12 = 0$$

المعادلة الأصلية

$$(2^x)^2 + 2^x - 12 = 0$$

$$4^x = (2^2)^x = (2^x)^2$$

$$u^2 + u - 12 = 0$$

$$2^x = u \text{ بافتراض أن } u$$

$$(u+4)(u-3) = 0$$

بالتحليل

$$u = -4 \text{ or } u = 3$$

خاصية الضرب الصفري

$$2^x = -4 \quad 2^x = 3 \quad \times$$

بإستبدال  $u$  بـ  $2^x$

$$\log 2^x = \log 3$$

بأخذ اللوغاريتم الاعتيادي لكلا الطرفين

$$x \log 2 = \log 3$$

قانون القوة في اللوغاريتمات


$$x = \frac{\log 3}{\log 2}$$

بقسمة طرفي المعادلة على  $\log 2$

$$x \approx 1.5850$$

باستعمال الآلة الحاسبة

إذن: حل المعادلة هو  $x \approx 1.5850$



### أتحقق من فهمي

أحلّ المعادلات الأسية الآتية، مقرباً إجابتي إلى أقرب 4 منازل عشرية:

a)  $5^x = 8$

b)  $4e^{2x} - 3 = 2$

c)  $2^{x-1} = 3^{3x+2}$

d)  $9^x + 3^x - 20 = 0$

تُسمى المعادلات التي تحوي متغيراً داخل تعبير لوغاريتمي **معادلة لوغاريتمية** (logarithmic equations)، ومن أمثلتها:

$$\log_2 x = 4, \quad \log x + \log(x+3) = 1$$


ولحلّ المعادلة اللوغاريتمية جبرياً؛ أكتبها أولاً بدلالة لوغاريتم واحد في أحد طرفي المعادلة، ثم أستعمل خاصية المساواة اللوغاريتمية.

### مثال 6

أحلّ المعادلات اللوغاريتمية الآتية:

1  $\log_3 x = -2$

أُمثل المعادلتين  $y = \log_3 x$ ،  $y = -2$  في المستوى الإحداثي نفسه، كما في التمثيل البياني المجاور. ألاحظ أنّ منحنَي المعادلتين يتقاطعان في نقطة واحدة فقط، ما يعني أنّ للنظام حلاً واحداً فقط. أتحقق من ذلك جبرياً باستعمال خاصية المساواة اللوغاريتمية.



$$\log_3 x = -2$$

المعادلة الأصلية

$$3^{-2} = x$$

بالتحويل إلى الصورة الأسية

$$\frac{1}{3^2} = x$$

قانون الأسس السالبة

$$\frac{1}{9} = x$$

بالتبسيط

للتحقق؛ أعوّض قيمة  $x$  في المعادلة الأصلية:

$$\log_3 \frac{1}{9} \stackrel{?}{=} -2$$


$$\log_3 3^{-2} \stackrel{?}{=} -2$$

$$-2 = -2 \quad \checkmark$$

إذن: حلّ المعادلة هو  $x = \frac{1}{9}$

## 2 $\log x + \log (x + 3) = 1$

أمثل المعادلتين  $y = 1$ ،  $y = \log x + \log (x + 3)$  في المستوى الإحداثي نفسه، كما في التمثيل البياني المجاور. ألاحظ أن منحنَيي المعادلتين يتقاطعان في نقطة واحدة فقط، ما يعني أن للنظام حلاً واحداً فقط. أتأكد من ذلك جبرياً باستعمال خاصية المساواة اللوغاريتمية.



$$\log x + \log (x + 3) = 1$$

المعادلة الأصلية

$$\log(x(x + 3)) = 1$$

قانون الضرب في اللوغاريتمات

$$x(x + 3) = 10^1$$

بالتحويل إلى الصورة الأسية

$$x^2 + 3x = 10$$

خاصية التوزيع

$$x^2 + 3x - 10 = 0$$

إعادة ترتيب المعادلة

$$(x - 2)(x + 5) = 0$$

بالتحليل

$$x - 2 = 0 \quad \text{or} \quad x + 5 = 0$$

خاصية الضرب الصفري

$$x = 2 \quad \text{or} \quad x = -5$$

بحل المعادلة

للتأكد؛ أعوض قيمة  $x$  في المعادلة الأصلية:

عندما  $x = 2$

عندما  $x = -5$

$$\log(2) + \log(2+3) \stackrel{?}{=} 1$$

$$\log(-5) + \log(-5+3) \stackrel{?}{=} 1 \quad \times$$

$$\log(2) + \log(5) \stackrel{?}{=} 1$$

$$\log(2 \times 5) \stackrel{?}{=} 1$$

$$\log 10 = 1 \quad \checkmark$$

العدد  $-5$  ليس حلاً للمعادلة اللوغاريتمية؛ لأن ناتج تعويضه داخل اللوغاريتم عدد سالب، إذن: حل المعادلة هو  $x = 2$

أتأكد من فهمي

أحل المعادلات اللوغاريتمية الآتية:

a)  $5 + 2 \ln x = 4$

b)  $\log_5 (x + 6) + \log_5 (x + 2) = 1$

## مثال 7: من الحياة



**كائنات حية:** وجد العلماء أنه يُمكن معرفة عمر عيّنة من كائن ميّت؛ وفقاً لنسبة الكربون 14 المتبقّية فيها عن طريق الاقتران:  
 $A(p) = \frac{\ln p}{-0.000121}$ ، حيث  $A(p)$  عمر العيّنة بالسنوات،  $P$  النسبة المئوية (بالصورة العشرية) المتبقّية من الكربون 14 في العيّنة. أجد النسبة المئوية من الكربون 14 المتبقّية في جمجمة إنسان عمرها 2715 عاماً تقريباً. أقرّب إجابتي إلى أقرب جزء من مئة.

$$A(p) = \frac{\ln p}{-0.000121}$$

المعادلة الأصلية

$$2715 = \frac{\ln p}{-0.000121}$$

بتعويض  $A(p) = 2715$

$$-0.328515 = \ln p$$

بالضرب التبادلي

$$p = e^{-0.328515}$$

بالتحويل إلى الصورة الأسية

$$p \approx 0.72$$

إذن: النسبة المئوية من الكربون المتبقّية في الجمجمة 72%

### أتحقق من فهمي

كشفت دراسة أنّ المجموعة الأخيرة من حيوان الماموث الصوفي قد لقيت حتفها قبل 4000 سنة تقريباً في جزيرة نائية في المحيط القطبي الشمالي. أجد النسبة المئوية من الكربون 14 المتبقّية في أحدها. أقرّب إجابتي إلى أقرب جزء من مئة.



### أدرب وأحل المسائل

إذا كان  $\log_a 7 \approx 0.845$  و  $\log_a 11 \approx 1.041$ ؛ فأجد كلّ ممّا يأتي:

1  $\log_a \frac{7}{11}$

2  $\log_a 77$

3  $\frac{\log_a 11}{\log_a 7}$

4  $\log_b \frac{1}{7}$

5  $\log_a 539$

6  $\log_7 11$

7  $\log_a (11 a^2)$

8  $\log_a \sqrt[3]{121}$

أكتب كلّ عبارة لوغاريتمية ممّا يأتي بالصورة المطوّلة؛ علماً بأنّ المتغيّرات جميعها تُمثّل أعداداً حقيقية موجبة:

9  $\log_a \left(\frac{xy}{x}\right)$

10  $\log_a (xyz)$

11  $\ln \sqrt[3]{5x^2}$

12  $\log \sqrt{\frac{m^8 n^{12}}{a^3 b^5}}$

أكتب كل عبارة لوغاريتمية مما يأتي بالصورة المختصرة؛ علماً بأن المتغيرات جميعها تمثل أعداداً حقيقية موجبة:

13  $\ln 75 + \ln 2$

14  $\log x + \log(x^2 - 1) - \log 7 - \log(x + 1)$

15  $\log_a \frac{a}{\sqrt{x}} - \log_a \sqrt{ax}$

16  $\frac{2}{3} (\ln(x^2 - 9) - \ln(x + 3) + \ln(x + y))$

أجد قيمة كل مما يأتي، مقرباً إجابتي إلى أقرب 4 منازل عشرية:

17  $\log_4 17$

18  $\log_4 \left( \frac{1}{100} \right)$

19  $\log_9 (0.0006)$

20  $\log_8 120$

21 **فيزياء:** يُقاس الضغط الجوي  $P$  بوحدة الباسكال على ارتفاع مقداره  $H$  بالأمتار؛ باستعمال المعادلة

$$H = 15500(5 - \log(P))$$

الباسكال على قمة إفريست؛ إذا علمت أن ارتفاعها

8850 m عن سطح الأرض.



أحلّ المعادلات الآتية، مقرباً إجابتي إلى أقرب 4 منازل عشرية:

22  $5^{x+2} = 4^{1-x}$

23  $e^x + e^{-x} - 6 = 0$

24  $3^{x^2+4x} = \frac{1}{27}$

25  $25^x - 3(5^x) + 2 = 0$

أحلّ المعادلات اللوغاريتمية الآتية:

26  $\log(x + 5) - \log(x - 3) = \log 2$

27  $\ln(x + 8) + \ln(x - 1) = 2 \ln x$


28  $\log_3 (\log_4 x) = 0$

29  $\ln x^2 = (\ln x)^2$

30  $2 \log 50 = 3 \log 25 + \log(x - 2)$

31 **حرارة:** تُمثل المعادلة  $T = 27 + 219e^{-0.032t}$  درجة حرارة معدن بالسليسيوس °C

بعد  $t$  دقيقة من بدء تبريده. أجد الوقت اللازم لتبريد المعدن لدرجة حرارة 100 °C



## مهارات التفكير العليا



تحذّر: أحلّ كلّاً من المعادلات الآتية:

32  $7e^{3k} - 7e^{-3k} - 48 = 0$

33  $|2^{x^2} - 8| = 3$

34 **تبرير:** إذا كانت  $\log_3 x = k \log_2 x$ ,  $x > 0$ ؛ فأجد قيمة  $k$  مقرباً إجابتي إلى أقرب 4 منازل عشرية، وأبرّر إجابتي.

35 إذا كان  $f(x) = e^x - e^{-x}$ ؛ فأجد  $f^{-1}(x)$ .

أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة في ما يأتي:

1 معامِل النمو للاقتِران  $f(x) = 4(3^x)$  يساوي:

- a) 3      b) 4      c) 12      d) 64

2 حلّ المعادلة  $\ln x = -1$ ، هو:

- a) 1      b)  $\frac{1}{e}$       c) 1      d)  $e$

3 قيمة  $\log(0.01)^2$  تساوي:

- a) -2      b) 2      c) 4      d) -4

4 يُكتب التعبير  $\log_a 9 - 2 \log_a 3 + \log_a 2$  على

صورة لوغاريتم واحد:

- a)  $\log_a 6$       b)  $\log_a 2$   
c)  $\log_a 9$       d)  $2 \log_a 3$

5 أيّ المقادير الآتية يكافئ المقدار  $\log_a \frac{3x^2}{y}$ ؟

- a)  $2 \log_a 3x - \log_a y$   
b)  $3 \log_a x^2 - \log_a y$   
c)  $6 \log_a x - \log_a y$   
d)  $\log_a 3 + 2 \log_a x - \log_a y$

6 حلّ المعادلة  $\log_2 x - \log_3(x+1) = \log_5(x-3)$ ،

هو:

- a) 2      b) 4      c) 6      d) 8

إذا كان  $\log_3 5 = c$ ؛ فأكتب قيمة كل ممّا يأتي بدلالة  $c$ :

7  $\log_3 15$       8  $\log_3 0.2$

9  $\log_3 125$       10  $\log_9 5$

أحلّ كلّاً من المعادلات الآتية:

11  $\frac{1}{4} \log_6(x-3) = \log_3 6$

12  $\log_4(x+3) + \log_4(x-3) = 2$

13  $e^x + e^{-x} = 5$

14  $27 = 3^{5x} \times 9^{x^2}$

حرارة: تُمثّل المعادلة  $T = 18 + 12e^{0.002t}$  درجة حرارة حساس جهاز إلكتروني بالسلسيوس  $^{\circ}\text{C}$  بعد  $t$  ساعة من بدء تشغيل الجهاز.



15 أجد حرارة الحساس بعد 5 ساعات من بدء التشغيل.

16 عندما تصل حرارة الحساس إلى  $50^{\circ}\text{C}$  يجب إطفاء الجهاز لتبريده. بعد كم ساعة من بدء تشغيل الجهاز يتم ذلك.

أكتب كل عبارة لوغاريتمية ممّا يأتي بالصورة المختصرة؛ علماً بأن المتغيرات جميعها تمثل أعداداً حقيقية موجبة:

29  $2 \log x - \log (x + 1)$

30  $\log (x^2 - 5x - 14) - \log (x^2 - 4)$

31  $4 \log_b x - 2 \log_b 6 - \frac{1}{2} \log_b y$

### تدريب على الاختبارات الدولية

32 قيمة  $\log 12$  تساوي:

a)  $3 \log 4$       b)  $\log 3 + \log 4$

c)  $\log 3 \times \log 4$       d)  $2 \log 6$

33  $\log \frac{1}{2} x^2$  يساوي:

a)  $-2 \log_2 x$       b)  $2 \log_2 x$

c)  $-2 \log_2 |x|$       d)  $\frac{1}{2} \log_2 x$

34 النقطة التي تشترك فيها الاقترانات الأسية جميعها التي

على الصورة  $f(x) = b^x$ ،  $b > 0$  هي:

a)  $(1, 1)$       b)  $(1, 0)$

c)  $(0, 1)$       d)  $(0, 0)$

أمثل كلّاً من الاقترانات الآتية، وأجد مجالها ومداها:

17  $f(x) = 2^x + 1$

18  $g(x) = 5(3^{x+2})$

19  $h(x) = \log \frac{1}{6} x$

20  $p(x) = 3 \ln x - 4$

صوت: تُمثل المعادلة  $L = 10 \log \left( \frac{I}{I_0} \right)$  شدة الصوت  $L$  بالديسيبل، حيث  $I_0$  أقل قدرة صوت يُمكن للإنسان سماعها، و  $I$  الصوت المراد قياس شدته.

21 أجد شدة صوت مقداره  $5500 I_0$

22 أجد صوتاً بدلالة  $I_0$  مستوى شدته 32



كوالا: يتناقص عدد حيوانات

الكوالا الموجود في غابة وفق

المعادلة  $N = 873e^{-0.078t}$  حيث

$N$  العدد المتبقي من الكوالا في

الغابة، و  $t$  الزمن بالسنوات.

23 أمثل اقتران الاضمحلال الأسّي بيانياً.

24 أجد عدد حيوانات الكوالا المتبقي في الحديقة بعد

مرور 10 سنوات.

أكتب كل عبارة لوغاريتمية ممّا يأتي بالصورة المطوّلة؛

علماً بأن المتغيرات جميعها تمثل أعداداً حقيقية موجبة:

25  $\log_a (\sqrt{xyz})$

26  $\ln \frac{2}{3x^3 y}$

27  $\ln \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$

28  $\log_a (x\sqrt{y})$

### الوحدة 3 تحليل الاقترانات

#### ما أهمية هذه الوحدة؟

تستعمل الاقترانات في نمذجة كثير من المواقف الحياتية مثل تحديد مسار كرة في الهواء، وتمثيل معدلات النمو السكاني، والدخل المتوقع من معاملات صناعية أو تجارية وغير ذلك في كافة مجالات الحياة. سأتعرف في هذه الوحدة على أساليب مختلفة للتعامل مع الاقترانات تعد أساساً لموضوعات الرياضيات التي سوف أدرسها لاحقاً.

#### تعلمت سابقاً:

- ✓ اقترانات كثيرات الحدود والاقترانات النسبية وتمثيلها بيانياً.
- ✓ الاقترانات المتشعبة و اقتران القيمة المطلقة وتمثيلها بيانياً.
- ✓ تحليل العبارة التربيعية وفرق المكعبين ومجموعهما والتحليل بتجميع الحدود.
- ✓ حل أنظمة معادلات خطية وتربيعية.

#### سوف أتعلم في هذه الوحدة:

- إيجاد باقي قسمة كثير حدود على كثير حدود خطي باستعمال نظرية الباقي.
- تحليل كثيرات حدود باستعمال نظرية العوامل.
- حل معادلات من الدرجتين الثالثة والرابعة باستعمال التحليل اعتماداً على نظرية العوامل.
- كتابة مقادير نسبية بصورة مجموع كسور جزئية.
- تمثيل الاقترانات بيانياً باستعمال تحويلات الإزاحة والتمدد والانعكاس.
- استعمال النهاية للتحقق من الاتصال عند نقطة.

**مسألة اليوم:** صندوق شاحنة على شكل متوازي مستطيلات أبعاده بالأمتار هي  $2x^2 - 26x - 256$  ،  $2x$  ،  $2$

ما قيمة  $x$  التي تجعل حجم الصندوق  $480 \text{ m}^3$ ؟

<https://www.shutterstock.com/image-photo/blue-cargo-delivery-truck-side-view-1678830934>



**فكرة الدرس:** تعرف نظريتي الباقي والعوامل واستعمالهما لتحليل كثيرات الحدود وإيجاد أصفارها.

**المصطلحات:** طريقة الجدول، نظرية الباقي، نظرية العوامل، أصفار الاقتران، نظرية الأصفار النسبية، معادلة كثير الحدود.

**القسمة باستعمال الجدول**

تعلمت سابقًا أن كثير الحدود بمتغير واحد يتكون من وحيد حد أو أكثر، وأن صورته العامة هي:

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

حيث  $n$  عدد صحيح غير سالب، و  $a_n, a_{n-1}, \dots, a_1, a_0$  أعداد حقيقية.

**أتعلم:** في الهامش مقابل السطر التالي

يسمى اقتران كثير الحدود أحياناً "كثير حدود" فقط وذلك للاختصار.

ويسمى الاقتران على الصورة  $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$  اقتران كثير حدود، ومن أمثلته:

$$f(x) = x^3 - 6x^2 + 8x \quad P(x) = 5 \quad P(x) = 2 - x$$

وتعلمت أيضًا أنه يمكن قسمة كثير حدود على آخر باستعمال القسمة الطويلة، فمثلاً يمكن قسمة  $x^3 + 2x^2 - 11x - 12$  على  $x + 4$  كما يلي:

|              |  |  |  |  |                                            |
|--------------|--|--|--|--|--------------------------------------------|
| المقسوم      |  |  |  |  |                                            |
|              |  |  |  |  | $x^2 - 2x - 3$                             |
|              |  |  |  |  | $x + 4 \overline{) x^3 + 2x^2 - 11x - 12}$ |
|              |  |  |  |  | $\underline{x^3 + 4x^2}$                   |
|              |  |  |  |  | $-2x^2 - 11x$                              |
|              |  |  |  |  | $\underline{-2x^2 - 8x}$                   |
|              |  |  |  |  | $-3x - 12$                                 |
|              |  |  |  |  | $\underline{-3x - 12}$                     |
|              |  |  |  |  | $0$                                        |
| باقى القسمة  |  |  |  |  |                                            |
| المقسوم عليه |  |  |  |  |                                            |
| ناتج القسمة  |  |  |  |  |                                            |

بالضرب في  $x^2$   
بالطرح  
بالضرب في  $-2x$   
بالطرح  
بالضرب في  $-3$   
بالطرح

**أتذكر:** للمصمم أذكر بموازة فقرة تعلمت أيضًا.

قبل البدء بقسمة كثيرات الحدود، أكتب المقسوم والمقسوم عليه بالصورة القياسية.

**أتذكر:** للمصمم أذكر بموازة الصفر في آخر خطوة من الحل السابق.

تتوقف عملية قسمة كثيرات الحدود عندما تصبح درجة باقي القسمة أقل من درجة المقسوم عليه.

**طريقة الجدول (grid method)** هي طريقة لقسمة كثيرات الحدود تعتمد بشكل أساسي على ضرب كثيرات الحدود كعملية عكسية لعملية القسمة.

**أتعلم:** للمصمم في هامش الخطوة 1 في المثال في الأسفل

درجة كثير الحدود هي أكبر أس للمتغير في جميع حدوده، وعند قسمة كثير حدود على كثير حدود آخر تكون درجة ناتج القسمة مساوية للفرق بين درجتي المقسوم والمقسوم عليه.


**مثال 1:**

**1) أستعمل طريقة الجدول لأجد ناتج:**  $(x^3 + 2x^2 - 11x - 12) \div (x + 4)$

**الخطوة 1:** أنشئ جدولاً من 4 أعمدة (درجة ناتج القسمة + 1) و 3 صفوف

(درجة المقسوم عليه + 1). أكتب كل حد من حدود المقسوم عليه في خانة منفصلة

في العمود الأول من جهة اليسار كما في الجدول المجاور.



**الخطوة 2:** أكتب الحد الأكبر من المقسوم في الخانة اليسرى من الصف الأول في منطقة العمل.

|       |       |  |  |
|-------|-------|--|--|
|       |       |  |  |
| $x$   | $x^3$ |  |  |
| $+ 4$ |       |  |  |

**الخطوة 3:** أبحث عن مقدار ناتج ضربه في الحد الأكبر من المقسوم عليه يساوي الحد الأكبر من المقسوم.

بما أن ناتج ضرب  $x^2$  في  $x$  يساوي  $x^3$ ، إذن يكون الحد الأول من ناتج القسمة  $x^2$ .

أكتب  $x^2$  أعلى الجدول كما الجدول المجاور.

|       |       |  |  |
|-------|-------|--|--|
|       | $x^2$ |  |  |
| $x$   | $x^3$ |  |  |
| $+ 4$ |       |  |  |

**الخطوة 4:** أضرب  $x^2$  في 4، وأكتب الناتج  $4x^2$  أسفل الحد الأكبر من المقسوم.

|       |        |  |  |
|-------|--------|--|--|
|       | $x^2$  |  |  |
| $x$   | $x^3$  |  |  |
| $+ 4$ | $4x^2$ |  |  |

|       |        |         |  |
|-------|--------|---------|--|
|       | $x^2$  | $-2x$   |  |
| $x$   | $x^3$  | $-2x^2$ |  |
| $+ 4$ | $4x^2$ |         |  |

**الخطوة 5:** للحصول على الحد الثاني من المقسوم (وهو  $+2x^2$ )، يجب إضافة  $-2x^2$  إلى  $4x^2$  في منطقة العمل. إن إضافة  $-2x^2$  يحدد الحد الثاني من ناتج القسمة وهو  $(-2x)$  لأن ناتج ضرب  $-2x$  في  $x$  يساوي  $-2x^2$

|       |        |         |       |
|-------|--------|---------|-------|
|       | $x^2$  | $-2x$   | $-3$  |
| $x$   | $x^3$  | $-2x^2$ | $-3x$ |
| $+ 4$ | $4x^2$ | $-8x$   |       |

**الخطوة 6:** أضرب  $-2x$  في 4، وأكتب الناتج  $-8x$  في منطقة العمل. وللحصول على الحد الثالث من المقسوم (وهو  $-11x$ )، أحتاج إلى إضافة  $-3x$  إلى  $-8x$  في منطقة العمل. إن إضافة الحد  $-3x$  يحدد الحد الأخير من ناتج القسمة وهو  $(-3)$  لأن ناتج ضرب  $-3$  في  $x$  يساوي  $-3x$

|       |        |         |       |     |
|-------|--------|---------|-------|-----|
|       | $x^2$  | $-2x$   | $-3$  |     |
| $x$   | $x^3$  | $-2x^2$ | $-3x$ | $0$ |
| $+ 4$ | $4x^2$ | $-8x$   | $-12$ |     |

**الخطوة 7:** أضرب  $-3$  في 4، وأكتب الناتج  $-12$  في الخانة المتبقية. وبما أنني حصلت على قيمة مساوية للحد الأخير (الثابت) في المقسوم فهذا يعني أن باقي القسمة يساوي صفر. أضيف خانة إلى منطقة العمل وأضع فيها 0 ليمثل باقي القسمة.

الباقى

إن، ناتج القسمة هو:  $x^2 - 2x - 3$  و الباقي 0، ويمكن كتابة ذلك كما يأتي:

$$\frac{x^3 + 2x^2 - 11x - 12}{x + 4} = x^2 - 2x - 3$$

**أتعلم:** للمصمم أتعلم بجانب الخطوة 7

بما أن المقسوم عليه كثير حدود درجته 1، فإن باقي القسمة من الدرجة 0، وناتج القسمة من الدرجة 2

**أتحقق من صحة الحل:**

يمكنني التحقق من صحة الحل بإيجاد مجموع الحدود في منطقة العمل والتحقق من مساواتها للمقسوم.

$$x^3 - 2x^2 - 3x + 4x^2 - 8x - 12 = x^3 + 2x^2 - 11x - 12$$

(2) أستعمل طريقة الجدول لأجد ناتج:  $(9x^3 - x + 3) \div (3x - 2)$

|      |        |  |  |
|------|--------|--|--|
|      |        |  |  |
| $3x$ | $9x^3$ |  |  |
| $-2$ |        |  |  |

**الخطوة 1:** أنشئ جدولاً من 4 أعمدة (درجة ناتج القسمة +1) و 3 صفوف

(درجة المقسوم عليه +1). أكتب كل حد من حدود المقسوم عليه في خانة منفصلة

في العمود الأول من جهة اليسار كما في الجدول المجاور. أكتب الحد الأكبر من المقسوم في الخانة اليسرى العليا من الصف الأول في منطقة العمل.

|      |        |  |  |
|------|--------|--|--|
|      | $3x^2$ |  |  |
| $3x$ | $9x^3$ |  |  |
| $-2$ |        |  |  |

**الخطوة 3:** أبحث عن مقدار ناتج ضربه في الحد الأكبر من المقسوم عليه يساوي الحد الأكبر من المقسوم.

بما أن ناتج ضرب  $3x^2$  في  $3x$  يساوي  $9x^3$ ، إذن يكون فإن الحد الأول من ناتج القسمة يساوي  $3x^2$ .

أكتب  $3x^2$  أعلى الجدول.

|      |         |        |  |
|------|---------|--------|--|
|      | $3x^2$  | $2x$   |  |
| $3x$ | $9x^3$  | $6x^2$ |  |
| $-2$ | $-6x^2$ |        |  |

**الخطوة 4:** أضرب  $3x^2$  في  $-2$ ، وأكتب الناتج  $-6x^2$  أسفل الحد الأكبر من المقسوم. وبما أن المقسوم

لا يحتوي على حد من الدرجة أصيف  $6x^2$  إلى  $-6x^2$  في منطقة العمل. إن إضافة الحد  $6x^2$  يحدد

الحد الثاني من ناتج القسمة وهو  $(2x)$  لأن ناتج ضرب  $2x$  في  $3x$  يساوي  $6x^2$

|      |         |        |      |
|------|---------|--------|------|
|      | $3x^2$  | $2x$   | $1$  |
| $3x$ | $9x^3$  | $6x^2$ | $3x$ |
| $-2$ | $-6x^2$ | $-4x$  |      |

**الخطوة 5:** أضرب  $2x$  في  $-2$ ، وأكتب الناتج  $-4x$  منطقة العمل. وللحصول على الحد الثالث من

المقسوم (وهو  $-x$ )، يجب إضافة  $3x$  إلى  $-4x$  في منطقة العمل. إن إضافة الحد  $3x$  يحدد الحد

الأخير من ناتج القسمة وهو  $(1)$  لأن ناتج ضرب  $1$  في  $3x$  يساوي  $3x$

|      |         |        |      |
|------|---------|--------|------|
|      | $3x^2$  | $2x$   | $1$  |
| $3x$ | $9x^3$  | $6x^2$ | $3x$ |
| $-2$ | $-6x^2$ | $-4x$  | $-2$ |

**الخطوة 6:** أضرب  $1$  في  $-2$ ، وأكتب الناتج  $-2$  في الخانة المتبقية. وبما أنني لم أحصل على

الباقى

قيمة مساوية للحد الأخير (الثابت) في المقسوم، فهذا يعني أنني بحاجة

إلى إضافة خانة إلى منطقة العمل أضع فيها العدد  $5$  الذي ناتج جمعه

الى العدد  $-2$  يساوي  $(3)$  وهو الحد الأخير (الثابت) في المقسوم، وعندئذ يكون باقى القسمة  $5$

إذن، ناتج القسمة هو:  $3x^2 + 2x + 1$  و الباقي  $5$ ، ويمكن كتابة ذلك كما يأتي:

$$\frac{9x^3 - x + 3}{3x - 2} = 3x^2 + 2x + 1 + \frac{5}{3x - 2}$$

**أتحقق من صحة الحل:**

يمكنني التحقق من صحة الحل بإيجاد مجموع الحدود في منطقة العمل والتحقق من مساواتها للمقسوم.

$$9x^3 - 6x^2 + 6x^2 - 4x + 3x - 2 + 5 = 9x^3 - x + 3$$

**أتحقق من فهمي:**

أستعمل طريقة الجدول لأجد ناتج كل مما يأتي:

a)  $(x^3 + 6x^2 - 9x - 14) \div (x + 1)$

b)  $(2x^3 - x^2 + 3) \div (x - 3)$

## نظرية الباقي

ألاحظ مما سبق أنه يمكن إيجاد باقي قسمة كثير حدود مثل  $P(x) = 2x^3 - 7x^2 + 5$  على كثير حدود من الدرجة 1 مثل  $x - 3$  بطريقتين:

الطريقة 2: طريقة الجدول

الطريقة 1: القسمة الطويلة

|      |         |        |       |      |
|------|---------|--------|-------|------|
|      | $2x^2$  | $-x$   | $-3$  |      |
| $x$  | $2x^3$  | $-x^2$ | $-3x$ | $-4$ |
| $-3$ | $-6x^2$ | $3x$   | $9$   |      |

الباقي

$$\begin{array}{r}
 2x^2 - x - 3 \\
 x - 3 \overline{) 2x^3 - 7x^2 + 0x + 5} \\
 \underline{2x^3 - 6x^2} \phantom{+ 0x + 5} \\
 -x^2 + 0x \phantom{+ 5} \\
 \underline{-x^2 + 3x} \phantom{+ 5} \\
 -3x + 5 \\
 \underline{-3x + 9} \\
 -4
 \end{array}$$

الباقي

ولكن هل يمكن إيجاد باقي قسمة كثير حدود على كثير حدود من الدرجة 1 بطريقة أبسط؟

في المثال السابق أقارن بين باقي القسمة وهو 16، وقيمة  $P(3)$

$$\begin{aligned}
 P(x) &= 2x^3 - 7x^2 + 5 \\
 P(3) &= 2(3)^3 - 7(3)^2 + 5 \\
 &= 54 - 63 + 5 \\
 &= -4
 \end{aligned}$$

كثير الحدود المعطى

بتعويض  $x = 3$

أضرب

بالتبسيط

ألاحظ أن قيمة  $P(3)$  تساوي باقي قسمة كثير الحدود  $P(x)$  على  $x - 3$ ، وهذا يقودنا إلى نظرية الباقي (remainder theorem).

| مفهوم أساسي                                                                                                                                                                                                                          | نظرية الباقي |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <p>باقي قسمة كثير الحدود <math>P(x)</math> على <math>(x - c)</math> هو <math>P(c)</math></p> <p>وبصورة عامة فإن باقي قسمة <math>P(x)</math> على <math>(ax - b)</math> هو <math>P(\frac{b}{a})</math>، حيث <math>a \neq 0</math>.</p> |              |

مثال (1):

أستعمل نظرية الباقي لأجد باقي قسمة  $P(x)$  على  $h(x)$  في كل مما يأتي:

1)  $P(x) = x^3 + 7x^2 - 6x + 2$ ,  $h(x) = x - 3$  .

باقي قسمة  $P(x)$  على  $(x-3)$  هو  $P(3)$

$$P(x) = x^3 + 7x^2 - 6x + 2$$

$$P(3) = (3)^3 + 7(3)^2 - 6(3) + 2$$

$$= 27 + 63 - 18 + 2$$

$$= 74$$

كثير الحدود المعطى

بتعويض  $x=3$

بالضرب

بالتبسيط

إذن باقي قسمة  $P(x)$  على  $h(x)$  يساوي 74

2)  $P(x) = 2x^3 - 5x^2 - 4x + 9$ ,  $h(x) = x + 2$  .

باقي قسمة  $P(x)$  على  $(x+2)$  هو  $P(-2)$

$$P(x) = 2x^3 - 5x^2 - 4x + 9$$

$$P(-2) = 2(-2)^3 - 5(-2)^2 - 4(-2) + 9$$

$$= -16 - 20 + 8 + 9$$

$$= -19$$

كثير الحدود المعطى

بتعويض  $x=-2$

بالضرب

بالتبسيط

إذن باقي قسمة  $P(x)$  على  $h(x)$  يساوي -19.

3)  $P(x) = 2x^3 - 4x^2 - 2x + 1$ ,  $h(x) = 2x - 1$

لأجد باقي قسمة  $P(x)$  على  $h(x) = 2x - 1$ ، أكتب  $h(x)$  على الصورة  $h(x) = 2(x - \frac{1}{2})$ ، ليكون الباقي  $P(\frac{1}{2})$

$$P(x) = 2x^3 - 4x^2 - 2x + 1$$

$$P(\frac{1}{2}) = 2(\frac{1}{2})^3 - 4(\frac{1}{2})^2 - 2(\frac{1}{2}) + 1$$

$$= \frac{1}{4} - 1 - 1 + 1$$

$$= -\frac{3}{4}$$

كثير الحدود المعطى

بتعويض  $x = \frac{1}{2}$

بالضرب

بالتبسيط

إذن باقي قسمة  $P(x)$  على  $h(x)$  يساوي  $-\frac{3}{4}$

## أتحقق من فهمي

أستعمل نظرية الباقي لأجد باقي قسمة  $P(x)$  على  $h(x)$  في كل مما يأتي:

- a)  $P(x) = 4x^4 - 7x^3 + 5x^2 + 2$  ,  $h(x) = x-1$   
b)  $P(x) = 3x^3 + 8x^2 - 3x - 6$  ,  $h(x) = x+3$   
c)  $P(x) = -2x^3 - 5x^2 + 10x + 9$  ,  $h(x) = 2x + 8$

## نظرية العوامل

|     |         |        |   |   |
|-----|---------|--------|---|---|
|     | $2x^2$  | $-x$   | 0 |   |
| $x$ | $2x^3$  | $-x^2$ | 0 | 0 |
| -1  | $-2x^2$ | $x$    | 0 |   |

ألاحظ في المثالين 1 و 2 بداية الدرس أنه عند قسمة كثير حدود على كثير حدود من الدرجة 1،

يكون ناتج القسمة كثير حدود درجته أقل بواحد من درجة كثير الحدود الأصلي، فمثلاً عند قسمة

كثير الحدود  $2x^3 - 3x^2 + x$  على كثير الحدود  $x-1$ ، ألاحظ أن درجة ناتج القسمة

$(2x^2 - x)$  تساوي 2. وبما أن باقي القسمة يساوي صفراً، فإن  $P(1) = 0$ ، وهذا يعني أن

$x - 1$  عامل من عوامل كثير الحدود  $2x^3 - 3x^2 + x$ ، وهذا يوضح **نظرية العوامل** (factor theorem)، التي تعد حالة خاصة من نظرية الباقي.

| مفهوم أساسي                                                                                   | نظرية العوامل |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| يكون $(x - c)$ عاملاً من عوامل $P(x)$ إذا وفقط إذا كان $P(c) = 0$ وبصورة عامة:                |               |
| يكون $(ax - b)$ عاملاً من عوامل $P(x)$ إذا وفقط إذا كان $P(\frac{b}{a}) = 0$ حيث $a \neq 0$ . |               |

إذا علم أحد عوامل كثير الحدود فإنه يمكن تحليله **تحليلاً كاملاً**، وذلك بكتابته على صورة حاصل ضرب مجموعة من كثيرات الحدود التي لا يمكن تحليلها (من الدرجة 1 أو من درجة زوجية وليس لها أصفار).

## مثال 3:

إذا كان  $P(x) = x^3 + 6x^2 + 5x - 12$

(1) أبين أن  $x + 4$  عامل من عوامل  $P(x)$

يكون  $x + 4$  عاملاً من عوامل  $P(x)$  إذا كان  $P(-4) = 0$ ، لذا أجد  $P(-4)$

$$P(x) = x^3 + 6x^2 + 5x - 12$$

$$= (-4)^3 + 6(-4)^2 + 5(-4) - 12$$

$$= -64 + 96 - 20 - 12$$

$$= 0$$

كثير الحدود المعطى

بتعويض  $x = -4$

بالضرب

بالتبسيط

إذن،  $x + 4$  عامل من عوامل  $P(x)$

## (2) أحل $P(x)$ تحليلًا كاملاً

بما أن  $x + 4$  عامل من عوامل  $P(x)$ ، فإنه يمكن إيجاد العوامل الأخرى بقسمة  $P(x)$  على  $x + 4$  ثم تحليل كثير الحدود الناتج إن أمكن

|      |        |        |       |   |
|------|--------|--------|-------|---|
|      | $x^2$  | $2x$   | $-3$  |   |
| $x$  | $x^3$  | $2x^2$ | $-3x$ | 0 |
| $+4$ | $4x^2$ | $8x$   | $-12$ |   |

إذن، ناتج القسمة يساوي  $x^2 + 2x - 3$ ، ومنه فإنه يمكن تحليل كثير الحدود كما يلي:

$$\begin{aligned}
 P(x) &= x^3 + 6x^2 + 5x - 12 && \text{كثير الحدود المعطى} \\
 &= (x+4)(x^2 + 2x - 3) && \text{التحليل باستعمال القسمة} \\
 &= (x+4)(x+3)(x-1) && \text{بتحليل ثلاثي الحدود}
 \end{aligned}$$

$$P(x) = (x - 4)(x + 3)(x + 1) \quad \text{إذن:}$$


**أتتحقق من فهمي**

$$P(x) = x^3 - 2x^2 - 13x - 10 \quad \text{إذا كان}$$

(a) أبين أن  $x-5$  عامل من عوامل  $P(x)$

(b) أحل  $P(x)$  تحليلًا كاملاً

**الأصفار النسبية**



**أصفار كثير الحدود (zeros of a polynomial)** هي قيم  $x$  التي يكون عندها  $P(x) = 0$ ، وعند

تمثيل كثير الحدود بيانيًا فإن أصفاره هي إحداثيات  $x$  لنقاط تقاطع منحناه مع المحور  $x$ .

يمكن استعمال **نظرية الأصفار النسبية (rational zero theorem)** لإيجاد بعض الأصفار المحتملة

لكثيرات الحدود لاختبارها.

$$Q(x) = 2x^4 - 6x^3 - 26x^2 + 30x \quad \text{لكثير الحدود}$$

أربع أصفار هي:  $-3, 0, 1, 5$  ويقطع عندها المنحنى المحور  $x$

### نظرية الأصفار النسبية

مفهوم أساسي

إذا كان  $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$  كثير حدود معاملاته أعداد صحيحة، فإن كل صفر نسبي لـ  $P(x)$  يكون على الصورة  $\frac{p}{q}$  حيث  $p$  أحد عوامل الحد الثابت  $(a_0)$ ، و  $q$  أحد عوامل المعامل الرئيس  $(a_n)$ .

**نتيجة من نظرية الأصفار النسبية**


إذا كان  $a_0 = 1$ ، فإن الصفر النسبي يكون أحد عوامل الحد الثابت.

عند إيجاد أحد الأصفار النسبية لكثير الحدود، فإنه يمكن إيجاد أصفاره الأخرى باستعمال القسمة والتحليل.

**أتعلم:** في الهامش بجانب أول سطر

عدد أصفار كثير الحدود أقل من أو يساوي درجته.

**مثال 4:**



**(1) أجد جميع أصفار كثير الحدود  $P(x) = 2x^3 + x^2 - 13x + 6$**

يمكن استعمال برمجية جيوجيبرا، لتمثيل  $P(x)$  بيانياً وتحديد عدد أصفاره. ألاحظ أن منحنى كثير الحدود يقطع محور  $x$  في 3 نقاط؛ ما يعني أن  $P(x)$  له 3 أصفار. ويمكن التحقق من ذلك جبرياً.

**الخطوة 1:** أجد الأصفار النسبية المحتملة لكثير الحدود.

أجد عوامل الحد الثابت (6) :  $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$

أجد عوامل المعامل الرئيس (2) :  $\pm 1, \pm 2$

إذن الأصفار النسبية المحتملة لكثير الحدود  $P(x)$  هي:

$$\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6, \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{3}{2}$$

**أنتكر:** للمصمم في هامش السطر السابق.

أكتب الأصفار النسبية المحتملة بأبسط صورة

**الخطوة 2:** أكون جدولاً لاختبار بعض الأصفار النسبية المحتملة.

| $\frac{p}{q}$ | $P\left(\frac{p}{q}\right)$                  | هل $\frac{p}{q}$ صفر<br>لكثير<br>الحدود؟ |
|---------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| -1            | $f(-1) = 2(-1)^3 + (-1)^2 - 13(-1) + 6 = 18$ | ✗                                        |
| 1             | $f(1) = 2(1)^3 + (1)^2 - 13(1) + 6 = -4$     | ✗                                        |
| 2             | $f(2) = 2(2)^3 + (2)^2 - 13(2) + 6 = 0$      | ✓                                        |

بما أن  $P(2) = 0$ ، فإنه يوجد لكثير الحدود صفر عند  $x = 2$ ، إذن  $x - 2$  عامل من عوامل  $P(x)$ .

**أتعلم:** للمصمم في هامش الجدول

أتوقف عن التعويض عندما أجد أول صفر لكثير الحدود.

**الخطوة 3:** أحلل كثير الحدود تحليلًا كاملاً

بما أن  $x - 2$  عامل من عوامل  $P(x)$ ، فإنه يمكن إيجاد العوامل الأخرى بقسمة  $P(x)$  على  $x - 2$  ثم تحليل كثير الناتج إن أمكن:

|      |         |        |       |     |
|------|---------|--------|-------|-----|
|      | $2x^2$  | $5x$   | $-3$  |     |
| $x$  | $2x^3$  | $5x^2$ | $-3x$ | $0$ |
| $-2$ | $-4x^2$ | $-10x$ | $6$   |     |

ناتج القسمة يساوي  $2x^2 + 5x - 3$  ، ومنه فإنه يمكن تحليل كثير الحدود كما يلي:

$$\begin{aligned}
 P(x) &= 2x^3 + x^2 - 13x + 6 && \text{كثير الحدود المعطى} \\
 &= (x - 2)(2x^2 + 5x - 3) && \text{التحليل باستعمال القسمة} \\
 &= (x - 2)(2x - 1)(x + 3) && \text{بتحليل ثلاثي الحدود}
 \end{aligned}$$

$$P(x) = (x - 2)(2x - 1)(x + 3) \quad \text{إذن:}$$

ومنه فإن أصفار  $P(x)$  الناتجة عن تحليله هي:  $2, \frac{1}{2}, -3$

**أتعلم:** للمصمم في هامش السطر السابق

أجد أصفار كثير الحدود بمساواة كل عامل من عوامله بالصفر.

$$x - 2 = 0 \rightarrow x = 2$$

$$2x - 1 = 0 \rightarrow x = \frac{1}{2}$$


$$x + 3 = 0 \rightarrow x = -3$$

$$(2) \quad \text{أجد جميع أصفار كثير الحدود } P(x) = x^4 - 5x^3 - 5x^2 + 23x + 10$$

يمكنني استعمال برمجية جيوجيبرا، لتمثيل  $P(x)$  بيانيًا وتحديد عدد أصفاره. ألاحظ أن منحنى كثير الحدود يقطع محور  $x$  في 4 نقاط؛ ما يعني أن  $P(x)$  له 4 أصفار. ويمكن التحقق من ذلك جبريًا.

**الخطوة 1:** أجد الأصفار النسبية المحتملة لكثير الحدود.

بما أن معامل الحد الرئيس 1، فإن الأصفار النسبية المحتملة هي عوامل الحد الثابت والذي يساوي (10).



إن الأصفار النسبية المحتملة لكثير الحدود  $P(x)$  هي:

$$\pm 1, \pm 2, \pm 5, \pm 10$$

**الخطوة 2:** أكون جدولاً لاختبار بعض الأصفار النسبية المحتملة.

| $p$ | $P(p)$                                             | هل $p$ صفر<br>لكثير<br>الحدود؟ |
|-----|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1   | $P(1) = (1)^4 - 5(1)^3 - 5(1)^2 + 23(1) + 10 = 24$ | ✗                              |
| 2   | $P(2) = (2)^4 - 5(2)^3 - 5(2)^2 + 23(2) + 10 = 12$ | ✗                              |
| 5   | $P(5) = (5)^4 - 5(5)^3 - 5(5)^2 + 23(5) + 10 = 0$  | ✓                              |

بما أن  $P(5) = 0$  ، إذن فإنه يوجد لكثير الحدود صفر عند  $x = 5$  ، إذن  $x-5$  عامل من عوامل  $P(x)$  .

**الخطوة 3:** أحلل كثير الحدود تحليلاً كاملاً

بما أن  $x-5$  عامل من عوامل  $P(x)$  ، فإنه يمكن إيجاد العوامل الأخرى بقسمة  $P(x)$  على  $x-5$  ثم تحليل كثير الناتج إن أمكن:

|      |         |   |         |       |   |
|------|---------|---|---------|-------|---|
|      | $x^3$   | 0 | $-5x$   | $-2$  |   |
| $x$  | $x^4$   | 0 | $-5x^2$ | $-2x$ | 0 |
| $-5$ | $-5x^3$ | 0 | $25x$   | 10    |   |

ناتج القسمة يساوي  $x^3 - 5x - 2$  ، وهو يحتاج إلى تحليل. الأصفار النسبية المحتملة لناتج القسمة هي عوامل الحد الثابت والذي يساوي ( 2 ) وهي:

$$\mp 1, \mp 2$$

بالتجريب أجد أن  $-2$  أحد أصفار  $x^3 - 5x - 2$  . إذن أقسم  $x^3 - 5x - 2$  على  $x+2$

|      |        |         |      |   |
|------|--------|---------|------|---|
|      | $x^2$  | $-2x$   | $-1$ |   |
| $x$  | $x^3$  | $-2x^2$ | $-x$ | 0 |
| $+2$ | $2x^2$ | $-4x$   | $-2$ |   |

لذا يمكن تحليل كثير الحدود كما يلي:

$$\begin{aligned}
 P(x) &= x^4 - 5x^3 - 5x^2 + 23x + 10 && \text{كثير الحدود المعطى} \\
 &= (x-5)(x^3 - 5x - 2) && \text{التحليل باستعمال القسمة} \\
 &= (x-2)(2x-1)(x^2 - 2x - 1) && \text{التحليل باستعمال القسمة}
 \end{aligned}$$

$$P(x) = (x-2)(2x-1)(x^2 - 2x - 1) \text{ ، إذن ،}$$

لإيجاد أصفار العبارة التربيعية الناتجة أستعمل القانون العام. أحدد قيم المعاملات ثم أعوضها في صيغة القانون العام:

$$a = 1, b = -2, c = -1$$

صيغة القانون العام

$$x = \frac{-b \mp \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

بالتعويض

$$x = \frac{-(-2) \mp \sqrt{(-(-2))^2 - 4(1)(-1)}}{2(1)}$$

بالتبسيط

$$x = 1 \mp \sqrt{2}$$

ومنه فإن أصفار  $P(x)$  الناتجة عن تحليله هي:  $5, -2, 1 + \sqrt{2}, 1 - \sqrt{2}$

**أتعلم:** للمصمم في هامش كلمة بالتجريب

بما أنني توصلت من التجريب السابق إلى أن 1 و 2 ليسا صفرين لكثير الحدود الأصلي  $P(x)$ ، إذن لا أعيد اختبارهما مرة أخرى في ناتج القسمة، وأجرب العددين المتبقين 1- و -2 ، ومنه:

$$(-2)^3 - 5(-1) - 2 = 0$$

**أتحقق من فهمي:**

أجد جميع أصفار كثيرات الحدود الآتية:

$$a) P(x) = 3x^3 + 5x^2 - 2x - 4$$

$$b) Q(x) = x^4 - 7x^3 + 14x^2 - 3x - 9$$

**حل معادلات كثيرات الحدود**

**معادلة كثير الحدود (polynomial equation)** هي معادلة يمكن كتابتها على صورة  $P(x) = 0$ ، حيث  $P(x)$  كثير حدود من أي رتبة ويسمى كثير الحدود المرتبط بالمعادلة. يمكن حل بعض معادلات كثيرات الحدود باستعمال طرق التحليل البسيطة التي تعلمتها سابقاً مثل التحليل بإخراج عامل مشترك أو باستعمال التجميع، إلا أن بعض معادلات كثيرات الحدود لا يمكن حلها باستعمال هذه الطرق وعندئذ يمكن استعمال نظرية الأصفار النسبية لإيجاد أصفار كثير الحدود المرتبط بالمعادلة وتحليلها.

**أتعلم** في الهامش مقابل المصطلح المظلل بالأصفر في السطر السابق

المعادلات الخطية والتربيعية والتكعيبية التي تعلمتها سابقاً هي حالات خاصة من معادلة كثير الحدود.

مثال 5:

$$x^3 - x^2 - 14x + 24 = 0 \text{ أحل المعادلة}$$

كثير الحدود المرتبط بالمعادلة هو:  $P(x) = x^3 - x^2 - 14x + 24$ ، وبما أنه لا توجد طريقة واضحة لتحليله مثل إخراج العامل المشترك أو التجميع، أجد أحد أصفاره النسبية ثم أحله.

**الخطوة 1:** أجد الأصفار النسبية المحتملة لكثير الحدود المرتبط بالمعادلة.

بما أن معامل الحد الرئيس (1)، فإن الأصفار النسبية المحتملة هي عوامل الحد الثابت والذي يساوي (24).

إن الأصفار النسبية المحتملة لكثير الحدود  $P(x)$  هي:

$$\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 6, \pm 8, \pm 12, \pm 24$$

**الخطوة 2:** أكون جدولاً لاختبار بعض الأصفار النسبية المحتملة.

| $p$ | $P(p)$                                   | هل $p$ صفر لكثير الحدود؟ |
|-----|------------------------------------------|--------------------------|
| 1   | $f(1) = (1)^3 - (1)^2 - 14(1) + 24 = 10$ | $\times$                 |
| 2   | $f(2) = (2)^3 - (2)^2 - 14(2) + 24 = 0$  | $\checkmark$             |

بما أن  $P(2) = 0$ ، فإنه يوجد لكثير الحدود صفر عند  $x=2$ ، إذن  $x-2$  عامل من عوامل  $P(x)$

**الخطوة 3:** أحلل كثير الحدود باستعمال الأصفار النسبية ثم أحل المعادلة.

بما أن  $x-2$  أحد عوامل كثير الحدود، فإنه يمكن إيجاد العوامل الأخرى بقسمة  $P(x)$  على  $x-2$  ثم تحليل كثير الناتج إن أمكن:

|     |         |       |        |   |
|-----|---------|-------|--------|---|
|     | $x^2$   | $x$   | -12    |   |
| $x$ | $x^3$   | $x^2$ | $-12x$ | 0 |
| -2  | $-2x^2$ | $-2x$ | 24     |   |

ناتج القسمة يساوي  $x^2 + x - 12$ ، ومنه فإنه يمكن تحليل كثير الحدود وحل المعادلة كما يلي:

$$x^3 - x^2 - 14x + 24 = 0$$

$$(x-2)(x^2 + x - 12) = 0$$

$$(x-2)(x+4)(x-3) = 0$$

$$x-2 = 0 \text{ or } x+4 = 0 \text{ or } x-3 = 0$$

$$x = 2 \text{ or } x = -4 \text{ or } x = 3$$

المعادلة الأصلية

التحليل باستعمال القسمة

بتحليل ثلاثي الحدود

خاصية الضرب الصفري

بحل كل معادلة

إن حلول المعادلة هي:  $x = -2, x = -4, x = 3$

أتحقق من فهمي:

a)  $x^3 - x^2 - 9x + 9 = 0$

b)  $x^3 + 9x^2 + 13x + 5 = 0$

يمكن نمذجة الكثير من المواقف الحياتية والعلمية باستعمال معادلات كثيرات حدود يتطلب حلها استعمال نظرية الأصفار النسبية.

### مثال 5 من الحياة

**هندسة العمارة:** صنع مهندس معماري نموذجًا لبنائية على هيئة هرم قاعدته مربعة باستعمال

طابعة ثلاثة الأبعاد. فإذا كان ارتفاع النموذج يقل 2 dm عن طول ضلع قاعدته، وكان

حجمه  $25 \text{ dm}^3$ ، فما أبعاد النموذج؟



<https://www.shutterstock.com/image-illustration/3d-abs-plastic-printing-technology-business-221669467>

**الخطوة 1:** أستعمل قانون حجم الهرم لأكتب معادلة

بما أنه قاعدة الهرم مربعة أفرض أن طول ضلعها  $x \text{ dm}$ ، ومنه فإن مساحتها  $x^2$ ، وبما أن ارتفاع الهرم يقل 2 dm عن طول ضلع القاعدة، فإنه ارتفاع الهرم  $(x - 2) \text{ dm}$ .

$$\begin{array}{ccccc} \text{حجم الهرم} & & & & \text{الارتفاع} \\ V & = & \frac{1}{3} \times & B & \times h \\ \downarrow & & & \downarrow & \downarrow \\ 25 & = & \frac{1}{3} \times & x^2 & \times (x - 2) \end{array}$$

$$x^3 - 2x^2 = 75$$

$$x^3 - 2x^2 - 75 = 0$$

بضرب طرفي المعادلة في 3

ب طرح 75 من طرفي المعادلة

**أنتكر:** للمصمم في الهامش مقابل أول عبارة شارحة.

حجم الهرم (V) يساوي ثلث مساحة قاعدته B في ارتفاعه (h)

**الخطوة 2:** أجد أحد الأصفار النسبية لكثير الحدود المرتبط بالمعادلة.

أجد الأصفار النسبية المحتملة لكثير الحدود المرتبط بالمعادلة وهو  $P(x) = x^3 - 2x^2 - 75$

بما أن معامل الحد الرئيس 1، فإن الأصفار النسبية المحتملة هي عوامل الحد الثابت والذي يساوي (75).

إذن الأصفار النسبية المحتملة لكثير الحدود  $P(x)$  هي:

$$\mp 1, \quad \mp 3, \quad \mp 5, \quad \mp 15, \quad \mp 25, \quad \mp 75$$

**إرشاد:** للمصمم الارشاد بجانب الفقرة السابقة.

بما أن الارتفاع  $x - 2$ ، فهذا يدل على أن  $x > 2$ ، لذا أختبر الأصفار النسبية التي تزيد عن 2

**الخطوة 3:** أكون جدولًا لاختبار بعض الأصفار النسبية المحتملة.

بما أن الطول لا يمكن أن يكون سالبًا، إذن أختبر الأصفار النسبية الموجبة فقط.

| $p$ | $f(p)$                             | هل $p$ صفر<br>لكثير الحدود؟ |
|-----|------------------------------------|-----------------------------|
| 3   | $f(3) = (3)^3 - 2(3)^2 - 75 = -66$ | ✗                           |
| 5   | $f(5) = (5)^3 - 2(5)^2 - 75 = 0$   | ✓                           |

بما أن  $P(5) = 0$  ، فإنه يوجد لكثير الحدود المرتبط بالمعادلة صفر عند  $x=5$ ، إذن  $x-5$  عامل من عوامل  $P(x)$

**الخطوة 4:** أحلل المعادلة باستعمال الأصفار النسبية ثم أحلها.

بما أن  $x-5$  أحد عوامل كثير الحدود المرتبط بالمعادلة، فإنه يمكن إيجاد العوامل الأخرى بقسمة  $P(x)$  على  $x-5$  ثم تحليل كثير الناتج إن أمكن:

|     |         |         |       |   |
|-----|---------|---------|-------|---|
|     | $x^2$   | $3x$    | 15    |   |
| $x$ | $x^3$   | $+3x^2$ | $15x$ | 0 |
| -5  | $-5x^2$ | $-15x$  | -75   |   |

ناتج القسمة يساوي  $x^2 + 3x + 15$ ، ومنه فإنه يمكن حل المعادلة كما يلي:

$$x^3 - 2x^2 - 75 = 0$$

المعادلة الأصلية

$$(x - 5)(x^2 + 3x + 15) = 0$$

التحليل باستعمال القسمة

$$x - 5 = 0 \text{ or } x^2 + 3x + 15 = 0$$

خاصية الضرب الصفري

بما أن العامل التربيعي  $x^2 + 3x + 15$  مميزه سالب فإنه لا يوجد له أصفار. ولذلك فإن  $x-5$  هو العامل الوحيد للمعادلة ومنه فإن  $x = 5$  هو الحل الوحيد للمعادلة.

إذن، طول قاعدة النموذج 5 dm، وارتفاعه 3 dm

**أنتذكر:** في هامش العبارة الشارحة من الجدول السابق

مميز المعادلة التربيعية  $ax^2 + bx + c = 0$  هو:

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

**أتحقق من فهمي**

هرم قاعدته مربعة يقل طول ضلع قاعدته 3 cm عن ارتفاعه. إذا كان حجم الهرم  $108 \text{ cm}^3$ ، فما ارتفاعه؟

**معلومة:** للمصمم المعلومة في هامش المثال

الطباعة ثلاثية الأبعاد هي عملية صنع نماذج صلبة ثلاثية الأبعاد تم رسمها على الحاسوب، عن طريق وضع طبقات متتالية من المادة الخام حتى يتم إنشاء النموذج.

## أُتدرب وأحل المسائل

أستعمل طريقة الجدول لأجد ناتج القسمة والباقي في كل مما يأتي:

1)  $(6x^4 - 5x^3 + 8x^2 - 7x - 12) \div (3x - 4)$

2)  $(2x^5 - 5x^4 + 9x^2 - 10x + 15) \div (1 - 2x)$

أستعمل نظرية الباقي لأجد باقي قسمة  $f(x)$  على  $h(x)$  في كل مما يأتي:

3)  $f(x) = 8x^4 + 2x^3 - 53x^2 + 37x - 6$  ,  $h(x) = x + 1$

4)  $f(x) = 4x^3 + 2x^2 - 6x - 8$  ,  $h(x) = 3x + 4$

أبين أن  $h(x)$  عامل من عوامل  $f(x)$  في كل مما يأتي:

5)  $f(x) = x^3 - 37x + 84$  ,  $h(x) = x + 7$

6)  $f(x) = 2x^3 - 5x^2 - x + 6$  ,  $h(x) = 2x - 3$

أحل كل اقتران مما يأتي تحليلًا كاملاً:

7)  $f(x) = x^3 + 3x^2 - 13x - 15$

8)  $g(x) = x^4 - 7x^3 + 13x^2 + 3x - 18$

9)  $h(x) = 2x^3 - 13x^2 + 17x + 12$

10)  $q(x) = 3x^3 - 18x^2 + 2x - 12$


أحل كلًا من المعادلات الآتية:

11)  $x^3 - 4x^2 - 7x + 10 = 0$

12)  $5x^3 - 15x^2 - 47x - 15 = 2x^3 - 10x^2$

13)  $3x^3 + 3x^2 - 14x - 8 = 0$

14)  $6x^3 - 13x^2 + x + 2 = 0$





15) يمثل الاقتران  $V(x) = 2x^3 + 5x^2 + 19x - 42$  حجم متوازي المستطيلات المجاور.

أكتب كثير حدود بالصورة القياسية يمثل المساحة الكلية للمتوازي.


أستعمل التمثيل البياني لمنحنى كل اقتران مما يأتي، لإيجاد أحد أصفاره النسبية، ثم أجد جميع أصفار الاقتران:

16)  $f(x) = 4x^3 - 20x + 16$


17)  $f(x) = 4x^3 - 12x - x + 15$



18)  $f(x) = 6x^3 + 25x^2 + 16x - 15$



19)  $f(x) = -3x^3 + 20x^2 - 36x + 16$



(20) إذا كان للمعادلة  $x^3 - 3x^2 + ax + b = 0$  حلان هما:  $x = 1$  ، و  $x = 4$  . أجد الحل الثالث للمعادلة.

(21) إذا كان باقي قسمة  $f(x) = x^3 + ax^2 + x + 5$  على  $x-1$  يساوي مثلي باقي قسمته على  $x + 1$  ، فما قيمة  $a$  ؟

(22) إذا كان باقي قسمة المقدار  $x^3 + ax^2 - 13x + b$  على  $(x+5)$  يساوي صفراً ، وباقي قسمة  $x^3 + bx^2 + ax + 10$  على  $(x-1)$  يساوي  $-1$  ، فما قيمة كل من  $a$  ، و  $b$  ؟



(23) **منحوتات جليدية**: تصنع بعض المنحوتات الجليدية عن طريق ملئ قالب بالماء ثم تجميده. إذا كانت

إحدى المنحوتات الجليدية على شكل هرم قاعدته مربعة الشكل، ارتفاعها يزيد 1 m عن طول

القاعدتها، أجد أبعاد المنحوتة إذا كان حجمها  $4 m^3$

للمصمم : أرجو تصميم قالب مشابه للصورة دون حذاء التزلج.

(24) أحل المعادلة  $\frac{x^3 - 35}{11 - x} = 3x$

ليكن  $f(x) = ax^3 + bx^2 - 9x - 9$  ، حيث  $a, b$  ثابت و  $a, b \neq 0$  .

(25) إذا كان  $(x-3)$  عاملاً من عوامل الاقتران  $f(x)$  ، فأبين أن  $3a + b = 4$

(26) إذا كان باقي قسمة  $f(x)$  على  $x - 2$  يساوي  $-15$  ، فأبين أن  $2a + b = 3$

(27) أجد قيمة كل من  $a$  ، و  $b$  .

(28) يزيد ارتفاع اسطوانة 5 cm على طول نصف قطر قاعدتها. إذا كان حجم الاسطوانة  $72\pi \text{ cm}^3$  ، فما أبعادها؟

### مهارات التفكير العليا

(29) **مسألة مفتوحة**: أكتب اقتراناً من الدرجة الثالثة يكون  $(x-3)$  أحد عوامله ويكون باقي قسمته على  $(x+1)$  يساوي  $-8$  .

(30) **أكتشف الخطأ**: أوجدت سهام الأصفار النسبية المحتملة للاقتران  $f(x) = -8x^6 + 7x^5 - 3x^4 + 45x^3 -$

$1500x^2 + 16x$  ، وكان حلها كالاتي:


$$f(x) = -8x^6 + 7x^5 - 3x^4 + 45x^3 - 1500x^2 + 16x$$

$$\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 8, \pm \frac{1}{4}, \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{1}{16}, \pm \frac{1}{8} \quad \text{X}$$

أبين الخطأ الذي وقعت فيه سهام وأصححه.

(31) **تحذ:** أجد ناتج قسمة  $4x^3 + 8x^2 - 41x + 28$  على  $x^2 + 3x - 4$  باستعمال طريقة الجدول.

(32) **تحذ:** أحل المقدار  $x^{13} - 15x^9 - 16x^5$



**مسألة اليوم:** يظهر في الشكل المجاور منحنى الاقتران  $v = \frac{t^2 - 5t + 6}{(t+2)(t^2 - 1)}$  ، الذي

يمثل العلاقة بين سرعة سيارة  $v$  بالكيلومتر لكل ساعة و الزمن  $t$  بالساعات. هل يمكن

كتابة الاقتران  $v$  على صورة مجموع مقدارين نسبيين مقام أحدهما  $(t + 2)$  ومقام

الآخر  $(t^2 - 1)$ ؟

**فكرة الدرس:** كتابة الاقتران النسبي الذي يمكن تحليل مقامه بصورة مجموع اقترانات نسبية أبسط.

**المصطلحات:** تجزئة المقادير النسبية، كسرًا جزئيًا

تعلمت سابقًا أن المقدار الجبري النسبي هو كسر بسطه ومقامه كثيري حدود، وتعلمت - أيضًا - أنه عند جمع مقدارين نسبيين بمقامين مختلفين أو طرحهما، يجب توحيد مقاميهما أولًا باستعمال المضاعف المشترك الأصغر (م. م. أ) للمقامين كما يأتي:

$$\begin{aligned} \frac{3}{x-4} - \frac{2}{x+2} &= \frac{3(x+2)}{(x-4)(x+2)} - \frac{2(x-4)}{(x+2)(x-4)} && \text{بتوحيد المقامين} \\ &= \frac{3x+6-2x+8}{(x-4)(x+2)} && \text{بطرح البسطين} \\ &= \frac{x+14}{(x-4)(x+2)} && \text{بالتبسيط} \end{aligned}$$

**تجزئة المقادير النسبية** (decomposition of rational expression) هي عملية عكسية للعملية السابقة وتكون بكتابة المقدار النسبي على صورة مجموع مقادير نسبية أبسط كل منها على صورة  $\frac{P(x)}{Q(x)}$  حيث  $P$  و  $Q$  كثيري حدود لا يوجد بينهما عوامل مشتركة، ودرجة  $P$  أقل من درجة  $Q$ ، ويسمى كل من هذه المقادير النسبية **كسرًا جزئيًا** (partial fraction)

$$\frac{x+14}{(x-4)(x+2)} = \frac{3}{x-4} + \frac{-2}{x+2}$$

كسر جزئي      كسر جزئي

**تجزئة المقدار النسبي** →

تعتمد عملية تجزئة المقادير النسبية على عوامل المقام، وسأتعلم في هذا الدرس ثلاث حالات مختلفة من تجزئة الكسور بحسب نوع عوامل المقام وهي:

- عوامل المقام كثيرات حدود خطية مختلفة.
- عوامل المقام كثيرات حدود خطية أحدها مكرر.

- عوامل المقام كثيرات حدود خطية وأحدها تربيعي غير قابل للتحليل ( مميزه سالب).

### تجزئة مقدار نسبي عوامل مقامه كثيرات حدود خطية مختلفة

إذا كانت جميع عوامل كثير الحدود في مقام المقدار النسبي خطية فإنه ينتج عن كل منها كسر جزئي بسطه ثابت ومقامه العامل الخطي على الصورة الآتية:

$$\frac{A}{ax + b}$$

ثابت

عامل خطي

| مفهوم أساسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | تجزئة مقدار نسبي عوامل مقامه كثيرات حدود خطية مختلفة |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <p>إذا كان <math>Q(x)</math> كثير حدود يمكن تحليله تحليلًا كاملاً دون تكرار إي عامل على الصورة الآتية:</p> $Q(x) = (a_1x + b_1)(a_2x + b_2)(a_3x + b_3) \dots (a_nx + b_n)$ <p>فإنه يمكن تجزئة المقدار النسبي <math>\frac{P(x)}{Q(x)}</math> حيث درجة <math>P</math> أقل من درجة <math>Q</math> ، على الصورة الآتية:</p> $\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A_1}{a_1x + b_1} + \frac{A_2}{a_2x + b_2} + \frac{A_3}{a_3x + b_3} + \dots + \frac{A_n}{a_nx + b_n}$ |                                                      |

مثال 1:

أجزئ  $\frac{2x-13}{x^2-x-2}$  إلى كسور جزئية.

الخطوة 1: أحلل المقام تحليلًا كاملاً.

$$\frac{2x - 13}{x^2 - x - 2} = \frac{2x - 13}{(x - 2)(x + 1)}$$

بتحليل ثلاثي الحدود

الخطوة 2: أبدأ بإعداد تجزئة للمقدار النسبي باستعمال ثوابت غير معروفة، بحيث أكتب ثابتاً في بسط كل عامل خطي في المقام.

$$\frac{2x - 13}{(x - 2)(x + 1)} = \frac{A}{(x - 2)} + \frac{B}{(x + 1)}$$

الخطوة 3: أضرب طرفي المعادلة في المضاعف المشترك الأصغر للمقام.

بضرب طرفي المعادلة في (م.م.أ) للمقام وهو  $(x-2)(x+1)$ :

$$(x-2)(x+1) \frac{2x-13}{(x-2)(x+1)} = (x-2)(x+1) \left( \frac{A}{(x-2)} + \frac{B}{(x+1)} \right)$$

باستعمال خاصية التوزيع على طرف الأيمن من المعادلة والاختصار:

$$\cancel{(x-2)}\cancel{(x+1)} \frac{2x-13}{\cancel{(x-2)}\cancel{(x+1)}} = \cancel{(x-2)}(x+1) \frac{A}{\cancel{(x-2)}} + (x-2)\cancel{(x+1)} \frac{B}{\cancel{(x+1)}}$$

المعادلة الناتجة هي:

$$2x - 13 = A(x + 1) + B(x - 2)$$

**الخطوة 4:** أجد قيمة كل من الثابتين A و B باستعمال التعويض

• بتعويض  $x = 2$  في المعادلة الناتجة

$$2(2) - 13 = A(2 + 1) + B(2 - 2)$$

بتعويض  $x = 2$

$$-9 = 3A$$

بالتبسيط

$$A = -3$$

بقسمة طرفي المعادلة على 3

**أتعلم:** للمصمم أتعلم في هامش النقطة السابقة.

تعويض  $x = 2$  يحذف المتغير B ويجعل المعادلة بمتغير واحد وهو A ؛ مما يجعل إيجاد قيمته أسهل.

• بتعويض  $x = -1$  في المعادلة الناتجة.

$$2(-1) - 13 = A(-1 + 1) + B(-1 - 2)$$

بتعويض  $x = -1$

$$-15 = -3B$$

بالتبسيط

$$B = 5$$

بقسمة طرفي المعادلة على 3

**أتعلم:** للمصمم أتعلم في هامش النقطة السابقة.

تعويض  $x = -1$  يحذف المتغير A ويجعل المعادلة بمتغير واحد وهو B ؛ مما يجعل إيجاد قيمته أسهل.

إذن، يمكن تجزئة المقدار النسبي يكون على الصورة الآتية:

$$\frac{2x-13}{(x-2)(x+1)} = \frac{-3}{(x-2)} + \frac{5}{(x+1)}$$

**أنتحق من فهمي:**

أجزئ  $\frac{x}{x^2-5x+6}$  إلى كسور جزئية.

ألاحظ أن مقام المقدار النسبي في المثال السابق كثير حدود من الدرجة الثانية ( ثلاثي حدود)؛ لذا كان تحليله مباشراً، أما إذا كان مقام المقدار النسبي كثير حدود من الدرجة الثالثة فتحليله يكون إما بإخراج عامل مشترك أو باستعمال التجميع، أو استعمال نظرية الأصفار النسبية ونظرية العوامل.

**مثال 2:**

أجزئ  $\frac{3x^2+2x-1}{x^3-6x^2+11x-6}$  إلى كسور جزئية.

**الخطوة 1:** أحلل المقام تحليلًا كاملاً.

بما أن المقام  $Q(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$  كثير حدود من الدرجة الثالثة ولا يمكن تحليله بإخراج العامل المشترك أو التجميع؛ إذن أستعمل نظرية الأصفار النسبية لإيجاد أحد أصفار المقام، ثم إيجاد أصفاره الأخرى باستعمال القسمة والتحليل.

**أولاً:** أجد الأصفار النسبية المحتملة لكثير الحدود في المقام.

بما أن معامل الحد الرئيس 1، فإن الأصفار النسبية المحتملة هي عوامل الحد الثابت والذي يساوي (-6).

إذن الأصفار النسبية المحتملة لكثير الحدود  $P(x)$  هي:

$$\mp 1, \mp 2, \mp 3, \mp 6$$

**ثانياً:** أكون جدولاً لاختبار بعض الأصفار النسبية المحتملة.

| $p$ | $Q(p)$                                        | هل $p$ صفر<br>لكثير<br>الحدود؟ |
|-----|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| -1  | $Q(-1) = (-1)^3 - 6(-1)^2 + 11(-1) - 6 = -24$ | ✗                              |
| 1   | $Q(1) = (1)^3 - 6(1)^2 + 11(1) - 6 = 0$       | ✓                              |

بما أن  $Q(1) = 0$ ، إذن فإنه يوجد لكثير الحدود صفر عند  $x = 1$ ، إذن  $x-1$  عامل من عوامل  $Q(x)$ .

**ثالثاً:** أحلل كثير الحدود في المقام تحليلًا كاملاً

بما أن  $x-1$  عامل من عوامل  $Q(x)$ ، فإنه يمكن إيجاد العوامل الأخرى بقسمة  $Q(x)$  على  $x-1$  ثم تحليل كثير الناتج إن أمكن:

|     |        |         |      |   |
|-----|--------|---------|------|---|
|     | $x^2$  | $-5x$   | 6    |   |
| $x$ | $x^3$  | $-5x^2$ | $6x$ | 0 |
| -1  | $-x^2$ | $5x$    | -6   |   |

ناتج القسمة يساوي  $x^2 - 5x + 6$ ، ومنه فإنه يمكن تحليل كثير الحدود  $Q(x)$  كما يلي:

$$\begin{aligned} Q(x) &= x^3 - 6x^2 + 11x - 6 && \text{كثير الحدود في المقام} \\ &= (x - 1)(x^2 - 5x + 6) && \text{التحليل باستعمال القسمة} \\ &= (x - 1)(x - 2)(x - 3) && \text{بتحليل ثلاثي الحدود} \end{aligned}$$

إذن، تحليل كثير الحدود في المقام  $Q(x) = (x - 1)(x - 2)(x - 3)$

ومنه فإنه يمكن كتابة المقدار النسبي على الصورة الآتية:

$$\frac{3x^2 + 2x - 1}{x^3 - 6x^2 + 11x - 6} = \frac{3x^2 + 2x - 1}{(x - 1)(x - 2)(x - 3)}$$

**الخطوة 2:** أبدأ بإعداد تجزئة للمقدار النسبي باستعمال ثوابت غير معروفة، بحيث أكتب ثابتاً في بسط كل عامل خطي في المقام.

$$\frac{3x^2 + 2x - 1}{(x - 1)(x - 2)(x - 3)} = \frac{A}{(x - 1)} + \frac{B}{(x - 2)} + \frac{C}{(x - 3)}$$

**الخطوة 3:** أضرب طرفي المعادلة في المضاعف المشترك الأصغر للمقام.

بضرب طرفي المعادلة في (م.م.أ) للمقام وهو  $(x - 1)(x - 2)(x - 3)$ :

$$(x - 1)(x - 2)(x - 3) \frac{3x^2 + 2x - 1}{(x - 1)(x - 2)(x - 3)} = (x - 1)(x - 2)(x - 3) \left( \frac{A}{(x - 1)} + \frac{B}{(x - 2)} + \frac{C}{(x - 3)} \right)$$

باستعمال خاصية التوزيع على طرف الأيمن من المعادلة والاختصار، فإن المعادلة الناتجة هي:

$$3x^2 + 2x - 1 = A(x - 2)(x - 3) + B(x - 1)(x - 3) + C(x - 1)(x - 2)$$

**الخطوة 4:** أجد قيمة كل من الثوابت  $A$  و  $B$  و  $C$  باستعمال التعويض

• بتعويض  $x = 1$  في المعادلة الناتجة

$$3(1)^2 + 2(1) - 1 = A(1 - 2)(1 - 3) + B(1 - 1)(1 - 3) + C(1 - 1)(1 - 2) \quad \text{بتعويض } x = 1$$

$$4 = 2A$$

$$A = 2$$

بالتبسيط

بقسمة طرفي

المعادلة على 2

• بتعويض  $x = 2$  في المعادلة الناتجة.

$$3(2)^2 + 2(2) - 1 = A(2 - 2)(2 - 3) + B(2 - 1)(2 - 3) + C(2 - 1)(2 - 2) \quad \text{بتعويض } x = 2$$

$$B = -15 \quad \text{بالتبسيط}$$

• بتعويض  $x = 3$  في المعادلة الناتجة.

$$3(3)^2 + 2(3) - 1 = A(3 - 2)(3 - 3) + B(3 - 1)(3 - 3) + C(3 - 1)(3 - 2) \quad \text{بتعويض } x = 3$$

$$32 = 2C \quad \text{بالتبسيط}$$

$$C = 16 \quad \text{بقسمة طرفي المعادلة على 2}$$

إذن، يمكن تجزئة المقدار النسبي على الصورة الآتية:

$$\frac{3x^2 + 2x - 1}{(x - 1)(x - 2)(x - 3)} = \frac{2}{(x - 1)} + \frac{-15}{(x - 2)} + \frac{16}{(x - 3)}$$

أتحقق من فهمي

أجزئ  $\frac{x^2 + x - 6}{x^3 + 5x^2 + 2x - 8}$  إلى كسور جزئية.

تجزئة مقدار نسبي عوامل مقامه كثيرات حدود خطية أحدها مكرر.

في بعض الحالات ينتج عن التحليل الكامل لمقام المقدار النسبي، بعض العوامل الخطية المكررة.

| مفهوم أساسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تجزئة مقدار نسبي عوامل مقامه كثيرات حدود خطية بعضها مكرر |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <p>يمكن تجزئة المقدار النسبي <math>\frac{P(x)}{Q(x)}</math> حيث يحوي التحليل الكامل لـ <math>Q(x)</math> عوامل خطية مكررة <math>n</math> من المرات، ودرجة <math>P</math> أقل من درجة <math>Q</math> على الصورة الآتية:</p> $\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A_1}{ax + b} + \frac{A_2}{(ax + b)^2} + \frac{A_3}{(ax + b)^3} + \dots + \frac{A_n}{(ax + b)^n}$ |                                                          |

مثال 3:

أجزئ  $\frac{-x^2+2x+4}{x^3-4x^2+4x}$  إلى كسور جزئية.

الخطوة 1: أحلل المقام تحليلًا كاملاً.

$$\begin{aligned}\frac{-x^2+2x+4}{x^3-4x^2+4x} &= \frac{-x^2+2x+4}{x(x^2-4x+4)} \\ &= \frac{-x^2+2x+4}{x(x-2)(x-2)} = \frac{-x^2+2x+4}{x(x-2)^2}\end{aligned}$$

بإخراج x عاملاً مشتركاً

بتحليل ثلاثي الحدود

الخطوة 2: أبدأ بإعداد تجزئة للمقدار النسبي باستعمال ثوابت غير معروفة، بحيث أكتب ثابتاً في بسط كل عامل خطي في المقام.

ألاحظ أن تحليل المقام  $x(x-2)^2$ ، وأن العامل  $(x-2)$  مكرر مرتين؛ لذا يجب أن تحتوي التجزئة على ثلاث مقامات وهي:  
 $x, (x-2), (x-2)^2$

$$\frac{-x^2+2x+4}{x(x-2)^2} = \frac{A}{x} + \frac{B}{(x-2)} + \frac{C}{(x-2)^2}$$

الخطوة 3: أضرب طرفي المعادلة في المضاعف المشترك الأصغر للمقام.

بضرب طرفي المعادلة في (م.م.أ) للمقام وهو  $x(x-2)^2$ :

$$x(x-2)^2 \frac{-x^2+2x+4}{x(x-2)^2} = x(x-2)^2 \left( \frac{A}{x} + \frac{B}{(x-2)} + \frac{C}{(x-2)^2} \right)$$

باستعمال خاصية التوزيع على طرف الأيمن من المعادلة والاختصار، فإن المعادلة الناتجة هي:

$$-x^2+2x+4 = A(x-2)^2 + Bx(x-2) + Cx$$

الخطوة 4: أجد قيمة كل من الثوابت A و B و C باستعمال التعويض

• بتعويض  $x = 0$  في المعادلة الناتجة

$$-(0)^2 + 2(0) + 4 = A(0-2)^2 + B(0)(0-2) + C(0)$$

بتعويض  $x = 0$

$$4 = 4A$$

بالتبسيط

$$A = 1$$

بقسمة طرفي المعادلة على 4

- بتعويض  $x = 2$  في المعادلة الناتجة.

$$-(2)^2 + 2(2) + 4 = A(2-2)^2 + B(2)(2-2) + C(2)$$

$$4 = 2C$$

$$C = 2$$

بتعويض  $x = 0$

بالتبسيط

بقسمة طرفي المعادلة على 2

- بتعويض أي قيمة أخرى للمتغير  $x$  (مثلاً  $x = 1$ ) في المعادلة الناتجة إضافة إلى تعويض قيمتي  $A$  و  $C$  الناتجتين.

$$-(1)^2 + 2(1) + 4 = (1)(1-2)^2 + B(1)(1-2) + (2)(1) \quad \text{بتعويض } x=0, A=1, C=2$$

$$5 = 3 - B$$

$$2 = -B$$

$$B = -2$$

بالتبسيط

ب طرح -3 من طرفي المعادلة

بقسمة طرفي المعادلة على -1

إذن، يمكن تجزئة المقدار النسبي على الصورة الآتية:

$$\frac{-x^2 + 2x + 4}{x(x-2)^2} = \frac{1}{x} + \frac{-2}{(x-2)} + \frac{2}{(x-2)^2}$$

**أتعلم:** للمصمم في هامش الخطوة 2

أتجنب الخطأ الشائع الآتي:

$$\frac{-x^2 + 2x + 4}{x(x-2)^2} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-2} + \frac{C}{x-2}$$

تكرار العامل الخطي دون استعمال القوة لا يعطي تجزئة صحيحة للمقدار النسبي

**أتحقق من فهمي:**

$$\text{أجزئ } \frac{x^2+8x+4}{x^3-2x^2} \text{ إلى كسور جزئية.}$$

**تجزئة مقدار نسبي أحد عوامل مقامه كثير حدود تربيعي غير مكرر وغير قابل للتحليل.**

تعلمت في الأمثلة السابقة تجزئة مقادير نسبية جميع عوامل مقاماتها خطية، ولكن في بعض الحالات قد ينتج عن تحليل المقام عامل تربيعي لا يمكن تحليله، في هذه الحالة ينتج عن العامل التربيعي كسر جزئي بسطه كثير حدود خطي على الصورة  $Ax + B$  ومقامه العامل التربيعي.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| مفهوم أساسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | تجزئة مقدار نسبي عوامل مقامه كثيرات حدود خطية بعضها مكرر |
| <p>يمكن تجزئة المقدار النسبي <math>\frac{P(x)}{Q(x)}</math> حيث يحوي التحليل الكامل لـ <math>Q(x)</math> عاملاً تربيعياً غير مكرر لا يمكن تحليله، ودرجة <math>P</math> أقل من درجة <math>Q</math> على الصورة الآتية:</p> $\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A_1x + B_1}{a_1x^2 + b_1x + c_1} + \frac{A_2x + B_2}{a_2x^2 + b_2x + c_2} + \dots + \frac{A_nx + B_n}{a_nx^2 + b_nx + c_n}$ |                                                          |

مثال 4:

أجزئ  $\frac{x^2 - 3x + 16}{(x+1)(x^2+9)}$  إلى كسور جزئية.

بما أن المقدار النسبي يحتوي عاملاً تربيعياً لا يمكن تحليله في مقامه، إذن سيكون بسط أحد الكسور الجزئية ثابتاً، والآخر مقداراً خطياً.

**الخطوة 1:** أبدأ بإعداد تجزئة للمقدار النسبي باستعمال ثوابت غير معروفة، بحيث أكتب ثابتاً في بسط العامل الخطي ومقداراً خطياً في بسط العامل التربيعي.

$$\frac{x^2 - 3x + 16}{(x+1)(x^2+9)} = \frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2+9}$$

**الخطوة 2:** أضرب طرفي المعادلة في المضاعف المشترك الأصغر للمقام.

بضرب طرفي المعادلة في (م.م.أ) للمقام وهو  $(x+1)(x^2+9)$ :

$$(x+1)(x^2+9) \frac{x^2 - 3x + 16}{(x+1)(x^2+9)} = (x+1)(x^2+9) \left( \frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2+9} \right)$$

باستعمال خاصية التوزيع على طرف الأيمن من المعادلة والاختصار، فإن المعادلة الناتجة هي:

$$x^2 - 3x + 16 = A(x^2 + 9) + (Bx + C)(x + 1)$$

**الخطوة 3:** أجد قيمة كل من الثوابت  $A$  و  $B$  و  $C$  باستعمال التعويض

• بتعويض  $x = -1$  في المعادلة الناتجة

$$(-1)^2 - 3(-1) + 16 = A((-1)^2 + 9) + (B(-1) + C)(-1 + 1)$$

بتعويض  $x = -1$

$$20 = 10A$$

بالتبسيط

$$A = 2$$

بقسمة طرفي المعادلة على 2

- بتعويض  $x = 0$  و قيمة  $A$  في المعادلة الناتجة.

$$\begin{aligned} (0)^2 - 3(0) + 16 &= 2((0)^2 + 9) + (B(0) + C)(0 + 1) && \text{بتعويض } x = 0, A = 2 \\ 16 &= 18 + C && \text{بالتبسيط} \\ C &= -2 && \text{ب طرح 18 من طرفي المعادلة} \end{aligned}$$

- بتعويض أي قيمة أخرى للمتغير  $x$  (مثلاً  $x = 1$ ) في المعادلة الناتجة إضافة إلى تعويض قيمتي  $A$  و  $C$  الناتجتين.

$$\begin{aligned} (1)^2 - 3(1) + 16 &= 2((1)^2 + 9) + (B(1) + (-2))(1 + 1) && \text{بتعويض } x = 0, A = 2, C = -2 \\ 14 &= 2B + 16 && \text{بالتبسيط} \\ -2 &= 2B && \text{ب طرح 16 من طرفي المعادلة} \\ B &= -1 && \text{بقسمة طرفي المعادلة على -1} \end{aligned}$$

إذن، يمكن تجزئة المقدار النسبي على الصورة الآتية:

$$\frac{x^2 - 3x + 16}{(x + 1)(x^2 + 9)} = \frac{2}{x + 1} + \frac{-x - 1}{(x^2 + 9)}$$

أتحقق من فهمي:

$$\text{أجزئ } \frac{21-7x}{(x+5)(x^2+3)} \text{ إلى كسور جزئية.}$$

**تجزئة مقدار نسبي درجة كثير الحدود في بسطه مساوية لدرجة كثير الحدود في مقامه أو أكبر منها.**

تعلمت في الأمثلة السابقة تجزئة مقادير نسبية مختلفة، على صورة  $\frac{P(x)}{Q(x)}$  حيث  $P$  و  $Q$  كثيري حدود لا يوجد بينهما عوامل مشتركة، ودرجة  $P$  أقل من درجة  $Q$ ، ولكن إذا كانت درجة  $P$  مساوية لدرجة  $Q$  أو أكبر منها، فيجب أولاً تجهيز المقدار النسبي باستعمال القسمة الطويلة بقسمة  $P$  على  $Q$

**مثال 5:**

$$\text{أجزئ } \frac{x^2+13x+6}{x^2+6x-16} \text{ إلى كسور جزئية}$$

بما أن درجة البسط مساوية لدرجة المقام، إذن أقسم البسط على المقام أولاً، ثم أجزئ.

**الخطوة 1:** أقسم البسط على المقام باستعمال القسمة الطويلة، ثم أكتب الكسر الناتج بصورة مجموع ناتج القسمة مع كسر يمثل باقي القسمة.

$$\begin{array}{r} 2 \\ x^2 + 6x - 16 \overline{) 2x^2 + 13x + 6} \\ \underline{(-) 2x^2 + 12x - 32} \phantom{6} \\ x + 38 \end{array}$$

إذن ناتج القسمة 2 والباقي  $x + 38$  ومنه:

$$\frac{x^2 + 13x + 6}{x^2 + 6x - 16} = 2 + \frac{x + 38}{x^2 + 6x - 16}$$

**الخطوة 2:** أحل مقام باقي القسمة تحليلًا كاملاً، وأبدأ بإعداد تجزئة للمقدار النسبي باستعمال ثوابت غير معروفة، بحيث أكتب ثابتاً في بسط كل عامل خطي في المقام.

$$\frac{x + 38}{x^2 + 6x - 16} = \frac{x + 38}{(x + 8)(x - 2)}$$

$$\frac{x + 38}{(x + 8)(x - 2)} = \frac{A}{x + 8} + \frac{B}{x - 2}$$

**الخطوة 3:** أضرب طرفي المعادلة في المضاعف المشترك الأصغر للمقام.

بضرب طرفي المعادلة في (م.م.أ) للمقام وهو  $(x+8)(x-2)$ :

$$(x + 8)(x - 2) \frac{x + 38}{(x + 8)(x - 2)} = (x + 8)(x - 2) \left( \frac{A}{x + 8} + \frac{B}{x - 2} \right)$$

باستعمال خاصية التوزيع على طرف الأيمن من المعادلة والاختصار، فإن المعادلة الناتجة هي:

$$x + 38 = A(x - 2) + B(x + 8)$$

**الخطوة 4:** أجد قيمة كل من الثابتين A و B باستعمال التعويض

• بتعويض  $x = -8$  في المعادلة الناتجة

$$-8 + 38 = A(-8 - 2) + B(-8 + 8)$$

بتعويض  $x = -8$

$$30 = -10A$$

بالتبسيط

$$A = -3$$

بقسمة طرفي المعادلة على 10

• بتعويض  $x = 2$  في المعادلة الناتجة

$$2 + 38 = A(2 - 2) + B(2 + 8)$$

بتعويض  $x = 2$

$$40 = 10B$$

بالتبسيط

$$B = 4$$

بقسمة طرفي المعادلة على 10

إذن، يمكن تجزئة المقدار النسبي على الصورة الآتية:

$$\frac{x^2 + 13x + 6}{x^2 + 6x - 16} = 2 + \frac{-3}{x + 8} + \frac{4}{x - 2}$$

أتحقق من فهمي:

$$\text{أجزئ } \frac{3x^2 + 12x + 4}{x^2 + x} \text{ إلى كسور جزئية.}$$

أتدرب وأحل المسائل

أجزئ كلاً من المقادير النسبية الآتية إلى كسور جزئية:

$$1) \frac{2x - 5}{(x + 2)(x + 3)}$$

$$2) \frac{6x - 12}{(x - 1)(x + 5)}$$

$$3) \frac{3 - 5x}{(x - 3)(x - 7)}$$

$$4) \text{ أبين أن المقدار } \frac{11 - 2x}{(x - 2)(x + 5)} \text{ يكتب بالصورة } \frac{A}{x - 2} + \frac{B}{x + 5}, \text{ وأجد قيمة كل من } A, \text{ و } B.$$

أجزئ كلاً من المقادير النسبية الآتية إلى كسور جزئية:

$$5) \frac{2 - 3x}{(2x + 1)(3 - x)}$$

$$6) \frac{2x + 22}{x^2 + 2x}$$

$$7) \frac{4x - 30}{x^2 - 8x + 15}$$

$$8) \text{ أكتب كلاً من } \frac{1}{x^2 - 9}, \text{ و } \frac{1}{x^2 - 16} \text{ بصورة كسور جزئية. ماذا ألاحظ؟}$$

أجزئ كلاً من المقادير النسبية الآتية إلى كسور جزئية:

$$9) \frac{2x^2 - 4x + 8}{(x - 1)(x - 2)(x - 3)}$$

$$10) \frac{2 - 3x - 4x^2}{x(x - 1)(1 - 2x)}$$

$$11) \frac{6 - 6x - 5x^2}{(x - 1)(x - 2)(x + 4)}$$

$$12) \text{ أبين أنه يمكن كتابة } \frac{1}{x^2 - a^2} \text{ بالصورة } \frac{1}{2a(x - a)} - \frac{1}{2a(x + a)} \text{ حيث } a \text{ عدد حقيقي.}$$

(13) أجزئ  $\frac{5+3x-x^2}{-x^3+5x^2+4x-12}$  إلى كسور جزئية، شارحاً ومبرّراً جميع خطوات الحل.

(14) أبين أنه لا يمكن كتابة  $\frac{5}{x^2-x+10}$  بصورة كسور جزئية مبرّراً إجالتى.

(15) أبين أنه يمكن كتابة  $\frac{x^2+x-6}{x^3+5x^2+2x-8}$  بصورة كسور جزئية.

(16) أجد معامل  $\frac{1}{2x+1}$  عند تجزئة  $\frac{1}{2x^3-3x^2-32x-15}$  إلى كسور جزئية.

(17) أبين أنه يمكن كتابة  $\frac{x^2+8x+4}{x^2(x-2)}$  بالصورة  $\frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x-2}$ ، وأجد قيمة كل من A، B، و C.

(18) إذا كان  $\frac{5x}{(x+3)^2} \equiv \frac{p}{x+3} - \frac{3p}{(x+3)^2}$ ، فما قيمة p ؟

أكتب كلاً مما يأتي بصورة كسور جزئية:

19)  $\frac{7x-3}{x^2-8x+16}$

20)  $\frac{2x^2+6x-5}{(x-2)^3}$

21)  $\frac{1}{x^2-6x+9}$

22)  $\frac{1}{x^2-6x+9}$

23)  $\frac{1}{(x+1)(x-2)^2}$

24)  $\frac{2x^2-x-6}{x^3+4x^2+4x}$

(25) أجد معامل  $\frac{1}{(x+5)^2}$  عند تجزئة  $\frac{x^2+7x-1}{(x+5)^3}$  إلى كسور جزئية.

(26) أبين أنه يمكن كتابة  $\frac{x^2-5x+6}{(x+2)(x^2+1)}$  بالصورة  $\frac{Ax+B}{x^2+1} + \frac{C}{x+2}$ ، وأجد قيمة كل من A، B، و C.

(27) إذا كان  $\frac{x^2+8x+7}{(x-1)^2(x^2+2)} \equiv \frac{px-37}{9(x^2+2)} - \frac{p}{9(x-1)} + \frac{8p}{3(x-1)^2}$ ، فما قيمة p ؟

(28) أجد معامل  $\frac{1}{x^2+2}$  عند تجزئة  $\frac{1}{(x^2+2)(2x-1)}$  إلى كسور جزئية.

اكتب كلاً مما يأتي بصورة كسور جزئية:

29)  $\frac{6x^2-7x+10}{(x-2)(x^2+1)}$

30)  $\frac{x^2+3x-5}{(x-1)(x^2+3)}$

31)  $\frac{(x-3)^2}{x(x^2-6)}$

$$32) \frac{3x-1}{(x+5)(x^2-1)}$$

$$33) \frac{3x^2+x-4}{x^2-2x}$$

$$34) \frac{x^3+12x^2+33x+2}{x^2+8x+15}$$

35) هل يمكن كتابة  $\frac{x^2-5}{x(x^2-3)}$  بصورة كسور جزئية؟ أبرر إجابتي.

36) أحل المسألة الواردة في بداية الدرس.


#### مسائل مهارات التفكير العليا

تبرير أعدد إن كانت العبارات الآتية صحيحة أم غير صحيحة مبرراً إجابتي:

$$37) \frac{2x^2-x-6}{x^3+4x^2+4x} = \frac{-3}{x} + \frac{7}{x+2} + \frac{2}{(x+2)^2}$$

$$38) \frac{x^2-7x+6}{(x+3)(x^2+1)} = \frac{18}{5(x+3)} + \frac{4-13x}{5(x^2+1)}$$

39) مسألة مفتوحة أكتب اقتراناً نسبياً بالصورة  $\frac{f(x)}{g(x)}$  بحيث تحتوي مقامات كسوره الجزئية على عوامل خطية غير مكررة.




40) حدد أي الاقترانات الآتية ينتج من تفكيكه إلى كسور جزئية الاقترانين الممثلين بالرسمين المجاورين؟

$$a) f(x) = \frac{6}{x^2-2x-3}$$

$$b) f(x) = \frac{6}{x^2+2x-3}$$

$$c) f(x) = \frac{6}{x^2-4x+3}$$

$$d) f(x) = \frac{6}{x^2+4x+3}$$



## Transformations of Functions

**فكرة الدرس:** رسم منحنيات اقترانات باستعمال التحويلات الهندسية، وكتابة معادلة التحويل لمنحنى معطى.

**المصطلحات:** الاقتران الرئيس، تحويل قياسي، تحويل غير قياسي، الإزاحة، الانعكاس، التمدد، توسع رأسي، تضيق رأسي، توسع أفقي، تضيق أفقي

**مسألة اليوم:** أسقطت كرة من ارتفاع 145 m عن سطح الأرض، وكان ارتفاعها عن سطح الأرض بعد t ثانية يعطى

بالاقتار  $h(t) = -4.9 t^2 + 145$ . أصف التحويلات التي تمت على الاقتران

$f(t) = t^2$  للحصول على  $h(t)$ .

مجموعة الاقترانات التي تتشابه منحنياتها في صفة واحدة أو أكثر تسمى عائلة اقترانات، ويسمى أبسط اقترانات هذه العائلة







**الاقتران الرئيس** parent function. فمثلاً الاقترانات

$f(x) = x + 3$ ,  $g(x) = 5x$ ,  $h(x) = 5x - 4$ ,  $j(x) = -7x - 1$ ,

الخطية، والاقتران الرئيس لها هو الاقتران  $f(x) = x$  الذي يسمى الاقتران المحايد.

وبالمثل فإن الاقتران الرئيس لعائلة الاقترانات التربيعية هو  $f(x) = x^2$ ، وللاقتارات التكعيبية  $f(x) = x^3$ . يبين الجدول الآتي





بعض الاقترانات الرئيسة التي تعرفتها سابقاً ومنحنياتها.

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>الاقتران التربيعي<br/><math>f(x) = x^2</math></p>      |  <p>الاقتران المحايد<br/><math>f(x) = x</math></p>             |
|  <p>اقتران المقلوب<br/><math>f(x) = \frac{1}{x}</math></p> |  <p>الاقتران التكعيبى<br/><math>f(x) = x^3</math></p>          |
|  <p>اقتران القيمة المطلقة<br/><math>f(x) =  x </math></p>  |  <p>اقتران الجذر التربيعي<br/><math>f(x) = \sqrt{x}</math></p> |

سأتعرف في هذا الدرس على عدد من التحويلات الهندسية التي تساعدني في رسم منحنيات اقترانات أكثر تعقيداً اعتماداً على منحنى الاقتران الرئيس للعائلة.

تؤثر هذه التحويلات في شكل منحنى الاقتران الرئيس، فبعضها يغير موقع المنحنى فقط ولا يغير في شكله وأبعاده وتسمى تحويلات **قياسية rigid**، وبعضها يغير شكل المنحنى بحيث يبدو أوسع من منحنى الاقتران الرئيس أو أضيق منه. وتسمى التحويلات التي تغير الشكل تحويلات **غير قياسية nonrigid**.


أحد التحويلات القياسية هو **الإزاحة translation** التي تنقل المنحنى من موقع إلى آخر. فالإزاحة الرأسية تنقل المنحنى إلى أعلى أو إلى أسفل، في حين تنقل الإزاحة الأفقية المنحنى يمينًا أو يسارًا.

| الإزاحة الرأسية (إضافة عدد حقيقي للإحداثي y)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الإزاحة الأفقية (إضافة عدد حقيقي للإحداثي x)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>في الإزاحة الرأسية <math>g(x) = f(x) + k</math> تتحرك كل نقطة من منحنى <math>f(x)</math> بمقدار <math>k</math> وحدة إلى أعلى.</p>  <p>وفي الإزاحة الرأسية <math>g(x) = f(x) - k</math> تتحرك كل نقطة من منحنى <math>f(x)</math> بمقدار <math>k</math> وحدة إلى أسفل.</p>  | <p>في الإزاحة الأفقية <math>g(x) = f(x + h)</math> تتحرك كل نقطة من منحنى <math>f(x)</math> بمقدار <math>h</math> وحدة إلى اليسار.</p>  <p>وفي الإزاحة الأفقية <math>g(x) = f(x - h)</math> تتحرك كل نقطة من منحنى <math>f(x)</math> بمقدار <math>h</math> وحدة إلى اليمين.</p>  |

## مثال 1


أستعمل منحنى الاقتران الرئيس  $f(x) = |x|$  لأمثل كلاً من الاقترانات الآتية بيانياً:

1)  $g(x) = |x| + 3$




هذا الاقتران على الصورة  $g(x) = f(x) + k$ ، ولذلك فإن منحناه يمثل إزاحة لمنحنى  $f(x) = |x|$  بمقدار 3 وحدات إلى أعلى، فسوف يزيد الإحداثي  $y$  لكل نقطة بمقدار 3، فالنقطة  $(0, 0)$  ستنتقل إلى  $(0, 3)$ ، والنقطة  $(1, 1)$  ستنتقل إلى  $(1, 4)$ ، وهكذا...

2)  $g(x) = |x+2|$



هذا الاقتران على الصورة  $g(x) = f(x+k)$ ، ولذلك فإن منحناه يمثل إزاحة لمنحنى  $f(x) = |x|$  بمقدار وحدتين إلى اليسار، فسوف ينقص الإحداثي  $x$  لكل نقطة بمقدار 2، فالنقطة  $(0, 0)$  ستنتقل إلى  $(-2, 0)$ ، والنقطة  $(-2, 2)$  ستنتقل إلى  $(-4, 2)$ ، وهكذا...

3)  $g(x) = |x-3| - 2$



هذا الاقتران على الصورة  $g(x) = f(x-h) - k$ ، ولذلك فإن منحناه يمثل إزاحة لمنحنى  $f(x) = |x|$  بمقدار 3 وحدات إلى اليمين، ثم وحدتين إلى أسفل، فسوف يزيد الإحداثي  $x$  لكل نقطة بمقدار 3 وينقص الإحداثي  $y$  لها بمقدار 2، فالنقطة  $(0, 0)$  ستنتقل إلى  $(3, -2)$ ، والنقطة  $(1, 1)$  ستنتقل إلى  $(4, -1)$ ، وهكذا...

**أتحقق من فهمي**


أستعمل منحنى الاقتران الرئيس  $f(x) = x^2$  لأمثل كلاً من الاقترانات الآتية بياناً:

a)  $g(x) = x^2 + 2$

b)  $g(x) = (x-2)^2$

c)  $g(x) = (x+1)^2 - 3$

هناك تحويل قياسي آخر هو الانعكاس الذي يكون لمنحنى الاقتران صورة مرآة بالنسبة إلى مستقيم معلوم.

| الانعكاس حول المحور $y$                                                                                                                                                                       | الانعكاس حول المحور $x$                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| يحول النقطة $(x, y)$ إلى $(-x, y)$                                                                                                                                                            | يحول النقطة $(x, y)$ إلى $(x, -y)$                                                                                                                                                              |
|  <p>منحنى <math>g(x) = f(-x)</math> هو صورة منحنى <math>f(x)</math> بالانعكاس حول المحور <math>y</math>.</p> |  <p>منحنى <math>g(x) = -f(x)</math> هو صورة منحنى <math>f(x)</math> بالانعكاس حول المحور <math>x</math>.</p> |

## مثال 2


أستعمل منحنى الاقتران الرئيس  $f(x) = \sqrt{x}$  لأمثل كلاً من الاقترانات الآتية بيانياً:

1)  $g(x) = -\sqrt{x}$



هذا الاقتران على الصورة  $g(x) = -f(x)$  فمنحناه صورة منحنى  $f(x) = \sqrt{x}$  بالانعكاس حول المحور  $x$ .

2)  $g(x) = \sqrt{2-x}$



أكتب الاقتران على الصورة  $g(x) = \sqrt{-(x-2)}$  فيصبح على الصورة  $g(x) = f(-(x-2))$  (منحنى  $f(x) = \sqrt{x}$  بالانعكاس حول المحور  $y$  متبوعاً بإزاحة بمقدار وحدتين يميناً).

## أتحقق من فهمي

أستعمل منحنى الاقتران  $f(x) = x^3$  لأمثل كلاً من الاقترانين الآتين بيانياً:



a)  $g(x) = -(x+2)^3$

b)  $g(x) = (3-x)^3 + 2$

والتمدد تحويل هندسي غير قياسي يغير الشكل حيث يؤدي إلى توسعه (تكبيره) أو تضيقه (انكماشه).



### التمدد الرأسي

إذا كان  $a$  عددًا حقيقيًا موجبًا فإن منحنى الاقتران  $g(x) = af(x)$  الناتج من ضرب الإحداثي  $y$  لكل نقطة على منحنى  $f(x)$  بالعدد  $a$  هو توسع رأسي لمنحنى  $f(x)$  معاملته  $a$  إذا كان  $a > 1$ ، وهو تضيق رأسي لمنحنى  $f(x)$  معاملته  $a$  إذا كان  $0 < a < 1$ ، وإذا كان  $a < 0$  فإن هناك انعكاس حول المحور  $x$  مع تمدد.



### التمدد الأفقي

إذا كان  $b$  عددًا حقيقيًا موجبًا فإن منحنى الاقتران  $g(x) = f(bx)$  الناتج من ضرب الإحداثي  $x$  لكل نقطة على منحنى  $f(x)$  بالعدد  $\frac{1}{b}$  هو تضيق أفقي لمنحنى  $f(x)$  معاملته  $\frac{1}{b}$  إذا كان  $b > 1$ ، وهو توسع أفقي لمنحنى  $f(x)$  معاملته  $\frac{1}{b}$  إذا كان  $0 < b < 1$ ، وإذا كان  $b < 0$  فإن هناك انعكاس حول المحور  $y$  مع تمدد.



### مثال 3

أستعمل منحنى الاقتران  $f(x) = \sqrt{x}$  لأمثل الاقتران  $g(x) = \sqrt{2x-6}$  بيانيًا.

أكتب  $g(x)$  بالصورة  $g(x) = \sqrt{2(x-3)}$ . ألاحظ أن التغير هنا هو على الإحداثي  $x$  فقط من طرح 3 وضرب في 2 ،

إذن هذا الاقتران يتضمن تحويلين هما تضيق أفقي معاملته  $\frac{1}{2}$  وإزاحة أفقية بمقدار 3 وحدات إلى اليمين.


أكون جدول  $f(x) = \sqrt{x}$

|                   |   |   |   |   |
|-------------------|---|---|---|---|
| x                 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| $f(x) = \sqrt{x}$ | 0 | 1 | 2 | 3 |

سوف تتغير الإحداثيات x لهذا الجدول بضربها في  $\frac{1}{2}$  وإضافة 3 لكل منها، فتصبح الإحداثيات x الجديدة

3, 3.5, 5, 7.5 وستبقى الإحداثيات y كما هي

أعين النقاط (3, 0), (3.5, 1), (5, 2), (7.5, 3) ، وأرسم المنحنى الذي يمر بها وهو منحنى  $\sqrt{2(x-3)}$ .




إرشاد

في حال وجود سلسلة تحويلات للاقتزان يتم تنفيذها بالترتيب الآتي: الانعكاس، فالتمدد، فالإزاحة.

أتحقق من فهمي

أستعمل منحنى الاقتزان  $f(x)$  المجاور لأمثل كلاً من

الاقتزائين الآتين بيانياً:



a)

$$g(x) = 2f(x) - 1$$

$$b) g(x) = -f\left(\frac{1}{2}x+2\right)$$

فقرة شرح جديدة

يمكن كتابة معادلة الاقتزان من تمثيله البياني بالتعرف على الاقتزان الرئيس للمنحنى والتحويلات التي أجريت عليه.

مثال 4

أكتب معادلة المنحنى الذي له التمثيل المجاور.

هذا منحنى اقتزان تربيعي، فالأقتزان الرئيس له هو  $g(x) = x^2$


وألأظ أنه مقلوب ما يدل على انعكاس للمنحنى الرئيس حول المحور x، وهناك

إزاحة أفقية لليسار وإزاحة رأسية إلى أعلى. وبذلك تكون معادلة  $f(x)$  على

$$\text{الصورة } f(x) = -a(x+h)^2 + k$$

وبما أن رأس القطع كان في الأصل عند (0, 0) وأصبح

عند (-1, 2) فإن  $h = 1$  ,  $k = 2$



ولإيجاد قيمة  $a$  أعوض إحداثيات نقطة واقعة على المنحنى مثل  $(0, 1)$  في معادلته.


$$f(0) = -a(0+1)^2 + 2$$

$$1 = -a + 2 \Rightarrow a = 1$$

إذن، معادلة هذا المنحنى هي:  $f(x) = -(x+1)^2 + 2$

أتحقق من فهمي

أكتب معادلة المنحنى الذي له التمثيل المجاور.



### فقرة شرح جديدة

تستعمل تحويلات الاقترانات في مواقف حياتية يمكن نمذجتها باقترانات ويمكن وصف التحويلات التي نفذت على الاقتران الرئيس للحصول على الاقتران النهائي.

مثال 5 من الحياة

**رياضة الجولف** ضرب لاعب كرة جولف فاتخذت المسار المعطى بالاقتران  $g(x) = 0.176x - 0.0004x^2$

حيث  $g(x)$  هو ارتفاع الكرة عن الأرض بالأقدام، و  $x$  المسافة الأفقية التي قطعتها الكرة بالأقدام حيث  $x = 0$  يشير إلى نقطة البداية. أصف التحويلات التي تمت على الاقتران  $f(x) = x^2$  للحصول على الاقتران  $g(x)$ .

### الخطوة 1

أعيد كتابة الاقتران  $g(x)$  على الصورة  $g(x) = af(x-h) + k$  بإكمال المربع

$$g(x) = 0.176x - 0.0004x^2$$

$$= -0.0004(x^2 - 440x)$$

$$= -0.0004(x^2 - 440x + (220)^2 - (220)^2)$$

$$= -0.0004(x - 220)^2 + 0.0004(220)^2$$

$$g(x) = -0.0004(x - 220)^2 + 19.36$$

الاقتران الأصلي

إخراج  $-0.0004$  عاملاً مشتركاً

إضافة  $(\frac{440}{2})^2$  وطرحها

بفك القوسين وتحليل المربع الكامل

بالتبسيط

$$g(x) = -0.0004f(x-220) + 19.36$$

إذن،

الخطوة 2 أصف التحويلات.

بما أن العامل المضروب بالاقتران سالب، فذلك يعني انعكاس للاقتران  $f(x)$  حول المحور  $x$  مع تضيق رأسي معاملته  $0.0004$ ، وطرح  $220$  من  $x$  يدل على إزاحة أفقية إلى اليمين بمقدار  $220$  وحدة، وإضافة  $19.36$  إلى  $f(x)$  يدل على إزاحة رأسية إلى أعلى بمقدار  $19.36$  وحدة.

أتحقق من فهمي

**تجارة** وجدت شركة تباع الآلات الحاسبة أن دخلها بالدنانير من بيع  $x$  آلة حاسبة يعطى بالاقتران  $R(x) = -\frac{1}{150}x^2 + 140x$  أصف التحويلات التي تمت على الاقتران  $f(x) = x^2$  للحصول على  $R(x)$ .

| ملخص المفهوم<br>لرسم التحويل:             | التحويلات الهندسية<br>أرسم $f(x)$ وأنفذ الإجراء الآتي: | التغيير على المعادلة |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>الإزاحة الرأسية</b>                    |                                                        |                      |
| $y = f(x) + k, k > 0$                     | إزاحة منحنى $f(x)$ بمقدار $k$ وحدة إلى أعلى            | إضافة $k$ إلى $f(x)$ |
| $y = f(x) - k, k > 0$                     | إزاحة منحنى $f(x)$ بمقدار $k$ وحدة إلى أسفل            | طرح $k$ من $f(x)$    |
| <b>الإزاحة الأفقية</b>                    |                                                        |                      |
| $y = f(x+h), h > 0$                       | إزاحة منحنى $f(x)$ بمقدار $h$ وحدة إلى اليسار          | استبدال $x$ بـ $x+h$ |
| $y = f(x-h), h > 0$                       | إزاحة منحنى $f(x)$ بمقدار $h$ وحدة إلى اليمين          | استبدال $x$ بـ $x-h$ |
| <b>التوسع والتضيق</b>                     |                                                        |                      |
| $y = af(x), a > 0$                        | ضرب الإحداثي $y$ من $y = f(x)$ في $a$                  | ضرب $f(x)$ في $a$    |
|                                           | توسع رأسي إذا كانت $a > 1$                             |                      |
|                                           | تضيق رأسي إذا كانت $0 < a < 1$                         |                      |
| $y = f(ax), a > 0$                        | ضرب الإحداثي $x$ من $y = f(x)$ في $\frac{1}{a}$        | استبدال $x$ بـ $ax$  |
|                                           | توسع أفقي إذا كانت $0 < a < 1$                         |                      |
|                                           | تضيق أفقي إذا كانت $a > 1$                             |                      |
| <b>الانعكاس حول المحور <math>x</math></b> |                                                        |                      |
| $y = -f(x)$                               | انعكاس المنحنى حول المحور $x$                          | ضرب $f(x)$ في $-1$   |
| <b>الانعكاس حول المحور <math>y</math></b> |                                                        |                      |
| $y = f(-x)$                               | انعكاس المنحنى حول المحور $y$                          | استبدال $x$ بـ $-x$  |

### أدرب وأحل المسائل

- كيف يمكن التمييز بين الإزاحة الأفقية والإزاحة الرأسية من معادلة الاقتران الناتج من عدة تحويلات؟
- أكتب معادلة المنحنى الناتج من إجراء إزاحة رأسية بمقدار وحدة واحدة إلى أعلى وإزاحة أفقية إلى اليسار بمقدار 3 وحدات لمنحنى  $f(x) = |x|$ .
- أستعمل منحنى  $f(x) = \sqrt{x}$  لأمثل كلاً من الاقترانات الآتية بيانياً:
- 3)  $f(x) = \sqrt{x-3}$
- 4)  $f(x) = \sqrt{x+4}$
- 5)  $f(x) = \sqrt{x-2} + 5$

أستعمل منحنى  $f(x) = \frac{1}{x}$  لأمثل كلاً من الاقترانات الآتية بيانياً:

6)  $f(x) = \frac{1}{x} + 5$


7)  $f(x) = \frac{1}{x-3} + 2$

8)  $f(x) = \frac{1}{x+2} - 3$

أكتب معادلة منحنى  $g(x)$  الذي له التمثيل البياني التالي:



(10)



(9)

أصف التحويلات التي تمت على  $f(x)$  للحصول على  $g(x)$  في كل مما يأتي:

11)  $g(x) = -f(x) + 8$

12)  $g(x) = 3f(x-2) - 5$

13)  $g(x) = 2f(-x) + 3$

14)  $g(x) = f\left(\frac{1}{5}x\right) - 10$

15)  $g(x) = f(2(x-4)) + 6$

16)  $g(x) = -3f(4x) + 8$

أكتب معادلة  $g(x)$  الناتج من إجراء التحويلات المذكورة في كلٍ مما يأتي على  $f(x)$ :

17) انعكاس حول المحور  $y$  ، وتضييق أفقي معاملته  $\frac{1}{4}$  على منحنى  $f(x) = |x|$ .

18) انعكاس حول المحور  $x$  ، وتوسع أفقي معاملته 2 على منحنى  $f(x) = \sqrt{x}$ .

19) توسع رأسي معاملته 8، وإزاحة إلى اليمين بمقدار 4 وحدات، وإزاحة إلى أعلى بمقدار وحدتين على منحنى

$f(x) = \frac{1}{x}$

20) تضيق رأسي معاملته  $\frac{1}{2}$ ، وإزاحة إلى اليسار بمقدار 3 وحدات، وإزاحة إلى أسفل بمقدار 3 وحدات على منحنى

$f(x) = x^2$

أصف التحويلات التي تمت على الاقتران الرئيس وأمثل كلاً مما يأتي بيانياً:

21)  $g(x) = 4(x+1)^2 - 5$

22)  $h(x) = -2|x - 4| + 3$

23)  $q(x) = \left(\frac{1}{4}x\right)^3 + 1$

24)  $m(x) = \sqrt{-x+4}$

25)  $k(x) = 4\sqrt{2-x} + 3$

26)  $n(x) = \frac{3}{x-2} + 1$

(27) **أعمال** وجدت شركة لبيع الساعات أن ربحها الشهري بالدنانير من بيع  $x$  ساعة يعطى بالاقتران  $P(x) = 0.2x^2 + 42x - 1750$ . أصف التحويلات التي تمت على  $f(x) = x^2$  للحصول على  $P(x)$ .

(28) أحل المسألة الواردة في بداية الدرس.

مسائل مهارات التفكير العليا

(29) **اكتشف الخطأ** وصف كل من أحمد ومنصور التحويل الهندسي الذي تم للحصول على  $g(x) = (\frac{1}{3}x)^3$ ، فقال

أحمد أنه تم تضيق رأسي معاملته  $\frac{1}{27}$  لمنحنى الاقتران الرئيس


$f(x) = x^3$ ، وقال منصور أنه تم توسع أفقي معاملته 3 لمنحنى الاقتران الرئيس

$f(x) = x^3$ . فأيهما كانت إجابته صحيحة؟ أبرر إجابتي.

(30) **أكتب** أشرح أهمية الترتيب عند إجراء تحويري الانعكاس والإزاحة.

(31) **تحذ** أصف التحويلات التي تمت على الاقتران  $f(x) = x^3$  للحصول على

الاقتران  $g(x)$  الممثل بالرسم المجاور.




فكرة الدرس:

- إيجاد نهاية اقتران عند نقطة بيانيًا وعدديًا وجبريًا
- البحث في اتصال اقتران عند نقطة.

المصطلحات: النهاية، الصيغة غير المحددة، النهاية.

مسألة اليوم:

ما العلاقة بين مساحة الدائرة ومساحة المضلع المنتظم  $(A_n)$  حيث  $n$  عدد أضلاع المضلع، عندما تزداد قيمة  $n$  بشكل كبير؟




إيجاد النهايات بيانيًا وعدديًا

تعلمت سابقًا الكثير من خواص الاقترانات مثل المجال والمدى والتزايد والتناقص وشكل المنحنى، وذلك من خلال تحليل تمثيلاتها البيانية أو دراسة جدول قيم يمثل الاقتران، وسأتعلم في هذا الدرس تحليل سلوك اقتران معطى مثل  $f$ ، وتحديد ما إذا كانت قيم الاقتران (المخرجات) تقترب أكثر فأكثر من عدد ما، عندما تقترب قيم  $x$  (المدخلات) أكثر فأكثر من عدد محدد مثل  $(c)$ ، عندها يسمى العدد الذي تقترب منه قيم الاقتران **النهاية** (limit).

إذا كان  $f(x) = x^2 - x + 1$  وأخترت قيمًا  $x$  تقترب أكثر فأكثر من العدد 2، عندها يمكنني الملاحظة من جدول القيم والتمثيل البياني أدناه أنه عندما تقترب قيم  $x$  من العدد (2) من جهة اليسار فإن قيم  $f(x)$  تقترب من العدد (3)، وعندما تقترب قيم  $x$  من 2 من جهة اليمين فإن قيم الاقتران تقترب من العدد (3)، عندها يمكنني القول أن: نهاية  $(x^2 - x + 1)$  عندما تقترب  $x$  من العدد 2 من جهتي اليمين واليسار هي 3، وتكتب على الصورة:

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - x + 1) = 3$$



|        |          |          |          |          |          |  |          |          |          |          |          |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| $x$    | 1.9      | 1.95     | 1.99     | 1.995    | 1.999    |  | 2.001    | 2.005    | 2.01     | 2.05     | 2.1      |
| $f(x)$ | 2.710000 | 2.852500 | 2.970100 | 2.985025 | 2.997001 |  | 3.003001 | 3.015025 | 3.030100 | 3.152500 | 3.310000 |

جهة اليسار

جهة اليمين

**أتعلم: في الهامش بجانب فقرة الشرح السابقة.**

تعلمت سابقاً أن السرعة اللحظية هي السرعة التي يمكن إيجادها بتقليص الفترة الزمنية للسرعة المتوسطة حتى تصبح نقطة ( لحظة )؛ مما يعني أن السرعة اللحظية هي **نهاية** السرعة المتوسطة.

| مفهوم أساسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | النهاية عند نقطة |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <p><b>بالكلمات:</b> إذا كانت قيمة الاقتران <math>f(x)</math> تقترب من قيمة واحدة <math>L</math> عندما تقترب <math>x</math> من <math>c</math>، فإن نهاية <math>f(x)</math> عندما تقترب <math>x</math> من <math>c</math> هي <math>L</math></p> <p><b>بالرموز:</b></p> $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$ <p><b>ونقرأ:</b> نهاية الاقتران <math>f(x)</math> عندما تقترب <math>x</math> من <math>c</math> هي <math>L</math></p> |                  |

**لغة الرياضيات: للمصمم في الهامش بجانب آخر سطر من الصندوق المجاور.**

نقرأ  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$  أيضاً على الصورة:

يقترب  $f(x)$  من  $L$  عندما تقترب  $x$  من  $c$

عند كتابة  $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ ، فهذا يشير إلى أن  $x$  تقترب من  $c$  من جهتي اليمين واليسار، وإذا أردنا أن نكون أكثر تحديداً حول الجهة التي تقترب منها قيم  $x$  من القيمة  $c$ ، فإننا نستعمل التعبيرين الآتيين:

- أستعمل التعبير  $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x)$  لدلالة على النهاية من جهة اليسار حيث  $x < c$ ، ونقرأ: نهاية  $f(x)$  عندما تقترب  $x$  من  $c$  من اليسار.
- أستعمل التعبير  $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x)$  لدلالة على النهاية من جهة اليمين حيث  $x > c$ ، ونقرأ: نهاية  $f(x)$  عندما تقترب  $x$  من  $c$  من اليمين.

وتكون النهاية موجودة إذا كانت النهايتين من اليمين واليسار موجودتين ومتساويتين.

**إرشاد: للمصمم بجانب الفقرة السابقة**

للبحث في النهاية من يسار الاقتران عند  $c$  يجب أن يكون الاقتران معرفاً على يسار  $c$  على الفترة  $(a, c)$ ، وللبحث في النهاية من يمين اقتران عند  $c$  يجب أن يكون الاقتران معرفاً على يمين  $c$  على الفترة  $(a, c)$

| مفهوم أساسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | النهاية من الجهتين |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <p><b>بالكلمات:</b> تكون النهاية <math>f(x)</math> موجودة عندما تقترب <math>x</math> من <math>c</math>، إذا وفقط إذا كانت النهايتان من اليمين واليسار موجودتين ومتساويتين.</p> <p><b>بالرموز:</b></p> $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = L \quad \text{إذا وفقط إذا} \quad \lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$ |                    |

مثال 1:

(1) إذا كان  $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$  فأجد  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$

يمكن إيجاد  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$  بطريقتين: بيانياً و عددياً.

### الطريقة 1: إيجاد النهاية بيانياً.

إن مجال الاقتران  $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$  هو مجموعة الأعداد الحقيقية ما عدا 1 (  $R - \{1\}$  )، وبما أن :

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} = x + 1$$

لذا فإن التمثيل البياني لـ  $f(x)$  هو نفسه التمثيل البياني للمستقيم  $y = x + 1$  مع دائرة صغيرة مفرغة عند  $x = 1$  كما في الشكل المجاور.

**أفكر:** في الهامش مقابل الطريقة 1

لماذا مجال  $f(x)$  هو مجموعة الأعداد الحقيقية ما عدا 1 ؟

ألاحظ من التمثيل البياني لـ  $f(x)$  أنه كلما اقتربت قيم  $x$  من العدد (1) من الجهتين، فإن قيم  $f(x)$  المقابلة لها تقترب من العدد (2) من الجهتين ، وهذا يعني أن:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 2$$

**إرشاد:** للمصمم في هامش السطر السابق

ألاحظ أن الاقتران  $f(x)$  غير معرف عند  $x = 1$  ، إلا أن النهاية موجودة عندما  $x \rightarrow 1$

**الطريقة 2: إيجاد النهاية عددياً**

أنشئ جدول قيم، باختيار قيم  $x$  القريبة من العدد 1 من كلا الجهتين، وإيجاد قيم  $f(x)$  المقابلة لها.


|        |            |      |       |       |            |      |     |
|--------|------------|------|-------|-------|------------|------|-----|
|        | ← 1 →      |      |       | ← 1 → |            |      |     |
| $x$    | 0.9        | 0.99 | 0.999 |       | 1.001      | 1.01 | 1.1 |
| $f(x)$ | 1.9        | 1.99 | 1.999 |       | 2.001      | 2.01 | 2.1 |
|        | → 2 ←      |      |       | → 2 ← |            |      |     |
|        | جهة اليسار |      |       |       | جهة اليمين |      |     |

ألاحظ أنه كلما اقتربت قيم  $x$  من العدد (1) من الجهتين، فإن قيمة  $f(x)$  المقابلة لها تقترب من العدد (2) ، وهذا يعني أن:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 2$$

ألاحظ مما سبق أن قيمة النهاية متساوية من الطريقتين.

(2) إذا كان  $\lim_{x \rightarrow 1} H(x)$  فأجد ،  $H(x) = \begin{cases} 2x + 2, & x < 1 \\ 2x - 4, & x \geq 1 \end{cases}$



### الطريقة 1: إيجاد النهاية بيانياً.

إن الاقتران  $H(x)$ ، اقتران متشعب، وتمثيله البياني كما يظهر في الشكل المجاور.

ألاحظ من التمثيل البياني أنه

ألاحظ من التمثيل البياني لـ  $H(x)$  أنه كلما اقتربت قيم  $x$  من العدد (1) من جهة اليسار، فإن قيم  $H(x)$  المقابلة لها تقترب من العدد (4) ، وهذا يعني أن:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} H(x) = 4$$

ولكن كلما اقتربت قيم  $x$  من العدد (1) من جهة اليمين، فإن قيم  $H(x)$  المقابلة لها تقترب من العدد (-2) ، وهذا يعني أن:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} H(x) = -2$$

وبما أن النهايتين من اليمين ومن اليسار غير متساويتين، فإن  $\lim_{x \rightarrow 1} H(x)$  غير موجودة.

**إرشاد:** للمصمم في هامش السطر السابق

ألاحظ أن  $H(1) = -2$ ، مما يعني أن الاقتران معرف عند  $x = 1$ ، ولكن النهاية عندما تقترب  $x$  من العدد (1) غير موجودة.

## الطريقة 2: إيجاد النهاية عددياً

أنشئ جدول جدول قيم، باختيار قيم  $x$  القريبة من العدد 1 من كلا الجهتين، وإيجاد قيم  $f(x)$  المقابلة لها.

|        |     |      |       |        |       |      |
|--------|-----|------|-------|--------|-------|------|
| $x$    | 0.9 | 0.99 | 0.999 | 1.001  | 1.01  | 1.1  |
| $f(x)$ | 3.8 | 3.98 | 3.998 | -1.998 | -1.98 | -1.8 |

← 1 →
← 2 →

→ 4 ←
→ 2 ←

جهة اليسار
جهة اليمين

ألاحظ أنه كلما اقتربت قيم  $x$  من العدد (1) من جهة اليسار، فإن قيم  $H(x)$  المقابلة لها تقترب من العدد (4)، وأنه كلما اقتربت قيم  $x$  من العدد

(1) من جهة اليمين، فإن قيم  $H(x)$  المقابلة لها تقترب من العدد  $(-2)$  ، وبما أن النهايتين من اليمين ومن اليسار غير متساويتين، فإن

$$\lim_{x \rightarrow 1} H(x) \text{ غير موجودة.}$$

**أفكر :** للمصمم في الهامش بجانب الفقرة السابقة.


$$\lim_{x \rightarrow -3} H(x) \text{ أجد}$$

أتحقق من فهمي:

(a) إذا كان  $f(x) = \frac{x^2-9}{x-3}$ ، فأجد  $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$


(b) إذا كان  $f(x) = \begin{cases} x & , x \leq 0 \\ 1 & , x > 0 \end{cases}$ ، فأجد  $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$

ألاحظ من المثال السابق أن نهاية  $f(x)$  عندما تقترب  $x$  من العدد  $c$  لا علاقة لها بقيمة  $f(c)$  (صورة الاقتران عند النقطة)، فمثلاً  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$  لجميع الحالات الثلاث الآتية:




$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$$

$$f(c) = L$$



$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$$

$$f(c) = N$$



$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$$

$f(c)$  غير معرفة


## نهايات تتضمن المالانهاية

في بعض الأحيان تكون قيمة النهاية غير موجودة في إحدى جهتي النهاية أو كليتهما وذلك لأن قيم الاقتران تزداد بشكل غير محدود وفي هذه الحالة نشير إلى النهاية بالرمز  $\infty$ ، أو تتناقص بشكل غير محدود فنشير عندها إلى النهاية بالرمز  $-\infty$

مثال 2:

أجد كلاً من النهايات الآتية بيانياً:

$$1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x}$$



ألاحظ من التمثيل البياني للاقتران  $f(x) = \frac{1}{x}$ ، أنه كلما اقتربت قيم  $x$  من العدد (0) من جهة اليسار، فإن قيم  $f(x)$  المقابلة لها تقل بشكل غير محدود، وهذا يعني أن:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$$

وأنه كلما اقتربت قيم  $x$  من العدد (0) من جهة اليمين، فإن قيم  $f(x)$  المقابلة لها تزداد بشكل غير محدود، وهذا يعني أن:


$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = \infty$$

وبما أن النهاية من جهة اليمين لا تطابق النهاية من جهة اليسار، فإن  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x}$  غير موجودة.

**أتذكر:** للمصمم في هامش الفقرة السابقة

تعلمت سابقاً أن الاقتران  $f(x) = \frac{1}{x}$  هو من أبسط الاقترانات النسبية ويسمى اقتران المقلوب.

2)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2}$



ألاحظ من التمثيل البياني للاقتران  $f(x) = \frac{1}{x^2}$ ، أنه كلما اقتربت قيم  $x$  من العدد (0) من جهة اليسار، فإن قيم  $f(x)$  المقابلة لها تزداد بشكل غير محدود، وهذا يعني أن:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x^2} = \infty$$

وأنه كلما اقتربت قيم  $x$  من العدد (0) من جهة اليمين، فإن قيم  $f(x)$  المقابلة لها تزداد بشكل غير محدود، وهذا يعني أن:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^2} = \infty$$

وبما أن كلتا النهايتين  $\infty$ ، فإن:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = \infty$$

**أتعلم:** في هامش الفقرة السابقة.

الرمزان  $\infty$ ،  $-\infty$  ليسا عدداً حقيقيين، ولكنهما يصفان بعض الحالات التي لا يوجد لها نهاية، ومنها الاقترانات التي لها خطوط تقارب رأسي.

**أتحقق من فهمي:**



أجد كلاً من النهايات الآتية بياناً:

a)  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x-2}$

b)  $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{1}{(x+3)^2}$

## إيجاد النهايات جبرياً

تعلمت في الأمثلة السابقة كيفية إيجاد النهايات بيانياً وعددياً، وسأتعلم الآن الطرائق الجبرية لإيجاد النهايات.

| مفهوم أساسي                                                                                                                                                                                                                                                                                 | نهايات الاقترانات                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>نهاية الاقتران الثابت</b></p> <p><b>بالكلمات:</b> نهاية الاقتران الثابت عند أي نقطة <math>c</math> هي القيمة الثابتة للاقتران.</p> <p><b>بالرموز:</b> <math>\lim_{x \rightarrow c} k = k</math></p>  | <p><b>نهاية الاقتران المحايد</b></p> <p><b>بالكلمات:</b> نهاية الاقتران <math>f(x) = x</math> عند النقطة <math>c</math> هي <math>c</math></p> <p><b>بالرموز:</b> <math>\lim_{x \rightarrow c} x = c</math></p>  |

وتعد الخواص الآتية للنهايات، الأدوات الأساسية لإيجاد النهايات جبرياً:

| مفهوم أساسي                                                                                                                                                                                                           | خصائص النهايات                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>إذا كان <math>k, c</math> عددين حقيقيين، <math>n</math> عدداً صحيحاً موجباً، وكانت النهايتان <math>\lim_{x \rightarrow c} f(x), \lim_{x \rightarrow c} g(x)</math> موجودتين، فإن كلاً من الخصائص الآتية صحيحة:</p> |                                                                                                                                                                       |
| <b>خاصية المجموع:</b>                                                                                                                                                                                                 | 1) $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) + g(x)) = \lim_{x \rightarrow c} f(x) + \lim_{x \rightarrow c} g(x)$                                                                 |
| <b>خاصية الفرق:</b>                                                                                                                                                                                                   | 2) $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) - g(x)) = \lim_{x \rightarrow c} f(x) - \lim_{x \rightarrow c} g(x)$                                                                 |
| <b>خاصية الضرب في ثابت:</b>                                                                                                                                                                                           | 3) $\lim_{x \rightarrow c} (kf(x)) = k \lim_{x \rightarrow c} f(x)$                                                                                                   |
| <b>خاصية الضرب:</b>                                                                                                                                                                                                   | 4) $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) \times g(x)) = \lim_{x \rightarrow c} f(x) \times \lim_{x \rightarrow c} g(x)$                                                       |
| <b>خاصية القسمة:</b>                                                                                                                                                                                                  | 5) $\lim_{x \rightarrow c} \left( \frac{f(x)}{g(x)} \right) = \frac{\lim_{x \rightarrow c} f(x)}{\lim_{x \rightarrow c} g(x)}$ , $\lim_{x \rightarrow c} g(x) \neq 0$ |
| <b>خاصية القوة:</b>                                                                                                                                                                                                   | 6) $\lim_{x \rightarrow c} (f(x))^n = (\lim_{x \rightarrow c} f(x))^n$                                                                                                |
| <b>خاصية الجذر النوني:</b>                                                                                                                                                                                            | 7) $\lim_{x \rightarrow c} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\lim_{x \rightarrow c} f(x)}$ , $\lim_{x \rightarrow c} f(x) > 0$ ، فإن $n$ عدد زوجي ،                           |

مثال 3:

أستعمل خصائص النهايات لحساب كل نهاية مما يأتي:

$$1) \lim_{x \rightarrow -1} (x^3 - 4x + 6)$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -1} (x^3 - 4x + 6) &= \lim_{x \rightarrow -1} x^3 - \lim_{x \rightarrow -1} 4x + \lim_{x \rightarrow -1} 6 \\ &= (\lim_{x \rightarrow -1} x)^3 - 4 \lim_{x \rightarrow -1} x + \lim_{x \rightarrow -1} 6 \\ &= (-1)^3 - 4(-1) + 6 \\ &= 9 \end{aligned}$$

خاصيتا المجموع والفرق

خاصيتا القوة والضرب في ثابت

نهايتا الضرب في ثابت و الاقتران المحايد

بالتبسيط

$$2) \lim_{x \rightarrow 5} \sqrt{\frac{x^2}{x-1}}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 5} \sqrt{\frac{x^2}{x-1}} &= \sqrt{\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^2}{x-1}} \\ &= \sqrt{\frac{\lim_{x \rightarrow 5} x^2}{\lim_{x \rightarrow 5} (x-1)}} \\ &= \sqrt{\frac{(\lim_{x \rightarrow 5} x)^2}{\lim_{x \rightarrow 5} x - \lim_{x \rightarrow 5} 1}} \\ &= \sqrt{\frac{(5)^2}{5-1}} \\ &= \frac{5}{2} \end{aligned}$$

خاصية الجذر النوني

خاصية القسمة

خاصية القوة والفرق

نهايتا الضرب في ثابت و الاقتران المحايد

بالتبسيط

**أتحقق من فهمي:**

أستعمل خصائص النهايات لحساب كل نهاية مما يأتي:

$$a) \lim_{x \rightarrow -1} (2x^3 + 3x^2 - 4)$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{1+3x^2}}{3x-2}$$

**أنتكر:** في هامش الفرع 3

في الفرع 3 من المثال 3 ، يجب التحقق أن  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) > 0$  لأن دليل الجذر عدد زوجي.

في المثال السابق إذا أوجدت  $f(c)$  لكل النهايات المطلوبة، سأجد أن نهاية كل اقتران عندما تقترب  $x$  من  $c$  تساوي  $f(c)$ ، وبكلمات أخرى فإنه يمكن إيجاد النهاية بالتعويض المباشر، ولكن هذا لا ينطبق على جميع الاقترانات، إلا أنه ينطبق على كثيرات الحدود والاقترانات النسبية التي مقاماتها لا تساوي صفرًا عندما  $x = c$ .

| مفهوم أساسي                                                                                                                                                                   | النهايات بالتعويض المباشر |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <p>إذا كان <math>f(x)</math> كثير حدود أو اقترانًا نسبيًا، و <math>c</math> عدد حقيقي ينتمي إلى مجال الاقتران <math>f(x)</math> فإن:</p> $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$ |                           |

مثال 4:

أجد كل نهاية مما يأتي باستعمال التعويض المباشر إذا كان ممكنًا، وإلا فأذكر السبب:

$$1) \lim_{x \rightarrow 2} (x^4 - 5x^3 + x^2 - 7)$$

بما أنها نهاية كثير حدود، إذن يمكن إيجادها بالتعويض المباشر.

$$\lim_{x \rightarrow 0} (x^4 - 5x^3 + x^2 - 7) = (2)^4 - 5(2)^3 + (2)^2 - 7$$

بالتعويض المباشر

$$= -27$$

بالتبسيط

$$2) \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{x^2 - 3x + 2}$$

بما أن ما داخل الجذر موجب عند  $x = 0$ ، إذن يمكن إيجاد النهاية بالتعويض المباشر.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{x^2 - 3x + 2} = \sqrt{(0)^2 - 3(0) + 2}$$

بالتعويض المباشر

$$= \sqrt{2}$$

بالتبسيط

$$3) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + 5x}{x^4 + 2}$$

بما أنها نهاية اقتران نسبي مقامه لا يساوي صفرًا عند  $x = -1$ ، إذن يمكن إيجادها بالتعويض المباشر.

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + 5x}{x^4 + 2} = \frac{(-1)^2 + 5(-1)}{(-1)^4 + 2}$$

بالتعويض المباشر

$$= -\frac{4}{3}$$

بالتبسيط

$$4) \lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 - x - 12}{x + 3}$$

بما أنها نهاية اقتران نسبي مقامه يساوي صفر، إذن لا يمكن إيجادها بالتعويض المباشر.

أتحقق من فهمي:


أجد كل نهاية مما يأتي باستعمال التعويض المباشر إذا كان ممكناً، وإلا فأذكر السبب:

$$a) \lim_{x \rightarrow 2} (3x^2 - 5x + 4)$$

$$b) \lim_{x \rightarrow -1} \sqrt{1 - 4x^2}$$

$$c) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3 - 5x - 6}{x^2 - 2}$$

$$d) \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 16}{x - 4}$$



إن ناتج التعويض المباشر للنهية في الفرع 4 من المثال الرابع ( $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 - x - 12}{x + 3}$ ) يعطي الناتج  $\frac{0}{0}$ ، وتسمى هذه النتيجة الصيغة غير المحددة (indeterminate form)، ولكن هذا لا يعني أن

النهية غير موجودة، فالتمثيل البياني المجاور للاقتران  $f(x) = \frac{x^2 - x - 12}{x + 3}$

يظهر أن النهاية موجودة عند  $x = -3$  وتساوي -7

في مثل الحالة (ناتج التعويض المباشر  $\frac{0}{0}$ ) فإننا نحتاج إلى البحث عن صيغة مكافئة للاقتران،

وتبسيطه جبرياً من خلال تحليل كل من البسط والمقام واختصار العوامل المشتركة، أو انطاق

البسط أو المقام واختصار العوامل المشتركة.

مثال 5:

أجد كل نهاية مما يأتي:

$$1) \lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 - x - 12}{x + 3}$$

بما أن ناتج التعويض المباشر  $\frac{0}{0}$ ، لذا أحل المقدار جبرياً وأختصر العوامل المشتركة بين البسط والمقام.

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 - x - 12}{x + 3} = \lim_{x \rightarrow -3} \frac{(x - 4)(x + 3)}{x + 3}$$

بتحليل ثلاثي الحدود

$$= \lim_{x \rightarrow -3} \frac{(x - 4)(x + 3)}{x + 3}$$

باختصار العامل المشترك بين البسط والمقام

$$= \lim_{x \rightarrow -3} (x - 4)$$

بالتبسيط

$$= -3 - 4 = -7$$

بالتعويض المباشر والتبسيط

$$2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x}$$

بما أن ناتج التعويض المباشر  $\frac{0}{0}$ ، لذا أنطق البسط أولاً، ثم اختصر العوامل المشتركة.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x} \times \frac{\sqrt{x+1} + 1}{\sqrt{x+1} + 1} && \text{أضرب كلا من البسط والمقام بمرافق } \sqrt{x+1} + 1 \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+1-1}{x(\sqrt{x+1}+1)} && \text{بالتبسيط} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cancel{x}+1-1}{\cancel{x}(\sqrt{x+1}+1)} && \text{بالتبسيط} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+1}+1} && \text{باختصار العوامل المشتركة} \\ &= \frac{1}{2} && \text{بالتعويض المباشر} \end{aligned}$$

**أتعلم:** للمصمم في الهامش

بشكل عام، إذا كان ناتج التعويض المباشر يساوي  $\frac{0}{0}$ ، فإنه يجب تبسيط المقادير جبرياً، لإيجاد عوامل مشتركة واختصارها.

$$3) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{|x-2|}{x-2}$$

بما أن ناتج التعويض المباشر  $\frac{0}{0}$ ، لذا أحتاج إلى إعادة التعريف أولاً، ثم أختصر العوامل المشتركة بين البسط والمقام.

**أتذكر:** للمصمم في هامش خطوة 1

إعادة التعريف هي إعادة كتابة اقتران القيمة المطلقة على صورة اقتران متشعب، من دون استعمال رمز القيمة المطلقة.

**الخطوة 1:** أعيد تعريف الاقتران

$$\begin{aligned} f(x) = \frac{|x-2|}{x-2} &= \begin{cases} \frac{x-2}{x-2}, & x > 2 \\ \frac{-(x-2)}{x-2}, & x < 2 \end{cases} \\ &= \begin{cases} 1, & x > 2 \\ -1, & x < 2 \end{cases} \end{aligned}$$

**الخطوة 2:** أجد نهاية من جهة اليمين ومن جهة اليسار

ألاحظ أنه يوجد قاعدتين مختلفتين عن يمين وعن يسار العدد 2، لذا يجب إيجاد نهاية اليمين واليسار.


$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (-1) = -1$$

النهاية من جهة اليسار

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (1) = 1$$

النهاية من جهة اليمين

وبما أن النهايتين من اليمين ومن اليسار غير متساويتين، فإن  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{|x-2|}{x-2}$  غير موجودة.



**إرشاد:** للمصمم في هامش الفقرة الأخيرة

ألاحظ من التمثيل البياني للاقتران  $f(x) = \frac{|x-2|}{x-2}$  أن النهاية غير موجودة.

أتحقق من فهمي:

أجد كل نهاية مما يأتي:

a)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{7x - x^2}{x}$


b)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 - \sqrt{x+4}}{x}$

c)  $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{|x-5|}{x-5}$


## الاتصال

يكون **الاقتران متصلاً** (continuous function) إذا لم يكن في تمثيله البياني أي انقطاع أو قفزة أو فجوة. ويكون الاقتران متصلاً عند نقطة إذا كان منحناه يمر عبر هذه النقطة دون انقطاع.


توضح التمثيلات البيانية الآتية الحالات المختلفة للاتصال:




f(x) متصل على مجاله



h(x) غير متصل عند x=1



g(x) غير متصل عند x=1



f(x) غير متصل عند x=1

ألاحظ أن منحنىي الاقترانين p(x) و h(x) غير متصلين عند x = 1 لأن كل من الاقترانين غير معرف عند x = 1 ( بالرغم من أن النهاية موجودة في الشكل b). أما الاقتران g(x) فإنه غير متصل عند x = 1 بسبب وجود قفزة (مما يعني أن النهاية غير موجودة).

مما سبق يمكن التوصل إلى أن الاقتران يكون متصلاً عند نقطة إذا كانت النهاية تساوي صورة الاقتران عند تلك النقطة.

| الاتصال عند نقطة | مفهوم أساسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <p>يكون الاقتران <math>f(x)</math> متصلًا عند النقطة <math>x = c</math> إذا حقق جميع الشروط الآتية:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>f(c)</math> موجودة.</li> <li>• <math>\lim_{x \rightarrow c} f(x)</math> موجودة.</li> <li>• <math>\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)</math></li> </ul> |

**أتعلم:** للمصمم فقرة أتعلم مقابل فقرة الشرح قبل الجدول

يمكن اختبار اتصال اقتران بتمرير قلم على منحنى الاقتران دون الحاجة إلى رفع القلم عن الورقة.

**أنتكر:** للمصمم أنتكر مقابل صندوق المفهوم الأساسي.

النهاية موجودة تعني أن نهايتي اليمين واليسار متساويتين، ووجود النهاية عند نقطة لا يتأثر بوجود الاقتران عند تلك النقطة أم لا.

**مثال 6:**

أحدد ما إذا كان كل اقتران مما يأتي متصلًا عند قيمة  $x$  المعطاة، مبررًا إجابتي:

1)  $f(x) = x^3 - x$  ,  $x = 3$

الاقتران  $f$  متصل عند  $x = 3$  لأن  $f(3) = \lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 24$

2)  $g(x) = \frac{x^2 - x - 2}{x - 2}$  ,  $x = 2$

الاقتران  $g$  غير متصل عند  $x = 2$  لأنه غير معرف عن هذه النقطة ( صفر مقام).

**أتعلم:** للمصمم في هامش الفرع 1

- كثيرات الحدود متصلة عند جميع قيم  $x$  التي تنتمي إلى مجالها.
- الاقترانات النسبية غير متصلة عند أصفار المقام.

3)  $h(x) = \begin{cases} x^2 - 3 & , x \leq -1 \\ x - 1 & , x > -1 \end{cases}$  ,  $x = -1$

لتحديد ما إذا كان الاقتران المتشعب  $h$  متصلًا عند  $x = -1$  ، علي إثبات أن  $\lim_{x \rightarrow -1} h(x) = h(-1)$

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 16}{x - 4} &= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(x + 4)(x - 4)}{x - 4} \\ &= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(x+4)\cancel{(x-4)}}{\cancel{x-4}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 4} (x + 4) \\ &= 4 + 4 = 8\end{aligned}$$

بتحليل الفرق بين مربعين

باختصار العامل المشترك بين البسط والمقام


بالتبسيط

بالتعويض المباشر والتبسيط

- $h(-1) = -2$
- $\lim_{x \rightarrow -1^-} h(x) = \lim_{x \rightarrow -1^-} x^2 - 3 = -2$
- $\lim_{x \rightarrow -1^+} h(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} x^2 - 3 = -2$

$$\lim_{x \rightarrow -1} h(x) = -2 \text{ ، فإن } \lim_{x \rightarrow -1^-} h(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} h(x) = -2$$

وبما أن  $\lim_{x \rightarrow -1} h(x) = h(-1) = -2$  ، إذن  $h(x)$  متصل عند  $x = -1$ . ويوضح التمثيل البياني المجاور للاقتزان  $h(x)$  أنه متصل عند  $x = -1$



$$4) p(x) = \begin{cases} \frac{x^2-16}{x-4} , & x \neq 4 \\ 7 , & x = 4 \end{cases}$$

لتحديد ما إذا كان الاقتزان المتشعب  $p$  متصلاً عند  $x = 4$  ، علي إثبات أن  $\lim_{x \rightarrow 4} p(x) = p(4)$

- $p(4) = 7$
- $\lim_{x \rightarrow 4} p(x) = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2-16}{x-4}$

$$\begin{aligned}&= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(x - 4)(x + 4)}{x - 4} \\ &= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(x-4)\cancel{(x+4)}}{\cancel{x-4}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 4} (x + 4) \\ &= 4 + 4 = 8\end{aligned}$$

بتحليل الفرق بين مربعين

باختصار العامل المشترك بين البسط والمقام


بالتبسيط

بالتعويض المباشر والتبسيط

أنتكر: للمصمم في هامش الجدول

بما أن ناتج التعويض المباشر  $\frac{0}{0}$ ، لذا أحل المقدار جبريًا وأختصر العوامل المشتركة بين البسط والمقام.

بما أن  $\lim_{x \rightarrow -1} p(x) \neq p(4)$ ، إذن  $p(x)$  غير متصل عند  $x = 4$ . ويوضح التمثيل البياني المجاور للاقتزان  $p(x)$  عدم اتصاله عند  $x = 4$



أتحقق من فهمي:

أحدد ما إذا كان كل اقتزان مما يأتي متصلًا عند قيمة  $x$  المعطاة، مبررًا إجابتي:

a)  $f(x) = x^5 + 2x^3 - x$  ,  $x = 1$

b)  $g(x) = \frac{x^2+16}{x-5}$ ,  $x=5$

c)  $h(x) = \begin{cases} x-1 & , x < 3 \\ 5-x & , x \geq 3 \end{cases}$  ,  $x = 3$

d)  $p(x) = \begin{cases} \frac{x^2-25}{x-5} & , x \neq 5 \\ 10 & , x = 5 \end{cases}$

أتدرب وأحل المسائل

أجد كلاً من النهايات الآتية بيانيًا وعدديًا:

1)  $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + 1)$

2)  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x-2}$

3)  $\lim_{x \rightarrow 3} (x + 7)$

أجد كلاً من النهايات الآتية بيانيًا:

4)  $\lim_{x \rightarrow 0} |x|$

5)  $\lim_{x \rightarrow -1} (x^2 - 5)$

6)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} - 2$

7)  $\lim_{x \rightarrow -2} (4 - x^2)$

8)  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-1}{x^2-2x+1}$

9)  $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{(x-3)^2}$


10)  $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ ,  $f(x) = \begin{cases} -1 & , x \neq 3 \\ 1 & , x = 3 \end{cases}$

11)  $\lim_{x \rightarrow 2} h(x)$ ,  $h(x) = \begin{cases} 2x & , x < 2 \\ x^2 & , x \geq 2 \end{cases}$

$$12) \lim_{x \rightarrow -2} p(x), p(x) = \begin{cases} x + 6, & x < -2 \\ -\frac{1}{2}x + 1, & x > -2 \end{cases}$$

$$12) \lim_{x \rightarrow 0} g(x), g(x) = \begin{cases} x, & x \leq 0 \\ \sqrt{x}, & x > 0 \end{cases}$$

أستعمل التمثيل البياني الآتي لأجد كل نهاية مما يأتي:




$$15) \lim_{x \rightarrow 1} h(x)$$

$$16) \lim_{x \rightarrow 2} h(x)$$

$$17) \lim_{x \rightarrow -3} h(x)$$

أستعمل التمثيل البياني الآتي لأجد كل نهاية مما يأتي:



$$13) \lim_{x \rightarrow 2} f(x)$$

$$14) \lim_{x \rightarrow -2} f(x)$$

18) إذا كان  $f(x) = ax^2 + bx + c, a \neq 0$ ، وكان  $f(0) = 0, \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 5, \lim_{x \rightarrow -2} f(x) = 8$ ، فأجد قيم الثوابت a و b و c.

أجد كل نهاية مما يأتي:

$$19) \lim_{x \rightarrow 3} (x^2 - 4x + 7)$$

$$20) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 16}{x - 4}$$

$$21) \lim_{x \rightarrow 9} \left( \sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} \right)^2$$

$$22) \lim_{x \rightarrow 2\pi} (x^3 + \pi x - 5\pi^3)$$

$$23) \lim_{x \rightarrow -3} \sqrt{\frac{x-3}{2x+4}}$$

$$24) \lim_{x \rightarrow 4} \sqrt[3]{x^2 + 11}$$

$$25) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3 - 27}{x - 3}$$

$$26) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{2x^2 + 5x + 3}{x + 1}$$

$$27) \lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sqrt{x} - 5}{x - 25}$$

$$28) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - x - 2}{|x - 2|}$$



$$29) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+1} - 3}{x - 3}$$

$$30) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{\frac{1}{x} - \frac{1}{2}}$$

$$31) \lim_{x \rightarrow 3} f(x), f(x) = \begin{cases} x - 1, & x < 3 \\ 3x - 7, & x > 3 \end{cases}$$

$$32) \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\frac{1}{\sqrt{t}} - \frac{1}{2}}{t - 4}$$

أستعمل التمثيل البياني المجاور، لأجد كل نهاية مما يأتي:



$$33) \lim_{x \rightarrow 2} (f(x) + g(x))$$

$$34) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)}{g(x)}$$

$$35) \lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{3 + f(x)}$$

$$36) \lim_{x \rightarrow 0} (f(x) \times g(x))$$

أحدد ما إذا كان كل اقتران مما يأتي متصلًا عند قيمة  $x$  المعطاة، مبررًا إجابتي:

$$37) f(x) = \pi x^2 4.2x + 7, x = -5$$

$$38) g(x) = \frac{16}{x^2 + 25}, x = -5$$

$$39) h(x) = \begin{cases} x^2, & x < 0 \\ 3, & x \geq 0 \end{cases}, x = 0$$

$$40) \text{ إذا كان } f(x) = \begin{cases} x + 3, & x \neq 3 \\ 2 + \sqrt{k}, & x = 3 \end{cases} \text{ متصلًا عند } x = 3, \text{ فأجد قيمة الثابت } k.$$



**أفران:** يتحكم فني مختبر في درجة الحرارة  $T$  داخل فرن (القمين) لتزداد بمقدار  $2^\circ\text{C}$  لكل دقيقة بدءًا بالدرجة  $0^\circ\text{C}$  خلال الدقائق الستين الأولى، وبعد ذلك يبدأ بخفض درجة حرارة الفرن بمقدار  $3^\circ\text{C}$  لكل دقيقة. ويمثل الاقتران الآتي العلاقة بين درجة  $T$  والزمن  $t$  بالدقائق:

$$T(t) = \begin{cases} 2t, & t \leq 60 \\ k - 3t, & t > 60 \end{cases}$$

(41) أجد قيمة  $k$  التي تجعل الاقتران  $T$  متصلًا عند  $t = 60$

(42) أبين لماذا يجب أن يكون الاقتران  $T$  متصلًا عند  $t = 60$

<https://www.shutterstock.com/image-photo/vacuum-oven-on-white-background-226596490>

**معلومة:** للمصمم المعلومة أسفل الصور بخط صغير مائل.

فرن القمين (Kiln) هو فرن على شكل حجرات معزولة توقد النار داخلها ويستعمل في عمليات التجفيف وبعض التجارب الكيميائية، واستعمل هذا النوع من الأفران منذ القدم لتحضير الفخار ولبنات البناء (الأجر).

**مهارات التفكير العليا**

$$(43) \text{ تحد: أجد } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + |x-1| - 1}{|x-1|} \text{ بيانياً و جبرياً.}$$

$$(44) \text{ تبرير: أجد قيمة } m \text{ الثابت التي تجعل } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{mx+b} - 3}{x} \text{، حيث } m \text{ ينتمي للأعداد الحقيقية. أبرر إجابتي.}$$

$$(45) \text{ تبرير: أجد قيمة الثابت } a \text{ التي تجعل } \lim_{x \rightarrow 1} \left( \frac{1}{x-1} - \frac{a}{x^2-1} \right) \text{ موجودة.}$$

## اختبار نهاية الوحدة

أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة في ما يأتي:

- (1) ما التحويل الذي يتم على منحنى  $f(x)$  للحصول على منحنى الاقتران  $g(x) = 2f(x)$  ؟  
 (a) تضيق أفقي (b) توسع رأسي (c) إزاحة رأسية (d) إزاحة أفقية

(2) ما معادلة الاقتران  $g(x)$  الناتج من انعكاس منحنى  $f(x)$  حول المحور  $x$ ، ثم إزاحته 3 وحدات لليمين؟

- a)  $g(x) = -f(x) + 3$       b)  $g(x) = -f(x+3)$   
 b)  $g(x) = -f(x-3)$       d)  $g(x) = f(3-x)$

(3) ما إحداثيي صورة النقطة  $A(-1, 3)$  بتوسع رأسي معاملته 2 ، وإزاحة بمقدار وحدتين إلى اليسار؟

- a)  $A'(-2, 1)$       b)  $A'(1, 6)$       c)  $A'(-3, 6)$       d)  $A'(-4, 2)$

(4) ما باقي قسمة  $f(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 9$  على  $(x+2)$  ؟

- a) 3      b) -1      c) 9      d) 27

(5) إذا كان  $(x-3)$  عاملاً من عوامل  $g(x) = 2x^3 + x^2 + px - 6$  ، فما قيمة  $p$  ؟

- a) -17      b) -3      c) 10      d) 19

(6) إذا كان  $120 = (x^2 + Ax + 38)(x - 3) + 6 + 11x + 6x^2 + x^3$  ، فإن  $A =$

- a) -39      b) 9      c) 11      d) 17

(7) إذا كان  $\frac{5x-12}{x^2-3x-4} \equiv \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-4}$  ، فما قيمة  $A+B$  ؟

- a) -12      b) -7      c) 3      d) 5

(8) ما معامل  $\frac{1}{x+2}$  عند تجزئة  $\frac{15}{(x+2)(x^2+1)}$  إلى كسور جزئية؟

- a) 3      b) 5      c) 6      d) 10


(9) أستخدم منحنى  $f(x) = \sqrt{x}$  لأمثل  $g(x) = \sqrt{\frac{1}{3}(x-6)} + 2$  بيانياً.

أصف التحويلات التي تمت على  $f(x)$  للحصول على  $g(x)$  في كل مما يأتي:

- 10)  $g(x) = -2f(x+4)-5$       11)  $g(x) = \frac{1}{2}f(-x) + 3$

(12) أكتب معادلة  $g(x)$  الناتج من إجراء التحويلات التالية على منحنى  $f(x) = x^2$ :

تضيق رأسي معاملته  $\frac{1}{4}$  وإزاحة لليساار مقدارها 4 وحدات وإزاحة إلى أعلى مقدارها 5 وحدات.



(13) أكتب معادلة  $g(x)$  الذي له التمثيل البياني التالي.

(14) أبين أن  $(2x+1)$  ليس أحد عوامل المقدار  $3x^3 - 4x^2 + 1$

أحل كل مما يأتي تحليلًا كاملاً:

15)  $3x^3 - 13x^2 - 10x + 21$

15)  $8x^4 + 2x^3 - 53x^2 + 37x - 6$

أحل كلًا من المعادلات الآتية:

16)  $x^4 - 7x^3 + 13x^2 + 3x - 18 = 0$

17)  $x^3 + 16x^2 - 3x = 5x^2 - 18x + 27$

(18) إذا كان  $(x-d)$  أحد عوامل المقدار  $6 + (14-d^2)x + dx - 2x^2$ ، فما قيمة العدد الصحيح  $d$ ؟

(19) عند قسمة كل من المقدارين  $mx^3 + x^2 - 10x - 6$  و  $2x^3 - 4x^2 + mx + 8$  على  $(x-2)$ ، يكون لهما الباقي نفسه، فما قيمة  $m$ ؟

أجزئ كلًا من المقادير النسبية الآتية إلى كسور جزئية:

20)  $\frac{6}{(x+3)(x+1)}$

21)  $\frac{5x^2 - 6}{x^3 - 2x^2 + x}$

22)  $\frac{3x^2 + x - 4}{x^2 - 2x}$

(23) يريد حداد أن يصنع حاوية على هيئة متوازي مستطيلات بحيث يزيد طولها 1 m على مثلي عرضها، ويزيد ارتفاعها 1 m على

عرضها، ويكون حجمها  $30 \text{ m}^3$ ، فكم مترًا مربعًا من الحديد يلزمه لصنعها؟

أجد كلا من النهايات التالية:

24)  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 2x + 3}{x - 5}$

25)  $\lim_{x \rightarrow -4} \frac{x^2 - 16}{x^2 + 1}$

26)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+2}{x}$


27)  $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3 - x^2 - x - 9}{x^2 - 9}$

28)  $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + 6x + 8}{x^2 - 4}$

أبين أن الاقترانات التالية متصلة أم غير متصلة عند قيمة  $x$  المبينة بجانب كل منها

$$20) \lim_{x \rightarrow 3} f(x) \quad f(x) = \begin{cases} \frac{x+1}{x-4} , & x \geq 3 \\ x-6 , & x < 3 \end{cases}$$

$$21) \lim_{x \rightarrow 1} h(x) \quad h(x) = \begin{cases} \frac{x^3-1}{x^2-1} , & x > 1 \\ \frac{3}{2} , & x = 1 \\ \frac{x^2+2}{3x-1} , & x < 1 \end{cases}$$



أجيب عن الأسئلة الآتية معتمدًا على الشكل المجاور الذي يمثل منحنى الاقتران  $g(x)$ :

$$22) \lim_{x \rightarrow -3} g(x)$$

$$32) \lim_{x \rightarrow -2^+} g(x)$$

$$33) \lim_{x \rightarrow -2^-} g(x)$$

$$34) \lim_{x \rightarrow -2} g(x)$$

(35) هل الاقتران  $g(x)$  متصل عند  $x = -2$  ؟ أبرر إجابتي

### ما أهمية هذه الوحدة؟

يُستعمل الاشتقاق في الكثير من التطبيقات الحياتية. ومن ذلك؛ إيجاد معدلات التغير بالنسبة إلى الزمن، مثل السرعة والتكاثر والتغير في درجات الحرارة، إضافة إلى أهميته في تحديد القيمة العظمى أو الصغرى، في الكثير من المواقف، مثل تحديد أعلى ربح وأقل تكلفة.

### سأتعلّم في هذه الوحدة:

- ◀ إيجاد مشتقة اقترانات القوة.
- ◀ استعمال قاعدة السلسلة؛ لإيجاد مشتقة تركيب اقترانين.
- ◀ رسم منحني كثيرات الحدود؛ باستعمال المشتقة.
- ◀ حل مسائل وتطبيقات حياتية على المشتقات.

### تعلمت سابقًا:

- ✓ إيجاد المشتقة الأولى لكثيرات الحدود.
- ✓ إيجاد القيم العظمى والصغرى لكثيرات الحدود.
- ✓ حل مسائل حياتية عن القيم العظمى والصغرى.

# اشتقاق اقتران القوة

## The derivative of power function

إيجاد مشتقة اقترانات القوة.

فكرة الدرس



التعريف العام للمشتقة، العمودي على المماس.

المصطلحات



يُمثل الاقتران  $s(t) = 100 + 5t^2$  المسافة التي يقطعها قمر صناعي في أثناء سقوطه عائداً إلى الأرض، بعد  $t$  ثانية من بدء حركته. أجد سرعة القمر الصناعي بعد 12 ثانية من سقوطه.

مسألة اليوم



تعلمت سابقاً أن المشتقة هي طريقة لإيجاد ميل منحنى الاقتران عند نقطة، وذلك بإيجاد ميل المماس عند تلك النقطة.

يُبين الشكل المجاور مماساً لمنحنى اقتران عند النقطة  $P$ .

ألاحظ أنه في أثناء حركة النقطة  $Q_1$  على منحنى الاقتران نحو النقطة  $P$  فإنها تمر بالنقاط  $Q_2$  و  $Q_3$  و  $Q_4$ ، وألاحظ كذلك أن ميل كلٍّ من القواطع  $PQ_2$  و  $PQ_3$  و  $PQ_4$  يقترب شيئاً فشيئاً من ميل المماس عند النقطة  $P$ .

يمكنني بالاعتماد على هذه الملاحظة، إيجاد مشتقة اقتران

قاعدته معلومة مثل  $y = 3x^2$

فإذا علمت أن النقطة  $Q$  تبعد مسافة أفقية صغيرة مقدارها  $h$  عن النقطة  $P(x, 3x^2)$ ، فإن

إحداثيي النقطة  $Q$  هما:


$$(x + h, 3(x + h)^2)$$

إذن: ميل القاطع  $PQ$  يساوي:

$$\begin{aligned} m &= \frac{\Delta y}{\Delta x} \\ &= \frac{3(x + h)^2 - 3x^2}{(x + h) - x} \\ &= \frac{3x^2 + 6hx + 3h^2 - 3x^2}{h} \\ &= \frac{6hx + 3h^2}{h} \\ &= 6x + 3h \end{aligned}$$

أفكر

لماذا يجب علينا تجنب أن تكون قيمة  $h = 0$ ؟



وعندما تقترب  $Q$  من  $P$ ؛ فإن  $h$  تصبح أصغر فأصغر، وعندها يُمكنني القول إن  $h$  تقترب من الصفر) وتكتب على الصورة  $h \rightarrow 0$

ومنه: يكون ميل المماس عند النقطة  $P$  يساوي نهاية  $6x + 3h$  عندما  $h \rightarrow 0$

$$m = \lim_{h \rightarrow 0} (6x + 3h) = 6x$$

تُسمى  $6x$  مشتقة الاقتران  $y = 3x^2$ ، ويُرمز لها بالرمز  $\frac{dy}{dx}$ .

إذن: إذا كان  $y = 3x^2$  فإن  $\frac{dy}{dx} = 6x$

تُسمى هذه الطريقة في إيجاد مشتقة اقتران عند نقطة **التعريف العام للمشتقة** (the definition of the derivative).

## رموز رياضية

يُرمز لمشتقة  $y = f(x)$

بالرموز  $f'(x)$ ,  $\frac{dy}{dx}$ ,  $\frac{df}{dx}$ ,  $y'$

## التعريف العام للمشتقة

### مفهوم أساسي

**بالكلمات:** مشتقة الاقتران  $f(x)$  عند النقطة  $P(x, f(x))$  تساوي نهاية ميل القاطع الذي يمر بالنقطة  $P$  عندما  $h \rightarrow 0$ ، لكل  $x$  تنتمي لمجال الاقتران، وبشرط وجود النهاية.

$$\frac{dy}{dx} = m = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(f(x+h) - f(x))}{h} \quad \text{بالرموز:}$$

### مثال 1

أجد مشتقة الاقتران  $y = x^2$  باستعمال التعريف العام للمشتقة عندما  $x = 3$ :

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(f(x+h) - f(x))}{h} \quad \text{التعريف العام للمشتقة}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(f(3+h) - f(3))}{h} \quad \text{بالتعويض: } x=3$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(3+h)^2 - (3)^2}{h} \quad \text{بالتعويض: } f(3+h) = (3+h)^2, f(3) = (3)^2$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{9 + 6h + h^2 - 9}{h} \quad \text{بالتبسيط}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(6 + h)}{h} \quad \text{بإخراج } h \text{ عاملاً مشتركاً من البسط}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} (6 + h) \quad \text{بالقسمة على } h$$

$$= 6 \quad \text{بالتعويض: } h = 0$$

### أتحقق من فهمي

(a) أجد مشتقة الاقتران  $y = 3x - 2$  باستعمال التعريف العام للمشتقة؛ عندما  $x = 2$ .

(b) أجد مشتقة الاقتران  $y = 4x^2 + 1$  باستعمال التعريف العام للمشتقة؛ عندما  $x = -1$ .

يُمكنني استعمال التعريف العام للمشتقة؛ لإيجاد اقتران جديد يُمثل مشتقة الاقتران الأصلي عند أي من قيم مجاله.

### مثال 2

أجد مشتقة الاقتران  $y = x^2$  باستعمال التعريف العام للمشتقة.

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \quad \text{التعريف العام للمشتقة}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(3+h)^2 - (3)^2}{h} \quad \text{بالتعويض: } f(x+h) = (x+h)^3, f(x) = x^3$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^3 + 3hx^2 + 3h^2x + h^3 - x^3}{h} \quad \text{بالتبسيط}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(3x^2 + 3hx + h^2)}{h} \quad \text{بإخراج } h \text{ عاملاً مشتركاً من البسط}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} (3x^2 + 3hx + h^2) \quad \text{بالقسمة على } h$$

$$= 3x^2 \quad \text{بالتعويض: } h = 0$$

### أتحقق من فهمي

(a) أجد مشتقة الاقتران  $y = 8 - x^2$  باستعمال التعريف العام للمشتقة.

(b) أجد مشتقة الاقتران  $y = \frac{3}{x+2}$ ,  $x \neq -2$  باستعمال التعريف العام للمشتقة.

إنَّ إيجاد المشتقة من التعريف ليس سهلاً، ويتطلَّب في كثير من الأحيان وقتاً كبيراً؛ ولكن توجد بعض القواعد التي تُسهِّل عملية إيجاد المشتقة، ومنها مشتقة اقتران القوة.

## مشتقة اقتران القوة

### مفهوم أساسي

**بالكلمات:** عند اشتقاق الاقتران  $y = x^n$ ؛ فإنّ قوة  $x$  في المشتقة تكون أقل بواحد من قوة  $x$  في الاقتران الأصلي، ويكون معامل  $x$  في المشتقة مساوياً لقوة  $x$  في الاقتران الأصلي.

**بالرموز:** إذا كان  $y = x^n$ ، حيث  $n$  عدد حقيقي؛ فإنّ  $\frac{dy}{dx} = nx^{n-1}$

### مثال 3

أجد مشتقة كل اقتران مما يأتي:

1  $y = \frac{1}{x}, x \neq 0$

$$= x^{-1}$$

$$\frac{dy}{dx} = -1x^{-1-1}$$

$$= -x^{-2} = -\frac{1}{x^2}$$

بكتابة الاقتران على الصورة الأسية:

قاعدة مشتقة القوة:

تعريف الأس السالب:

### أتذكر

- $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$
- $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$

2  $y = x^{\frac{3}{2}}$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3}{2}x^{\frac{3}{2}-1}$$

$$= \frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}}$$

قاعدة مشتقة القوة:

بالتبسيط:

3  $y = \sqrt{x}, x \geq 0$

$$= x^{\frac{1}{2}}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}-1}$$

$$= \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

بكتابة الاقتران على الصورة الأسية

قاعدة مشتقة القوة

تعريف الأس السالب

### أنتحق من فهمي

أجد مشتقة كل اقتران مما يأتي:

a)  $y = x^{-11}, x > 0$

b)  $y = \frac{1}{x^5}, x > 0$

c)  $y = \sqrt[3]{x^5}$

توجد أيضًا بعض القواعد التي تُسهّل عملية إيجاد مشتقة الاقترانات، التي تحتوي على أكثر من حدّ.

### قواعد أخرى للمشتقة

#### مفهوم أساسي

**مشتقة الثابت:** إذا كان  $y = c$  حيث  $c$  عدد حقيقي؛ فإن  $\frac{dy}{dx} = 0$ ، أي إن مشتقة الثابت تساوي صفرًا.

**مشتقة مضاعفات القوة:** إذا كان  $y = ax^n$ ، حيث  $n$  عدد حقيقي؛ فإن  $\frac{dy}{dx} = anx^{n-1}$

**مشتقة المجموع أو الفرق:** إذا كان  $y = u \pm v$ ، حيث  $u$  و  $v$  اقترانان قابلان للاشتقاق عند قيم  $x$  جميعها؛ فإن  $\frac{dy}{dx} = \frac{du}{dx} \pm \frac{dv}{dx}$

#### مثال 4

أجد مشتقة كل اقتران مما يأتي:

1  $y = x + 2\sqrt[3]{x}$

$$= x + 2x^{\frac{3}{2}}$$

بكتابة الاقتران على الصورة الأسية

$$\frac{dy}{dx} = 1 + 2 \times \frac{1}{3} x^{-\frac{3}{2}}$$

قاعدتا مشتقتي مضاعفات القوى، والمجموع

$$= 1 + \frac{2}{3\sqrt{x^2}}$$

تعريف الأس السالب

2  $y = \frac{5-7x}{x}, x \neq 0$

$$= \frac{5}{x} - \frac{7x}{x}$$

بقسمة كل حد في البسط على  $x$

$$= 5x^{-1} - 7$$

بكتابة الاقتران على الصورة الأسية

$$\frac{dy}{dx} = (-5)x^{-2} - 0$$

قواعد مشتقات الثابت، ومضاعفات القوة، والفرق

$$= -\frac{5}{x^2}$$

تعريف الأس السالب

#### أتحقق من فهمي

أجد مشتقة كل اقتران مما يأتي:

a)  $y = \sqrt{x} + \frac{4}{x^2}, x > 0$

b)  $y = \frac{x^5 - 8x^6}{4x}, x \neq 0$

تعرفتُ سابقاً أنّ السرعة اللحظية، تساوي مشتقة اقتران المسافة عند لحظة، ويمكنني الآن استعمال قواعد المشتقة التي تعرفتُ إليها في هذا الدرس في إيجاد السرعة اللحظية.

## مثال 5: من الحياة

إذا كانت المسافة التي قطعها عداء في 5 ثوانٍ تُعطى بالاقتران  $s = 10t^{\frac{3}{2}} - 3t^2$ ,  $0 \leq t \leq 5$  حيث  $s$  المسافة التي يقطعها العداء بالأمتار، و  $t$  الزمن بالثانية. أجد سرعة العداء بعد 3 ثوانٍ من بدء حركته.

السرعة هي مشتقة اقتران المسافة، والمطلوب إيجاد السرعة عندما  $t = 3$

$$\frac{ds}{dt} = 10 \times \frac{3}{2} t^{\frac{3}{2}-1} - 3 \times 2t \quad \text{مشتقة اقتران المسافة:}$$

$$= 10 \times \sqrt{t} - 6t \quad \text{بالتبسيط:}$$


$$= 15 \times \sqrt{3} - 6(3) \quad \text{بتعويض: } t = 3$$

$$\approx 7.98 \quad \text{باستعمال الآلة الحاسبة:}$$


إذن: سرعة العداء بعد 3 ثوانٍ من بدء حركته هي  $7.98 \text{ m/s}$  تقريباً.

## أتحقق من فهمي

يُمثل الاقتران  $s = t^3 - \sqrt{t}$  المسافة التي يقطعها جسم متحرك بالأمتار، حيث  $t$  الزمن بالثانية. أجد سرعة الجسم بعد 4 ثوانٍ من بدء حركته.



من أنواع سباقات الجري الطويل سباق 400 m؛ إذ يجري العداء 400 m في الملعب في المسار نفسه، دورة واحدة بقوة، وسرعة كبيرة.



يُمثل الشكل المجاور

منحنى الاقتران  $y = x^2 - \frac{1}{8}$

$x^2$ . ألاحظ وجود مستقيمين

يمرّان بالنقطة  $(6, 1.5)$ . يُمثل

المستقيم الأزرق مماساً

للاقتران  $y$  عند النقطة  $(6, 1.5)$ ، والمستقيم الأزرق عموداً على المماس.

يُسمى المستقيم الأزرق **العمودي على المماس** (the normal) عند النقطة  $(6, 1.5)$ .

ويمكنني استعمال المشتقة في إيجاد معادلة المماس والعمودي على المماس عند نقطة.

## مثال 6

إذا كان الاقتران  $y = x - \frac{1}{8}x^2$ ، فاستعمل المشتقة لإيجاد كل ممّا يأتي:

1 معادلة المماس عند النقطة (6, 1.5).

**الخطوة 1:** أجد ميل المماس عند النقطة (6, 1.5).

$$\frac{dy}{dx} = 1 - \frac{1}{4}x \quad \text{مشتقة اقتران المسافة:}$$

$$= 1 - \frac{1}{4}(x) \quad \text{بتعويض: } x = 6$$

$$= -0.5 \quad \text{بالتبسيط:}$$

**الخطوة 2:** أجد معادلة المماس.

$$y - y_1 = m(x - x_1) \quad \text{معادلة المستقيم بصيغة الميل ونقطة:}$$

$$y - 1.5 = -0.5(x - 6) \quad \text{بتعويض: } x_1 = 6, y_1 = 1.5, m = -0.5$$

$$y = -0.5x + 4.5 \quad \text{بالتبسيط:}$$

إذن: معادلة المماس هي:  $y = -0.5x + 4.5$

2 معادلة العمودي على المماس عند النقطة (6, 1.5).

ميل العمودي على المماس يساوي 2، ومنه: فإنّ معادلة العمودي على المماس عند النقطة (6, 1.5) هي:

$$y - 1.5 = 2(x - 6)$$

$$y = 2x - 13.5$$

أتحقق من فهمي 

إذا كان الاقتران  $y = 8x - \frac{1}{x}$ ؛ فاستعمل المشتقة لإيجاد معادلة المماس ومعادلة العمودي على المماس عن النقطة (0.25, -2).

### أتذكر

إذا تعامد مستقيمان؛ فإنّ حاصل ضرب ميليهما يساوي -1



أجد مشتقة كل من الاقترانات الآتية؛ باستعمال التعريف العام للمشتقة عند النقطة المعطاة:

1  $y = x^2 + 3x + 1, x = 3$

2  $y = \frac{1}{x^2 + 1}, x = 2$

3  $y = (2x + 3)^2, x = -1$

أجد مشتقة كل من الاقترانات الآتية؛ باستعمال التعريف العام للمشتقة:

4  $y = \frac{x-3}{x^2}, x \neq 0$

5  $y = x(x+2)$

6  $y = \frac{1}{x-1}, x \neq 1$

أجد مشتقة كل اقتران مما يأتي:

7  $y = 10x - \frac{6}{\sqrt{x}}, x > 0$

8  $y = x^8 - x^{-8}, x \neq 0$

9  $y = 9x^{-2} + 3\sqrt{x}, x > 0$

10  $y = \frac{1+\sqrt{x}}{x}, x > 0$


11  $y = \frac{6}{x^3} + \frac{2}{x^2} - 3, x \neq 0$

12  $y = 20x^5 + 3\sqrt[3]{x} + 17$

إذا كان الاقتران  $y = x^2 - x$ ؛ فاستعمل المشتقة لإيجاد كل مما يأتي:

14 معادلة العمودي عندما  $x = 4$

13 معادلة المماس عندما  $x = 4$



يُمثل الشكل المجاور منحنى الاقتران  $f(x) = \frac{24}{x}, x \neq 0$

15 أجد  $f'(x)$ .

16 أبين أن ميل المماس سالب دائماً عند أي نقطة.



17 أقلعت طائرة من دون طيار عمودياً في رحلة مدتها 20 ثانية. فإذا كان

ارتفاع الطائرة يُعطى بالاقتران  $h = 2t^2 - t^3, 0 \leq t \leq 20$ ، حيث  $h$  ارتفاع

الطائرة بالامتار، و  $t$  الزمن بالثواني؛ فأجد سرعة الطائرة بعد 10 ثوانٍ من

إقلاعها.

#### معلومة

لا توجه الطائرات من دون طيار نفسها بنفسها بشكل كامل، بل تحتاج إلى طيار يجلس في محطة توجيه على الأرض، يُحدّد لنظامها الآلي مسار الرحلة، ويتحكم بها عبر الأقمار الصناعية.

18 أجد معادلة المماس للاقتران  $y = (x-3)(x-5)$ ، عند نقطة تقاطعه مع محور  $x$ .


19 يُمثّل الاقتران  $s = 10\sqrt{t} + t + \pi$ ,  $0 \leq t \leq 4$  المسافة (بالمتر) التي يقطعها جسيم متحرّك، حيث  $t$  الزمن بالثانية. أجد سرعة الجسيم بعد ثانية واحدة من بدء حركته.

إذا كان منحنى الاقتران  $C$  يُعطى بالمعادلة  $y = \sqrt[3]{8x}$ ؛ فأُجيب عمّا يأتي:

20 أجد مشتقة الاقتران عند النقطة  $P(125, 10)$ .

21 إذا كان الاقتران  $D$  الاقتران العكسي للاقتران  $C$ ، وكانت النقطة  $Q$  انعكاسًا للنقطة  $P$ ؛ فأبيّن أنّ مشتقة الاقتران  $D$  عند النقطة  $Q$  تساوي مقلوب مشتقة الاقتران  $C$  عند النقطة  $P$ .

### مهارات التفكير العليا



تبرير: يُمثّل الشكل المجاور منحنى الاقتران  $y = \frac{x}{2} + \frac{2}{x}$ ,  $x \neq 0$

22 أبين أنّ ميل المماس عند النقطتين  $(2, 2)$  و  $(-2, -2)$  يساوي صفرًا.


23 أثبت أنّه إذا كانت  $x$  عددًا كبيرًا جدًّا؛ فإنّ ميل المماس يساوي 5.0 تقريبًا.

تبرير: إذا كان الاقتران  $y = x^2 + 4x$ ؛ فأُجيب عمّا يأتي:

24 أثبت أنّ معادلة المماس عند النقطة  $x = k$  هي  $y - (2k+4)x - k^2 = 0$

25 أجد قيمة  $k$  التي يكون عندها معادلة العمودي على المماس، هي  $4y + x = 0$

تحذّر: يُمثّل الشكل المجاور منحنى الاقتران  $y = x^2$ ، وكانت نقطة تقع على منحناه. إذا علمت ما يأتي:



- يقطع مماس الاقتران عند النقطة  $P$  المحور  $y$  في النقطة  $T$ .
- يقطع العمودي على المماس عند النقطة  $P$  المحور  $y$  في النقطة  $N$ .
- تقع النقطة  $A$  المحور الإحداثي  $y$ ، إذ إنّ  $AP$  يوازي المحور  $x$ .

26 أثبت أنّ  $\overline{OA} = \overline{OT}$

27 أثبت أنّ  $\overline{AN} = \frac{1}{2}$

## قاعدة السلسلة the Chain Rule

استعمال قاعدة السلسلة؛ لإيجاد مشتقة تركيب اقترانين.

فكرة الدرس



قاعدة السلسلة.

المصطلحات



مسألة اليوم



يزداد نصف قطر فقاعة صابون كروية الشكل بمعدل  $0.5 \text{ cm/s}$ . أجد سرعة زيادة مساحة سطح الفقاعة؛ عندما يكون نصف قطرها  $2.8 \text{ cm}$

تعلّمت في الدرس السابق، قاعدة اشتقاق اقتران القوة على صورة  $y = x^n$ ، حيث  $n$  عدد حقيقي، وسأتعلّم في هذا الدرس كيفية اشتقاق اقترانات القوة على صورة  $y = (ax+b)^n$

**مشتقة اقتران القوة على صورة  $y = (ax+b)^n$**

**مفهوم أساسي**

إذا كان  $y = (ax+b)^n$ ، حيث  $a$  و  $b$  أعداد حقيقية؛ فإن  $\frac{dy}{dx} = n(ax+b)^{n-1} \times a$

**مثال 1**

أجد مشتقة كل اقتران مما يأتي:

1  $y = (3x + 1)^5$

$$\frac{dy}{dx} = 5(3x + 1)^4 \times 3$$

قاعدة مشتقة اقتران القوة

$$= 15(3x + 1)^4$$

بالتبسيط

2  $y = \sqrt{1-7x}, x < \frac{1}{7}$

$$= (1-7x)^{\frac{1}{2}}$$

بكتابة الاقتران على الصورة الأسية

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2} (1-7x)^{-\frac{1}{2}} \times -7$$

قاعدة مشتقة اقتران القوة

$$= \frac{-7}{2\sqrt{1-7x}}$$

تعريف الأس السالب

3  $y = \frac{1}{8x+11}, x \neq -\frac{11}{8}$

$$= (8x+11)^{-1}$$

$$\frac{dy}{dx} = -1 (8x+11)^{-2} \times 8$$

$$= \frac{8}{8x+11}$$

بكتابة الاقتران على الصورة الأسية

قاعدة مشتقة اقتران القوة

تعريف الأس السالب

أتحقق من فهمي

أجد مشتقة كل اقتران مما يأتي:

a)  $y = (4x+9)^7$

b)  $y = \sqrt[3]{1-10x}$

c)  $y = \frac{1}{2x-7}$

تعلّمت سابقًا مفهوم الاقتران المركّب، ومن أمثله  $h(x) = (3x^3 + 2)^5$  الذي مركّبه

$$h(x) = (f \circ g)(x) \text{ حيث } f(x) = x^5 \text{ و } g(x) = 3x^3 + 2$$


$$h(x) = \underbrace{(3x^3 + 2)}_{\text{الداخلي}}^5$$

وسأتعلّم في هذا الدرس كيفية اشتقاق هذا النوع من الاقترانات.

### لغة الرياضيات

يُسمّى  $g(x)$  اقترانًا داخليًا للاقتران المركّب، ويُسمّى  $f(x)$  اقترانًا خارجيًا له.

إذا أردت اشتقاق الاقتران المركّب  $h(x) = (3x^3 + 2)^5$ ؛ فيمكنني فكّ الأقواس، واشتقاق كلّ حدّ من حدود كثير الحدود الناتج، ولكنّ هذا ليس بالأمر السهل. يُمكن أيضًا إيجاد مشتقة الاقتران المركّب بطريقة أبسط؛ عن طريق اشتقاق الاقتران الخارجي، وإيجاد قيمته عند الاقتران الداخلي، ثم ضربه في مشتقة الاقتران الداخلي، وهذا يُسمّى: **قاعدة السلسلة** (chain rule).



### أتذكّر

إذا كان  $g(x)$  و  $f(x)$  اقترانين؛ فإنّ الاقتران الناتج من تركيب  $f, g$  هو:  
 $(f \circ g)(x) = f(g(x))$

قاعدة السلسلة

مفهوم أساسي

إذا كان الاقتران  $f$  قابلاً للاشتقاق عند النقطة  $u = g(x)$  والاقتران  $g$  قابلاً للاشتقاق عند  $x$ ؛ فإن الاقتران المركب:

$(f \circ g)(x) = f(g(x))$  قابل للاشتقاق عند  $x$ ، ويُعطى بالقاعدة:

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

وبصيغة أخرى، إذا كان  $y = f(u)$  و  $u = g(x)$  فإن:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \times \frac{du}{dx}$$

حيث تُحسب قيمة  $\frac{dy}{du}$  عند  $u = g(x)$

مثال 2

أجد مشتقة كل اقتران مما يأتي:

1  $h(x) = (5x^3 - 2x)^4$

**الخطوة 1:** أجد مشتقة الاقتران الداخلي والاقتران الخارجي للاقتران المركب.

الاقتران الداخلي للاقتران المركب  $u = 5x^3 - 2x$  والاقتران الخارجي  $y = u^4$

$$\frac{dy}{du} = 15x^2 - 2$$

مشتقة الاقتران الداخلي

$$\frac{dy}{du} = 4u^3$$

مشتقة الاقتران الخارجي

**الخطوة 2:** أجد مشتقة الاقتران المركب؛ باستعمال قاعدة السلسلة.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \times \frac{du}{dx}$$

قاعدة السلسلة

$$= 4u^3 \times (15x^2 - 2)$$

$$\frac{du}{dx} = 15x^2 - 2, \frac{dy}{du} = 4u^3$$

بالتعويض

$$= 4(5x^3 - 2x)^3 (15x^2 - 2)$$

$$u = 5x^3 - 2x$$

بتعويض

$$2 \quad y = \frac{1}{(1-4x^2)^3}, \quad x \neq \pm \frac{1}{2}$$

$$= (1-4x^2)^{-3}$$

**الخطوة 1:** أجد مشتقة الاقتران الداخلي والاقتران الخارجي للاقتران المركب.

الاقتران الداخلي للاقتران المركب  $u = 1 - 4x^2$  والاقتران الخارجي  $y = u^{-3}$

$$\frac{dy}{dx} = -8x \quad \text{مشتقة الاقتران الداخلي}$$

$$\frac{dy}{du} = -3u^{-3} \quad \text{مشتقة الاقتران الخارجي}$$

**الخطوة 2:** أجد مشتقة الاقتران المركب؛ باستعمال قاعدة السلسلة.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \times \frac{du}{dx} \quad \text{قاعدة السلسلة}$$

$$= -3u^{-4} \times -8x \quad \text{بالتعويض } \frac{du}{dx} = -8x, \frac{dy}{du} = -3u^{-4}$$

$$= 24(1-4x^2)^{-4} \quad \text{بتعويض } u = 1 - 4x^2$$

$$= \frac{24}{(1-4x^2)^4} \quad \text{تعريف الأس السالب}$$

**أتحقق من فهمي** 

أجد مشتقة كل اقتران مما يأتي:

a)  $y = (2x^4 - 8)^{\frac{5}{3}}$

b)  $y = \frac{13}{(x^2-8)^7}, \quad x \neq \pm\sqrt{8}$

تعلّمت في المثال السابق إحدى حالات قاعدة السلسلة، وفيها يكون الاقتران الخارجي اقتران قوة على صورة  $y = (g(x))^n$ ، وهذا يقود إلى التعميم الآتي:

### قاعدة السلسلة لاقترانات القوة

### مفهوم أساسي

$$\frac{dy}{dx} = n(g(x))^{n-1} \times g'(x) \quad \text{فإن } n \text{ عدد حقيقي؛ إذا كان } y = (g(x))^n$$

مثال 3

أوجد مشتقة كل اقتران مما يأتي، عند النقطة المعطاة:

1  $f(x) = \sqrt[5]{2x^3 - 1}$  ,  $x = 1$

$$= (2x^3 - 1)^{\frac{1}{5}}$$

بكتابة الاقتران على الصورة الأسية

$$f'(x) = \frac{1}{5} (2x^3 - 1)^{-\frac{4}{5}} \times (6x^2)$$

قاعدة مشتقة اقتران القوة

$$= \frac{6x^2}{5\sqrt[5]{(2x^3 - 1)^4}}$$

تعريف الأس السالب

$$= \frac{6}{5}$$

بتعويض  $x = 1$

2  $y = (1 - x^3)^{\frac{4}{7}}$  ,  $x = -2$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{4}{7} (1 - x^3)^{-\frac{3}{7}} \times (-3x^2)$$

قاعدة مشتقة اقتران القوة

$$= \frac{-12x^2}{7\sqrt[7]{(1 - x^3)^3}}$$

تعريف الأس السالب

$$= \frac{6}{5}$$

بتعويض  $x = -2$

أتحقق من فهمي

أوجد مشتقة كل اقتران مما يأتي، عند النقطة المعطاة:

a)  $f(x) = \sqrt[7]{x^4 + 1}$  ,  $x = -1$

b)  $y = (2x - 5)^{\frac{2}{3}}$  ,  $x = 0$

تعلّمت سابقاً أنّ المشتقة هي نهاية ميل القاطع عندما  $h \rightarrow 0$ ، وبما أنّ ميل القاطع هو معدل تغيير قيمة  $y$  بالنسبة إلى قيمة  $x$ ؛ فإنّ المشتقة هي معدل تغيير أيضاً، ولكن عند لحظة (نقطة) معيّنة. فعند إيجاد  $\frac{dy}{dx}$  فهذا يعني إيجاد معدل تغيير  $y$  بالنسبة إلى  $x$ .

تتغير الأشياء من حولنا في كثير من المواقف الحياتية بالنسبة إلى الزمن، فمثلاً إذا كانت  $r$  كمية معيّنة؛ فإنّ معدل تغييرها بالنسبة إلى الزمن  $t$  هو  $\frac{dr}{dt}$ ، ولكن إذا افترضت أنّ  $r$  هو نصف قطر بالون كروي الشكل، وكان معدل تغيير حجم البالون بالنسبة إلى الزمن معلوماً؛ فكيف أجد معدل تغيير نصف القطر بالنسبة إلى الزمن؟ بكلمات أخرى، كيف أجد  $\frac{dr}{dt}$  إذا علمت قيمة  $\frac{dv}{dt}$ ؟ يُمكن الإجابة عن مثل هذا النوع من الأسئلة عن طريق قاعدة السلسلة.

## مثال 4 : من الحياة



تسرّب نفط من ناقلة بحرية، مكوّنًا بقعة دائرية الشكل على سطح الماء، تزداد مساحتها بمعدل  $50 \text{ m}^2/\text{min}$ . أجد سرعة تزايد نصف قطر بقعة النفط، عندما يكون نصف قطرها  $20 \text{ m}$ .

إذا كان نصف قطر بقعة النفط الدائرية الشكل  $r$  مترًا، ومساحتها  $A \text{ m}^2$ ؛ فإن  $\frac{dA}{dr} = 50$ .

**الخطوة 1:** أجد مشتقة مساحة الدائرة بالنسبة إلى نصف القطر.

$$A = \pi r^2 \quad \text{قانون مساحة الدائرة}$$

$$\frac{dA}{dr} = 2\pi r \quad \text{مشتقة المساحة بالنسبة إلى نصف القطر}$$

**الخطوة 2:** أجد معدل تغيير نصف القطر بالنسبة إلى الزمن؛ باستعمال قاعدة السلسلة.

$$\frac{dA}{dr} \times \frac{dr}{dt} = \frac{dA}{dt} \quad \text{قاعدة السلسلة}$$

$$2\pi r \times \frac{dr}{dt} = 50 \quad \text{بالتعويض } \frac{dA}{dr} = 2\pi r, \frac{dA}{dt} = 50$$

$$\frac{dr}{dt} = \frac{25}{\pi r} \quad \text{بقسمة طرفي المعادلة على } 2\pi r$$

$$= \frac{25}{\pi \times 20} \quad \text{بتعويض } r = 20$$

$$\approx 0.398 \quad \text{باستعمال الآلة الحاسبة}$$

إذن: معدل تغيير نصف القطر بالنسبة إلى الزمن  $0.398 \text{ m/min}$  تقريبًا.

### أتحقق من فهمي



يُنْفَخ بالون على شكل كرة؛ بحيث يزداد حجمه بمعدل  $30 \text{ cm}^3/\text{s}$ . أجد معدل زيادة نصف قطر البالون؛ عندما يكون:

(a) نصف القطر  $4 \text{ cm}$

(b) نصف القطر  $8 \text{ cm}$

### معلومة

تُلوّث السفن المجاري المائية والمحيطات بعدّة طرائق، مثل تسرّب النفط أو المواد الكيميائية من الناقلات، ما يُشكّل تهديدًا متزايدًا للحياة البحرية.

### لغة الرياضيات

تُعَدّ كلمة السرعة من المصطلحات التي تدلّ على معدل التغيّر بالنسبة إلى الزمن، فالسرعة معدل تغيير المسافة بالنسبة إلى الزمن.

### أتعلّم

أستعمل الإشارة الموجبة للدلالة على معدلات التغيّر المتزايدة، أمّا معدلات التغيّر المتناقصة فأعبر عنها باستعمال الإشارة السالبة.



أجد مشتقة كل اقتران مما يأتي:

1  $f(x) = (4x + 2)^2$

2  $y = (8 - x)^{10}$

3  $g(x) = (1 + 3x^2)^5$

4  $y = (6x - 5x^2)^{-8}$

5  $y = (\pi - x^2)^3$

6  $h(x) = \sqrt{6x - 1}, x > \frac{1}{6}$

7  $y = \left(\frac{1 + \sqrt{x}}{\sqrt[3]{x^2}}\right)^3, x > 0$

8  $h(x) = (\sqrt{x} + x)^{-2}, x > 0$

أجد مشتقة كل اقتران مما يأتي، عند النقطة المعطاة:

9  $h(x) = \sqrt{(2 - x)^5} + 16, x = -4$

10  $y = \frac{1}{\sqrt{x} - 1}, x = \frac{1}{4}$


11  $y = \frac{2}{(x^2 - 13)^{\frac{4}{7}}}, x = 1$

12  $h(x) = \sqrt{1 - \sqrt{x}}, x = \frac{1}{4}$

يُمثل الشكل المجاور منحنى الاقتران  $y = \frac{20}{2 + x}, x > -2$

13 أجد ميل المماس عند النقطة (2, 5).

14 أجد إحداثيات النقطة التي يكون عندها ميل المماس يساوي -0.2



إذا كان الاقتران  $y = \sqrt{2x + 5}$ ؛ فأُجب عما يأتي:


16 أجد النقطة التي يقطع عندها مماس الاقتران عند النقطة (2, 3) المحور  $x$ .

15 أثبت أن  $\frac{dy}{dt} = \frac{1}{y}$

يُمثل الشكل المجاور منحنى الاقتران  $y = \frac{600}{x^2 + 50}$

17 أجد  $\frac{dy}{dx}$

18 أجد معادلة المماس عند النقطة (10, 4).




إذا كان الاقتران  $f(x) = \sqrt{100 - x^2}, x \in [-10, 10]$ ؛ فأُجب عما يأتي:

19 أجد مشتقة الاقتران عند النقطة  $P(-6, 8)$

20 أثبت أن المستقيم الواصل بين نقطة الأصل والنقطة  $P$  عمودي على مماس الاقتران عند النقطة  $P$ .


21 إذا كان الاقتران  $y = (2x^2 - 3x + 1)^5$ ؛ فأثبت أن:  $\frac{dy}{dt} = 5(4x-3)(4x-1)^4 (x-1)^4$

22 إذا كان الاقتران  $y = \sqrt{a + bx^2}$  حيث  $a, b > 0$ ؛ فأثبت أن:  $\frac{x}{y} = c \frac{dy}{dx}$ ، حيث  $a, b, c$  ثوابت. أبرر إجابتي.



23 يُبين الشكل المجاور خزان ماء أسطواني الشكل، إذا كانت كمية الماء في الخزان تزداد بمعدل 0.4 L/s؛ فأجد معدل تغير عمق الماء في الخزان  $h$  cm.

24 يزداد حجم مكعب بمعدل  $50 \text{ cm}^3/\text{s}$ . أجد معدل زيادة مساحة سطح المكعب؛ عندما يكون طول ضلع المكعب 5 cm.




25 يُبين الشكل المجاور مخروطًا مقلوبًا، ارتفاعه 20 cm وقطر قاعدته 16 cm، يُملأ بالماء بمعدل  $25 \text{ cm}^3/\text{s}$ . أجد معدل زيادة ارتفاع الماء؛ عندما يكون ارتفاعه 12 cm.

26 إذا كان المتغيران  $u$  و  $w$  مرتبطين بالعلاقة  $u = 150\sqrt[3]{w^2}$ ، وكانت قيمة المتغير  $w$  تزداد مع الزمن  $t$  وفقًا للعلاقة  $w = 0.05t + 8$ ؛ فأجد معدل تغير  $u$  بالنسبة إلى الزمن عندما  $w = 64$ .

27 يخرج الهواء من منطاد كروي الشكل بمعدل ثابت مقداره  $0.6 \text{ cm}^3/\text{s}$  محافظًا على شكله الكروي. أجد معدل تناقص نصف قطر المنطاد، عند اللحظة التي يكون فيها نصف القطر 2.5 m.


### مهارات التفكير العلي



28 **تبرير:** يُمثل الشكل المجاور منحنى الاقتران  $y = \frac{a}{1+x^2}$ ،  $a > 0$ . أبين أن مماس الاقتران عند  $x = 1$  ومنحنى الاقتران يقطعان المحور  $y$  عند النقطة نفسها. أبرر إجابتي.

29 **تحّد:** أجد مشتقة الاقتران  $f(x) = \frac{x^2}{x^2 + 4}$ ، عندما  $x = -1$ .

30 **تحّد:** أثبت أن مماس الاقتران  $y = (x^2 + x - 2)^3 + 3$  عند النقطة (1, 3)، هو أيضًا مماس للاقتران عند نقطة أخرى.



31 **تحّد:** يُبين الشكل المجاور متوازي مستطيلات قاعدته مربعة الشكل وحجمه  $1000 \text{ cm}^3$ . إذا كان طول ضلع قاعدة المتوازي تزداد بمعدل  $0.2 \text{ cm/s}$ ؛ فأجد معدل تغير الارتفاع عندما يصبح الشكل مكعبًا.

# رسم منحنى الاقتران باستعمال المشتقة

## sketch a graph of the function using the derivative

رسم منحنى كثيرات الحدود؛ باستعمال المشتقة.

فكرة الدرس



متزايد، متناقص، نقطة حرجة، قيمة حرجة، نقطة صغرى محلية، نقطة عظمى محلية، نقطة انعطاف أفقي، المشتقة الثانية.

المصطلحات



مسألة اليوم




يُمثل الاقتران  $h(t) = -5t^2 + 10t$  ارتفاع الدلفين (بالمتر)

فوق سطح الماء بعد  $t$  ثانية من ظهوره فوق سطح الماء.

- ما أقصى ارتفاع يصل إليه الدلفين؟
- أصف حركة الدلفين خارج الماء.
- هل يُمكنني تمثيل منحنى حركة الدلفين من دون إنشاء جدول؟

يُمثل الشكل المجاور منحنى كثير الحدود  $y = f(x)$



ألاحظ أن قيم  $y$  تزداد في الفترة  $-\infty < x < a$ ،

والفترة  $b < x < \infty$ ، ويرتفع المنحنى من

اليسار إلى اليمين في هاتين الفترتين؛ لذا، يكون

الاقتران  $f(x)$  متزايداً (increasing) في

هاتين الفترتين. ألاحظ -أيضاً- أن قيم  $y$

تقل في الفترة  $a < x < b$ ، وينخفض منحنى

الاقتران من اليسار إلى اليمين؛ لذا، يكون

الاقتران  $f(x)$  متناقصاً (decreasing) في هذه الفترة.

### أتعلم


تكتب فترات التزايد على صورة الفترة المفتوحة  $(a, b)$ ، لأن التزايد يبدأ من يمين النقطة  $a$  وينتهي عند يسار النقطة  $b$ ، وكذلك الأمر بالنسبة لفترات التناقص.

### تزايد وتناقص الاقتران

### مفهوم أساسي

- يكون الاقتران  $f$  متناقصاً في الفترة  $I$ ، إذا كان  $f(x_1) > f(x_2)$  لكل  $x_1 < x_2$  في الفترة.
- يكون الاقتران  $f$  متزايداً في الفترة  $I$ ، إذا كان  $f(x_1) < f(x_2)$  لكل  $x_1 < x_2$  في الفترة.

تعلّمتُ سابقاً أنّ مشتقّة الاقتران عند نقطة، تساوي ميل المماس عند تلك النقطة. ولكن، كيف يُمكن استعمال المشتقّة في دراسة تزايد الاقتران وتناقصه على مجاله؟  
يُبيّن الشكل المجاور بعض مماسات منحنى الاقتران  $f(x)$ . ألاحظ أنّ:



- المماسات ذات الميل الموجب، مرتبطة بالجزء المتزايد من منحنى الاقتران.
  - المماسات ذات الميل السالب، مرتبطة بالجزء المتناقص من منحنى الاقتران.
- وهذا يقود إلى الاستفادة من إشارة المشتقّة، في تحديد فترات التزايد والتناقص للاقتران.

### نظرية

- إذا كان  $f'(x) > 0$  لقيم  $x$  جميعها في الفترة  $I$ ؛ فإنّ  $f$  يكون متزايداً على الفترة  $I$ .
- إذا كان  $f'(x) < 0$  لقيم  $x$  جميعها في الفترة  $I$ ؛ فإنّ  $f$  يكون متناقصاً على الفترة  $I$ .

### مثال 1

أحدّد فترات التزايد والتناقص لكلّ اقتران ممّا يأتي:

1  $f(x) = x^2 + 2x - 3$

**الخطوة 1:** أجد مشتقّة مساحة الدائرة بالنسبة إلى نصف القطر.

$$f'(x) = 2x + 2$$

مشتقّة الاقتران

$$2x + 2 = 0$$

بمساواة المشتقّة بالصفر

$$2x = -2$$

بجمع -2 للطرفين

$$x = -1$$

بقسمة الطرفين على 2

إذن: صفر المشتقّة  $x = -1$

**الخطوة 2:** أبحث في إشارة المشتقة.

يكون الاقتران متزايداً عندما تكون  $f'(x) > 0$ ، ومتناقصاً عندما  $f'(x) < 0$ .

|                   |                                                                                                   |             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                   | $\xleftarrow{\hspace{1.5cm}} \begin{array}{c}   \\ -1 \end{array} \xrightarrow{\hspace{1.5cm}} x$ |             |
|                   | $x < -1$                                                                                          | $x > -1$    |
| قِيم الاختبار (x) | $x = -2$                                                                                          | $x = 0$     |
| إشارة $f'(x)$     | $f'(-2) < 0$                                                                                      | $f'(0) > 0$ |
| سلوك الاقتران     | متناقص ▼                                                                                          | متزايد ▲    |

إذن:  $f(x)$  متناقص في الفترة  $(-\infty, -1)$ ، و متزايد في الفترة  $(-1, \infty)$ .

**2**  $f(x) = -2x^3 + 3x^2 + 36x$

**الخطوة 1:** أجد مشتقة الاقتران، ثم أجد أصفار المشتقة.

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| $f'(x) = -6x^2 + 6x + 36$  | مشتقة الاقتران           |
| $-6x^2 + 6x + 36 = 0$      | بمساواة المشتقة بالصفر   |
| $-6(x^2 - x - 6) = 0$      | بإخراج -6 عاملاً مشتركاً |
| $x^2 - x - 6 = 0$          | بقسمة الطرفين على -6     |
| $(x + 2)(x - 3) = 0$       | بالتحليل إلى العوامل     |
| $(x + 2) = 0, (x - 3) = 0$ | خاصية الضرب الصفرى       |
| $x = -2, x = 3$            | بحل المعادلتين الناتجتين |

إذن: أصفار المشتقة  $x = -2, x = 3$

**الخطوة 2:** أبحث في إشارة المشتقة.

يكون الاقتران متزايداً عندما تكون  $f'(x) > 0$ ، ومتناقصاً عندما  $f'(x) < 0$ .

|                   |                                                                                                                                       |                    |                    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                   | $\xleftarrow{\hspace{1.5cm}} \begin{array}{c}   \\ -2 \end{array} \begin{array}{c}   \\ 3 \end{array} \xrightarrow{\hspace{1.5cm}} x$ |                    |                    |
|                   | $x < -2$                                                                                                                              | $-2 < x < 3$       | $x > 3$            |
| قِيم الاختبار (x) | $x = -3$                                                                                                                              | $x = 0$            | $x = 4$            |
| إشارة $f'(x)$     | $f'(-3) < 0$<br>(-)                                                                                                                   | $f'(0) > 0$<br>(+) | $f'(4) > 0$<br>(-) |
| سلوك الاقتران     | متناقص ▼                                                                                                                              | متزايد ▲           | متناقص ▼           |

إذن:  $f(x)$  متناقص في الفترة  $(-\infty, -2)$ ، والفترة  $(3, \infty)$ ، و متزايد في الفترة  $(-2, 3)$ .

### أذكر


إذا كان  $a \times b = 0$ ، فإنه:  
إما  $a = 0$  وإما  $b = 0$  وإما  
كلاهما يساوي صفراً.

## أتحقق من فهمي

أحدد فترات التزايد والتناقص لكل اقتران مما يأتي:

a)  $f(x) = 6x^2 - 6x + 12$

b)  $h(x) = x^3 - 3x^2 + 4x + 3$



يُمثل الشكل المجاور منحنى كثير الحدود  $y = f(x)$ .

تُسمى النقطة التي يُمكنني رسم مماس أفقي عندها **نقطة حرجية** (critical point)، وهذا يعني أن مشتقة الاقتران عندها تساوي صفرًا ( $f'(x) = 0$ )، ويُسمى الإحداثي  $x$  في النقطة الحرجة **القيمة الحرجة** (critical value).

## أتعلم

- يُسمى الاقتران  $f(x) = x^3$  متزايدًا؛ لأن  $f'(x) \geq 0$  لجميعها.
- يُسمى الاقتران  $f(x) = 10 - x^3$  اقترانًا متناقصًا؛ لأن  $f'(x) \leq 0$  لجميعها.


يُمكن استعمال المشتقة؛ لتصنيف النقط الحرجة لكثيرات الحدود:



- نقطة عظمى محلية** (local maximum point): النقطة الحرجة التي يكون منحنى الاقتران عن يسارها متزايدًا وعن يمينها متناقصًا، ما يعني أن إشارة المشتقة عند الحركة من يسار النقطة إلى يمينها، تتغير من الموجب إلى السالب.



- نقطة صغرى محلية** (local minimum point): النقطة الحرجة التي يكون منحنى الاقتران عن يسارها متناقصًا وعن يمينها متزايدًا، ما يعني أن إشارة المشتقة عند الحركة من يسار النقطة إلى يمينها، تتغير من السالب إلى الموجب.



- نقطة انعطاف أفقي** (horizontal point of inflection): النقطة الحرجة التي يكون منحنى الاقتران حولها إما متزايدًا وإما متناقصًا، ما يعني أن إشارة المشتقة عند الحركة من يسار النقطة إلى يمينها، تكون إما موجبة وإما سالبة.

## أتعلم

- القيمة العظمى المحلية هي الإحداثي  $y$  للنقطة العظمى المحلية، وتُسمى ذلك لأنها أكبر من القيم المجاورة لها.
- القيمة الصغرى المحلية هي الإحداثي  $y$  للنقطة الصغرى المحلية، وتُسمى ذلك لأنها أصغر من القيم المجاورة لها.

مثال 2

إذا كان الاقتران  $f(x) = \frac{4}{3}x^3 + 5x^2 - 6x - 2$ ، فأستعمل المشتقة لإيجاد كل ممّا يأتي:

1 النقطة الحرجة للاقتران  $f$ .

$$f'(x) = 4x^2 + 10x - 6$$

$$4x^2 + 10x - 6 = 0$$

$$2(2x^2 + 5x - 3) = 0$$

$$2x^2 + 5x - 3 = 0$$

$$(2x - 1)(x + 3) = 0$$

$$(2x - 1) = 0, (x + 3) = 0$$

$$x = \frac{1}{2}, x = -3$$

مشتقة الاقتران

بمساواة المشتقة بالصفر

بإخراج 2 عاملاً مشتركاً

بالقسمة على 2

بالتحليل إلى العوامل

خاصية الضرب الصفري

بحلّ المعادلتين الناتجتين

عندما  $x = \frac{1}{2}$  فإن  $y = \frac{-43}{12}$ .

عندما  $x = -3$  فإن  $y = 25$ .

إذن: النقطة الحرجة هي:  $(\frac{1}{2}, \frac{-43}{12})$  و  $(-3, 25)$ .

2 أصنّف النقطة الحرجة إلى: عظمى محلية، أو صغرى محلية، أو انعطاف أفقي.



|                    | $x < -3$            | $-3 < x < \frac{1}{2}$ | $x > \frac{1}{2}$  |
|--------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| قيم الاختبار $(x)$ | $x = -4$            | $x = 0$                | $x = 1$            |
| إشارة $f'(x)$      | $f'(-4) > 0$<br>(+) | $f'(0) < 0$<br>(-)     | $f'(1) > 0$<br>(+) |
| سلوك الاقتران      | متزايد ▲            | متناقص ▼               | متزايد ▲           |

إذن: النقطة  $(\frac{1}{2}, \frac{-43}{12})$  صغرى محلية، والنقطة  $(-3, 25)$  عظمى محلية.

أتحقق من فهمي

إذا كان الاقتران  $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x - 1$ ، فأستعمل المشتقة لإيجاد كل ممّا يأتي:

(a) النقطة الحرجة للاقتران  $f$ .

(b) أصنّف النقطة الحرجة إلى: عظمى محلية، أو صغرى محلية، أو انعطاف أفقي.

أتعلم

النقطة الصغرى المحلية ليست أقل نقطة على المنحنى، وإنما هي فقط أقل من النقط التي حولها، وكذلك الأمر بالنسبة إلى النقطة العظمى المحلية؛ فهي ليست أعلى نقطة على المنحنى، إنما هي فقط أعلى من النقط التي حولها.

تعلّمتُ سابقًا أنّ اقتران المشتقة هو اقتران جديد، وهذا يعني أنّه يُمكنني اشتقاقه.

يُسمّى الاقتران الذي نحصل عليه من اشتقاق الاقتران مرّتين **المشتقة الثانية** (second derivative) أو اقتران المشتقة الثانية، ويُرمز له بالرمز  $f''(x)$ . على سبيل المثال، إذا كان  $f(x) = x^4$ ؛ فإنّ مشتقة الاقتران هي:  $f'(x) = 4x^3$ ، والمشتقة الثانية للاقتران هي:

$$f''(x) = 12x^2$$

### رموز رياضية

تُستعمل الرموز  $f''(x)$ ,  $\frac{d^2y}{dx^2}$ ,  $y''$  للتعبير عن المشتقة الثانية.

تُعدّ المشتقة الثانية للاقتران طريقة أكثر فاعلية في تحديد إذا كانت النقطة الحرجة عظمى محليّة أم صغرى محليّة وهو ما يسمى **باختبار المشتقة الثانية** (the second-derivative test)، فإذا كانت المشتقة الثانية عند القيمة الحرجة موجبة؛ فإنّ النقطة الحرجة هي صغرى محليّة، أمّا إذا كانت المشتقة الثانية عند القيمة الحرجة سالبة؛ فإنّ النقطة الحرجة هي عظمى محليّة.

### أتعلّم

إذا كانت المشتقة الثانية عند القيمة الحرجة تساوي صفرًا؛ عندها يفشل اختبار المشتقة الثانية.

### مثال 3

إذا كان الاقتران  $y = 1000 + 300x - x^3$ ؛ فأجد كلّ ممّا يأتي:

#### 1 النقطة الحرجة للاقتران.

$$\frac{dy}{dx} = 300 - 3x^2 \quad \text{مشتقة الاقتران}$$

$$300 - 3x^2 = 0 \quad \text{بمساواة المشتقة بالصفر}$$

$$3(100 - x^2) = 0 \quad \text{بإخراج 3 عاملاً مشتركاً}$$

$$100 - x^2 = 0 \quad \text{بقسمة الطرفين على 3}$$

$$-x^2 = -100 \quad \text{بإضافة 100 للطرفين}$$

$$x^2 = 100 \quad \text{بقسمة الطرفين على -1}$$

$$x = \pm 10 \quad \text{بأخذ الجذر التربيعي للطرفين}$$

عندما  $x = 10$  فإنّ  $y = 3000$ .

عندما  $x = -10$  فإنّ  $y = -1000$ .

إذن: النقطة الحرجة هي:  $(10, 3000)$  و  $(-10, -1000)$ .

2

أصنّف النقط الحرجة إلى صغرى محلية أو عظمى محلية؛ باستعمال المشتقة الثانية.

• أجد المشتقة الثانية للاقتران.  $\frac{d^2y}{dx^2} = -6x$

• أعوّض القيم الحرجة في المشتقة الثانية.

• القيمة الحرجة الأولى: إذا كانت  $x = 10$  فإن:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = -60 < 0$$

إذن:  $(10, 3000)$  نقطة عظمى محلية.

• القيمة الحرجة الثانية: إذا كانت  $x = -10$  فإن:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = 60 > 0$$

إذن:  $(-10, -1000)$  نقطة صغرى محلية.

 **أتتحقق من فهمي**

إذا كان الاقتران  $y = x^3 - 3x^2 + 1$ ؛ فأجيب عمّا يأتي:

(a) أجد النقط الحرجة للاقتران.

(b) أصنّف النقط الحرجة إلى صغرى محلية أو عظمى محلية؛ باستعمال المشتقة الثانية.

**أتعلم**

في بعض الاقترانات يُفضّل تحديد مقطع المحور  $x$  ومقطع المحور  $y$  للحصول على تمثيل أكثر دقة للاقتران.

**مثال 4**

أمثل الاقتران  $f(x) = x^4 - 2x^3$  بيانياً.

**الخطوة 1:** أجد النقط الحرجة للاقتران.

$$f'(x) = 4x^3 - 6x^2$$

$$4x^3 - 6x^2 = 0$$

$$2x^2(2x - 3) = 0$$

$$2x^2 = 0, (2x - 3) = 0$$

$$x = \frac{3}{2}, x = 0$$

مشتقة الاقتران

بمساواة المشتقة بالصفر

بإخراج  $2x^2$  عاملاً مشتركاً

خاصية الضرب الصفري

بحلّ المعادلتين الناتجتين

عندما  $x = \frac{3}{2}$  فإن  $f\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{-27}{16}$ .

عندما  $x = 0$  فإن  $f(0) = 0$ .

إذن: النقط الحرجة هي:  $(0, 0)$  ,  $\left(\frac{3}{2}, \frac{-27}{16}\right)$ .

**الخطوة 2:** أصنّف النقاط الحرجة إلى صغرى محلية أو عظمى محلية؛ باستعمال المشتقة الثانية.

• أجد المشتقة الثانية للاقتران.  $f''(x) = 12x^2 - 12x$

• أعوّض القيم الحرجة في المشتقة الثانية.

• القيمة الحرجة الأولى: إذا كانت  $x = \frac{3}{2}$  فإن:

$f''\left(\frac{3}{2}\right) = 9 > 0$

إذن:  $\left(\frac{3}{2}, \frac{-27}{16}\right)$  نقطة صغرى محلية.


• القيمة الحرجة الثانية: إذا كانت  $x = 0$  فإن:

$f''(0) = 0$

بما أن  $f''(0) = 0$ ، فإنه لا يُمكنني تحديد نوع النقطة الحرجة باستعمال المشتقة الثانية؛ لذا، أجباً إلى دراسة إشارة المشتقة الأولى حول النقطة لتحديد نوعها.



إذن:  $(0, 0)$  نقطة انعطاف أفقي.



**الخطوة 3:** أحدد النقاط الحرجة على المستوى الإحداثي، وأصل بينها مراعيًا في ذلك طبيعة كل نقطة وسلوك الاقتران حولها.

**أتحقق من فهمي**

أمثل الاقتران  $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 4$  بيانيًا.

**أتعلّم**

يُمكن اختيار نقط أخرى لتمثيل الاقتران إضافة إلى النقط الحرجة؛ للحصول على تمثيل بياني أكثر دقة للاقتران.

**أتذكّر**

يكون منحنى الاقتران متناقصًا على يسار القيمة الصغرى، ومتزايدًا على يمينها.

**أفكّر**

لماذا رُسم منحنى الاقتران متناقصًا حول نقطة الانعطاف  $(0, 0)$ ؟

يُمكن استعمال التمثيل البياني لكثيرات الحدود في الكثير من المواقف الحياتية، منها رسم منحني الأفعوانيات في مدن الألعاب.

## مثال 5: من الحياة



إنَّ المسار الذي تسلكه العربة الدوارة في الأفعوانية، قد يرتفع لدرجة كافية لتقلب راكبيها رأسًا على عقب، ولكنَّ قوة التسارع التي تدفع العربة إلى الأمام تتغلب على قوة الجاذبية. ومن ثمَّ، تُكمل مسارها.

يُمثِّل الاقتران  $f(t) = t^3 - 3t^2 + 10, t \geq 0$  ارتفاع أفعوانية بالأمتار؛ حيث  $t$  الزمن بالثواني. أمثِّل بيانًا مسار الأفعوانية في الثواني الأربع الأولى من حركتها. بما أنَّ منحني الاقتران  $f(t)$  يُمثِّل مسار الأفعوانية؛ إذن: أمثِّل الاقتران  $f$  في الفترة  $0 \leq t \leq 4$ .

**الخطوة 1:** أجد إحداثيات نقطتي طرفي الفترة:

$$f(0) = (0)^3 - 3(0)^2 + 10 = 10$$

$$f(4) = 4^3 - 3(4)^2 + 10 = 26$$

إذن: نقطتا طرفي الفترة  $(0, 10)$ ،  $(4, 26)$ .

**الخطوة 2:** أجد النقط الحرجة للاقتران في الفترة  $0 < t < 4$

$$f'(t) = 3t^2 - 6t$$

$$3t^2 - 6t = 0$$

$$3t(t-2) = 0$$

$$3t = 0, (t-2) = 0$$

$$t = 0, t = 2$$

مشتقة الاقتران

بمساواة المشتقة بالصفر

بإخراج  $3t$  عاملاً مشتركاً

خاصية الضرب الصفري

بحل المعادلتين الناتجتين

عندما  $t = 0$  فإن  $f(0) = 10$

عندما  $t = 2$  فإن  $f(2) = 6$

إذن: النقط الحرجة هي:  $(2, 6)$ ،  $(0, 10)$ .

**الخطوة 3:** أصنّف النقط الحرجة إلى صغرى محلية أو عظمى محلية؛ باستعمال المشتقة الثانية.

• أجد المشتقة الثانية للاقتران.

$$f''(x) = 6t - 6$$

• أعوّض القيم الحرجة في المشتقة الثانية.

• القيمة الحرجة الأولى: لا يُمكنني تصنيف النقطة الحرجة  $(0, 10)$  عظمى محلية أو صغرى محلية.

## أفكر

لماذا لا يُمكن تحديد نوع النقطة الحرجة  $(0, 10)$ ؟

### أتعلم

أقل ارتفاع للأفعوانية في  
الفترة المعطاة 6 m

### أفكر

ماذا تمثل كل من النقطتين  
(0, 0), (4, 26) بالنسبة  
إلى التمثيل البياني؟

• القيمة الحرجة الثانية: إذا كانت  $x = 2$  فإن  $f''(2) = 6 > 0$

إذن: (2, 6) نقطة صغرى محلية.


**الخطوة 4:** أحدد النقاط الحرجة على المستوى

الإحداثي، وأصل بينها مراعيًا

في ذلك طبيعة كل نقطة وسلوك

الاقتان حولها، إضافة إلى تحديد

النقطتين (0, 0), (4, 26).



أتحقق من فهمي

يُمثل الاقتان  $f(t) = 0.001t^3 - 0.12t^2 + 3.6t + 10, t \geq 0$  ارتفاع الأفعوانية بالأمتار،  
حيث  $t$  الزمن بالثواني. أمثل بيانيًا مسار الأفعوانية في الفترة  $0 \leq t \leq 70$ .

### أدرب وأحل المسائل

أحدد فترات التزايد والتناقص لكل اقتان مما يأتي:

1  $f(x) = x^3 + 3x^2 + 3x - 20$

2  $f(x) = (x^2 + 4)^3$

3  $f(x) = (x-2)^9$

4  $y = x^4 - 8x^2$

أجد النقاط الحرجة لكل اقتان مما يأتي، ثم أحدد نوعها باستعمال المشتقة:

5  $y = x^3 + 6x^2 - 15x - 90$

6  $y = -(x-2)^3 + 1$

7  $f(x) = x^3 - 3x^2 - 144x$

8  $f(x) = 3x^4 + 16x^3 + 24x^2 + 3$

أجد النقاط الحرجة لكل اقتان مما يأتي، ثم أحدد نوعها باستعمال المشتقة الثانية:

9  $y = x^4 - 2x^2$

10  $f(x) = 3x^4 - 8x^3 + 6x^2$

11  $y = x^2(x-4)$

12  $f(x) = x^5 - 5x^3$

أمثل كلاً من الاقترانات الآتية بيانياً:

13  $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 15$

14  $y = x^2 - 12x - 20$

15  $f(x) = x^3 - 6x^2 - 180x$

16  $y = 2x^3 - 9x^2 + 12x + 8$

17 إذا كانت مشتقة الاقتران  $f$  تُعطى بالاقتران  $f'(x) = (x-1)^2(x-3)$ ؛ فأجد قيم  $x$  التي يكون عندها نقط حرجة للاقتران  $f$ ، ثم أحدّد نوعها.

إذا كان الاقتران  $y = x(6-x^2)$ ؛ فأجيب عما يأتي:

18 أمثل منحنى كل من الاقترانات:  $y$ ،  $\frac{dy}{dx}$ ،  $\frac{d^2y}{dx^2}$

19 أصف العلاقة بين منحنيات الاقترانات الثلاثة، موضحاً في ذلك مفهوم المشتقة.



يُمثل الاقتران  $s(t) = t^3 - 15t^2 + 63t$ ،  $t > 0$ ، المسافة (بالمتر) التي يقطعها فهد بعد  $t$  ثانية من البدء بمطاردة فريسته.

20 أجد أقصى سرعة للفهد بعد 8 ثوانٍ من بدء حركته.

21 أمثل منحنى الاقتران  $s$  بيانياً.



لوحظ أنّ عدد الضفادع في بحيرة ينمو وفق الاقتران  $P(t) = 120t - 0.4t^2 + 1000$ ، حيث  $P$  عدد الضفادع، و  $t$  الزمن بالأشهر منذ بدء ملاحظة الضفادع في البحيرة.

22 أجد أكبر عدد يُمكن أن تصل إليه الضفادع في البحيرة منذ بدء ملاحظتها.

23 بعد كم شهراً ستختفي الضفادع من البحيرة؟

24 أمثل الاقتران  $P$  بيانياً.

## معلومة

يُمكن لأنثى الضفدع وضع عدد يتراوح بين بيضتين إلى 50,000 بيضة في المرة الواحدة، حسب نوعها.

أقلعت طائرة من دون طيار عمودياً من الأرض، ثم عادت لتهبط رأسياً على الأرض في رحلة مدتها 20 ثانية. فإذا كان الاقتران  $h(t) = 0.2t^2 - 0.01t^3$ ،  $0 \leq t \leq 20$ ، يُمثل ارتفاع الطائرة بعد  $t$  ثانية من انطلاقها؛ فأجيب عما يأتي:

25 أمثل الاقتران  $h(t)$  بيانياً.

26 أثبت أنّ الزمن اللازم لصعود الطائرة، يساوي مثلي الزمن اللازم لهبوطها.

- 27 إذا كان الاقتران  $y = ax^2 + bx + c$ ، يمرّ بالنقطتين  $(0, -48)$ ، و  $(6, 0)$ ، وله قيمة عظمى عندما  $x = 7$ ؛ فأجد قيم الثوابت  $a$  و  $b$  و  $c$ .

### مهارات التفكير العليا



#### معلومة

تُعدّ أفضل زاوية للوجه الأمامي لمضرب كرة التنس 50 درجة تقريبًا بالنسبة إلى سطح الأرض، ما يجعل ضرب الكرة أسهل.

تبرير: يُمثّل الاقتران  $y = 23t - 5t^2$ ،  $0 \leq t \leq 4$  ارتفاع كرة مضرب (بالمتر) بعد  $t$  ثانية من ارتطامها بالمضرب.


28 أجد أقصى ارتفاع تصل إليه الكرة.

29 إذا كانت مقاومة الهواء قد أُهملت في الاقتران  $y$ ؛ فكيف من المحتمل أن تؤثر مقاومة الهواء في أقصى ارتفاع تصله الكرة؟ أبرّر إجابتي.

تحذّر: إذا كان الاقتران  $y = x^3 + ax^2 + b$ ، حيث  $a$  و  $b$  ثوابت؛ فأجيب عمّا يأتي:

30 أثبت أن لمنحنى الاقتران نقطة حرجة عند تقاطعه مع المحور  $y$ .

31 أثبت أن للاقتران نقطة صغرى محلية إذا كانت  $a > 0$ .



32 تحدّد: يُمثّل الشكل المجاور منحنى الاقتران  $f(x)$ . أمثل بيانياً منحنى الاقتران  $f'(x)$ .

33 تحدّد: إذا كان الاقتران  $y = px^3 - 4px^2 + 5x - 11$ ، حيث  $p > 0$ ؛ فأجد مجموعة قيم  $p$  التي يكون عندها للاقتران نقطتان حرجتان.

## تطبيقات عملية على الاشتقاق Applications of differentiation

فكرة الدرس



مسألة اليوم



حلّ مسائل وتطبيقات حياتية على المشتقات.




وجد باحث زراعي أنّ عدد حبّات البرتقال التي تنتجها كلّ شجرة في أحد بساتين غور الأردن، يعتمد على كثافة الأشجار المزروعة. إذا علمت أنّ عدد الأشجار في البستان  $n$ ، وأنّ كلّ شجرة تنتج  $9n - 900$  برتقالة؛ فأجد أكبر عدد من أشجار البرتقال التي يمكن زراعتها في البستان للحصول على أكبر عائد.

تعلّمت في الدرس السابق كيفية إيجاد النقاط الحرجة للاقتران، وتصنيفها عن طريق المشتقة. وأستطيع الآن توظيف هذه المفاهيم في تطبيقات حياتية متنوعة، مثل: تحديد أكبر ربح ممكن، أو إيجاد أقل كمية من المواد اللازمة لصنع الأشياء. ويمكن تلخيص الإجراءات العامة التي نحتاج إليها لحلّ مسائل عملية تتطلّب إيجاد قيمة عظمى أو صغرى في الخطوات الآتية:

- أرسم مخططاً يُمثل المسألة.
- أكتب اقتراناً يُمثل الكمية المراد تصغيرها أو تكبيرها، بحيث يربط الاقتران المتغيّرات ببعضها.
- أستعمل الشروط الواردة في المسألة لكتابة الاقتران بدلالة متغيّر واحد.
- أجد القيمة الحرجة باستعمال الاشتقاق، وأحدّد نوعها.
- أجد المطلوب من المسألة.

### مثال 1

يُصمّم مهندس سلّة بلاستيكية على شكل متوازي مستطيلات، قاعدتها مربعة الشكل ومفتوحة من الأعلى وسماكتها قليلة. إذا كان حجم السلّة  $40000 \text{ cm}^3$ ؛ فأجد أبعادها التي تجعل كمية البلاستيك المستعملة في تصنيعها أقل ما يمكن.



**الخطوة 1:** أرسم مخططاً لمتوازي أضلاع قاعدته مربعة الشكل، ثم أكتب اقتراناً يُمثل المساحة الكلية لسطح السلّة.

أفرض أن طول ضلع القاعدة المربعة  $x$  وارتفاع السلّة  $h$ ، إذن: الاقتران الذي يُمثّل المساحة الكلية لسطح السلّة مستشّياً مساحة القاعدة العلوية:

$$A = x^2 + 4xh$$

**الخطوة 2:** أكتب الاقتران الذي يُمثّل المساحة الكلية؛ بدلالة متغيّر واحد.

$$V = x^2 h$$

قانون حجم متوازي المستطيلات

$$40000 = x^2 h$$

بتعويض  $V = 40000$

$$h = \frac{40000}{x^2}$$

بكتابة  $h$  موضوعاً للقانون

إذن: العلاقة بين الارتفاع وطول ضلع القاعدة:

$$h = \frac{40000}{x^2}$$

ولكتابة الاقتران الذي يُمثّل مساحة السطح الكلية بدلالة  $x$ ، أعوّض  $h = \frac{40000}{x^2}$  بالاقتران.

$$A = x^2 + 4xh$$

اقتران المساحة السطحية للسلّة

$$= x^2 + 4x \left( \frac{40000}{x^2} \right)$$

$$h = \frac{40000}{x^2}$$

$$= x^2 + \frac{160000}{x}$$

بالتبسيط

إذن: الاقتران الذي يُمثّل مساحة السطح الكلية بدلالة المتغيّر  $x$ :

$$A = x^2 + \frac{160000}{x}$$

**الخطوة 3:** أشتقّ الاقتران، ثم أجد القيمة الحرجة وأحدّد نوعها.

$$\frac{dA}{dx} = 2x - \frac{160000}{x^2}$$

مشتقة اقتران المساحة

$$2x - \frac{160000}{x^2} = 0$$

بمساواة المشتقة بالصفر

$$2x^3 = 160000$$

بضرب طرفي المعادلة بـ  $x^2$

$$x = \sqrt[3]{80000}$$

بأخذ الجذر التكعيبي للطرفين

$$x = 43.1$$

باستعمال الآلة الحاسبة

إذن: القيمة الحرجة لاقتران المساحة  $x = 43.1$ . ولتحديد نوعها؛ أجد المشتقة الثانية للاقتران.

$$\frac{d^2A}{dx^2} = 2 + \frac{320000}{x^3}$$

## أفكر

ما علاقة المساحة الكلية لسطح السلّة، بكمية المواد المستعملة في تصنيعها؟

## أتعلّم

يُمكن كتابة معادلة المساحة الكلية للسطح؛ بدلالة المتغيّر  $h$  أيضاً.

وبما أن المشتقة الثانية لاقتزان المساحة موجبة لقيم  $x$  جميعها حيث  $x > 0$ ، إذن: القيمة الحرجة هي قيمة صغرى.

**الخطوة 4:** أجد المطلوب من المسألة.

أعوض قيمة  $x$  في الارتفاع وطول ضلع القاعدة:

$$h = \frac{40000}{x^2}$$

الارتفاع وطول ضلع القاعدة

$$= \frac{40000}{(43.1)^2}$$

بتعويض  $x = 43.1$

$$= 21.5$$

باستعمال الآلة الحاسبة

إذن: أقل كمية من البلاستيك يمكن استعمالها في تصنيع السلّة، تنتج عندما يكون طول ضلع قاعدتها 43.1 cm، وارتفاعها 21.5 cm

**أتحقق من فهمي**

يُريد مصنع تصميم علب كرتونية؛ لتغليف البضائع على شكل متوازي مستطيلات قاعدتها مربعة الشكل وحجمها  $1000 \text{ cm}^3$ . أجد أبعاد العلب بحيث تكون كمية المواد المستعملة في صنعها أقل ما يُمكن.

من التطبيقات الحياتية على الاشتقاق، تحديد السرعة الأمثل للسيارة والأكثر اقتصاداً في الوقود في أثناء السفر.

## مثال 2

تمثل المعادلة  $R = 30 + \frac{x^2}{14400}$  تكلفة تشغيل سيارة بالدينار في الساعة، حيث  $x$  سرعة السيارة km/h.

1 أجد الاقتران الذي يمثل تكلفة قيادة السيارة مسافة 200 km بدلالة  $x$ .

أجد الزمن اللازم لقطع مسافة 200 km بدلالة  $x$ .

$$t = \frac{d}{v}$$

قانون السرعة

$$= \frac{200}{x}$$

بتعويض  $d = 200$ ,  $v = x$

## أفكر

كيف حُكِم على أن المشتقة الثانية لاقتزان المساحة موجبة عندما  $x > 0$ ، من دون اللجوء إلى التعويض لتحديد الإشارة؟



تُفضّل شركات الشحن تغليف المنتجات في صناديق على شكل متوازي مستطيلات؛ لأنّ تكلفتها منخفضة، وتأخذ مساحة أقل في التخزين.

## أفكر

$t$ : time,  $d$ : distance,  $v$ : velocity

أفرض أن  $C$  التكلفة الكلية للرحلة؛ لذا، فإن  $t \times R = C$ ، ثم أعوض  $t = \frac{200}{x}$  في الاقتران.

$$\begin{aligned} C &= R \times t && \text{معادلة التكلفة الكلية للرحلة} \\ &= \left(30 + \frac{x^2}{14400}\right) \times \frac{200}{x} && \text{بتعويض } t = \frac{200}{x}, R = 30 + \frac{x^2}{14400} \\ &= \frac{6000}{x} + \frac{x}{72} && \text{بالتبسيط} \end{aligned}$$

إذن: الاقتران الذي يُمثل تكلفة قيادة السيارة مسافة 200 km بدلالة  $x$ :

$$C = \frac{6000}{x} + \frac{x}{72}$$

2 أجد سرعة السيارة الأكثر اقتصاداً للوقود في أثناء الرحلة.

أشتق الاقتران، ثم أجد القيمة الحرجة وأحدد نوعها.

$$\begin{aligned} \frac{dC}{dx} &= \frac{-6000}{x^2} + \frac{x}{36} && \text{مشتقة اقتران التكلفة} \\ -\frac{6000}{x^2} + \frac{x}{36} &= 0 && \text{بمساواة المشتقة بالصفر} \\ \frac{6000}{x^2} &= \frac{x}{36} && \text{بإعادة ترتيب المعادلة} \\ x^3 &= 216000 && \text{خاصية الضرب التبادلي} \\ x &= \sqrt[3]{216000} && \text{بأخذ الجذر التكعيبي للطرفين} \\ x &= 60 && \text{بالتبسيط} \end{aligned}$$

إذن: القيمة الحرجة لاقتران التكلفة  $x = 60$ ، ولتحديد نوعها أجد المشتقة الثانية للاقتران.

$$\frac{d^2C}{dx^2} = \frac{12000}{x^3} + \frac{1}{36}$$

وبما أن المشتقة الثانية لاقتران التكلفة موجبة لقيم  $x$  جميعها حيث  $x > 0$ ، إذن: القيمة الحرجة هي قيمة صغرى.

إذن: سرعة السيارة الأكثر اقتصاداً للوقود في أثناء الرحلة 60 km/h

أتحقق من فهمي

تُمثل المعادلة  $R = 8 + \frac{x^2}{2000}$  تكلفة تشغيل دراجة نارية بالدينار في الساعة، حيث  $x$  سرعة الدراجة km/h.

(a) أجد الاقتران الذي يُمثل تكلفة قيادة الدراجة مسافة 100 km بدلالة  $x$ .

(b) أجد سرعة الدراجة الأكثر اقتصاداً في الوقود في أثناء الرحلة.



تزداد نسبة استهلاك البنزين بزيادة سرعة السيارة عن 100 km في الساعة، فكلما زادت سرعة السيارة على تلك السرعة 10 km تزداد نسبة استهلاك الوقود بمعدل 10%؛ بسبب مقاومة السيارة للهواء.

يُعدّ المثالان السابقان تطبيقاً حياتياً على القيمة الصغرى، وسأتعرّف في هذا المثال أحد تطبيقات القيمة العظمى.

## مثال 3

حدّدت إحدى شركات تصنيع الحواسيب سعر بيع جهاز الحاسوب الواحد (بالدينار) باستعمال الاقتران  $s(x) = 1000 - x$ ، حيث  $x$  عدد الأجهزة المباعة. فإذا كانت تكلفة إنتاج  $x$  من الأجهزة تُعطى بالاقتران  $C(x) = 3000 + 20x$ ؛ فأجد عدد الأجهزة التي يجب إنتاجها وبيعها للحصول على أكبر ربح ممكن.

**الخطوة 1:** أكتب اقتراناً يمثّل ربح الشركة عند بيع  $x$  من الأجهزة.

$$\begin{aligned} R(x) &= x \cdot s(x) && \text{اقتران سعر بيع } x \text{ من الأجهزة} \\ &= x(1000 - x) && \text{بتعويض } s(x) = 1000 - x \\ &= 1000x - x^2 && \text{بالتبسيط} \end{aligned}$$

لإيجاد اقتران الربح لبيع  $x$  من الأجهزة، أطرح اقتران التكلفة من اقتران سعر البيع.

$$\begin{aligned} P(x) &= R(x) - C(x) && \text{اقتران الربح} \\ &= (1000x - x^2) - (3000 + 20x) && \text{بتعويض } R(x) = 1000x - x^2 \\ &= -x^2 + 980x - 3000 && \text{بالتبسيط} \end{aligned}$$

**الخطوة 2:** أشتقّ اقتران الربح، ثم أجد القيمة الحرجة وأحدّد نوعها.

$$\begin{aligned} P'(x) &= -2x + 980 && \text{مشتقة اقتران الربح} \\ -2x + 980 &= 0 && \text{بمساواة المشتقة بالصفر} \\ -2x &= -980 && \text{بطرح 980 من الطرفين} \\ x &= 490 && \text{بقسمة الطرفين على -2} \end{aligned}$$

إذن: القيمة الحرجة لاقتران الربح  $x = 490$ ، ولتحديد نوعها أجد المشتقة الثانية للاقتران.

$$P''(x) = -2$$

وبما أنّ المشتقة الثانية للاقتران سالبة لقيم  $x$  جميعها حيث  $x > 0$ ، إذن: القيمة الحرجة هي قيمة عظمى.

إذن: أكبر ربح يُمكن أن تحصل عليه الشركة، هو عند إنتاج 490 جهاز حاسوب وبيعها.



كان الهدف الأساسي لاختراع الحواسيب حلّ المعادلات الرياضية المعقّدة، وكانت النسخ الأولى منها باتّساع غرفة كاملة.


### أتحقق من فهمي

حدّدت إحدى شركات تصنيع الثلاجات سعر بيع الثلاجة الواحدة (بالدينار) باستعمال الاقتران  $s(x) = 1750 - 2x$ ، حيث  $x$  عدد الثلاجات المباعة. فإذا كانت تكلفة إنتاج  $x$  من الثلاجات تُعطى بالاقتران  $C(x) = 2250 + 18x$ ؛ فأجد عدد الثلاجات التي يجب إنتاجها وبيعها للحصول على أكبر ربح ممكن.

يُمكن توظيف المشتقات؛ لإيجاد أكبر مساحة ممكنة لمنطقة ما، وذلك بإيجاد القيمة العظمى لاقتران المساحة الذي يُمثّل المنطقة.

### مثال 4

سلك طوله 100 cm يُراد ثنيه لإحاطة الشكل المجاور، المكوّن من مستطيل طوله  $h$  cm وعرضه  $2r$  cm، ونصفي دائرة نصف قطر كل منهما  $r$  cm في أعلى المستطيل وأسفله. أجد أكبر مساحة مغلقة يُمكن للسلك إحاطتها.



**الخطوة 1:** أكتب اقتراناً يُمثّل مساحة المنطقة المغلقة.

بما أنّ المنطقة مكوّنة من نصفي دائرة ومستطيل؛ فإنّ الاقتران الذي يُمثّل مساحة المنطقة:

$$A = \pi r^2 + 2rh$$

**الخطوة 2:** أكتب الاقتران بدلالة متغيّر واحد.

$$100 = 2\pi r + 2h$$

$$h = 50 - \pi r$$

ولكتابة الاقتران الذي يُمثّل المساحة بدلالة  $x$ ، أعوّض  $h = 50 - \pi r$  بالاقتران.

$$A = \pi r^2 + 2rh$$

$$= \pi r^2 + 2r(50 - \pi r)$$

$$= 100r - \pi r^2$$

محيط المنطقة

بكتابة  $h$  موضوعاً للقانون

اقتران مساحة المنطقة

بتعويض  $h = 50 - \pi r$

بالتبسيط

### أتذكّر

مساحة الدائرة:  $A = \pi r^2$ ، حيث  $r$  نصف قطر الدائرة.

مساحة المستطيل:  $A = l \times w$ ؛ حيث  $l$ : طول المستطيل، و  $w$ : عرض المستطيل.

### أفكر

لماذا استُثني عرض المنطقة المستطيلة من المحيط؟

**الخطوة 3:** اشتقّ اقتران المساحة، ثم أجد القيمة الحرجة وأحدّد نوعها.

$$\frac{dA}{dr} = 100 - 2\pi r$$

مشتقة اقتران المساحة

$$100 - 2\pi r = 0$$

بمساواة المشتقة بالصفر

$$-2\pi r = -100$$

ب طرح 100 من الطرفين

$$r = \frac{50}{\pi}$$

بقسمة الطرفين على  $-2\pi$

إذن: القيمة الحرجة لاقتران المساحة  $r = \frac{50}{\pi}$ ، ولتحديد نوعها أجد المشتقة الثانية للاقتران.

$$\frac{d^2A}{dr^2} = -2\pi$$

وبما أن المشتقة الثانية للاقتران سالبة لقيم  $x$  جميعها حيث  $x > 0$ ، إذن: القيمة الحرجة هي قيمة عظمى.

ولإيجاد أكبر مساحة مغلقة يمكن للسلك إحاطتها؛ أعوّض  $r = \frac{50}{\pi}$  باقتران المساحة:

$$A = 100r - \pi r^2$$

اقتران المساحة بدلالة  $r$

$$= 100\left(\frac{50}{\pi}\right) - \pi\left(\frac{50}{\pi}\right)^2$$


بتعويض  $\pi/r=50$

$$= \frac{5000}{\pi} - 50$$

بالتبسيط


إذن: أكبر مساحة مغلقة يمكن للسلك إحاطتها  $\frac{5000}{\pi} - 50 \text{ cm}^2$

**أتتحقق من فهمي**



سلك طوله 20 cm يُراد ثنيه لإحاطة المستطيل المجاور.  
أجد أكبر مساحة مغلقة يمكن للسلك إحاطتها.

**أتدرب وأحل المسائل**



يُمثل الشكل المجاور مخططاً لحديقة منزلية بُنيت مقابل جدار حجري، إذا كان محيط الحديقة دون الجدار يساوي 300 m؛ فأجيب عما يأتي:

1 أجد المقدار الجبري الذي يُمثل طول الضلع  $AB$  بدلالة  $x$ .


2 أجد اقتران مساحة الحديقة بدلالة  $x$ .

3 أجد أبعاد الحديقة بحيث تكون مساحة الحديقة أكبر ما يُمكن.



- 4 يُريد مصنع للمشروبات الغازية تصميم علبة على شكل أسطوانة سعتها نصف لتر. أجد أقل كمية من المواد اللازمة لتصنيع العلبة.


- 5 يُريد نجار بناء سقف خشبي لحظيرة حيوانات. إذا كان سقف الحظيرة على شكل مستطيل محيطه  $54\text{ m}$ ؛ فأجد أكبر مساحة ممكنة لسطح الحظيرة.



- مزارب ماء شكّل من صفيحة معدنية عرضها  $30\text{ cm}$  كما في الشكل المجاور.


- 6 أجد الاقتران الذي يُمثل مساحة المقطع العرضي للمزارب بدلالة  $x$ .

- 7 أجد قيمة  $x$  التي تجعل مساحة المقطع العرضي للمزارب أكبر ما يُمكن.



- 8 يُبين الشكل المجاور مخروطًا طول نصف قطر قاعدته  $r\text{ cm}$ ، وارتفاعه  $h\text{ cm}$ ، حيث:  $r + h = 60$ .

- أجد قيمتي  $r$  و  $h$  اللتين يكون عندهما حجم المخروط أكبر ما يُمكن.




- قطعة ورق مستطيلة الشكل طولها  $30\text{ cm}$ ، وعرضها  $20\text{ cm}$ . قُصّ من جوانبها الأربعة مربّعات متطابقة طول ضلع كل منها  $x\text{ cm}$  كما في الشكل المجاور، ثمّ ثُنيت الورقة لتشكيل علبة.


- 9 أجد الاقتران الذي يُمثل حجم العلبة بدلالة  $x$ .

- 10 أجد قيمة  $x$  التي تجعل حجم العلبة أكبر ما يُمكن.



- 11 قالب لصنع الكعك حجمه  $500\text{ cm}^3$  على شكل منشور قاعدته مثلث متطابق الأضلاع كما في الشكل المجاور. أجد أبعاد المنشور بحيث تكون المواد المستعملة في تصنيعه أقل ما يُمكن.






يُبين الشكل المجاور قطاعًا دائريًا محيطه 200 cm

12 أجد الاقتران الذي يُمثل مساحة القطاع الدائري بدلالة  $r$ .

13 أجد أكبر مساحة ممكنة للقطاع الدائري.




تريد إحدى شركات الشوكولاته إطلاق منتج جديد في علب من الورق المقوى. إذا كانت العلبة على شكل متوازي مستطيلات وفي داخلها فراغ على شكل متوازي مستطيلات أيضًا كما في الشكل المجاور، وكان حجمها  $2000 \text{ cm}^3$ ، فأجد كلاً مما يأتي:

14 الاقتران الممثل للمساحة الكلية لسطح العلبة.

15 قيمة  $x$  التي تجعل المساحة الكلية لسطح العلبة أقل ما يمكن.

### مهارات التفكير العليا


تبرير: مضمار سباق مكوّن من جزأين مستقيمين طول كل منهما  $x \text{ m}$ ، وجزأين على شكل نصف دائرة طول نصف قطر



كل منهما  $r \text{ m}$  كما في الشكل المجاور. إذا كانت الأجزاء المستقيمة من المضمار عمودية على أقطار الأجزاء، التي على شكل نصف دائرة، وكان محيط المضمار 400 m، فأجب عما يأتي:

16 أجد الاقتران الممثل لمساحة المنطقة المغلقة داخل المضمار بدلالة  $r$ .

17 أثبت أنه عندما يكون لمساحة المنطقة المغلقة داخل المضمار قيمة حرجة؛ فإن المضمار لا يحتوي على أجزاء مستقيمة، ثم أبين نوع القيمة الحرجة. أبرر إجابتي.



تحدّ: يُبين الشكل المجاور متوازي مستطيلات ارتفاعه  $h$  وحدة، موضوعًا داخل هرم رباعي منتظم ارتفاعه 8 وحدات، وطول ضلع قاعدته 4 cm بحيث تنطبق قاعدة المتوازي على قاعدة الهرم، وتقع رؤوس المتوازي  $A, B, C, D$  على أحرف الهرم  $OP, OQ, OR, OS$  على التوالي. إذا علمت أن الهرم  $OPQRS$  والهرم  $OABCD$  متشابهان، فأجد كلاً مما يأتي:

18 طول  $AD$  بدلالة  $h$ .

19 الاقتران الممثل لحجم متوازي المستطيلات بدلالة  $h$ .

20 قيمة  $h$  التي تجعل حجم متوازي المستطيلات أكبر ما يمكن.

أختار رمز الإجابة الصحيحة، لكل ممّا يأتي:

1 إذا كان  $y = 2x^4 - 5x^3 + 2$ ؛ فإنّ  $\frac{dy}{dx}$  تساوي:

a)  $y = 8x^3 - 5x^2 + 2$  b)  $y = 4x^4 - 15x^2 + 2$

c)  $y = 8x^3 - 15x + 2$  d)  $y = 8x^3 - 15x^2$

2 إذا كان  $f(x) = (x-3)^2$ ؛ فإنّ  $f'(x)$  تساوي:

a)  $x - 3$  b)  $x - 6$

c)  $2x - 6$  d)  $2x + 9$

3 إذا كان  $y = \frac{2x^4 + 9x^2}{3x}$ ؛ فإنّ  $\frac{dy}{dx}$  تساوي:

a)  $\frac{2x^4}{3} + 6x$  b)  $2x^2 + 3$

c)  $2x + 3$  d)  $8x^3 + 18x$

4 إذا كان  $f(x) = 12x^{\frac{2}{3}}$ ؛ فإنّ  $f'(x)$  تساوي:

a)  $\frac{4}{3}x^{\frac{-1}{3}}$  b)  $8x^{\frac{-1}{3}}$

c)  $\frac{2}{3}x^{\frac{-1}{3}}$  d)  $4x^{\frac{-1}{3}}$

5 إذا كان  $f(x) = (1-x)^3$ ؛ فإنّ  $f''(x)$  تساوي:

a)  $-3(1-x)^2$  b)  $3(1-x)^2$

c)  $-6(1-x)$  d)  $-3(1-x)$

إذا كان الاقتران  $f(x) = (x + \frac{4}{x})^2$ ،  $x \neq 0$ ؛ فأجد كلاً ممّا يأتي:

6  $f'(x)$

7 معادلة المماس عند النقطة (4, 25).

إذا كان الاقتران  $y = 2x + \frac{8}{x}$ ،  $x \neq 0$ ؛ فأجد كلاً ممّا يأتي:

8  $\frac{dy}{dx}$

9 ميل مماس المنحنى عند نقاط تقاطعه مع المستقيم  $y = 10$ .

10 إذا كان الاقتران  $y = (3x + a)(x - 1)$ ، حيث  $a$  ثابت؛ فأجد إحداثيات النقطة التي تكون عندها مشتقة الاقتران تساوي  $a$  بدلالة  $a$ .


إذا كان الاقتران  $y = x^2(x^2 - p)$ ، حيث  $p > 0$ ؛ فأجد كلاً ممّا يأتي:

11 مشتقة الاقتران بدلالة  $p$ .

12 النقاط الحرجة للاقتران؛ إذا كانت  $p = 8$ ، ثمّ أحدد نوعها.

13 أمثل الاقتران بيانياً عندما  $p = 8$ .


14 إذا كان الاقتران  $y = x^3 + ax^2 + bx + c$ ، حيث  $a$  و  $b$  و  $c$  ثوابت؛ فأثبت أنّه توجد نقطتان حرجتان للاقتران، إذا كانت  $a^2 > 3b$ . أبرّر إجابتي.



أمثل منحنى الاقتران  $f'(x)$  بيانياً.

28 بالون كروي الشكل يزداد حجمه بمعدل  $36 \text{ cm}^3/\text{s}$ .  
أجد معدل تغير مساحة سطح البالون عندما يكون حجمه  $2000 \text{ cm}^3$ .

29 يُمثّل الاقتران  $s(t) = 10 + 6t - 0.5t^2$ ,  $0 \leq t \leq 10$  المسافة (بالمتر)، التي تقطعها سيارّة بعد  $t$  ثانية من انطلاقها. أجد أقصى سرعة للسيارة بعد  $10 \text{ s}$  من حركتها.



30 صندوق على شكل متوازي مستطيلات، قاعدته مربعة الشكل طول ضلعها  $x \text{ cm}$  كما في الشكل المجاور.

إذا كان مجموع أطوال أحرف الصندوق يساوي  $144 \text{ cm}$ ،  
فأجد قيمة  $x$  التي تجعل حجم الصندوق أكبر ما يمكن.

### تدريب على الاختبارات الدولية

31 إذا كان  $f(x) = x^\pi$ ؛ فإن  $f'(x)$  تساوي:

- a)  $\frac{22}{7}$       b)  $\frac{7}{22}$   
c)  $\frac{22}{7} x^{\frac{15}{7}}$       d)  $\frac{7}{22} x^{\frac{15}{7}}$

32 يوجد للاقتران  $y = 4x^2 + 6x + 3$  قيمة حرجة عندما  $x$  تساوي:

- a)  $-\frac{3}{4}$       b)  $\frac{3}{5}$       c)  $-\frac{3}{2}$       d)  $-\frac{4}{3}$

33 يوجد للاقتران  $y = -5x^2 + 7x + 4$  قيمة عظمى محليّة عندما  $x$  تساوي:

- a) 0.7      b) 1      c) 0      d) -0.7

أجد القيم الحرجة لكل من الاقترانات الآتية، ثمّ أجد نوعها:

16  $f(x) = x^3 - 12x^2 + 48x - 58$

17  $f(x) = x^3 - 12x^2$

18  $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2 - 4x - 5$


19  $f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 45x + 8$

إذا كان الاقتران  $y = 12\sqrt{x}$ ,  $x > 0$ ؛ فأجد كلّ ممّا يأتي:

20 معادلة العمودي على المماس عند النقطة  $(4, 24)$ .

21 معادلة المماس عند النقطة  $(100, 120)$ .

يُمثّل الشكل المجاور منحنى الاقتران  $y = x^{\frac{3}{2}}$ ,  $x > 0$



22 أجد معادلة

المماس عند

النقطة  $(8, 4)$ .

23 أجد معادلة المماس عن النقطة التي يكون عندها ميل

المنحنى يساوي  $\frac{1}{6}$ .

إذا كان الاقتران  $y = 10 - x^2$ ؛ فأجد كلّ ممّا يأتي:

24 معادلة المماس عند النقطة  $(2, 6)$ .

25 مساحة المثلث المكوّن من المماس والمحورين الإحداثيين.

26 يُمثّل المستقيم  $x = 2y + 3$  العمودي على المماس

لمنحنى الاقتران  $y = x(x + 4)$  عند النقطة  $P$ . أجد

أحداثيات النقطة  $P$ .

27 إذا كان الضغط والحجم لغاز مُعيّن يرتبطان بالعلاقة:

$pV = 1200$ ، حيث  $p$  الضغط و  $V$  الحجم،

ويزداد الضغط مع الزمن، وبعد  $t$  ثانية وفقاً للعلاقة

$p = 10 + 0.4\sqrt{t}$  أجد معدل تغير حجم الغاز

بالنسبة إلى الزمن عندما  $t = 100$