

إدارة الامتحانات والاختبارات

قسم الامتحانات العامة

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢١/٢ التكميلي

(وثيقة محمية/محمود)

مدة الامتحان: ٣٠ : ٤٥

اليوم والتاريخ: الاثنين ١٠/١/٢٠٢٢
رقم الجلوس:

المبحث : الرياضيات (الورقة الثانية، ف٢، م٤)، الرياضيات الإضافية
الفرع: (ادبي، شرعي، مطوماتية، صحي، فندقي جمعات) رقم النموذج: (١)
اسم الطالب: رقم المبحث: 115

ملحوظة مهمة: أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددها (٤)؛ بحيث تكون إجابتك عن السؤال الأول على نموذج الإجابة (ورقة القارئ الضوئي)، وتكون إجابتك عن باقي الأسئلة على دفتر الإجابة، علماً أن عدد صفحات الامتحان (٧).

السؤال الأول: (١٤٠ علامة)

اختر رمز الإجابة الصحيحة في كل فقرة مما يأتي، ثم ظلّل بشكل غامق الدائرة التي تشير إلى رمز الإجابة في نموذج الإجابة (ورقة القارئ الضوئي) فهو النموذج المعتمد (فقط) لاحتساب علامتك في هذا السؤال، علماً أن عدد فقراته (٣٥).

(١) إذا كان $Q(s) = \frac{s^2 - 4}{s}$ ، فما قيمة $Q'(-4)$ ؟

(أ) -7 (ب) 7 (ج) $-\frac{1}{4}$ (د) $\frac{1}{4}$

(٢) $\frac{4}{s-3}$ دس يساوي:

(أ) $s^4 + 4$ (ب) $s^4 + 4$ (ج) $s^4 + 4$ (د) $s^2 + 4$

(٣) $\frac{s^2 - 8s + 10}{s+1}$ دس يساوي:

(أ) $s^2 - 10s + 1$ (ب) $s^2 + 10s + 1$ (ج) $s^2 - 10s + 5$ (د) $s^2 + 10s + 5$

(٤) إذا كان $Q(s)$ اقتراناً متصلاً وكان $Q(1) = 8$ ، $Q'(s) = 12 - s$ ، فما قيمة $Q(4)$ ؟

(أ) -20 (ب) 20 (ج) 4 (د) -4

(٥) إذا كان $\int_0^9 s^2 \text{ دس} = 81$ ، فما قيمة الثابت a ؟

(أ) -3 (ب) 3 (ج) -9 (د) 9

الصفحة الثانية/نموذج (١)

$$(٦) \int_1^{32} \frac{1}{\sqrt[4]{s}} ds \text{ يساوي:}$$

- (أ) $\frac{1}{5}$ (ب) $-\frac{1}{5}$ (ج) ٥ (د) -٥

$$(٧) \text{ إذا كان } \int_1^3 \frac{ق(س)}{٢} ds = -٤ ، \int_0^3 ق(س) ds = ٦ ، \text{ فما قيمة } \int_1^5 ق(س) ds ؟$$

- (أ) ١٤ (ب) -١٤ (ج) -٢ (د) ٢

$$(٨) \text{ إذا كان } \int_1^{٥+٤} ق(س) ds = \text{صفر} ، \text{ فما قيمة الثابت } أ ؟$$

- (أ) ٣ (ب) -٣ (ج) ٢ (د) -٢

$$(٩) \text{ إذا كان } \int_3^1 (٢ ق(س) - ٤) ds = ١٢ ، \text{ فما قيمة } \int_1^3 ق(س) ds ؟$$

- (أ) ٦ (ب) -٦ (ج) ١٦ (د) -١٦

$$(١٠) \int_1^6 (٣س + ٤) ds \text{ يساوي:}$$

- (أ) $-\frac{1}{٣}$ ظا $(٣س + ٤) + ج$ (ب) -٢ ظا $(٣س + ٤) + ج$
(ج) ٢ ظا $(٣س + ٤) + ج$ (د) $\frac{1}{٣}$ ظا $(٣س + ٤) + ج$

(١١) إذا كان ميل المماس لمنحنى الاقتران ق عند النقطة (س ، ص) يساوي $٨(٢ + س)^٢$ ، وكان منحنى الاقتران ق يمر بالنقطة $(١- ، ٥)$ ، فما قيمة ق(٠) ؟

- (أ) ٣٧ (ب) ٣٢ (ج) ٢١ (د) ١٦

(١٢) إذا كان ميل المماس لمنحنى الاقتران ل عند النقطة (س ، ص) يعطى بالقاعدة: $ل'(س) = س(٢ - ٣س)$ ، وكان منحناه يمر بالنقطة $(١- ، ٤)$ ، فإن قاعدة الاقتران ل هي:

- (أ) $ل(س) = س^٢ + ٢س + ٢$ (ب) $ل(س) = س^٢ + س - ٢$
(ج) $ل(س) = س^٢ - ٢س - ٢$ (د) $ل(س) = س^٢ - س + ٢$



الصفحة الثالثة/نموذج (١)

(١٣) إذا كان $\int_1^3 3 \, ds = -12$ ، فما قيمة الثابت أ ؟

- (أ) -٦ (ب) ٦ (ج) -٢ (د) ٢

(١٤) يتحرك جسيم على خط مستقيم بسرعة تعطى بالعلاقة: ع(ن) = (٨ ن + ٦) م/ث، إذا كان موقعه الابتدائي ف(٠) = ٥، فما موقع الجسيم بالأمتار بعد ن ثانية؟

- (أ) ف(ن) = $5 + 6n + 4n^2$ (ب) ف(ن) = $5 + 6n + 8n^2$
(ج) ف(ن) = $5 + 6n - 4n^2$ (د) ف(ن) = $5 + 6n - 8n^2$

(١٥) $\int_1^3 3 - 2s \, ds$ يساوي:

- (أ) $3 - 2s$ (ب) $3 - 2s$ (ج) $3 - 2s$ (د) $3 - 2s$

(١٦) إذا كان ق(١) = ٦، ق(١٦) = -٩، فما قيمة $\int_1^{16} 4s^2 \, ds$ ؟


- (أ) -٣ (ب) ٣ (ج) -١٥ (د) ١٥

(١٧) $\int_3^4 (3s^2 - 2s + 4) \, ds$ يساوي:

- (أ) ٣٠ (ب) -٣٠ (ج) صفر (د) ٢٥

(١٨) الشكل المجاور يُمثل المنطقة المخلقة المحصورة بين منحنى الاقتران ق(س) ومحور السينات في الفترة [أ، ب]، إذا علمت أن مساحة المنطقة ١٠ تساوي (٦) وحدات مربعة،

فما قيمة المساحة ٢٠ بالمحاور المربعة ؟



- (أ) ٢ (ب) ٦ (ج) ٨ (د) ٤

الصفحة الرابعة/نموذج (١)

١٩) في أحد الأسواق يباع (٤) أنواع من الخضار و (٣) أنواع من الفاكهة، أراد احمد أن يشتري نوعًا واحدًا من الخضار ونوعًا واحدًا من الفاكهة، ما عدد الطرق المختلفة التي يمكنه بها اختيار ذلك؟

- (أ) 14×3 (ب) 3×4 (ج) ل (٣ ، ٤) (د) $\left(\frac{4}{3}\right)$

٢٠) بكم طريقة يمكن تكوين لجنة تضم (٤) أشخاص من بين (٧) أشخاص؟

- (أ) $\frac{14}{17}$ (ب) $\frac{17}{13}$ (ج) $\frac{17}{14}$ (د) $\frac{17}{13 \times 14}$

٢١) بكم طريقة يمكن اختيار رئيس ونائب للرئيس من بين (٩) موظفين في إحدى الشركات ؟ (علمًا أن الشخص الواحد لا يشغل أكثر من وظيفة واحدة في الشركة)

- (أ) $\left(\frac{9}{2}\right)$ (ب) ١٢ (ج) ل (٢ ، ٩) (د) 18×9

٢٢) ما قيمة المقدار $\frac{ل(١ ، ٦)}{13}$ ؟

- (أ) ١ (ب) ٢ (ج) ٥ (د) ٩

٢٣) إذا كان $ل(٢ ، ٥) - ن = ٤٠$ ، فما قيمة ن ؟

- (أ) ٥ (ب) ٤٠ (ج) ٨٠ (د) ١٢٠

٢٤) حل المعادلة: $ل(٤ ، ن) = ٦ ل(٣ ، ن)$ يساوي:

- (أ) ٣ (ب) ٤ (ج) ٦ (د) ٩

٢٥) بكم طريقة يمكن اختيار (٤) طلاب و (٣) طالبات لتشكيل لجنة في إحدى الكليات من بين (٩) طلاب و (٦) طالبات؟

- (أ) $\left(\frac{9}{4}\right) \left(\frac{6}{3}\right)$ (ب) $\left(\frac{6}{4}\right) \left(\frac{9}{3}\right)$

- (ج) ل (٤ ، ٩) $\times$ ل (٣ ، ٦) (د) ل (٣ ، ٩) $\times$ ل (٤ ، ٦)

الصفحة الخامسة/نموذج (١)

(٢٦) قيمة $\left(\frac{7}{2}\right)$ تساوي:

(أ) $\frac{ل(٢,٧)}{١٧}$ (ب) $\frac{١٧}{١٢}$ (ج) $\frac{ل(٢,٧)}{١٢}$ (د) $\frac{١٧}{١٥}$

(٢٧) إذا كان $١ - (١ - ١) = ٢٤$ فما قيمة ن؟

(أ) ٣ (ب) ٤ (ج) ٥ (د) ٢٥

(٢٨) إذا كان التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي س معطى بالمجموعة $\left\{\left(\frac{١}{٢}, ٣\right), (٠, ١), (٢, ٠), (٠, ٣), (١, ٠), (٠, ٢), (٠, ٠)\right\}$ فما قيمة الثابت ك؟

(أ) ٠,٢ (ب) ٠,٨ (ج) ٠,٣ (د) ٠,٤

(٢٩) في تجربة اختيار عشوائي لعائلة لديها (٣) أطفال وتسجيل المواليد حسب الجنس وتسلسل الولادة ، إذا دل المتغير العشوائي س على عدد الأطفال الذكور، فما قيمة ل(س = ٠) ؟

(أ) $\frac{١}{٢}$ (ب) $\frac{١}{٤}$ (ج) $\frac{٣}{٤}$ (د) $\frac{١}{٨}$

(٣٠) إذا كان المتوسط الحسابي لأعمار مجموعة من الأشخاص (٤٤) سنة والانحراف المعياري لها (٥)، فما العمر الذي ينحرف انحرافين معياريين تحت المتوسط الحسابي؟


(أ) ٣٤ (ب) ٣٩ (ج) ٤٩ (د) ٥٤

(٣١) إذا كان المتوسط الحسابي لعلامات طلبة في امتحان اللغة العربية (٦٠)، والانحراف المعياري لها (٥)، فما قيمة العلامة المعيارية للعلامة (٥٨)؟

(أ) ٠,٢ (ب) ٠,٠٤ (ج) ٠,٤ (د) ٠,٤ -

(٣٢) إذا كان (ز) متغيرًا عشوائيًا طبيعيًا معياريًا وكان ل(ز $\geq$ أ) = ٠,٨ ، فما قيمة ل(ز $\leq$ - أ)؟

(أ) ٠,٨ - (ب) ٠,٨ (ج) ٠,٢ (د) ٠,٢ -



(٣٣) معتمدًا الشكل المجاور الذي يمثل العلاقة بين المتغيرين س، ص، ما القيمة التقديرية لمعامل الارتباط بين س، ص؟

(أ) ٠,٨٥ - (ب) ٠,١٥ (ج) ٠,٨٥ (د) ٠,١٥ -

يتبع الصفحة السادسة



الصفحة السادسة/نموذج (١)

(٣٤) إذا كان s ، v متغيرين عدد قيم كل منهما (٥) ، وكان $\sum_{i=1}^5 (s_i - \bar{s})(v_i - \bar{v}) = 25$ ،

$$\sum_{i=1}^5 (v_i - \bar{v})^2 = 16 ، \sum_{i=1}^5 (s_i - \bar{s})^2 = 4$$

فما قيمة معامل ارتباط بيرسون بين المتغيرين s ، v ؟

- أ (٠,١) ب (٠,٢) ج (٠,٠١) د (٠,٠٢)

(٣٥) إذا كان معامل ارتباط بيرسون بين المتغيرين s ، v هو (٠,٧) ، عُدلت قيم كل من المتغيرين s ، v

حسب العلاقة : $s - ١ = *s$ ، $v = *v$ ، فإن قيمة معامل الارتباط بين s ، v تساوي:

- أ (٠,٣ -) ب (٠,٣) ج (٠,٧) د (٠,٧ -)

السؤال الثاني: (٢٤ علامة)

أ) جد كلاً من التكميلات الآتية:

(٨ علامات) ١) $\int_0^2 s^2 (s^2 + 4s) ds$

(٨ علامات) ٢) $\int_0^2 (4 - s^2) \sqrt{s^2 - 4s + 4} ds$

ب) يتحرك جسيم على خط مستقيم بتسارع ثابت مقداره ٦ م/ث^2 ، جد موقع الجسيم بعد مرور ثانية واحدة من بدء الحركة، علماً أن سرعته الابتدائية ٠ م/ث ، وموقعة الابتدائي ٠ م (٨ علامات)

السؤال الثالث: (٢٢ علامة)

أ) جد مساحة المنطقة المغلقة المحصورة بين منحنى الاقتران $Q(s) = ٦ - ٢s$ ، ومحور السينات في الفترة $[٠, ٤]$ (٨ علامات)

ب) مجموعة مكونة من (٧) معلمين و(٤) إداريين ، جد عدد طرق تشكيل لجنة ثلاثية منهم بحيث تحتوي معلماً واحداً على الأقل. (٧ علامات)

ج) إذا كان احتمال أن يصيب صياد الهدف في كل طلقة يطلقها عليه ثابتاً في كل مرة ويساوي (٠,٧) ، فإذا أطلق (٤) طلقات على الهدف، فما احتمال إصابة الهدف مرة واحدة على الأكثر؟ (٧ علامات)

