



إدارة الامتحانات والاختبارات
قسم الامتحانات العامة

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٤

(وثيقة مضمونة/محدودة)

س. د.

مدة الامتحان: ٣٠ : ٢

رقم المبحث: 107

المبحث: الرياضيات (الورقة الثانية، ف٢)

رقم النموذج: (١)

الفرع: العلمي + الصناعي جامعات

اليوم والتاريخ: الثلاثاء ٢٠٢٤/٠٧/٠٢

رقم الجلوس:

اسم الطالب:

ملحوظة مهمة: أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددها (5)؛ بحيث تكون إجابتك عن السؤال الأول على نموذج الإجابة (ورقة القارئ الضوئي)، وتكون إجابتك عن باقي الأسئلة على دفتر الإجابة، علماً أن عدد صفحات الامتحان (8).

السؤال الأول: (100 علامة)

اختر رمز الإجابة الصحيحة في كل فقرة مما يأتي، ثم ظلّل بشكل غامق الدائرة التي تشير إلى رمز الإجابة في نموذج الإجابة (ورقة القارئ الضوئي) فهو النموذج المعتمد (فقط) لاحتساب علامتك في هذا السؤال، علماً أن عدد فقراته (25)، وانتبه عند تظليل إجابتك أن رمز الإجابة (a) على ورقة الأسئلة يقابله (أ) على ورقة القارئ الضوئي، و (b) يقابله (ب)، و (c) يقابله (ج)، و (d) يقابله (د).

(1) ناتج: $\int (3^{-x} + \sin(-x)) dx$ ، هو:

a) $3^{-x} - \cos x + C$

b) $\frac{-3^{-x}}{\ln 3} + \cos x + C$

c) $-3^{-x} + \cos x + C$

d) $\frac{3^{-x}}{\ln 3} - \cos x + C$

(2) ناتج: $\int (\cot^2 3x + 2) dx$ ، هو:

a) $-\frac{1}{3} \cot 3x + x + C$

b) $\frac{1}{3} \cot 3x + x + C$

c) $-\frac{1}{3} \cot 3x + 2x + C$


d) $\frac{1}{3} \cot 3x + 2x + C$

(3) قيمة: $\int_0^a \frac{1}{a + \frac{x}{2}} dx$, $a > 0$ ، هي:

- a) $\ln\left(\frac{3}{2}\right)$
- b) $\ln a^2$
- c) $\ln(5a)^2$
- d) $\ln\left(\frac{9}{4}\right)$**

(4) معتمداً الشكل الآتي الذي يُمثل منحنى الاقتران: $f(x) = |x - 2| + 1$ ، فإن قيمة $\int_0^4 f(x) dx$ هي:

- a) 9
- b) 8**
- c) 5
- d) 4



(5) إذا كان: $f'(x) = (2e^x + 1)^2$ ، وكان: $f(0) = 6$ ، فإن قاعدة الاقتران f هي:

- a) $f(x) = 12 - 2e^{2x} - 4e^x + x$
- b) $f(x) = 2e^{2x} + 4e^x - x$
- c) $f(x) = 2e^{2x} + 4e^x + x$**
- d) $f(x) = 12 - e^{2x} - 5e^x + x$

(6) يتحرك جُسيم في مسار مستقيم، وتُعطى سرعته بالاقتران: $v(t) = 2 \cos\left(\frac{t}{3}\right)$ ، حيث v السرعة بالمتري لكل ثانية، و t الزمن بالثواني. إن إزاحة الجُسيم بالأمتر في الفترة $[0, 2\pi]$ هي:

- a) $-3\sqrt{3}$
- b) $3\sqrt{3}$**
- c) -3
- d) 3

(7) ناتج: $\int \cos^3 x \sin^2 x dx$ ، هو:

- a) $3\sin^3 x + 5\sin^5 x + C$
- b) $3\sin^3 x - 5\sin^5 x + C$
- c) $\frac{1}{3}\sin^3 x + \frac{1}{5}\sin^5 x + C$
- d) $\frac{1}{3}\sin^3 x - \frac{1}{5}\sin^5 x + C$**

(8) قيمة: $\int_0^1 20x(1-x)^3 dx$ هي:

- a) 1
- b) 9
- c) -9
- d) -1

(9) ناتج: $\int \frac{4}{(x-2)(x+2)} dx$ هو:

- a) $\ln |x-2| + \ln |x+2| + C$
- b) $4 \ln |x^2 - 4| + C$
- c) $\ln |x-2| - \ln |x+2| + C$
- d) $2 \ln |x^2 - 4| + C$


(10) ناتج: $\int \ln \sqrt{x} dx$ هو:

- a) $\frac{1}{2}x \ln x - x + C$
- b) $\frac{1}{2}x \ln x + x + C$
- c) $\frac{1}{2}x \ln x - \frac{1}{2}x + C$
- d) $\frac{1}{2}x \ln x + \frac{1}{2}x + C$

(11) الحل العام للمعادلة التفاضلية: $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{xy}$, $x > 0$, $y > 0$ هو:

- a) $y^2 = \ln x^2 + C$
- b) $y = \ln x + C$
- c) $x^2 = \ln y^2 + C$
- d) $x = \ln y + C$

(12) معتمدًا الشكل الآتي الذي يُمثل منحنى السرعة - الزمن لجسيم يتحرك على المحور x في الفترة الزمنية $[0, 6]$. إذا بدأ الجسيم الحركة من $x = 2$ عندما $t = 0$ ، فإن الموقع النهائي للجسيم هو:




- a) 12 m
- b) 18 m
- c) 2 m
- d) 4 m

الصفحة الرابعة/نموذج (١)

13) حل المعادلة التفاضلية: $\frac{dy}{dx} = e^{(x+y)}$ ، الذي يحقق النقطة $(0,0)$ ، هو:

- a) $e^{-y} = e^x - 2$
- b) $3e^{-y} = 2 - e^x$
- c) $e^{-y} = 2 - e^x$**
- d) $3e^{-y} = e^x + 2$

14) معتمدًا الشكل الآتي، المثلث OAB فيه: $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$ و $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$ ، والنقطة D هي منتصف $\overline{AB}$.
إن $\overrightarrow{OD}$ بدلالة كل من $\vec{a}$ و $\vec{b}$ ، هو:



- a) $\frac{1}{2}(\vec{b} - \vec{a})$
- b) $\vec{b} - \vec{a}$
- c) $\frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b})$**
- d) $\vec{a} + \vec{b}$

15) إذا كان: $\vec{v} = \langle a, a-1, a+1 \rangle$ ، وكان: $|\vec{v}| = \sqrt{5}$ ، فإن القيمتين الممكنتين للثابت a ، هما:

- a) ± 4
- b) ± 3
- c) ± 2
- d) ± 1**

16) إذا كان: $\vec{u} = -2\hat{i} + 3\hat{k}$ ، $\vec{v} = 3\hat{j} - 2\hat{k}$ ، فإن $2\vec{u} - 3\vec{v}$ ، هو:

- a) $-13\hat{i} + 12\hat{k}$
- b) $-4\hat{i} - 9\hat{j} + 12\hat{k}$**
- c) $-4\hat{i} + 9\hat{j}$
- d) $-4\hat{i} - 9\hat{j} - 12\hat{k}$

17) إذا كان متجه الموقع للنقطة M هو $\langle 4, 2, -8 \rangle$ ، وكان متجه الموقع للنقطة N هو $\langle 4, -4, 6 \rangle$ ، فإن متجه الموقع للنقطة K التي تقع في منتصف $\overline{MN}$ ، هو:

- a) $\langle 0, 6, -14 \rangle$
- b) $\langle 8, -2, -14 \rangle$
- c) $\langle 4, -1, -7 \rangle$
- d) $\langle 4, -1, -1 \rangle$**

الصفحة الخامسة/نموذج (١)

(18) إذا كان: $\vec{v} = \hat{i} - 2\hat{j} + 2\hat{k}$ ، فإن المتجه الذي له اتجاه $\vec{v}$ نفسه، ومقداره 9 ، هو:

a) $\vec{u} = \frac{1}{3}\hat{i} - \frac{2}{3}\hat{j} + \frac{2}{3}\hat{k}$

b) $\vec{r} = 3\hat{i} - 6\hat{j} + 6\hat{k}$

c) $\vec{n} = 3\hat{i} - 3\sqrt{2}\hat{j} + 3\sqrt{2}\hat{k}$

d) $\vec{w} = \frac{1}{9}\hat{i} - \frac{2}{9}\hat{j} + \frac{2}{9}\hat{k}$

(19) إحداثيات النقطة التي تقع على المستقيم l الذي له معادلة متجهة: $\vec{r} = \langle 4, 5, -2 \rangle + t\langle -3, 1, 2 \rangle$ ، وتقع أيضًا في المستوى XZ ، هي:

a) (19, 0, -12)

b) (19, 0, 12)

c) (-11, 0, -5)

d) (11, 0, -5)

(20) إذا كان: $\vec{u} = \langle -2, 1 - a, 3 \rangle$ ، $\vec{v} = \langle b + 1, 4, -6 \rangle$ ، وكان: $\vec{u} \parallel \vec{v}$ ، فإن قيمة $(a + b)$ ، هي:

a) 0

b) -3

c) 3

d) 6

(21) في تجربة إلقاء حجر نرد منتظم 5 مرات، فإن احتمال ظهور عدد فردي 3 مرات، هو:

a) 0.3125

b) 0.1563

c) 0.4521

d) 0.0013


الصفحة السادسة/نموذج (١)

22) إذا كان: $X \sim B(4, p)$ ، وكان: $P(X = 1) = P(X = 2)$ ، فإنّ التباين للمتغير العشوائي X ، هو:

- a) 0.4
- b) 1.6
- c) 0.96**
- d) 2.4

23) اعتمادًا على القاعدة التجريبية في الشكل الآتي، إذا اتَّخذ التمثيل البياني لأطوال مجموعة من الطلبة شكل المنحنى الطبيعي بوسط حسابي μ ، وانحراف معياري σ . فإنّ النسبة المئوية للطلبة الذين تقلّ أطوالهم عن الوسط الحسابي بمقدار لا يزيد على انحرافين معياريين، هي:

- a) 68%
- b) 47.5%**
- c) 15.85%
- d) 13.5%



24) إذا كان: $X \sim N(\mu, \mu^2)$ ، $\mu > 0$ ، وكانت قيمة Z المعيارية المقابلة لقيمة $x = 1$ هي 2 ، فإنّ قيمة الانحراف المعياري لهذا التوزيع، هي:

- a) $\frac{1}{3}$**
- b) $\frac{1}{2}$
- c) 3
- d) 2

25) إذا كان Z متغيرًا عشوائيًا طبيعيًا معياريًا ، فإنّ $P(-0.5 < z < 1.5)$ يساوي:

- a) 0.2427
- b) 0.3345
- c) 0.4332
- d) 0.6247**

ملحوظة: يمكنك الاستفادة من الجدول الآتي الذي يُمثّل بعضًا من قيم جدول التوزيع الطبيعي المعياري.

z	0	0.25	0.50	1	1.5	2
$P(Z < z)$	0.5000	0.5987	0.6915	0.8413	0.9332	0.9772

عزيزي الطالب: أجب عن الأسئلة (الثاني والثالث والرابع والخامس) على دفتر إجابتك فهو المعتمد فقط لاحتساب علامتك في هذه الأسئلة.

السؤال الثاني: (32 علامة)

(a) جد كلاً من التكاملات الآتية:

$$1) \int (1 + \cos^2 x) \tan^3 x \, dx$$


(10 علامات)

$$2) \int \frac{4x^3 - 2}{2x^2 - 3x - 2} \, dx$$

(10 علامات)

(b) معتمداً الشكل المجاور، ما مساحة المنطقة المظللة؟

(12 علامة)



السؤال الثالث: (22 علامة)

(a) جد قيمة التكامل الآتي:

$$\int_0^1 \frac{x^3 e^{x^2}}{(x^2 + 1)^2} \, dx$$

(12 علامة)


(b) معتمداً الشكل المجاور الذي يُمثل مُنحنيي الاقترانين:


$$f(x) = \sqrt{ax}, \quad g(x) = \frac{x}{a}, \quad a > 0, \quad x \geq 0$$

إذا كان حجم المُجسّم الناتج من دوران المنطقة المظللة حول

المحور x يساوي $\frac{64\pi}{3}$ وحدة مكعبة، فجد قيمة الثابت a .

(10 علامات)






(12 علامة)

- (a) معتمدًا الشكل المجاور الذي يظهر فيه متوازي الأضلاع $OACB$ ، إذا كان: $\vec{OA} = 6\vec{a}$ و $\vec{OB} = 6\vec{b}$ ، وكانت النقطة T تقع على $\vec{CB}$ ، بحيث كان $CT = \frac{1}{2}TB$ ، والنقطة U تقسم $\vec{AB}$ ، حيث $AU:UB = 1:2$. إذا مُدَّ الضلع $\vec{OA}$ على استقامته إلى النقطة D ، حيث $OD = \frac{4}{3}OA$ ، فأثبت باستعمال المتجهات أن النقاط: T, U, D تقع على استقامة واحدة.

- (b) إذا كانت: $\vec{r}_1 = \langle 2, 4, -8 \rangle + t\langle 2, -2, 14 \rangle$ معادلة متجهة للمستقيم l_1 ، وكانت: $\vec{r}_2 = \langle -2, 2, 3 \rangle + u\langle 5, 1, -4 \rangle$ معادلة متجهة للمستقيم l_2 ، فأثبت أن المستقيمين l_1, l_2 متقاطعان، ثم جد نقطة التقاطع.

(10 علامات)



(6 علامات)

- (a) في الشكل المجاور يُظهر مُكعب طول ضلعه 4 cm مرسومًا في نظام الإحداثيات ثلاثي الأبعاد، بحيث يقع أحد رؤوسه في نقطة الأصل O ، وتقع أحرفه: $\vec{OC}$ على المحور x ، و $\vec{OB}$ على المحور y ، و $\vec{OD}$ على المحور z . جد $m\angle DAO$ إلى أقرب عُشر درجة (باستعمال المتجهات).

- (b) في يوم طبي مجاني، حُلَّت لجنة طبية فصول دم لطلبة إحدى المدارس. إذا كان احتمال ظهور فصيلة الدم A^+ يساوي 0.2 عند إجراء هذا التحليل لعينات دم الطلبة، فجد كلاً مما يأتي:
- احتمال تحليل أكثر من ثلاث عينات دم حتى ظهور أول عينة من فصيلة الدم A^+ .
 - العدد المتوقع لعينات الدم التي سَتُحَلَّل إلى حين ظهور أول عينة من فصيلة الدم A^+ .

(9 علامات)

- (c) أُجريت دراسة على 20000 شجرة في غابة، فُتَبِّين أن 2136 شجرة يقل طول كل منها عن 10 m . إذا كانت أطوال هذه الأشجار تتبع توزيعًا طبيعيًا وسطه الحسابي μ وانحرافه المعياري 4 m ، فجد قيمة μ .

(9 علامات)

ملحوظة: يمكنك الاستفادة من الجدول الآتي الذي يمثل بعضًا من قيم جدول التوزيع الطبيعي المعياري.

z	0	1	1.2	1.24	1.75	2	2.4
$P(Z < z)$	0.5000	0.8413	0.8849	0.8925	0.9599	0.9772	0.9918