

المرجع في الرياضيات

الثاني ثانوي العلمي

كتاب الطالب + كتاب التمارين

الفصل الأول / الوحدة الأولى

الدرس الثالث

قاعدة السلسلة

الأستاذ: معتصم ابراهيم

0790264376

أعزائي الطلاب: لأي ملاحظات على الدوسيه الرجاء ارسالها على رقم الواتس اب أعلاه

نسخة مجانية ليستفيد منها الطلبة، فلا
تتردد بنشرها لنعم الفائدة وكسب الأجر

طبعة السنة 2024

ولا تنسونا من دعائكم

مخطط الدرس الثالث

قاعدة السلسلة



تأسيس الدرس الثالث: (مهم جداً)

جدول قياسات الزوايا الخاصة: (مهم حفظ)

القياس الدائري	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
القياس الستيني	0	30	45	60	90	180	270	360
$\sin \theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
$\cos \theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
$\tan \theta$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	∞	0	∞	0

قوانين النسب المثلثية: (مهمة جداً حفظ)

(1) قوانين نصف الزاوية:

1) $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$

$$\sin 4x = 2 \sin 2x \cos 2x$$

$$\sin 6x = 2 \sin 3x \cos 3x$$

2) $\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$

$$\cos 4x = \cos^2 2x - \sin^2 2x$$

$$\cos 6x = \cos^2 3x - \sin^2 3x$$

3) $\cos 2x = 1 - 2 \sin^2 x$

$$\cos 4x = 1 - 2 \sin^2 2x$$

$$\cos 6x = 1 - 2 \sin^2 3x$$

4) $\cos 2x = 2 \cos^2 x - 1$

$$\cos 4x = 2 \cos^2 2x - 1$$

$$\cos 6x = 2 \cos^2 3x - 1$$

(2) قوانين ضعف الزاوية:

$$1) \quad \sin^2 x = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 2x$$

$$\sin^2 2x = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 4x$$

$$\sin^2 3x = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 6x$$

$$1) \quad \cos^2 x = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2x$$

$$\cos^2 2x = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 4x$$

$$\cos^2 3x = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 6x$$

الدرس الثالث: قاعدة السلسلة

قاعدة السلسلة

هي قاعدة الاشتقاق التي تطبق على الاقترانات المركبة أي يحتوي على اقترانين (داخلي و خارجي).
يتم اشتقاق الاقتران المركب :

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) \Rightarrow (f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

بمعنى مشتقة الاقتران الخارجي وقيمه عند الاقتران الداخلي، ثم ضربه في مشتقة الاقتران الداخلي.
ملاحظة مهمة: امثلة على الاقترانات التي تطبق قاعدة السلسلة:

(1) الاقترانات المثلثية:

قاعدة الاشتقاق : نشتق الاقتران المثلثي وتنزل الزاوية كما هي $\times$ مشتقة الزاوية .

(2) اقتران القوس المرفوع لأس:

الاقتران : القوس المرفوع إلى أس $f(x) = (g(x))^n$

$$\text{المشتقة: } f(x) = (g(x))^n \Rightarrow f'(x) = n(g(x))^{n-1} \times g'(x)$$

قاعدة الاشتقاق: ينزل الأس، وينزل القوس مع طرح من الأس واحد، ونشتق ما في داخل القوس.

(3) الاقتران اللوغاريتمي الطبيعي:

قاعدة الاشتقاق : إذا كان : (مقدار متغير) $f(x) = \ln$ ، حيث : $x > 0$ ،

$$\text{فإن المشتقة: } f'(x) = \frac{\text{مشتقة المقدار}}{\text{نفس المقدار}}$$

(4) الاقتران الأسّي الطبيعي:

قاعدة الاشتقاق: نشتق اقتران الأس، وينزل الاقتران الأسّي الطبيعي نفسه (الاساس مع الأس):

$$f(x) = e^{g(x)} \Rightarrow f'(x) = g'(x)e^{g(x)}$$

مسألة اليوم : يمكن نمذجة انتشار الانفلونزا في إحدى المدارس باستعمال الاقتران : $P(t) = \frac{100}{1+e^{3-t}}$ ، حيث $P(t)$ العدد التقريبي الكلي للطلبة المصابين بعد t يوماً من ملاحظة الانفلونزا أول مرة في المدرسة ، أجد سرعة انتشار الانفلونزا في المدرسة بعد 3 أيام ، مبرراً إجابتي .

$$P(t) = \frac{100}{1+e^{3-t}}$$

$$\dot{P}(t) = \frac{100e^{3-t}}{(1+e^{3-t})^2}$$

$$\dot{P}(3) = \frac{100e^{3-3}}{(1+e^{3-3})^2}$$

$$\dot{P}(3) = \frac{100(1)}{(1+1)^2}$$

$$\dot{P}(3) = \frac{100}{4}$$

$$\dot{P}(3) = 25$$

أي أن الانفلونزا تنتشر في المدرسة بعد 5 أيام بمعدل 5 طالباً / يوم .

مثال 1: أجد مشتقة كل اقتران مما يأتي: (صفحة 40)

1) $f(x) = \cos 2x$

$$\hat{f}(x) = \frac{d}{dx} (\cos 2x) = -\sin 2x \times 2 = -2 \sin 2x$$

2) $f(x) = e^{(x+x^2)}$

$$\hat{f}(x) = \frac{d}{dx} (e^{(x+x^2)}) = e^{(x+x^2)}(1+2x)$$

3) $f(x) = \ln(\sin x)$

$$\hat{f}(x) = \frac{d}{dx} (\ln(\sin x)) = \frac{\cos x}{\sin x} = \cot x$$

أتحقق من فهمي: (صفحة 41)

$$1) f(x) = \tan 3x^2$$

$$\hat{f}(x) = 6x \sec^2 3x^2$$

$$2) f(x) = e^{\ln x}$$

$$f(x) = x \quad \leftarrow \quad \boxed{e^{\log_e x} = e^{\ln x} = x}$$

$$\hat{f}(x) = 1$$

$$3) f(x) = \ln(\cot x)$$

$$\hat{f}(x) = \frac{-\csc^2 x}{\cot x}$$

قاعدة سلسلة القوة:

ويتم تطبيق قاعدة اشتقاق القوس المرفوع لأس:

مشتقة القوس المرفوع إلى أس $f(x) = (g(x))^n$ ،

$$\hat{f}(x) = n(g(x))^{n-1} \times \hat{g}(x) \quad \text{المشتقة}$$

المشتقة = ينزل الأس ، وينزل القوس مع طرح من الأس واحد ، ونشتق ما في داخل القوس .

ملاحظة 1): يجب تحويل الجذر إلى (أس) عند الاشتقاق وذلك بقسمة $\frac{\text{الداخل}}{\text{الخارج}}$.

ملاحظة 2): إذا كان الأس فوق الاقتران مثلثي فيعتبر هذا الأس للقوس كله ويشترك حسب قاعدة القوس المرفوع لأس.

مثال للتوضيح:

$$f(x) = \sin^2 5x \Rightarrow f(x) = (\sin 5x)^2$$

$$\hat{f}(x) = 2\sin(5x) \cdot \cos(5x) \cdot 5$$

$$\hat{f}(x) = 10\sin(5x)\cos(5x)$$

تم الاشتقاق حسب قاعدة القوس المرفوع لأس.

مثال 2: أجد مشتقة كل اقتران مما يأتي: (صفحة 42)

1) $f(x) = \sqrt[3]{(x^2 - 1)^2}$

$$f(x) = (x^2 - 1)^{\frac{2}{3}}$$

$$\dot{f}(x) = \frac{2}{3}(x^2 - 1)^{-\frac{1}{3}} \times \frac{d}{dx}(x^2 - 1)$$

$$= \frac{2}{3}(x^2 - 1)^{-\frac{1}{3}} \times 2x$$

$$= \frac{4x}{3\sqrt[3]{x^2 - 1}}$$

2) $f(x) = \tan^4 x$

$$f(x) = \tan^4 x = (\tan x)^4$$

$$\dot{f}(x) = 4(\tan x)^3 \times \frac{d}{dx}(\tan x)$$

$$= 4(\tan x)^3 \times \frac{d}{dx}(\tan x)$$

$$= 4 \tan^3 x \times \sec^2 x$$

3) $f(x) = \sqrt{\ln x}$

$$f(x) = (\ln x)^{\frac{1}{2}}$$

$$\dot{f}(x) = \frac{1}{2}(\ln x)^{-\frac{1}{2}} \times \frac{d}{dx}(\ln x)$$

$$= \frac{1}{2}(\ln x)^{-\frac{1}{2}} \times \frac{1}{x}$$

$$= \frac{1}{2x\sqrt{\ln x}}$$

أتحقق من فهمي: (صفحة 42)

أجد مشتقة كل اقتران مما يأتي:

$$1) f(x) = \sqrt[5]{(x^2 - 1)^2}$$

$$f(x) = (x^2 - 1)^{\frac{2}{5}}$$

$$\hat{f}(x) = \frac{2}{5} (x^2 - 1)^{-\frac{3}{5}} (2x)$$

$$\hat{f}(x) = \frac{4x}{5\sqrt[5]{(x^2 - 1)^3}}$$

$$2) f(x) = \sqrt{\cos x}$$

$$\hat{f}(x) = \frac{-\sin x}{2\sqrt{\cos x}}$$

$$3) f(x) = (\ln x)^5$$

$$\hat{f}(x) = 5(\ln x)^4 \left(\frac{1}{x}\right)$$

$$\hat{f}(x) = \frac{5(\ln x)^4}{x}$$

الاستعمال المتكرر لقاعدة السلسلة:

وهي ان نستعمل قاعدة السلسلة أكثر من مرة لإيجاد المشتقة. (بمعنى ان الاقتران مركب أكثر من مرة).

مثال: ان يكون الاقتران مثلثي مرفوع لأسّ وزاوية الاقتران المثلثي عبارة عن اقتران آخر.

المشتقة = مشتقة القوس المرفوع لقوة × مشتقة ما بداخل القوس × مشتقة الزاوية

أمثلة توضيحية: (غير موجودة في الكتاب)

$$1) f(x) = \cos^3(2x)$$

$$f(x) = (\cos(2x))^3$$

$$\hat{f}(x) = 3(\cos 2x)^2(-\sin 2x)(2)$$

$$\hat{f}(x) = -6(\cos^2 2x)(\sin 2x)$$

$$2) f(x) = \sin^2(\cos 3x^2)$$

$$f(x) = (\sin(\cos 3x^2))^2$$

$$\hat{f}(x) = (2 \sin(\cos 3x^2)) \times (\cos(\cos 3x^2) \times (-\sin 3x^2 \times 6x))$$

$$\hat{f}(x) = -12x \cos(\cos 3x^2) \sin(3x^2) \sin(\cos 3x^2)$$

مثال 3: (صفحة 43)

أجد مشتقة كل اقتران مما يأتي:

$$1) f(x) = e^{\csc 4x}$$

$$\hat{f}(x) = e^{\csc 4x} \times \frac{d}{dx}(\csc 4x)$$

$$= e^{\csc 4x} \times -\csc 4x \times \cot 4x \times \frac{d}{dx}(4x)$$

$$= -4e^{\csc 4x} \csc 4x \cot 4x$$

$$2) f(x) = \sin(\tan \sqrt{3x^2 + 4})$$

$$\hat{f}(x) = \cos(\tan \sqrt{3x^2 + 4}) \times \frac{d}{dx}(\tan \sqrt{3x^2 + 4})$$

$$= \cos(\tan \sqrt{3x^2 + 4}) \times \sec^2 \sqrt{3x^2 + 4} \times \frac{d}{dx}(\sqrt{3x^2 + 4})$$

$$= \cos(\tan \sqrt{3x^2 + 4}) \times \sec^2 \sqrt{3x^2 + 4} \times (3x^2 + 4)^{\frac{1}{2}}$$

$$= \cos(\tan \sqrt{3x^2 + 4}) \times \sec^2 \sqrt{3x^2 + 4} \times \frac{1}{2}(3x^2 + 4)^{-\frac{1}{2}} \times \frac{d}{dx} 6x (3x^2 + 4)$$

$$= \cos(\tan \sqrt{3x^2 + 4}) \times \sec^2 \sqrt{3x^2 + 4} \times \frac{1}{2}(3x^2 + 4)^{-\frac{1}{2}} \times 6x$$

$$= \frac{3x \cos(\tan \sqrt{3x^2 + 4}) \times \sec^2 \sqrt{3x^2 + 4}}{\sqrt{3x^2 + 4}}$$

أتحقق من فهمي: صفحة 44

أجد مشتقة كل اقتران مما يأتي:

1) $f(x) = \cos^2(7x^3 + 6x - 1)$

$$\hat{f}(x) = 2 \cos(7x^3 + 6x - 1)(-\sin 7x^3 + 6x - 1)(21x^2 + 6)$$

$$\hat{f}(x) = -2(21x^2 + 6) \cos(7x^3 + 6x - 1) \sin(7x^3 + 6x - 1)$$

$$\hat{f}(x) = -(21x^2 + 6) \sin 2(7x^3 + 6x - 1) \quad \boxed{\text{قانون نصف الزاوية}}$$

2) $f(x) = (2 + (x^2 + 1)^4)^3$

$$\hat{f}(x) = 3(2 + (x^2 + 1)^4)^2(4(x^2 + 1)^3(2x))$$

$$\hat{f}(x) = 24x(2 + (x^2 + 1)^4)^2(x^2 + 1)^3$$

قواعد الاشتقاق الأساسية وقاعدة السلسلة

أي تطبيق قواعد الاشتقاق الأساسية التي تعلمناها سابقاً بالإضافة لقاعدة السلسلة معاً،
مثل: مشتقة الجمع ومشتقة الضرب ومشتقة القسمة وغيرها .

مثال 4: (صفحة 44) أجد ميل المماس لمنحنى الاقتران : $f(x) = e^{-0.2x} \sin 4x$ عندما $x = \frac{\pi}{8}$

لإيجاد ميل المماس : (نجد المشتقة الأولى ثم نعوض قيمة x المغطاة بالسؤال)

(تم استخدام قاعدة الضرب وقاعدة السلسلة في الحل)

$$f(x) = e^{-0.2x} \sin 4x$$

$$\hat{f}(x) = e^{-0.2x} \frac{d}{dx}(\sin 4x) + \sin 4x \frac{d}{dx}(e^{-0.2x})$$

$$= e^{-0.2x} \times 4 \cos 4x + \sin 4x \times -0.2 e^{-0.2x}$$

$$= 4e^{-0.2x} \cos 4x - 0.2e^{-0.2x} \sin 4x$$

$$\hat{f}\left(\frac{\pi}{8}\right) = 4e^{-0.2\left(\frac{\pi}{8}\right)} \cos 4\left(\frac{\pi}{8}\right) - 0.2e^{-0.2\left(\frac{\pi}{8}\right)} \sin 4\left(\frac{\pi}{8}\right)$$

$$= -0.2e^{-0.025\pi}$$

(2) أجد ميل العمودي على المماس لمنحنى الاقتران : $f(x) = \left(\frac{3x-1}{x^2+3}\right)^2$ عندما $x = 0$

لإيجاد ميل العمودي على المماس : (نجد المشتقة الأولى ثم نعوض قيمة x المعطاة بالسؤال ثم نجد سالب مقلوب ميل المماس)

(تم استخدام قاعدة القسمة وقاعدة السلسلة في الحل)

$$f(x) = \left(\frac{3x-1}{x^2+3}\right)^2$$

$$\hat{f}(x) = 2\left(\frac{3x-1}{x^2+3}\right) \times \frac{d}{dx} \left(\frac{3x-1}{x^2+3}\right)$$

$$\hat{f}(x) = 2\left(\frac{3x-1}{x^2+3}\right) \times \left(\frac{(x^2+3)(3) - (3x-1)(2x)}{(x^2+3)^2}\right)$$

$$\hat{f}(x) = \frac{2(3x-1)(-3x^2+2x+9)}{(x^2+3)^3} \quad \text{المشتقة}$$

$$\hat{f}(0) = \frac{2(3(0)-1)(-3(0)^2+2(0)+9)}{((0)^2+3)^3}$$

$$\hat{f}(0) = \frac{-18}{27} = \frac{-2}{3} \quad \text{ميل المماس}$$

إذن ميل المماس لمنحنى الاقتران $f(x)$ عندما $x = 0$ هو : $-\frac{2}{3}$. ومنه، فإن ميل العمودي على المماس

عندما $x = 0$ هو $\frac{2}{3}$

أتحقق من فهمي: (صفحة 45)

1) أجد ميل المماس لمنحنى الاقتران : $f(x) = (2x + 1)^5(x^3 - x + 1)^4$ عندما $x = 1$

لإيجاد ميل المماس : (نجد المشتقة الأولى ثم نعوض قيمة x المعطاة بالسؤال)

(تم استخدام قاعدة الضرب وقاعدة السلسلة في الحل)

$$f(x) = (2x + 1)^5(x^3 - x + 1)^4$$

$$\hat{f}(x) = (2x + 1)^5 4(x^3 - x + 1)^3(3x^2 - 1) + (x^3 - x + 1)^4 5(2x + 1)^4(2)$$

$$\hat{f}(x) = (2x + 1)^5 4(x^3 - x + 1)^3(3x^2 - 1) + (x^3 - x + 1)^4 5(2x + 1)^4(2)$$

$$\hat{f}(1) = (2(1) + 1)^5 4((1)^3 - (1) + 1)^3(3(1)^2 - 1) + ((1)^3 - (1) + 1)^4 5(2(1) + 1)^4(2)$$

$$\hat{f}(1) = (3)^5(4)(1)^3(2) + (1)^4 5(3)^4(2)$$

$$\hat{f}(1) = (3)^5(4)(1)^3(2) + (1)^4(5)(3)^4(2)$$

$$\hat{f}(1) = 1944 + 810$$

$$\hat{f}(1) = 2754$$

(2) أجد ميل العمودي على المماس لمنحنى الاقتران : $f(x) = \frac{\cos^2 x}{e^{2x}}$ عندما $x = \frac{\pi}{2}$

(تم استخدام قاعدة القسمة وقاعدة السلسلة في الحل)

$$f(x) = \frac{\cos^2 x}{e^{2x}}$$

$$\hat{f}(x) = \frac{(e^{2x}) \times 2(\cos x)(-\sin x) - (\cos^2 x)(2e^{2x})}{(e^{2x})^2}$$

$$\hat{f}(x) = \frac{(e^{2x}) \times 2(\cos x)(-\sin x) - (\cos^2 x)(2e^{2x})}{e^{4x}}$$

$$\hat{f}(x) = \frac{-2(\cos x)(\sin x) - 2(\cos^2 x)}{e^{2x}}$$

قانون نصف الزاوية

$$\boxed{\hat{f}(x) = \frac{-(\sin 2x) - 2(\cos^2 x)}{e^{2x}}}$$

المشتقة

$$\hat{f}\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{-\left(\sin 2\left(\frac{\pi}{2}\right)\right) - 2\left(\cos^2\left(\frac{\pi}{2}\right)\right)}{e^{2\left(\frac{\pi}{2}\right)}}$$

$$\hat{f}\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{-\left(\sin 2\left(\frac{\pi}{2}\right)\right) - 2\left(\cos^2\left(\frac{\pi}{2}\right)\right)}{e^{2\left(\frac{\pi}{2}\right)}}$$

$$\hat{f}\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{-(\sin(\pi)) - 2\left(\cos^2\left(\frac{\pi}{2}\right)\right)}{e^{(\pi)}}$$

$$\hat{f}\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{(0) - 2(0)}{e^{(\pi)}}$$

$$\hat{f}\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$$

ميل العامودي على المماس: هو سالب مقلوب ميل المماس. $m_1 = -\frac{1}{m}$

$$\boxed{m_1 = -\frac{1}{0} = \text{غير معرف}}$$

ميل المماس يساوي صفراً، أي أن المماس أفقي، ومنه يكون العمودي على المماس رأسياً وميله غير معرف.

مثال 5: من الحياة: (صفحة 45)

أعمال: طرحت إحدى الشركات منتجاً جديداً في الأسواق، ثم رصدت عدد القطع المباعة منذ طرحه.

إذا مثل الاقتران : $t > 0$ ، $N(t) = \frac{250000t^2}{(2t+1)^2}$ عدد القطع المباعة منذ طرحه ، حيث t الزمن بالأسابيع ، فأجب عن السؤالين الآتيين تباعاً :

(1) أجد معدل تغير عدد القطع المباعة بالنسبة إلى الزمن:

(1) أجد $\dot{N}(t)$

$$\begin{aligned} N(t) &= \frac{250000t^2}{(2t+1)^2} \\ \dot{N}(t) &= \frac{(2t+1)^2 \frac{d}{dt}(250000t^2) - (250000t^2) \frac{d}{dt}(2t+1)^2}{((2t+1)^2)^2} \\ &= \frac{(2t+1)^2(500000t) - (250000t^2)2(2t+1) \times 2}{(2t+1)^4} \\ &= \frac{(2t+1)^2(500000t) - (1000000t^2)(2t+1)}{(2t+1)^4} \\ &= \frac{(2t+1)(500000t)((2t+1) - 2t)}{(2t+1)^4} \\ &= \frac{500000t}{(2t+1)^3} \end{aligned}$$

(2) أجد $\dot{N}(52)$ مفسراً معنى الناتج .

$$\begin{aligned} \dot{N}(t) &= \frac{250000t^2}{(2t+1)^2} \\ \dot{N}(52) &= \frac{250000(52)^2}{(2(52)+1)^2} \\ &\approx 22 \end{aligned}$$

إن $\dot{N}(52) = 22$ وهذا يعني أن إجمالي عدد القطع المباعة من المنتج يزداد بمعدل 22 قطعة لكل أسبوعاً بعد مرور 52 أسبوعاً على طرح المنتج في الأسواق .

أتحقق من فهمي: (صفحة 46)

تحتسب قيمة بدل الخدمة لأحد المنتجات تحسب بالدينار ، باستعمال الاقتران : $U(x) = 80 \sqrt{\frac{2x+1}{3x+4}}$

حيث x عدد القطع المباعة من المنتج .

1) أجد معدل تغير قيمة بدل الخدمة بالنسبة إلى عدد القطع المباعة من المنتج.

$$U(x) = 80 \sqrt{\frac{2x+1}{3x+4}}$$

$$\dot{U}(x) = 80 \frac{(3x+4)(2) - (2x+1)(3)}{(3x+4)^2} \cdot \frac{1}{2\sqrt{\frac{2x+1}{3x+4}}}$$

$$\dot{U}(x) = 40 \frac{6x+8-6x-3}{(3x+4)^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{\frac{2x+1}{3x+4}}}$$

$$\dot{U}(x) = \frac{200}{(3x+4)^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{\frac{2x+1}{3x+4}}}$$

$$\dot{U}(x) = \frac{200}{(3x+4)^2} \sqrt{\frac{3x+4}{2x+1}}$$

2- أجد $\dot{U}(20)$ مفسراً معنى الناتج .

$$\dot{U}(20) = \frac{200}{(3(20)+4)^2} \sqrt{\frac{3(20)+4}{2(20)+1}}$$

$$\dot{U}(20) = \frac{200}{4096} \sqrt{\frac{64}{41}}$$

$$\dot{U}(20) \approx 0.061$$

وهذا يعني أنه عند بيع 20 قطعة فإن قيمة بدل الخدمة تتزايد بمقدار 0.061 دينار / قطعة تقريباً .

مشتقة $a^{(g(x))}$

قاعدة اشتقاق اقتران الثابت مرفوع لأس اقتران:

ينزل الاقتران كما هو $\ln \times$ الأساس $\times$ مشتقة الاس

$$f(x) = a^x \Rightarrow \dot{f}(x) = a^x \ln a (\dot{g}(x))$$

ملاحظة : يشترط أن تكون $a > 1$ دائماً ، لأن $\ln 1 = 0$ بالتالي ناتج الاشتقاق يكون صفر .

مثال 6: (صفحة 47)

أجد مشتقة كل اقتران مما يأتي:

1) $f(x) = 8^{5x}$

$$\dot{f}(x) = 8^{5x} (\ln 8)(5)$$

$$\dot{f}(x) = (5 \ln 8) 8^{5x}$$

2) $f(x) = 6^{x^2}$

$$\dot{f}(x) = 6^{x^2} (\ln 6)(2x)$$

$$\dot{f}(x) = (2x \ln 6) 6^{x^2}$$

3) $f(x) = e^{3x} + 2^{3x}$

$$\dot{f}(x) = 3e^{3x} + 2^{3x} (\ln 2)(3)$$

$$\dot{f}(x) = 3e^{3x} + (3 \ln 2) 2^{3x}$$

أتحقق من فهمي: (صفحة 48)

أجد مشتقة كل اقتران مما يأتي:

1) $f(x) = \pi^{\pi x}$

$$\dot{f}(x) = \pi^{\pi x} (\ln \pi)(\pi)$$

$$\dot{f}(x) = \pi^{1+\pi x} \ln \pi$$

$$2) f(x) = 6^{1-x^3}$$

$$\hat{f}(x) = 6^{1-x^3} (\ln 6)(-3x^2)$$

$$\hat{f}(x) = (-3x^2 \ln 6) 6^{1-x^3}$$

$$3) f(x) = e^{4x} + 4^{2x}$$

$$\hat{f}(x) = 4e^{4x} + 4^{2x} (\ln 4)(2)$$

$$\hat{f}(x) = 4e^{4x} + (2 \ln 4) 4^{2x}$$

مشتقة $\log_a g(x)$

(تذكر 1) اللوغاريتم الاعتيادي: هو اللوغاريتم للأساس 10 أو $\log_{10}$ ، ويكتب عادة من دون أساس $\log$.

(تذكر 2) اللوغاريتم الطبيعي: هو اللوغاريتم للأساس e أو $\log_e$ ، ويرمز له بـ $\ln$.

(تذكر 3) نظرية اشتقاق اقتران اللوغاريتم الطبيعي: (مقدار متغير) $f(x) = \ln$ ، حيث $x > 0$ ، فإن المشتقة : $\hat{f}(x) = \frac{\text{مشتقة المقدار}}{\text{نفس المقدار}}$

قاعدة اشتقاق اقتران $\log$ للأساس a ما داخله اقتران:

نشتق ما داخل $\log \div (\ln \text{ الأساس} \times \text{ما داخل } \log)$

$$f(x) = \log_a g(x) \Rightarrow \hat{f}(x) = \frac{(\hat{g}(x))}{(\ln a)(g(x))} \Rightarrow \hat{f}(x) = \frac{(\text{مشتقة المقدار})}{(\ln a)(\text{نفس المقدار})}$$

نلاحظ أن الفرق بين القاعدتين (قاعدة اشتقاق اللوغاريتم الطبيعي وقاعدة اشتقاق اللوغاريتم للأساس a) هو ضرب $(\ln a)$ في المقام .

مثال 7: (صفحة 49)

أجد مشتقة كل اقتران مما يأتي:

$$1) f(x) = \log \cos x$$

$$\hat{f}(x) = \frac{-\sin x}{(\ln 10) \cos x}$$

$$2) f(x) = \log_2 \left(\frac{x^2}{x-1} \right)$$

$$f(x) = \log_2(x^2) - \log_2(x-1)$$

$$\hat{f}(x) = \frac{2}{(\ln 2)x} - \frac{1}{(\ln 2)(x-1)}$$

(تذكر) قانون القسمة: $\log_b \frac{x}{y} = \log_b x - \log_b y$

أتحقق من فهمي: (صفحة 49)

$$1) f(x) = \log \sec x$$

$$\hat{f}(x) = \frac{\sec x \tan x}{(\ln 10) \sec x}$$

$$\hat{f}(x) = \frac{\tan x}{\ln 10}$$

$$2) f(x) = \log_8(x^2 + 3x)$$

$$\hat{f}(x) = \frac{2x + 3}{(x^2 + 3x) \ln 8}$$

مشتقة المعادلات الوسطية

ويتم استخدامها عندما يكون لدينا اقترانين مختلفين بدلالة نفس المتغير.

1) الاقتران الثاني: y بدلالة المتغير t بحيث يكون: $y = g(t)$ 2) الاقتران الأول: x بدلالة المتغير t بحيث يكون: $x = h(t)$ ونريد إيجاد مشتقة y بدلالة المتغير x أي $\frac{dy}{dx}$

الخطوات:

- (1) نشتق الاقتران الأول $y = g(t)$ لنحصل على المشتقة $\frac{dy}{dt}$.
- (2) نشتق الاقتران الثاني $x = h(t)$ لنحصل على المشتقة $\frac{dx}{dt}$.
- (3) نقسم الاقتران الأول على الاقتران الثاني $\frac{dy}{dx}$ لنحصل على المشتقة $\frac{dy}{dx}$.
- (4) نعوض قيمة (t) المعطاة في السؤال في المشتقة الوسيطة $\frac{dy}{dx}$.

مثال 8: (صفحة 51)أجد معادلة مماس منحنى المعادلة الوسيطة الآتية عندما $t = \frac{\pi}{4}$

$$x = 2 \sin t$$

$$y = 3 \cos t$$

$$0 \leq t \leq 2\pi$$

الخطوة الأولى: إيجاد النقطة.

$$x = 2 \sin t$$

$$x = 2 \sin \frac{\pi}{4}$$

$$x = 2 \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

$$x = \frac{2}{\sqrt{2}}$$

$$y = 3 \cos \frac{\pi}{4}$$

$$y = 3 \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

$$y = \frac{3}{\sqrt{2}}$$

النقطة هي $\left(\frac{2}{\sqrt{2}}, \frac{3}{\sqrt{2}} \right)$

الخطوة الثانية : ايجاد ميل المماس عندما $t = \frac{\pi}{4}$

$$y = 3 \cos t$$

$$\frac{dy}{dt} = -3 \sin t$$

$$x = 2 \sin t$$

$$\frac{dx}{dt} = 2 \cos t$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-3 \sin t}{2 \cos t}$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{3}{2} \tan t$$

$$\frac{dy}{dx} \Big|_{t=\frac{\pi}{4}} = -\frac{3}{2} \tan \frac{\pi}{4}$$

$$\frac{dy}{dx} \Big|_{t=\frac{\pi}{4}} = -\frac{3}{2} (1)$$

$$\frac{dy}{dx} \Big|_{t=\frac{\pi}{4}} = -\frac{3}{2}$$

الخطوة الثالثة: أجد معادلة المماس.

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y - \frac{3}{\sqrt{2}} = -\frac{3}{2} \left(x - \frac{2}{\sqrt{2}} \right)$$

$$y - \frac{3}{\sqrt{2}} = -\frac{3}{2}x + \frac{6}{2\sqrt{2}}$$

$$y + \frac{3}{2}x = \frac{6}{2\sqrt{2}} + \frac{3}{\sqrt{2}}$$

$$y + \frac{3}{2}x = \frac{3}{\sqrt{2}} + \frac{3}{\sqrt{2}}$$

$$\left[y + \frac{3}{2}x = \frac{6}{\sqrt{2}} \right] \times 2$$

$$\boxed{2y + 3x = 6\sqrt{2}}$$

أتتحقق من فهمي: (صفحة 52)

أجد معادلة مماس منحنى المعادلة الوسيطة الآتية عندما $t = \frac{\pi}{4}$:

$$x = \sec t$$

$$y = \tan t$$

$$-\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2}$$

الخطوة الأولى: إيجاد النقطة.

$$x = \sec t$$

$$x = \sec \frac{\pi}{4}$$

$$\boxed{x = \sqrt{2}}$$

$$y = \tan t$$

$$y = \tan \frac{\pi}{4}$$

$$\boxed{y = 1}$$

النقطة هي $(\sqrt{2}, 1)$

الخطوة الثانية : ايجاد ميل المماس عندما $t = \frac{\pi}{4}$

$$y = \tan t$$

$$\frac{dy}{dt} = \sec^2 t$$

$$x = \sec t$$

$$\frac{dx}{dt} = \sec t \tan t$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\sec^2 t}{\sec t \tan t}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\sec t}{\tan t}$$

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{\pi}{4}} = \frac{\sec \frac{\pi}{4}}{\tan \frac{\pi}{4}}$$

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{\pi}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{1}$$

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{\pi}{4}} = \sqrt{2}$$

الخطوة الثالثة: أجد معادلة المماس.

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y - 1 = \sqrt{2}(x - \sqrt{2})$$

$$y - 1 = \sqrt{2}x - 2$$

$$y = \sqrt{2}x - 2 + 1$$

$$y = \sqrt{2}x - 1$$

اتدرب وأحل المسائل: (صفحة 53)

أجد مشتقة كل اقتران مما يأتي:

$$1) f(x) = e^{4x+2}$$

$$\hat{f}(x) = 4e^{4x+2}$$

$$2) f(x) = 50e^{2x-10}$$

$$\hat{f}(x) = 100e^{2x-10}$$

$$3) f(x) = \cos(x^2 - 3x - 4)$$

$$\hat{f}(x) = -\sin(x^2 - 3x - 4)(2x - 3)$$

$$\hat{f}(x) = (-2x + 3)\sin(x^2 - 3x - 4)$$

$$4) f(x) = 10x^2e^{-x^2}$$

$$\hat{f}(x) = (10x^2)(-2xe^{-x^2}) + (e^{-x^2})(20)$$

$$\hat{f}(x) = -20x^2xe^{-x^2} + 20xe^{-x^2}$$

$$\hat{f}(x) = 20xe^{-x^2}(1 - x^2)$$

$$5) f(x) = \sqrt{\frac{x+1}{x}}$$

$$f(x) = \sqrt{\frac{x}{x} + \frac{1}{x}}$$

$$f(x) = \sqrt{1 + \frac{1}{x}}$$

$$\hat{f}(x) = \frac{-\frac{1}{x^2}}{2\sqrt{1 + \frac{1}{x}}}$$

$$\hat{f}(x) = \frac{-1}{2x^2\sqrt{1 + \frac{1}{x}}}$$

$$6) f(x) = x^2 \tan \frac{1}{x}$$

$$\hat{f}(x) = (x^2) \left(-\frac{1}{x^2} \sec^2 \frac{1}{x} \right) + \left(\tan \frac{1}{x} \right) (2x)$$

$$\hat{f}(x) = (x^2) \left(-\frac{1}{x^2} \sec^2 \frac{1}{x} \right) + \left(\tan \frac{1}{x} \right) (2x)$$

$$7) f(x) = 3x - 5 \cos(\pi x)^2$$

$$\hat{f}(x) = 3 - (5)(2) - \sin(\pi x)^2 (\pi x)(\pi)$$

$$\hat{f}(x) = 3 + 10\pi^2 x \sin(\pi x)^2$$

$$8) f(x) = \ln \left(\frac{1+e^x}{1-e^x} \right)$$

$$f(x) = \ln(1+e^x) - \ln(1-e^x)$$

$$\hat{f}(x) = \frac{e^x}{1+e^x} + \frac{e^x}{1-e^x}$$

$$\hat{f}(x) = \frac{e^x(1+e^x) + e^x(1-e^x)}{(1+e^x)(1-e^x)}$$

$$\hat{f}(x) = \frac{(e^x + e^{2x}) + (e^x - e^{2x})}{(1+e^x)(1-e^x)}$$

$$\hat{f}(x) = \frac{e^x + e^{2x} + e^x - e^{2x}}{1-e^{2x}}$$

$$\hat{f}(x) = \frac{2e^x}{1-e^{2x}}$$

$$9) f(x) = (\ln x)^4$$

$$\hat{f}(x) = \frac{4}{x} (\ln x)^3$$

$$10) f(x) = \sin \sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{\sin x}$$

$$f(x) = \sin x^{\frac{1}{3}} + (\sin x)^{\frac{1}{3}}$$

$$\hat{f}(x) = \frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}}\cos x^{\frac{1}{3}} + \frac{1}{3}(\sin x)^{-\frac{2}{3}}(\cos x)(1)$$

$$\hat{f}(x) = \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}\cos \sqrt[3]{x} + \frac{\cos x}{3\sqrt[3]{\sin^2 x}}$$

$$11) f(x) = \sqrt[5]{x^2 + 8x}$$

$$f(x) = (x^2 + 8x)^{\frac{1}{5}}$$

$$\hat{f}(x) = \frac{1}{5}(x^2 + 8x)^{-\frac{4}{5}}(2x + 8)$$

$$\hat{f}(x) = \frac{2x + 8}{5\sqrt[5]{(x^2 + 8x)^4}}$$

$$12) f(x) = \frac{3^{2x}}{x}$$

$$\hat{f}(x) = \frac{(x)(2 \ln 3)3^{2x} - 3^{2x}(1)}{x^2}$$

$$\hat{f}(x) = \frac{(2x \ln 3)3^{2x} - 3^{2x}}{x^2}$$

$$\hat{f}(x) = \frac{3^{2x}(2x \ln 3 - 1)}{x^2}$$

$$13) f(x) = 2^{-x} \cos \pi x$$

$$\hat{f}(x) = (2^{-x})(\cos \pi x) + (\cos \pi x)(-\ln 2)(2^{-x})$$

$$\hat{f}(x) = (2^{-x}) - (\sin \pi x)(\pi) + (\cos \pi x)(-\ln 2)(2^{-x})$$

$$\hat{f}(x) = -\pi 2^{-x} \sin \pi x - 2^{-x}(\cos \pi x) \ln 2$$

$$14) f(x) = \frac{10 \log_4 x}{x}$$

$$\hat{f}(x) = \frac{(x) \frac{10}{x \ln 4} - (10 \log_4 x)(1)}{x^2}$$

$$\hat{f}(x) = \frac{\frac{10x}{x \ln 4} - 10 \log_4 x}{x^2}$$

$$\hat{f}(x) = \frac{\frac{10}{\ln 4} - 10 \log_4 x}{x^2}$$

$$15) f(x) = \left(\frac{\sin x}{1 + \cos x} \right)^2$$

$$\hat{f}(x) = 2 \left(\frac{\sin x}{1 + \cos x} \right) \left(\frac{(1 + \cos x)(\cos x) - (\sin x)(-\sin x)}{(1 + \cos x)^2} \right)$$

$$\hat{f}(x) = 2 \left(\frac{\sin x}{1 + \cos x} \right) \left(\frac{\cos x + \cos^2 x + \sin^2 x}{(1 + \cos x)^2} \right)$$

$$\hat{f}(x) = \left(\frac{2 \sin x}{1 + \cos x} \right) \left(\frac{\cos x + 1}{(1 + \cos x)^2} \right)$$

$$\hat{f}(x) = \left(\frac{2 \sin x}{1 + \cos x} \right) \left(\frac{1}{1 + \cos x} \right)$$

$$\hat{f}(x) = \frac{2 \sin x}{(1 + \cos x)^2}$$

$$16) f(x) = \log_3(1 + x \ln x)$$

$$\hat{f}(x) = \frac{(x) \left(\frac{1}{x} \right) + (\ln x)(1)}{(\ln 3)(1 + x \ln x)}$$

$$\hat{f}(x) = \frac{1 + \ln x}{(\ln 3)(1 + x \ln x)}$$

$$17) f(x) = e^{\sin 2x} + \sin(e^{2x})$$

$$\hat{f}(x) = e^{\sin 2x}(\cos 2x)(2) + \cos(e^{2x})(e^{2x})(2)$$

$$\hat{f}(x) = 2e^{\sin 2x} \cos 2x + 2e^{2x} \cos(e^{2x})$$

$$18) f(x) = \tan^4(\sec(\cos x))$$

$$\hat{f}(x) = 4(\tan(\sec(\cos x)))^3(\sec^2(\sec(\cos x)) \times (\sec \cos x)(\tan \cos x)(-\sin x))$$

$$\hat{f}(x) = -4\tan^3(\sec(\cos x))(\sec^2(\sec(\cos x)) \times \sec(\cos x) \tan(\cos x) \sin x)$$

أجد معادلة المماس لكل اقتران مما يأتي عند قيمة x المعطاة :

$$19) f(x) = 4e^{-0.5x^2}, x = -2$$

$$f(-2) = 4e^{-0.5x^2}$$

$$f(-2) = 4e^{-0.5(-2)^2}$$

$$f(-2) = 4e^{-2}$$

$$f(-2) = \frac{4}{e^2}$$

النقطة هي : $(-2, \frac{4}{e^2})$

$$\hat{f}(x) = 4e^{-0.5x^2}(-x)$$

$$\hat{f}(x) = -4xe^{-0.5x^2}$$

$$\hat{f}(-2) = -4(-2)e^{-0.5(-2)^2}$$

$$\hat{f}(-2) = 8e^{-2}$$

$$\hat{f}(-2) = \frac{8}{e^2} \quad \text{ميل المماس}$$

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y - \frac{4}{e^2} = \frac{8}{e^2}(x - (-2))$$

$$y - \frac{4}{e^2} = \frac{8}{e^2}(x + 2)$$

$$y - \frac{4}{e^2} = \frac{8}{e^2}x + 2\frac{8}{e^2}$$

$$y = \frac{8}{e^2}x + \frac{16}{e^2} + \frac{4}{e^2}$$

$$y = \frac{8}{e^2}x + \frac{20}{e^2} \quad \text{معادلة المماس}$$

$$20) f(x) = x + \cos 2x, x = 0$$

$$f(0) = 0 + \cos 2(0)$$

$$f(0) = \cos 0$$

$$f(0) = 1$$

النقطة هي : (0, 1)

$$\hat{f}(x) = 1 + (-\sin 2x)(2)$$

$$\hat{f}(x) = 1 - 2\sin 2x$$

$$\hat{f}(0) = 1 - 2\sin 2(0)$$

$$\hat{f}(0) = 1 - 2\sin 0$$

$$\hat{f}(0) = 1 - 2(0)$$

$$\hat{f}(0) = 1 \quad \text{ميل المماس}$$

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y - 1 = 1(x - 0)$$

$$y - 1 = 1(x)$$

$$y = x + 1 \quad \text{معادلة المماس}$$

$$21) f(x) = 2^x, x = 0$$

$$f(0) = 2^0$$

$$f(0) = 1$$

النقطة هي : (0, 1)

$$\hat{f}(x) = (\ln 2)2^x$$

$$\hat{f}(0) = (\ln 2)2^0$$

$$\hat{f}(0) = \ln 2 \quad \text{ميل المماس}$$

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y - 1 = \ln 2 (x - 0)$$

$$y = (\ln 2)x + 1 \quad \text{معادلة المماس}$$

$$22) f(x) = \sqrt{x+1} \sin \frac{\pi x}{2}, x = 3$$

$$f(3) = \sqrt{3+1} \sin \frac{\pi 3}{2}$$

$$f(3) = 2 \sin \frac{3\pi}{2}$$

$$f(3) = 2(-1)$$

$$f(3) = -2$$

النقطة هي : (3, -2)

$$\hat{f}(x) = (\sqrt{x+1}) \left(\cos \frac{\pi x}{2} \right) \left(\frac{\pi}{2} \right) + \left(\sin \frac{\pi x}{2} \right) \left(\frac{1}{2\sqrt{x+1}} \right)$$

$$\hat{f}(3) = (\sqrt{3+1}) \left(\cos \frac{\pi 3}{2} \right) \left(\frac{\pi}{2} \right) + \left(\sin \frac{\pi 3}{2} \right) \left(\frac{1}{2\sqrt{3+1}} \right)$$

$$\hat{f}(3) = (2)(0) \left(\frac{\pi}{2} \right) + (-1) \left(\frac{1}{4} \right)$$

$$\hat{f}(3) = 0 + \left(-\frac{1}{4} \right)$$

$$\hat{f}(3) = -\frac{1}{4} \quad \text{ميل المماس}$$

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y - (-2) = -\frac{1}{4}(x - 3)$$

$$y + 2 = -\frac{1}{4}x + \frac{3}{4}$$

$$y = -\frac{1}{4}x - \frac{5}{4} \quad \text{معادلة المماس}$$

(23) إذا كان : $A(x) = f(g(x))$ ، وكان : $f(-2) = 8, \hat{f}(-2) = 4, \hat{f}(5) = 3, g(5) = -2, \hat{g}(5) = 6$ ، فأوجد $\hat{A}(5)$.

$$A(x) = f(g(x))$$

$$\hat{A}(x) = \hat{f}(g(x)) \times \hat{g}(x)$$

$$\hat{A}(5) = \hat{f}(g(5)) \times \hat{g}(5)$$

$$\hat{A}(5) = \hat{f}(-2) \times \hat{g}(5)$$

$$\hat{A}(5) = 4 \times 6$$

$$\hat{A}(5) = 24$$

(24) إذا كان : $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$ ، فأثبت أن $\dot{f}(x) = \frac{1}{\sqrt{(x^2+1)^3}}$.

$$f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$$

$$\dot{f}(x) = \frac{(\sqrt{x^2+1})(1) - (x)\left(\frac{2x}{2\sqrt{x^2+1}}\right)}{(\sqrt{x^2+1})^2}$$

$$\dot{f}(x) = \frac{(\sqrt{x^2+1}) - \left(\frac{x^2}{\sqrt{x^2+1}}\right)}{x^2+1}$$

$$\dot{f}(x) = \frac{\frac{x^2+1}{\sqrt{x^2+1}} - \frac{x^2}{\sqrt{x^2+1}}}{x^2+1}$$

$$\dot{f}(x) = \frac{\frac{x^2+1-x^2}{\sqrt{x^2+1}}}{x^2+1}$$

$$\dot{f}(x) = \frac{1}{(x^2+1)(\sqrt{x^2+1})}$$

$$\dot{f}(x) = \frac{1}{(x^2+1)(x^2+1)^{\frac{1}{2}}}$$

$$\dot{f}(x) = \frac{1}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}$$

$$\dot{f}(x) = \frac{1}{\sqrt{(x^2+1)^3}}$$

بكتيريا :يمثل الاقتران : $A(t) = Ne^{0.1t}$ عدد الخلايا البكتيرية بعد t ساعة في مجتمع بكتيري :

(25) أجد معدل نمو المجتمع بعد 3 ساعات بدلالة الثابت N .

$$A(t) = Ne^{0.1t}$$

$$\dot{A}(t) = 0.1Ne^{0.1t}$$

$$\dot{A}(3) = 0.1Ne^{0.1(3)}$$

$$\dot{A}(3) = 0.1Ne^{0.3}$$



(26) إذا كان معدل نمو المجتمع بعد k ساعة هو 0.2 خلية لكل ساعة ، فما قيمة k بدلالة الثابت N ؟

$$\dot{A}(k) = 0.1Ne^{0.1(k)}$$

$$0.2 = 0.1Ne^{0.1(k)}$$

$$\frac{0.2}{0.1N} = \frac{0.1N}{0.1N} e^{0.1(k)}$$

$$e^{0.1(k)} = \frac{2}{N}$$

$$\ln e^{0.1(k)} = \ln \frac{2}{N}$$

$$0.1(k) = \ln \frac{2}{N}$$

$$\frac{0.1(k)}{0.1} = \frac{\ln \frac{2}{N}}{0.1}$$

$$k = 10 \ln \frac{2}{N}$$

أجد المشتقة العليا المطلوبة في كل مما يأتي:

27) $f(x) = \sin \pi x$, $\ddot{f}(x)$

$$\dot{f}(x) = \pi \cos \pi x$$

$$\dot{\dot{f}}(x) = -\pi \pi \sin \pi x$$

$$\dot{\dot{\dot{f}}}(x) = -\pi^2 \sin \pi x$$

$$\dot{\dot{\dot{\dot{f}}}}(x) = -\pi^2 \pi \cos \pi x$$

$$\dot{\dot{\dot{\dot{\dot{f}}}}}(x) = -\pi^3 \cos \pi x$$

28) $f(x) = \cos(2x + 1)$, $f^{(5)}(x)$

$$\dot{f}(x) = -2\sin(2x + 1)$$

$$\dot{\dot{f}}(x) = -2(2)\cos(2x + 1)$$

$$\dot{\dot{\dot{f}}}(x) = -4\cos(2x + 1)$$

$$\dot{\dot{\dot{\dot{f}}}}(x) = -(2) - 4\sin(2x + 1)$$

$$\dot{\dot{\dot{\dot{\dot{f}}}}}(x) = 8\sin(2x + 1)$$

$$f^{(4)}(x) = (2)8\cos(2x + 1)$$

$$f^{(4)}(x) = 16\cos(2x + 1)$$

$$f^{(5)}(x) = -(2)16\sin(2x + 1)$$

$$f^{(5)}(x) = -32\sin(2x + 1)$$

$$29) f(x) = \cos x^2, \quad \hat{f}(x)$$

$$\hat{f}(x) = -\sin x^2 (2x)$$

$$\hat{f}(x) = -2x \sin x^2$$

$$\hat{f}(x) = (-2x) \cos x^2 (2x) + (\sin x^2)(-2)$$

$$\hat{f}(x) = -4x^2 \cos x^2 - 2 \sin x^2$$

(30) إذا كان الاقتران : $y = e^{\sin x}$ ، فأجد ميل مماس منحنى الاقتران عند النقطة $(0, 1)$.

$$y = e^{\sin x}$$

$$\frac{dy}{dx} = e^{\sin x} \cos x$$

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = e^{\sin 0} \cos 0$$

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = e^0 (1)$$

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = (1)(1)$$

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = 1 \quad \text{ميل المماس}$$

(31) مواد مشعة : يمكن نمذجة الكمية A (بالغرام) المتبقية من عينة كتلتها الابتدائية 20 g من عنصر البلوتونيوم بعد t يوماً باستعمال الاقتران $A(t) = 20\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{140}}$ ، أجد معدل تحلل عنصر البلوتونيوم عندما $t = 2$.

$$A(t) = 20 \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{140}}$$

$$\hat{A}(t) = 20 \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{140}} \left(\ln \frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{140}\right)$$

$$\hat{A}(t) = \frac{20}{140} \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{140}} \left(\ln \frac{1}{2}\right)$$

$$\hat{A}(2) = \frac{20}{140} \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{2}{140}} \left(\ln \frac{1}{2}\right)$$

$$\hat{A}(2) = \frac{20}{140} \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{2}{140}} \left(\ln \frac{1}{2}\right)$$

$$\hat{A}(2) = \frac{1}{7} \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{70}} \left(\ln \frac{1}{2}\right)$$

$$\hat{A}(2) = 0.142 \times 0.99 \times (-0.693)$$

$$\hat{A}(2) \approx -0.098$$

إذن يتحلل البلوتونيوم بمعدل 0.098 g كل يوم عندما $t = 2$.



زنبرك : تتحرك كرة معلقة بزنبرك إلى الأعلى وإلى الأسفل ، ويحدد الاقتران : $s(t) = 0.1 \sin 2.4t$ موقع الكرة عند أي زمن لاحق ، حيث t الزمن بالثواني ، و s الموقع بالسنتيمترات .

(32) أجد السرعة المتجهة للكرة عندما $t = 1$.

$$s(t) = 0.1 \sin 2.4t$$

$$v(t) = 0.1 \cos 2.4t(2.4)$$

$$v(t) = 0.24 \cos 2.4t$$

$$v(1) = 0.24 \cos 2.4(1)$$

$$v(1) = 0.24 \cos 2.4$$

$$v(1) = 0.24 \times -0.737$$

$$v(1) \approx -0.177 \text{ cm/s}$$

(33) أجد موقع الكرة عندما تكون سرعتها صفراً .

$$v(t) = 0 \rightarrow 0.24 \cos 2.4t = 0$$

$$0.24 \cos 2.4t = 0$$

$$\cos 2.4t = 0$$

عندما يكون $\cos \theta = 0$ فهذا يعني أن $\sin \theta$ يساوي إما 1 أو -1 .

وبتعويض قيمة $\sin 2.4t = \pm 1$ في اقتران الموقع نجد أن :

$$s(t) = 0.1 \sin 2.4t$$

$$s(1) = (0.1)(1)(1)$$

$$s(1) = 0.1$$

$$s(1) = (0.1)(-1)(1)$$

$$s(1) = -0.1$$

إذن ، عندما يكون تسارع الكرة صفراً يكون موقعها عند 0.1 cm أو -0.1 cm

(34) أجد موقع الكرة عندما يكون تسارعها صفراً .

$$a(t) = 0.24 - \sin 2.4t \quad (2.4)$$

$$a(t) = -5.76 \sin 2.4t$$

$$a(t) = -5.76 \sin 2.4t = 0$$

$$\sin 2.4t = 0$$

بتعويض قيمة $\sin 2.4t = 0$ في اقتران الموقع نجد :

$$s(t) = 0.1 \sin 2.4t$$

$$s(t) = 0.1(0)$$

$$s(t) = 0$$

إذن عندما يكون تسارع الكرة صفراً يكون موقعها عند $s = 0$ ، أي عند مرور بموقع الاتزان.

أجد معادلة المماس لمنحنى كل معادلة وسيطية مما يأتي عند النقطة المحددة بقيمة t المعطاة :

35) $x = t + 2$, $y = t^2 - 1$, $t = 1$

$$x = t + 2$$

$$x = 1 + 2$$

$$\boxed{x = 3}$$

$$y = (1)^2 - 1$$

$$\boxed{y = 0}$$

النقطة هي : $(3, 0)$

$$\frac{dy}{dt} = 2t$$

$$\frac{dx}{dt} = 1$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2t}{1}$$

$$\frac{dy}{dx} = 2t$$

$$m = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=1} = 2(1)$$

$$m = 2 \quad \text{ميل المماس}$$

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y - 0 = 2(x - 3)$$

$$y - 0 = 2x - 6$$

$$y = 2x - 6 \quad \text{معادلة المماس}$$

$$36) \quad x = \frac{t}{2}, \quad y = t^2 - 4, \quad t = -1$$

$$x = \frac{t}{2}$$

$$x = -\frac{1}{2}$$

$$y = t^2 - 4$$

$$y = (1)^2 - 4$$

$$y = 1 - 4$$

$$y = -3$$

نقطة التماس هي : $\left(-\frac{1}{2}, -3\right)$

$$\frac{dy}{dt} = 2t$$

$$\frac{dx}{dt} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{2t}{\frac{1}{2}} = 4t$$

$$m = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=-1} = 4(-1)$$

$$m = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=-1} = -4 \quad \text{ميل المماس}$$

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y - (-3) = -4 \left(x - \left(-\frac{1}{2} \right) \right)$$

$$y + 3 = -4 \left(x + \frac{1}{2} \right)$$

$$y = -4x - 2 - 3$$

$$y = -4x - 5 \quad \text{معادلة المماس}$$

$$37) \quad x = t - \sin t, \quad y = 1 - \cos t, \quad t = \frac{\pi}{3}$$

$$x = t - \sin t$$

$$x = \frac{\pi}{3} - \sin \frac{\pi}{3}$$

$$x = \frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$x = \frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$y = 1 - \cos t$$

$$y = 1 - \cos \frac{\pi}{3}$$

$$y = 1 - \frac{1}{2}$$

$$y = \frac{1}{2}$$

$$\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2} \right) \quad \text{نقطة التماس هي :}$$

$$\frac{dy}{dt} = -(-\sin t)$$

$$\frac{dy}{dt} = \sin t$$

$$\frac{dx}{dt} = 1 - \cos t$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\sin t}{1 - \cos t}$$

$$m = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{\pi}{3}} = \frac{\sin \frac{\pi}{3}}{1 - \cos \frac{\pi}{3}}$$

$$m = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{\pi}{3}} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{1 - \frac{1}{2}}$$

$$m = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{\pi}{3}} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{1}{2}}$$

$$m = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{\pi}{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{2}{1}$$

$$m = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{\pi}{3}} = \sqrt{3} \quad \text{ميل المماس}$$

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y - \frac{1}{2} = \sqrt{3} \left(x - \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \right)$$

$$y - \frac{1}{2} = \sqrt{3} \left(x - \frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

$$y - \frac{1}{2} = \sqrt{3}x - \frac{\pi}{\sqrt{3}} + \frac{3}{2}$$

$$y = \sqrt{3}x - \frac{\pi}{\sqrt{3}} + \frac{3}{2} + \frac{1}{2}$$

$$y = \sqrt{3}x - \frac{\pi}{\sqrt{3}} + \frac{4}{2}$$

$$y = \sqrt{3}x - \frac{\pi}{\sqrt{3}} + 2 \quad \text{معادلة المماس}$$

$$38) \quad x = \sec^2 t - 1, \quad y = \tan t, \quad t = -\frac{\pi}{4}$$

$$x = \sec^2\left(-\frac{\pi}{4}\right) - 1$$

$$x = (-\sqrt{2})^2 - 1$$

$$x = 2 - 1$$

$$\boxed{x = 1}$$

$$y = \tan\left(-\frac{\pi}{4}\right)$$

$$\boxed{y = -1}$$

نقطة التماس هي : $\boxed{(1, -1)}$

$$y = \tan t$$

$$\frac{dy}{dt} = \sec^2 t$$

$$x = \sec^2 t$$

$$\frac{dx}{dt} = 2 \sec t \sec t \tan t$$

$$\frac{dx}{dt} = 2 \sec^2 t \tan t$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\sec^2 t}{2 \sec^2 t \tan t}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2 \tan t}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2} \cot t$$

$$m = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=-\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{2 \tan\left(-\frac{\pi}{4}\right)}$$

$$m = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=-\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{2(-1)}$$

$$m = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=-\frac{\pi}{4}} = -\frac{1}{2} \quad \text{ميل المماس}$$

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y - (-1) = -\frac{1}{2}(x - 1)$$

$$y + 1 = -\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$$

$$y = -\frac{1}{2}x + \frac{1}{2} - 1$$

$$y = -\frac{1}{2}x - \frac{1}{2} \quad \text{معادلة المماس}$$

(39) يعطى منحنى بالمعادلة الوسيطة : $x = 2(t - \sin t), y = 2(1 - \cos t)$ ، حيث : $0 \leq t \leq 2\pi$ ، أثبت أن ميل المماس وميل العمودي على المماس لمنحنى هذه العلاقة عندما $t = \frac{\pi}{4}$ هما : $1 + \sqrt{2}$ ، و $1 - \sqrt{2}$ على الترتيب .

$$y = 2(1 - \cos t)$$

$$\frac{dy}{dt} = 2(-(-\sin t))$$

$$\frac{dy}{dt} = 2 \sin t$$

$$x = 2(t - \sin t)$$

$$\frac{dx}{dt} = 2(1 - \cos t)$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2 \sin t}{2(1 - \cos t)}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\sin t}{1 - \cos t}$$

$$m = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{\pi}{4}} = \frac{\sin \frac{\pi}{4}}{1 - \cos \frac{\pi}{4}}$$

$$m = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{\pi}{4}} = \frac{\frac{1}{\sqrt{2}}}{1 - \frac{1}{\sqrt{2}}}$$

$$m = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{\pi}{4}} = \frac{\frac{1}{\sqrt{2}}}{\frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}}}$$

$$m = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}-1}$$

$$m = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{\sqrt{2}-1} \times \frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}+1}$$

$$m = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{\pi}{4}} = \sqrt{2} + 1 \quad \text{ميل المماس}$$

$$m_1 = -\frac{1}{m} \quad \text{ميل العمودي المماس}$$

$$m_1 = -\frac{1}{\sqrt{2} + 1}$$

$$m_1 = \frac{-1}{\sqrt{2} + 1} \times \frac{\sqrt{2} - 1}{\sqrt{2} - 1}$$

$$m_1 = -\sqrt{2} + 1$$

$$m_1 = 1 - \sqrt{2} \quad \text{ميل العمودي المماس}$$

يبين الشكل المجاور منحنى الاقترانين $f(x)$ و $g(x)$. إذا كان : $h(x) = f(g(x))$ وكان $p(x) = g(f(x))$ ، فأجد كلا مما يأتي :


40) $\dot{h}(1)$

$$h(x) = f(g(x))$$

$$\dot{h}(x) = \dot{f}(g(x)) \times \dot{g}(x)$$

$$\dot{h}(1) = \dot{f}(g(1)) \times \dot{g}(1)$$

$$\dot{h}(1) = \dot{f}(4) \times \dot{g}(1)$$



$\dot{f}(1)$ ميل المستقيم الذي يمر بالنقطتين $(2, 4)$ و $(5, 3)$ ويساوي $-\frac{1}{3}$

$$m = \frac{y - y_1}{x - x_1}$$

$$m = \frac{3 - 4}{5 - 2}$$

$$m = \frac{-1}{3}$$

$\dot{g}(1)$ ميل المستقيم الذي يمر بالنقطتين $(0, 5)$ و $(3, 2)$ ويساوي -1

$$m = \frac{y - y_1}{x - x_1}$$

$$m = \frac{2 - 5}{3 - 0}$$

$$m = \frac{-3}{3}$$

$$m = -1$$

$$\dot{h}(1) = \dot{f}(4) \times \dot{g}(1)$$

$$\dot{h}(1) = \frac{-1}{3} \times -1$$

$$\dot{h}(1) = \frac{1}{3}$$

41) $\dot{p}(1)$

$$\dot{p}(x) = \dot{g}(f(x)) \times \dot{f}(x)$$

$$\dot{p}(1) = \dot{g}(f(1)) \times \dot{f}(1)$$

$$\dot{p}(1) = \dot{g}(2) \times \dot{f}(1)$$

$\dot{g}(2)$ ميل المستقيم الذي يمر بالنقطتين $(3, 2)$ و $(0, 5)$ ويساوي -1

$$m = \frac{y - y_1}{x - x_1}$$

$$m = \frac{2 - 5}{3 - 0}$$

$$m = \frac{-3}{3}$$

$$m = -1$$

$\dot{f}(4)$ ميل المستقيم الذي يمر بالنقطتين $(0, 0)$ و $(2, 4)$ ويساوي 2

$$m = \frac{y - y_1}{x - x_1}$$

$$m = \frac{0 - 4}{0 - 2}$$

$$m = \frac{-4}{-2}$$

$$m = 2$$

$$\dot{h}(1) = \dot{f}(4) \times \dot{g}(1)$$

$$\dot{h}(1) = 2 \times -1$$

$$\dot{h}(1) = -2$$

مهارات التفكير العليا: (صفحة 57)

تبرير : إذا كان الاقتران : $y = \ln(ax + b)$ ، حيث a و b ثابتان موجبان ، وكان ميل المماس لمنحنى الاقتران عند النقطة P هو 1 ، فأجب عن السؤالين الآتيين تباعاً :

(42) أثبت أن الإحداثي x للنقطة p أقل من 1 .

$$y = \ln(ax + b)$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{a}{ax + b}$$

ليكن إحداثيا P هما (x_1, y_1) فيكون ميل المماس عند P هو :

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_1} = \frac{a}{ax_1 + b}$$

$$\frac{a}{ax_1 + b} = 1$$

$$ax_1 + b = a$$

$$ax_1 = a - b$$

$$\frac{ax_1}{a} = \frac{a - b}{a}$$

$$x_1 = \frac{a - b}{a}$$

$$x_1 = 1 - \frac{b}{a}$$

المقدار $(1 - \frac{b}{a})$ أقل من 1 لأن $\frac{b}{a}$ مقدار موجب كون a, b موجبين .

إذن الإحداثي x للنقطة P أقل من 1

(43) أجد قيمة كل من a و b ، علماً بأن P هي النقطة $(0, 2)$ ، ثم أبرر إجابتي .

$$y = f(x) = \ln(ax + b)$$

$$\dot{y} = \dot{f}(x) = \frac{a}{ax + b}$$

$$\dot{f}(0) = \frac{a}{a(0) + b}$$

$$\dot{f}(0) = \frac{a}{b}$$

ميل المماس عند النقطة $P(0, 2)$ يساوي 1 أي أن : $\dot{f}(0) = 1$

$$\frac{a}{b} = 1$$

$$a = b$$

$$f(x) = \ln(ax + b)$$

$$f(0) = \ln(a(0) + b)$$

$$f(0) = \ln b$$

$$\ln b = 2$$

$$b = e^2$$

$$\boxed{a = b = e^2}$$

(44) أجد إحداثيي النقطة التي يكون عندها ميل المماس $\frac{1}{2}$

افترض ان النقطة التي ميل المماس عندها يساوي $\frac{1}{2}$ هي (x_1, y_1)

بتعويض قيمة كل من a و b نجد أن :

$$f(x) = \ln(ax + b)$$

$$f(x) = \ln(e^2x + e^2)$$

$$f(x) = \ln(e^2(x + 1))$$

$$f(x) = 2 + \ln(x + 1)$$

$$\hat{f}(x) = \frac{1}{x + 1}$$

$$\hat{f}(x_1) = \frac{1}{x_1 + 1}$$

$$\frac{1}{x_1 + 1} = \frac{1}{2}$$

$$x_1 + 1 = 2$$

$$x_1 = 2 - 1$$

$$\boxed{x_1 = 1}$$

$$y_1 = f(x_1)$$

$$f(1) = \ln(e^2(1) + e^2)$$

$$f(1) = \ln(e^2 + e^2)$$

$$f(1) = \ln(2e^2)$$

$$f(1) = \ln 2 + \ln e^2$$

$$f(1) = \ln 2 + 2$$

إذن النقطة التي ميل المماس عندها يساوي $\frac{1}{2}$ هي $(1, \ln 2 + 2)$

تبرير : يعطى منحنى بالمعادلة الوسيطة : $y = 2t$ ، $x = t^2$.

(45) أجد $\frac{dy}{dx}$ بدلالة t .

$$y = 2t$$

$$\frac{dy}{dt} = 2$$

$$x = t^2$$

$$\frac{dx}{dt} = 2t$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2}{2t}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{t}$$

(46) أجد معادلة العمودي على مماس المنحنى عند النقطة $(t^2, 2t)$.

$$m = \frac{dy}{dx} = \frac{1}{t} \quad \text{ميل المماس}$$

$$m_1 = -\frac{1}{m} \quad \text{ميل العمودي على المماس}$$

$$m_1 = -\frac{1}{\frac{1}{t}}$$

$$m_1 = -\frac{1}{1} \times \frac{t}{1}$$

$$m_1 = -t \quad \text{ميل العمودي على المماس}$$

$$y - y_1 = m_1(x - x_1) \quad \text{معادلة العمودي على المماس}$$

$$y - 2t = -t(x - t^2)$$

$$y - 2t = -tx + t^3$$

$$y = -tx + t^3 + 2t \quad \text{معادلة العمودي على المماس}$$

(47) أثبت أن مساحة المثلث المكون من العمودي على المماس، والمحورين الإحداثيين،

$$\text{هي } \frac{1}{2}|t| (2 + t^2)^2.$$

لإيجاد المقطع x للعمودي على المماس نضع $y = 0$ في معادلته .

$$0 = -tx + t^3 + 2t$$

$$tx = t^3 + 2t$$

$$x = \frac{t^3 + 2t}{t}$$

$$x = t^2 + 2$$

لإيجاد المقطع y للعمودي على المماس نضع $x = 0$ في معادلته .

$$y = -t(0) + t^3 + 2t$$

$$y = t^3 + 2t$$

مساحة المثلث:

$$A = \frac{1}{2} \times x \times y$$

$$A = \frac{1}{2} \times |t^2 + 2| \times |t^3 + 2t|$$

$$A = \frac{1}{2} \times |(t^2 + 2)| \times |t(t^2 + 2)|$$

$$A = \frac{1}{2} \times |t|(t^2 + 2)^2$$

تحد : أجد $\frac{dy}{dx}$ لكل مما يأتي :

$$(48) \quad y = \sqrt{\sin \sqrt{x}}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\cos \sqrt{x} \frac{1}{2\sqrt{x}}}{2\sqrt{\sin \sqrt{x}}}$$

$$\frac{dy}{dx} = \cos \sqrt{x} \frac{1}{2\sqrt{x}} \times \frac{1}{2\sqrt{\sin \sqrt{x}}}$$


$$\frac{dy}{dx} = \frac{\cos \sqrt{x}}{4\sqrt{x}\sqrt{\sin \sqrt{x}}}$$

$$49) \quad y = e^x \sin^2 x \cos x$$

$$y = (e^x \sin^2 x)(-\sin x) + (\cos x) \left((e^x)(2 \sin x \cos x) + (\sin^2 x)(e^x) \right)$$

$$y = -e^x \sin^3 x + 2e^x \cos^2 x \sin x + e^x \cos x \sin^2 x$$

تحد: يبين الشكل المجاور منحنى المعادلة الوسيطة:



$$x = \sin 2t \quad y = \sin 3t \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

(50) إذا كان مماس منحنى المعادلة أفقياً عند النقطة A الواقعة في الربع الأول ، فأجد إحداثيي A .

$$y = \sin 3t$$

$$\frac{dy}{dt} = \cos 3t \quad (3)$$

$$\frac{dy}{dt} = 3 \cos 3t$$

$$x = \sin 2t$$

$$\frac{dx}{dt} = \cos 2t \quad (2)$$

$$\frac{dx}{dt} = 2 \cos 2t$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}$$

$$\frac{dy}{dx} = 0 \rightarrow \frac{3 \cos 3t}{2 \cos 2t} = 0$$

$$3 \cos 3t = 0$$

$$\cos 3t = 0 \rightarrow 3t = \frac{\pi}{2} \rightarrow t = \frac{\pi}{6}$$

$$x = \sin 2 \left(\frac{\pi}{6} \right)$$

$$x = \sin \frac{\pi}{3}$$

$$\boxed{x = \frac{\sqrt{3}}{2}}$$

$$y = \sin 3 \left(\frac{\pi}{6} \right)$$

$$y = \sin \frac{\pi}{2}$$

$$\boxed{y = 1}$$

إذن إحداثيا A هما $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, 1 \right)$.

(51) إذا كان مماس المنحنى موازياً للمحور y عند النقطة B ، فأجد إحداثي B .

عند النقطة B يكون المماس موازياً لمحور y ، أي أن ميله غير معرف ، ومنه يكون :

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3\cos 3t}{2\cos 2t} = \text{غير معرف}$$

$$2\cos 2t = 0$$

$$\cos 2t = 0 \rightarrow 2t = \frac{\pi}{2} \rightarrow t = \frac{\pi}{4}$$

$$x = \sin 2\left(\frac{\pi}{4}\right)$$

$$x = \sin \frac{\pi}{2}$$

$$\boxed{x = 1}$$

$$y = \sin 3\left(\frac{\pi}{4}\right)$$

$$y = \sin \frac{3\pi}{4}$$

$$\boxed{y = \frac{1}{\sqrt{2}}}$$

إذن إحداثيا B هما $\left(1, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$.

(52) إذا مر فرعان من المنحنى بنقطة الأصل كما هو موضح في الشكل ، فأجد ميل المماس لكل منهما عند هذه النقطة .

أي أن : $\sin 2t = 3\cos 3t = 0$

تتحقق هاتان المعادلتان معاً عندما $t = 0$ ، وعندها يكون ميل المماس :

$$m = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0} = \frac{3\cos 3(0)}{2\cos 2(0)}$$

$$m = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0} = \frac{3\cos 0}{2\cos 0}$$

$$m = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0} = \frac{3(1)}{2(1)}$$

$$m = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0} = \frac{3}{2}$$

كما تتحققان أيضاً عندما $t = \pi$ ، وعندها يكون ميل المماس :

$$m = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\pi} = \frac{3 \cos 3\pi}{2 \cos 2\pi}$$

$$m = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\pi} = \frac{3 \cos \pi}{2 \cos 0}$$

$$m = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\pi} = \frac{3(-1)}{2(1)}$$

$$m = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\pi} = \frac{-3}{2}$$

تبرير : يمثل الاقتران : $s(t) = \ln(t^2 - 2t + 1.9)$, $t \geq 0$ موقع جسيم يتحرك في مسار مستقيم ، حيث s الموقع بالأمتار ، و t الزمن بالثواني :
 (53) أجد سرعة الجسيم المتجهة وتسارعه بعد t ثانية .

$$s(t) = \ln(t^2 - 2t + 1.9)$$

$$v(t) = \frac{2t - 2}{t^2 - 2t + 1.9}$$

$$a(t) = \frac{(t^2 - 2t + 1.9)(2) - (2t - 2)(2t - 2)}{(t^2 - 2t + 1.9)^2}$$

$$a(t) = \frac{2t^2 - 4t + 3.8 - 4t^2 + 4t + 4t - 4}{(t^2 - 2t + 1.9)^2}$$

$$a(t) = \frac{-2t^2 + 4t - 0.2}{(t^2 - 2t + 1.9)^2}$$

(54) أجد موقع الجسم وتسارعه عندما تكون سرعته صفراً.

$$v(t) = \frac{2t - 2}{t^2 - 2t + 1.9} = 0$$

$$2t - 2 = 0$$

$$2t = 2$$

$$t = 1$$

$$s(1) = \ln((1)^2 - 2(1) + 1.9)$$

$$s(1) = \ln(1 - 2 + 1.9)$$

$$s(1) = \ln 0.9 \text{ m}$$

$$a(1) = \frac{-2(1)^2 + 4(1) - 0.2}{((1)^2 - 2(1) + 1.9)^2}$$

$$a(1) = \frac{-2 + 4 - 0.2}{(1 - 2 + 1.9)^2}$$

$$a(1) = \frac{1.8}{(0.9)^2}$$

$$a(1) = \frac{1.8}{0.81}$$

$$a(1) \approx 2.2 \text{ m/s}^2$$

(55) متى يعود الجسم إلى موقعه الابتدائي؟

$$s(0) = \ln((0)^2 - 2(0) + 1.9)$$

$$s(0) = \ln(1.9) \quad \text{الموقع الابتدائي}$$

$$s(t) = \ln(1.9) = \ln(t^2 - 2t + 1.9)$$

$$1.9 = t^2 - 2t + 1.9$$

$$t^2 - 2t + 1.9 - 1.9 = 0$$

$$t^2 - 2t = 0$$

$$t(t - 2) = 0$$

$$t - 2 = 0$$

$$\text{إما } \boxed{t = 2}$$

$$\text{أو } \boxed{t = 0}$$

يعود الجسم إلى موقعه الابتدائي بعد ثانيتين من بدء حركته.

كتاب التمارين

الدرس الثالث

قاعدة السلسلة

أجد مشتقة كل اقتران مما يأتي:

1) $f(x) = 100e^{-0.1x}$

$$\hat{f}(x) = (100)e^{-0.1x}(-0.1)$$

$$\hat{f}(x) = -10e^{-0.1x}$$

2) $f(x) = \sin(x^2 + 2)$

$$\hat{f}(x) = \cos(x^2 + 2) \cdot (2x)$$

$$\hat{f}(x) = 2x \cos(x^2 + 2)$$

3) $f(x) = \cos^2 x$

$$\hat{f}(x) = (2 \cos x)(-\sin x)(1)$$

$$\hat{f}(x) = -2 \cos x \sin x$$

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x \quad \text{قانون نصف الزاوية}$$

$$\hat{f}(x) = -\sin 2x$$

4) $f(x) = \cos 2x - 2 \cos x$

$$\hat{f}(x) = (-\sin 2x) \cdot (2) - 2(-\sin x)(1)$$

$$\hat{f}(x) = -2 \sin 2x + 2 \sin x$$

$$5) f(x) = \log_3 \frac{x\sqrt{x-1}}{2}$$

$$f(x) = \log_3 \frac{x(x-1)^{\frac{1}{2}}}{2}$$

$$f(x) = \log_3 x + \frac{1}{2} \log_3 (x-1) - \log_3 2$$

$$\hat{f}(x) = \frac{1}{x \ln 3} + \frac{1}{2(x-1) \ln 3} - 0$$

$$\hat{f}(x) = \frac{1}{x \ln 3} + \frac{1}{2x \ln 3 - 2 \ln 3}$$

$$6) f(x) = 2 \cot^2(\pi x + 2)$$

$$\hat{f}(x) = (2) 2 \cot(\pi x + 2) - \csc^2(\pi x + 2) (\pi)$$

$$\hat{f}(x) = -4\pi \cot(\pi x + 2) \csc^2(\pi x + 2)$$

$$7) f(x) = \log 2x$$

$$\hat{f}(x) = \frac{2}{2x \ln 10}$$

$$\hat{f}(x) = \frac{1}{x \ln 10}$$

$$8) f(x) = \ln(x^3 + 2)$$

$$\hat{f}(x) = \frac{3x^2}{x^3 + 2}$$

$$9) f(x) = \left(\frac{x^2}{x^3 + 2} \right)^2$$

$$\hat{f}(x) = (2) \left(\frac{x^2}{x^3 + 2} \right) \times \left(\frac{(x^3 + 2) \cdot (2x) - (x^2) \cdot (3x^2)}{(x^3 + 2)^2} \right)$$

$$\hat{f}(x) = \frac{2x^2}{x^3 + 2} \times \frac{2x^4 + 4x - 3x^4}{(x^3 + 2)^2}$$

$$\hat{f}(x) = \frac{2x^2}{x^3 + 2} \times \frac{4x - x^4}{(x^3 + 2)^2}$$

$$\hat{f}(x) = \frac{8x^3 - 2x^6}{(x^3 + 2)^3}$$

$$10) f(x) = x^2 \sqrt{20 - x}$$

$$\hat{f}(x) = (x^2) \cdot \frac{-1}{2\sqrt{20 - x}} + \sqrt{20 - x} \cdot (2x)$$

$$\hat{f}(x) = \frac{-x^2}{2\sqrt{20 - x}} + 2x\sqrt{20 - x}$$

$$\hat{f}(x) = \frac{-x^2}{2\sqrt{20 - x}} + \frac{2x\sqrt{20 - x} \cdot (2\sqrt{20 - x})}{1 \cdot (2\sqrt{20 - x})}$$

$$\hat{f}(x) = \frac{-x^2}{2\sqrt{20 - x}} + \frac{4x(20 - x)}{2\sqrt{20 - x}}$$

$$\hat{f}(x) = \frac{-x^2}{2\sqrt{20 - x}} + \frac{80x - 4x^2}{2\sqrt{20 - x}}$$

$$\hat{f}(x) = \frac{80x - 5x^2}{2\sqrt{20 - x}}$$

$$11) f(x) = \frac{\sin(2x + 1)}{e^{x^2}}$$

$$\hat{f}(x) = \frac{e^{x^2} \cos(2x + 1)(2) - \sin(2x + 1)2xe^{x^2}}{(e^{x^2})^2}$$

$$\hat{f}(x) = \frac{2e^{x^2} \cos(2x + 1) - 2xe^{x^2} \sin(2x + 1)}{e^{2x^2}}$$

$$\hat{f}(x) = \frac{2\cos(2x + 1) - 2x\sin(2x + 1)}{e^{x^2}}$$

$$12) f(x) = 3^{\cot x}$$

$$\hat{f}(x) = 3^{\cot x} (-\csc^2 x) \ln 3$$

$$\hat{f}(x) = -3^{\cot x} \ln 3 \csc^2 x$$

أجد معادلة المماس لكل اقتران مما يأتي عند قيمة x المعطاة :

$$13) f(x) = 2 \sin 5x - 4 \cos 3x, x = \frac{\pi}{2}$$

1- الخطوة الاولى: ايجاد النقطة

$$f(x) = 2 \sin 5\left(\frac{\pi}{2}\right) - 4 \cos 3\left(\frac{\pi}{2}\right)$$

$$f(x) = 2(1) - 4(0)$$

$$f(x) = 2$$

النقطة هي : $\left(\frac{\pi}{2}, 2\right)$

2- الخطوة الثانية: ايجاد ميل المماس

$$f(x) = 2 \sin 5x - 4 \cos 3x$$

$$\hat{f}(x) = 2 \cos 5x(5) - 4 (-\sin 3x)(3)$$

$$\hat{f}(x) = 10 \cos 5x + 12 \sin 3x$$

$$\hat{f}\left(\frac{\pi}{2}\right) = 10 \cos 5\left(\frac{\pi}{2}\right) + 12 \sin 3\left(\frac{\pi}{2}\right)$$

$$\hat{f}\left(\frac{\pi}{2}\right) = 10 \cos\left(\frac{5\pi}{2}\right) + 12 \sin\left(\frac{3\pi}{2}\right)$$

$$\hat{f}\left(\frac{\pi}{2}\right) = 10 \cos\left(\frac{5\pi}{2}\right) + 12 \sin\left(\frac{3\pi}{2}\right)$$

$$\hat{f}\left(\frac{\pi}{2}\right) = 10 \cos(\pi) + 12 \sin\left(\frac{3\pi}{2}\right)$$

$$\hat{f}\left(\frac{\pi}{2}\right) = 10(0) + 12(-1)$$

$$\hat{f}\left(\frac{\pi}{2}\right) = -12 \quad \text{ميل المماس}$$

3- الخطوة الثالثة: إيجاد معادلة المماس

$$y - y_1 = m(x - x_1) \quad \text{معادلة المماس:}$$

$$y - 2 = -12\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$y - 2 = -12x + 6\pi$$

$$y = -12x + 6\pi + 2$$

$$14) f(x) = (x^2 + 2)^3, x = -1$$

1- الخطوة الاولى: ايجاد النقطة

$$f(-1) = ((-1)^2 + 2)^3$$

$$f(-1) = (1 + 2)^3$$

$$f(-1) = (3)^3$$

$$f(-1) = 27$$

النقطة هي : $(-1, 27)$

2- الخطوة الثانية: ايجاد ميل المماس

$$f(x) = (x^2 + 2)^3$$

$$\hat{f}(x) = 3(x^2 + 2)^2(2x)$$

$$\hat{f}(x) = 6x(x^2 + 2)^2$$

$$\hat{f}(-1) = 6(-1)((-1)^2 + 2)^2$$

$$\hat{f}(-1) = -6(3)^2$$

$$\hat{f}(-1) = -6(9)$$

$$\hat{f}(-1) = -54$$

3- الخطوة الثالثة: إيجاد معادلة المماس

$$y - y_1 = m(x - x_1) \quad \text{معادلة المماس:}$$

$$y - 27 = -54(x - (-1))$$

$$y - 27 = -54(x + 1)$$

$$y - 27 = -54x - 54$$

$$y = -54x - 54 + 27$$

$$y = -54x - 27$$

$$15) f(x) = \tan 3x, x = \frac{\pi}{4}$$

1- الخطوة الاولى: ايجاد النقطة

$$f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \tan 3\left(\frac{\pi}{4}\right)$$

$$f\left(\frac{\pi}{4}\right) = -1 \quad \left(\frac{\pi}{4}, -1\right) \text{ النقطة هي}$$

2- الخطوة الثانية: ايجاد ميل المماس

$$\hat{f}(x) = \sec^2 3x. (3)$$

$$\hat{f}(x) = 3 \sec^2 3x$$

$$\hat{f}\left(\frac{\pi}{4}\right) = 3 \sec^2 3\left(\frac{\pi}{4}\right)$$

$$\hat{f}\left(\frac{\pi}{4}\right) = 3(-\sec \frac{\pi}{4})^2$$

$$\hat{f}\left(\frac{\pi}{4}\right) = 3(-\sqrt{2})^2$$

ملاحظة

$$\sec x = \frac{1}{\cos x} = \frac{1}{\frac{1}{\sqrt{2}}} = \sqrt{2}$$

$$\hat{f}\left(\frac{\pi}{4}\right) = 3(2) = 6$$

3- الخطوة الثالثة: إيجاد معادلة المماس

$$y - y_1 = m(x - x_1) \quad \text{معادلة المماس:}$$

$$y - (-1) = 6\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$$

$$y + 1 = 6x - \frac{3\pi}{2}$$

$$y = 6x - \frac{3\pi}{2} - 1$$

$$y = 6x - \frac{3\pi + 2}{2}$$

إذا كان الاقتران : $f(x) = 3 \sin x - \sin^3 x$ ، فأجب عن السؤالين الآتيين تباعاً :
 (16) أثبت أن $\dot{f}(x) = 3 \cos^3 x$.

$$f(x) = 3 \sin x - \sin^3 x$$

$$\dot{f}(x) = 3(\cos x) \cdot (1) - (3\sin^2 x) \cdot (\cos x) \cdot (1)$$

$$\dot{f}(x) = 3 \cos x - 3\sin^2 x \cos x$$

$$\dot{f}(x) = 3 \cos x(1 - \sin^2 x)$$

$$\dot{f}(x) = 3 \cos x(\cos^2 x)$$

$$\dot{f}(x) = 3 \cos^3 x$$

(17) أجد و $\ddot{f}(x)$.

$$\dot{f}(x) = 3 \cos^3 x$$

$$\ddot{f}(x) = 3(3) \cos^2 x \cdot -\sin x (1)$$

$$\ddot{f}(x) = -9 \cos^2 x \cdot \sin x$$

(18) يعطي منحنى بالمعادلة الوسيطة: $x = a \cos t$, $y = b \sin t$ ، حيث :

$0 \leq t \leq 2\pi$. أجد المقطع y لمماس المنحنى عندما $t = \frac{\pi}{4}$ بدلالة a و b .

1- الخطوة الاولى: ايجاد النقطة

$$x = a \cos\left(\frac{\pi}{4}\right)$$

$$x = a \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{a}{\sqrt{2}}$$

$$y = b \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = b \frac{1}{\sqrt{2}} \rightarrow y = \frac{b}{\sqrt{2}}$$

النقطة هي : $\left(\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{b}{\sqrt{2}}\right)$

2- الخطوة الثانية: ايجاد ميل المماس

$$y = b \sin t$$

$$\frac{dy}{dt} = b \cos t$$

$$x = a \cos t$$

$$\frac{dx}{dt} = -a \sin t$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{b \cos t}{-a \sin t}$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{b}{a} \cot t$$

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{\pi}{4}} = -\frac{b}{a} \cot\left(\frac{\pi}{4}\right)$$

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{\pi}{4}} = -\frac{b}{a} (1)$$

$$\boxed{\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{\pi}{4}} = -\frac{b}{a}}$$

ميل المماس

3- الخطوة الثالثة: ايجاد معادلة المماس:

$$y - y_1 = m(x - x_1) \quad \text{معادلة المماس:}$$

$$y - \frac{b}{\sqrt{2}} = -\frac{b}{a} \left(x - \frac{a}{\sqrt{2}}\right)$$

$$y - \frac{b}{\sqrt{2}} = -\frac{b}{a}x + \frac{b}{\sqrt{2}}$$

$$y = -\frac{b}{a}x + \left(\frac{b}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}\right) + \left(\frac{b}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}\right)$$

$$y = -\frac{b}{a}x + \frac{\sqrt{2}b}{2} + \frac{\sqrt{2}b}{2}$$

$$y = -\frac{b}{a}x + \frac{2\sqrt{2}b}{2}$$

$$y = -\frac{b}{a}x + \sqrt{2}b$$

إذا كان الاقتران : $y = e^{ax}$ ، حيث a ثابت، و $a > 0$ ، فأجب عن السؤالين الآتيين تبعاً :
 (19) أجد إحداثيي النقطة P التي تقع على منحنى الاقتران ، ويكون ميل المماس عندها 1 .

1- الخطوة الأولى : نشتق الاقتران $y = e^{ax}$ ثم نساوي المشتقة بالميل وهو 1 لإيجاد قيمة x

$$y = e^{ax}$$

$$\frac{dy}{dx} = ae^{ax}$$

$$ae^{ax} = 1$$

$$\frac{ae^{ax}}{a} = \frac{1}{a}$$

$$e^{ax} = \frac{1}{a}$$

$$\ln e^{ax} = \ln \frac{1}{a}$$

$$ax \cdot (1) = \ln \frac{1}{a}$$

$$ax = \ln 1 - \ln a$$

$$ax = 0 - \ln a$$

$$ax = -\ln a$$

$$\frac{ax}{a} = \frac{-\ln a}{a}$$

$$\boxed{x = \frac{-\ln a}{a}}$$

2- الخطوة الثانية: نعوض قيمة $x = \frac{-\ln a}{a}$ في الاقتران لإيجاد قيمة y

$$y = e^{a\left(\frac{-\ln a}{a}\right)}$$

$$y = e^{-\ln a}$$

$$y = (e^{\ln a})^{-1}$$

$$y = a^{-1}$$

$$\boxed{y = \frac{1}{a}}$$

إذن النقطة هي : $P\left(\frac{-\ln a}{a}, \frac{1}{a}\right)$

(20) أثبت أنه يمكن كتابة معادلة العمودي على المماس عند النقطة P في صورة : $x + y = k$ ، ثم أجد قيمة الثابت k .

1- الخطوة الأولى: إيجاد ميل العمودي على المماس:

بما أن ميل المماس هو 1 فإن ميل العمودي على المماس هو (- مقلوب ميل المماس) $m_1 = -1$

2- الخطوة الثانية: إيجاد معادلة العمودي على المماس:

$$y - y_1 = m_1(x - x_1) \quad \text{معادلة المماس:}$$

$$y - \frac{1}{a} = -1\left(x - \frac{-\ln a}{a}\right)$$

$$y - \frac{1}{a} = -x - \frac{\ln a}{a}$$

$$\boxed{y = -x - \frac{\ln a}{a} + \frac{1}{a}}$$

3- الخطوة الثالثة : كتابة معادلة العمودي على المماس عند النقطة P في صورة : $x + y = k$:

$$x + y = k$$

$$y = -x - \frac{\ln a}{a} + \frac{1}{a}$$

$$\boxed{y + x = -\frac{\ln a}{a} + \frac{1}{a}}$$

4- الخطوة الرابعة : إيجاد قيمة الثابت k :

$$k = -\frac{\ln a}{a} + \frac{1}{a}$$

$$\boxed{k = \frac{1 - \ln a}{a}}$$

(21) إذا كان الاقتران : $h(x) = \sqrt{4 + 3f(x)}$ ، وكان : $\hat{f}(1) = 4$ ، وكان : $f(1) = 7$ فأجد $\hat{h}(1)$.

$$h(x) = \sqrt{4 + 3f(x)}$$

$$\hat{h}(x) = \frac{(3\hat{f}(x))}{2\sqrt{4 + 3f(x)}}$$

$$\hat{h}(1) = \frac{(3\hat{f}(1))}{2\sqrt{4 + 3f(1)}}$$

$$\hat{h}(1) = \frac{3(4)}{2\sqrt{4 + 3(7)}}$$

$$\hat{h}(1) = \frac{12}{2\sqrt{25}}$$

$$\hat{h}(1) = \frac{6}{5}$$

(22) إذا كان الاقتران : $f(x) = e^{2x} + e^{-2x}$ فأثبت أن $\hat{\hat{f}}(x) = 4f(x)$.

$$f(x) = e^{2x} + e^{-2x}$$

$$\hat{f}(x) = (2)e^{2x} + (-2)e^{-2x}$$

$$\hat{f}(x) = 2e^{2x} - 2e^{-2x}$$

$$\hat{\hat{f}}(x) = (2)2e^{2x} - (-2)2e^{-2x}$$

$$\hat{\hat{f}}(x) = 4e^{2x} + 4e^{-2x}$$

$$\hat{\hat{f}}(x) = 4(e^{2x} + e^{-2x})$$

$$\hat{\hat{f}}(x) = 4f(x)$$

(23) إذا كان : $f(x) = \sin 4x + \cos 4x$ ، فأثبت أن $\ddot{f}(x) + 16f(x) = 0$.

$$f(x) = \sin 4x + \cos 4x$$

$$\dot{f}(x) = \cos 4x(4) + -\sin 4x(4)$$

$$\dot{f}(x) = 4 \cos 4x - 4 \sin 4x$$

$$\ddot{f}(x) = 4 - \sin 4x(4) - 4 \cos 4x(4)$$

$$\ddot{f}(x) = -16 \sin 4x - 16 \cos 4x$$

$$\ddot{f}(x) = -16(\sin 4x + \cos 4x)$$

$$\ddot{f}(x) = -16f(x)$$

$$\ddot{f}(x) + 16f(x) = 0 \quad \text{اثبات}$$

$$\ddot{f}(x) + 16f(x) = 0$$

$$\boxed{-16f(x) + 16f(x) = 0}$$

يعطى منحنى بالمعادلة الوسيطة: $y = 2 \cos \theta$ ، $x = \sin^2 \theta$ ، حيث : $0 \leq \theta \leq 2\pi$:

(24) أجد $\frac{dy}{dx}$ بدلالة θ .

$$y = 2 \cos \theta$$

$$\frac{dy}{d\theta} = -2 \sin \theta$$

$$x = \sin^2 \theta$$

$$\frac{dx}{d\theta} = 2 \sin \theta \cos \theta$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{2 \sin \theta}{2 \sin \theta \cos \theta}$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{\cos \theta}$$

$$\boxed{\frac{dy}{dx} = -\sec \theta}$$

(25) أجد معادلة المماس عندما يكون الميل $\sqrt{2}$.

1- الخطوة الأولى: مساواة المشتقة مع الميل

$$\frac{dy}{dx} = \sqrt{2}$$

$$-\sec \theta = \sqrt{2}$$

2- الخطوة الثانية : ايجاد قيم x, y

$$\cos \theta = -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\cos x = \frac{1}{\sec x} \quad \text{قانون}$$

$$y = 2 \cos \theta$$

$$y = 2\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

$$y = \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

$$y = \sqrt{2}(-1)$$

$$y = -\sqrt{2}$$

$$x = \sin^2 \theta$$

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1 \quad \text{قاعده}$$

$$\sin^2 \theta = 1 - \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2$$

$$\sin^2 x = 1 - \cos^2 x \quad \text{قاعدة}$$

$$\sin^2 \theta = 1 - \frac{1}{2}$$

$$\sin^2 \theta = 1 - \frac{1}{2}$$

$$\sin^2 \theta = x = \frac{1}{2}$$

3-الخطوة الثالثة: إيجاد معادلة العمودي على المماس:

معادلة المماس: $y - y_1 = m_1(x - x_1)$

$$y - (-\sqrt{2}) = \sqrt{2}(x - \frac{1}{2})$$

$$y + \sqrt{2} = \sqrt{2}x - (\sqrt{2} \cdot \frac{1}{2})$$

$$y + \sqrt{2} = \sqrt{2}x - \left(\sqrt{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}}\right)$$

$$y + \sqrt{2} = \sqrt{2}x - \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$y = \sqrt{2}x - \frac{1}{\sqrt{2}} - \sqrt{2}$$

$$y = \sqrt{2}x - \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{2}{\sqrt{2}}$$

$$\boxed{y = \sqrt{2}x - \frac{3}{\sqrt{2}}}$$

(26) أجد النقطة التي يكون عندها المماس موازياً للمحور y .

يكون المماس موازياً للمحور y عندما يكون $\frac{dy}{dx}$ غير معرف ، أي عندما يكون $\cos \theta = 0$

عندها يتم إيجاد قيم x و y على أن $\cos \theta = 0$

$$\sin^2 \theta = 1 - (0)^2$$

$$\boxed{\sin^2 x = 1 - \cos^2 x} \text{ قاعده}$$

$$\boxed{x = \sin^2 \theta = 1}$$

$$y = 2 \cos \theta$$

$$\boxed{y = 2 \times 0 = 0}$$

إذن النقطة هي : $(1, 0)$

(27) سيارة : يمثل الاقتران : $v(t) = 15te^{-0.05t^2}$ السرعة المتجهة (بالمتري لكل ثانية) لسيارة تتحرك في مسار مستقيم ، حيث : $0 \leq t \leq 10$. أجد السرعة المتجهة للسيارة عندما يكون تسارعها صفراً .

$$v(t) = 15te^{-0.05t^2}$$

$$a(t) = 15((t \cdot (e^{-0.05t^2}) \cdot (-0.1t) + (e^{-0.05t^2}) \cdot (1))$$

$$a(t) = -1.5t^2e^{-0.05t^2} + 15e^{-0.05t^2}$$

$$a(t) = 15e^{-0.05t^2}(1 - 0.1t^2)$$

$$a(t) = 0 \rightarrow 15e^{-0.05t^2}(1 - 0.1t^2) = 0$$

$$\frac{15e^{-0.05t^2}}{15e^{-0.05t^2}}(1 - 0.1t^2) = \frac{0}{15e^{-0.05t^2}}$$

$$1 - 0.1t^2 = 0$$

$$0.1t^2 = 1$$

$$\frac{0.1t^2}{0.1} = \frac{1}{0.1}$$

$$t^2 = 10$$

$$\sqrt{t^2} = \sqrt{10}$$

$$t = \sqrt{10}$$

$$v(\sqrt{10}) = 15\sqrt{10}e^{-0.05(\sqrt{10})^2}$$

$$v(\sqrt{10}) = 15\sqrt{10}e^{-0.5}$$

$$v(\sqrt{10}) = \frac{15\sqrt{10}}{e^{0.5}}$$

$$v(\sqrt{10}) = \frac{15\sqrt{10}}{\sqrt{e}} \text{ m/s}$$

أجد $(f \circ g)(x)$ عند قيمة x المعطاة في كل مما يأتي :

$$28) f(u) = u^5 + 1, u = g(x) = \sqrt{x}, x = 1$$

$$\dot{f}(u) = 5u^4$$

$$\dot{f}(u) = 5(\sqrt{1})^4$$

$$\dot{g}(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$(f \circ g)(x) = f[g(x)] = f[\sqrt{1}]$$

$$(f \circ g)(x) = (\sqrt{x})^5 + 1$$

$$(f \circ g)(x) = x^{\frac{5}{2}} + 1$$

$$(f \circ g)' = \frac{5}{2} x^{\frac{3}{2}}$$

$$(f \circ g)'(x) = \dot{f}(u) \times \dot{g}(x)$$

$$(f \circ g)'(x) = \dot{f}(g(x)) \times \dot{g}(x)$$

$$(f \circ g)'(x) = \dot{f}(g(1)) \times \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$(f \circ g)'(1) = \dot{f}(1) \times \frac{1}{2\sqrt{1}}$$

$$(f \circ g)'(1) = \dot{f}(1) \times \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$$

$$29) f(u) = u + \frac{1}{\cos^2 u}, u = g(x) = \pi x, x = \frac{1}{4}$$

$$f(u) = u + \sec^2 u$$

$$\dot{f}(u) = 1 + 2 \sec u \sec u \tan u$$

$$\dot{f}(u) = 1 + 2 \sec^2 u \tan u$$

$$, u = g(x) = \pi x$$

$$\dot{g}(x) = \pi$$

$$(f \circ g)'(x) = f'(u) \times g'(x)$$


$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \times g'(x)$$

$$(f \circ g)'(\frac{1}{4}) = f'(g(\frac{1}{4})) \times g'(\frac{1}{4})$$

$$(f \circ g)'(\frac{1}{4}) = f'(\frac{\pi}{4}) \times \pi$$

$$(f \circ g)'(\frac{1}{4}) = 5\pi$$

مرور: يبين التمثيل البياني المجاور شكل مطب سرعة صمم للتخفيف من سرعة السيارات على أحد الطرق. وفيه يمثل المحور x سطح الأرض ، وتقاس جميع الأطوال بالسنتيمترات .



إذا كانت المعادلة الوسيطة التي تمثل منحنى المطب هي:

$$x = 10 \sin t, y = 2 + 2 \cos 2t \text{ ، حيث } -\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2} \text{ ، فأجد كلا ما يأتي :}$$

(30) ميل المماس لمنحنى المطب بدلالة t .

$$y = 2 + 2 \cos 2t$$

$$\frac{dy}{dt} = 2(-\sin 2t)(2)$$

$$\frac{dy}{dt} = -4 \sin 2t$$

$$x = 10 \sin t$$

$$\frac{dx}{dt} = 10 \cos t$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-4 \sin 2t}{10 \cos t}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-2 \sin 2t}{5 \cos t}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-4 \sin t \cos t}{5 \cos t}$$

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x \quad \text{قاعده}$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{4 \sin t}{5}$$

(31) قيمة t عند أعلى نقطة على منحنى المطب .

يكون المماس عند أعلى نقطة في المنحنى المعطى أفقياً، إذن ميله يساوي صفر.

$$\frac{dx}{dt} = 0 \rightarrow \sin t = 0 \rightarrow t = 0$$

أو أن قيمة x عند أعلى نقطة تساوي صفر ، إذن

$$x = 10 \sin t$$

$$10 \sin t = 0$$

$$t = 0$$

أو أن قيمة y عند أعلى نقطة تساوي 4 ، إذن


$$y = 2 + 2 \cos 2t$$

$$2 + 2 \cos 2t = 4$$

$$2 \cos 2t = 2$$

$$\cos 2t = 1$$

$$t = 0$$



(32) تبرير: يبين الشكل المجاور منحنى المعادلة الوسيطة:

$$x = 2 \sin 2t, \quad y = 3 \cos t \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

أجد ميل المماس لكل من فرعي المعادلة عند نقطة الأصل، مبرراً إجابتي.

1- الخطوة الأولى: إيجاد النقطة، من السؤال نقطة الأصل وهي: (0,0)

2- الخطوة الثانية: إيجاد ميل المماس

$$y = 3 \cos t$$

$$\frac{dy}{dt} = -3 \sin t$$

$$x = 2 \sin 2t$$

$$\frac{dx}{dt} = 2 \cos 2t \quad (2)$$

$$\frac{dx}{dt} = 4 \cos 2t$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-3 \sin t}{4 \cos 2t}$$

$$(x, y) = (0, 0)$$

$$(x, y) = (2 \sin 2t, 3 \cos t)$$

$$2 \sin 2t = 0$$

$$\sin 2t = 0$$

$$t = 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}, 2\pi$$

$$3 \cos t = 0$$

$$\cos t = 0$$

$$t = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$$

يتحقق الشرطان معاً عندما $t = \frac{3\pi}{2}, t = \frac{\pi}{2}$

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{\pi}{2}} = \frac{-3 \sin \frac{\pi}{2}}{4 \cos 2 \frac{\pi}{2}}$$

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{\pi}{2}} = \frac{-3(1)}{4(-1)}$$

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{\pi}{2}} = \frac{-3}{-4}$$

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{\pi}{2}} = \frac{3}{4}$$

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{3\pi}{2}} = \frac{-3 \sin \frac{3\pi}{2}}{4 \cos 2 \frac{3\pi}{2}}$$

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{3\pi}{2}} = \frac{-3(-1)}{4(-1)}$$

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{3\pi}{2}} = \frac{3}{-4}$$

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{3\pi}{2}} = -\frac{3}{4}$$

إذن أحد فرعي المعادلة ميله عند نقطة الاصل $\frac{3}{4}$ ، والآخر ميله $-\frac{3}{4}$