



المركز الوطني
لتطوير المناهج والتقييم
National Center



الرياضيات

الصف الثاني عشر - المسار الأكاديمي

الفصل الدراسي الأول

كتاب الطالب

12

فريق التأليف

د. عمر محمد أبوغليون (رئيساً)

هبة ناصر الشيمي يوسف سليمان جرانات أ.د. محمد صبح صياحة

الناشر: المركز الوطني لتطوير المناهج والتقييم

يسر المركز الوطني لتطوير المناهج والتقييم استقبالكم وطلوطفكم عن هذا الكتاب عن طريق التعاون الآتي:

☎ 06-5376262 / 231 ☎ 06-5376266 ☎ P.O.Box: 2008 Amman 11941

📧 @nccdjor 📧 feedback@nccd.gov.jo 🌐 www.nccd.gov.jo

تمت وزادة التربية والتعليم تدريس هذا الكتاب في مدارس المملكة الأردنية الهاشمية جميعها، بناءً على قرار المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج والتطوير في جلسته رقم (2025/2)، تاريخ 2025/2/25 م، وقرار مجلس التربية والتعليم رقم (2025/50)، تاريخ 2025/4/30 م، ابتداءً من العام الدراسي 2025 / 2026 م.

© HarperCollins Publishers Limited 2025.

- Prepared Originally in English for the National Center for Curriculum Development and Evaluation.

Amman - Jordan

- Translated to Arabic, adapted, customised and published by the National Center for Curriculum Development and Evaluation, Amman - Jordan

ISBN: 978 - 9923 - 41 - 783 - 6

المملكة الأردنية الهاشمية
رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية
(2025 / 1 / 364)

بيانات الفهرسة الأردنية للكتاب

عنوان الكتاب	الرياضيات: كتاب الطالب الصف الثاني عشر - كرسى الأمتحان، الفصل الدراسي الأول
إعداد هيئة	الأردن، المركز الوطني لتطوير المناهج والتطوير
بيانات النشر	مركز المركز الوطني لتطوير المناهج والتطوير، 2025
رقم التصنيف	373.15
توافقات	الرياضيات / الصف الثاني عشر / المنهج / التعليم الثانوي
الطبعة	الطبعة الأولى
ملاحظات	يحتوي الكتاب على المساربات الفهرسية من محتوى الفصل، ولا يخرط الصف من رأي دائرة المكتبة الوطنية

التحرير والفهرسة: أحمد عيسى

التصميم الجرافيكي: ريم محمد السعدي

التحقيق النهائي: أحمد جلال أبو النور

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in retrieval system, or transmitted in any form by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the publisher or a license permitting restricted copying in the United Kingdom issued by the Copyright Licensing Agency Ltd, Barnard's Inn, 86 Fetter Lane, London, EC4A 3DF.

British Library Cataloguing in Publication Data

A catalogue record for this publication is available from the Library.

1446 هـ / 2025 م

2026 م

الطبعة الأولى (التجريبية)

أحدث طبعة

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد! فإختلافاً من إيمان المملكة الأردنية الهاشمية الراسخ بأهمية تنمية قدرات الإنسان الأردني، وتسليحه بالعلم والمعرفة، سعى المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، إلى تحديث المناهج الدراسية وتطويرها، لتكون مهيأة للطلبة على الارتقاء بمستواهم المعرفي والمهاري، ومجازاة الأقران في الدول المتقدمة. ولذا كان بحث الرياضيات من أهم المباحث الدراسية التي تُسهم في تدريب الطلبة مهارات التفكير وحل المشكلات، فقد أُنزِلَ المركز مناصحة غايةً كبراً وأَعْلَنَا وَقَرَأْنَا أفضل الطرائق المُكشَّفة عالمياً على أيدي خبراء أردنية؛ لضمان النجاحها مع القيم الوطنية الراسخة، وتلبية احتياجات الطلبة.

روعي في إعداد كتب الرياضيات للمرحلة الثانوية تلبيةً لأكثر الموضوعات الرياضية أهمية واستخداماً في التطبيقات العلمية المختلفة؛ ليُتِمَّ إعداد الطلبة للدراسة الجامعية إعداداً جيّداً يتواءم مع مناهج الدول المتقدمة. وكذلك الحرص على تقديم هذه الموضوعات بطريقة مثالية مُندرجة نتيج للطلبة فرصة تعلمها بعمق من دون عناء أو جهد كبيرين.

روعي أيضاً تقديم الموضوعات بطريقة مُنظمة، وجاذبة، ومُدخمة بتحديات بيئية، ومُروّدة بإرشادات تُعين الطلبة على مواصلة تعلمهم بسلاسة من دون تعثر؛ فهي تُذكّرهم بالخبرات التعليمية التي اكتسبوها سابقاً، وتساعدهم على ربط الموضوعات الجديدة بعضها ببعض ربطاً وثيقاً، إضافةً إلى صلة كثير من أمثلتها ومثالها ببيانات حتمية تُحظّر الطلبة على تعلم الرياضيات بشغف، وتجعله ذا معنى.

ولأن كثرة تدرب الطلبة على حلّ المسائل يُعزّج تجمع في تروسيخ المفاهيم الرياضية لديهم وتعزير طلاقتهم الإجزائية؛ فقد تضمّن كتابا الطالب والتمارين عدداً كافياً من التدريبات بهدف توثيق علاقة الطلبة بالكتاب المدرسي، بوصفه مرجعاً موثوقاً ودقيقاً يعتمدون عليه في البحث عن أية مراجع أو مصادر إضافية، ويُحقّق العدالة في التعلم.

وتحجّجنا بذلك هذا الكتاب، لكونه أن ينال إعجاب طلبةنا وأعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية، ويحظى بتعليم الرياضيات وتعلمها أكثر متعةً وسهولةً، ويُؤدُّ بأن نستمر في تطويره في ضوء ما يصلنا من ملاحظات مفيدة.

المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم

قائمة المحتويات

الوحدة 1 **الاقتربات والمقايير الجبرية** 6

الدرس 1: تقريبات الباقي والعوامل 8

الدرس 2: اقسام الجزيء 21

اختبار نهاية الوحدة 31

الوحدة 2 **المنطابقات والمعادلات المثلثية** 32

الدرس 1: المنطابقات المثلثية 1 34

الدرس 2: المنطابقات المثلثية 2 46

الدرس 3: حل المعادلات المثلثية 57

اختبار نهاية الوحدة 72

قائمة المحتويات

74	الوحدة 3 التفاضل وتطبيقاته
76	الدروس 1 مشتقة الدوال الخاصة
89	الدروس 2 مشتقا الضرب والتقسمة والمشتقات العليا
103	الدروس 3 قاعدة السلسلة
121	الدروس 4 الاستحقاق العملي
133	الدروس 5 المشتقات العكسية
146	اختبار نهاية الوحدة
148	الوحدة 4 التعاد التكرارية
150	الدروس 1 الأعداد التكرارية
165	الدروس 2 العمليات على الأعداد التكرارية
178	الدروس 3 المحل الهندسي في المستوى المركب
190	اختبار نهاية الوحدة
192	ملحقات

ما أهمية هذه
الوحدة؟

تُستعمل الاقترانات والمقادير الجبرية للمعالجة كثير من التطبيقات الجبرية لنا من المهم فهم معناها وتطبيقها. فمثلاً، يستعمل المهندسون خصائص الاقترانات والمقادير الجبرية لتصميم الطرق بشكل مسيحي لضمان قيادة المركبات عليها بسهولة وأمنه، وتقدير قدرة تحمل الجسور والسباني.

سألعلم في هذه الوحدة:

- تحليل كثيرات حدود باستخدام نظرية العوامل ونظرية الأصفار السية.
- كتابة مقادير لسيه علي صورة مجموع كسور جزئية.

تعلمت سابقاً:

- عقومات كثيرات الحدود والافتراضات السية، ويعرف جداول كل منها.
- لمسة كثير حدود علي كثير حدود آخر باستخدام القسمة الطويلة.
- تحليل المقادير الجزية الخطية والربعية غير الأولية وحالات خاصة من درجات أعلى.

تستعمل نظريات أستخدم للدراسة الوحيدة في الصفحات (6-10) من كتاب المصادر والمراجعة هذه العروض ذات طابع التمهيدية لدراسة الوحدة

نظريتا الباقي والعوامل

The Remainder and Factor Theorems

تعريف نظري الباقي والعوامل، واستعمالهما لتحليل الثمرات كثيرات الحدود وإيجاد أصفارها.
 طريقة الحصول: نظرية الباقي، نظرية العوامل، أصفار الاكبر، نظرية الأصفار النسبية، معادلة كثير الحدود.

قائمة الدروس

المفاهيم

مسائل اليوم



صندوق مساحة على شكل متوازي مستطيلات، أبعاده بالأمتار:
 $2x^2 + 6x - 19$ ما قيمة x التي تجعل حجم الصندوق 248 m^3

النسبة بالتعامل للجدول

تعلمت سابقاً أن كثير الحدود بمُتغير واحد يتكوّن من واحدٍ أو أكثر، وأن صورته العامة هي:

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

حيث n عدد صحيح غير سالب، و $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}, a_n$ أعداد حقيقية.

يُسمى الاكتران الذي يكون في صورة: $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ اكران كثير حدود ومن أمثله:

$$f(x) = x^2 - 6x + 8x, \quad P(x) = 5, \quad P(x) = 2 - x$$

تعلمت أيضاً أنه يمكن قسمة كثير حدود على كثير حدود آخر باستعمال القسمة الطويلة:

فمثلاً، يُمكن قسمة $(x^2 + 2x - 11x - 12)$ على $(x + 4)$ كما يأتي:

القسمة

$$\begin{array}{r} x^2 - 2x - 3 \\ x + 4 \overline{) x^2 + 2x - 11x - 12} \\ \underline{x^2 + 4x} \\ -2x - 11x \\ \underline{-2x - 8x} \\ -3x - 12 \\ \underline{-3x - 12} \\ 0 \end{array}$$

الباقي

بالطرح في 1
 بالشرح
 بالطرح في 2
 بالشرح
 بالطرح في 3
 بالشرح

تجزئة القسمة

القسمة

الباقي

تعلم
 يُسمى الاكران كثير الحدود
 اعداداً كثير حدود فقط
 (اختصاص)

التذكر
 عمل القسمة بقسمة كثيرات
 الحدود، اكتب المقسوم
 والمقسوم عليه بالعمود
 والقياسية

التذكر
 تعرف عملية قسمة كثيرات
 الحدود عندما تصبح درجة
 باقي القسمة اقل من درجة
 المقسوم عليه

طريقة الجدول (grid method) هي طريقة لتقسمة كثيرات الحدود تعتمد بشكل أساسي على ضرب كثيرات الحدود بـ صفاها عكسية لعكسية القسمة.

مثال 1

استعمل طريقة الجدول لإيجاد ناتج: $(9x^2 - x + 3) \div (3x - 2)$ ، ثم أتحقق من صحة الحل.

الخطوة 1: أنشئ جدولاً من 4 أعمدة (درجة ناتج القسمة $+2$) و 3 صفوف (درجة المقسوم عليه $+2$)، ثم أكتب حدود المقسوم عليه في العمود الأيسر، وأضيف حدة الباقي إلى منطقة العمل.

	x			
	$3x$			
	-2			

ملاحظة: (مجموع الحدود لها يساوي المقسوم)

x			
$3x$	$9x^2$		
-2			

الخطوة 2: أكتب الحد الرئيس من المقسوم $(9x^2)$ في الخانة اليسرى العليا من منطقة العمل.

x	$3x^2$		
$3x$	$9x^2$		
-2			

الخطوة 3: أبحث عن حد جبري ناتج ضربه في $3x$ يساوي $9x^2$. بما أن ناتج ضرب $3x$ في $3x^2$ يساوي $9x^3$ ، وبأنني أكتب $3x^2$ أعلى الجدول.

x	$3x^2$	$2x$	
$3x$	$9x^2$	$6x$	
-2		$-6x$	

الخطوة 4: أضرب $3x^2$ في -2 ، ثم أكتب الناتج $(-6x)$ في الخانة المناظرة للحددين المقسومين. وبما أن المقسوم في المسألة

الأصلية لا يحتوي على من الدرجة الثانية، فأنني أضرب $6x$ إلى منطقة العمل هي أخلف الحد $-6x = 6x$ عند إضامة $6x$ إلى منطقة العمل، فإنه يمكن تحديد الحد الثاني من ناتج القسمة، وهو (2) ، لأن ناتج ضرب $3x$ في $2x$ يساوي $6x^2$.

العلم

درجة كثير الحدود هي أكبر أول للشيء في حدود جميعها وعند قسمة كثير حدود على كثير حدود آخر، للدرجة ناتج القسمة تكون مساوية للفرق بين درجتي المقسوم والمقسوم عليه.

التذكر

يكتب المقسوم بالصورة
 $9x^2 - x + 3$
 القاسم كما يلي
 $3x + 0x^2 - x + 3$

التعلم

بمجموع الحدود في منطقة العمل يساوي المقسوم.

التعلم

جدول المقسوم كبير حدود من الدرجة 3 والمقسوم عليه كبير حدود من الدرجة 1، لأن باقي القسمة من الدرجة 0، وناتج القسمة من الدرجة 2.

استمع لرواية
أحمد بن زمراني



الخطوة 1: أضرب $2x$ في -2 ، ثم أكتب

الناتج $-4x$ في منطقة العمل. ولتحصول

على الحد ذي الدرجة 1 في المقسوم (-3) ،

x	$3x^2$	$2x$	1
$3x$	$9x^2$	$6x^2$	$3x$
-2	$-6x^2$	$-4x$	

يجب إضافة $3x$ إلى $-4x$ في منطقة العمل. عند إضافة $3x$ ، فإنه يمكن تحديد الحد الأخير في

ناتج القسمة وهو (1) ، لأن ناتج ضرب $3x$ في 1 يساوي $3x$.

الخطوة 2: أضرب 1 في -2 ، ثم أكتب الناتج -2 في الخانة المتبقية من منطقة العمل. وبما

أنني لم أحصل على قيمة مساوية للحد الأخير (الثابت) في المقسوم، فهذا يعني أنني بحاجة

إلى إضافة العدد 5 في خانة الباقي، لأن ناتج جمعه إلى العدد -2 يساوي (3) ، وهو الحد

الأخير (الثابت) في المقسوم، عندئذ يكون باقي القسمة 5 .

x	$3x^2$	$2x$	1	
$3x$	$9x^2$	$6x^2$	$3x$	5
-2	$-6x^2$	$-4x$	-2	

إذن، ناتج القسمة هو: $3x^2 + 2x + 1$ ، والباقي 5 ، ويمكنني كتابة ذلك كما يأتي:

$$\frac{9x^2 - x + 3}{3x - 2} = 3x^2 + 2x + 1 + \frac{5}{3x - 2}$$

التحقق من صحة الحل:

يمكنني التحقق من صحة الحل بإيجاد مجموع الحدود في منطقة العمل، والتحقق من

سأوتها للمقسوم.

$$9x^2 - 6x^2 + 6x^2 - 4x + 3x - 2 + 5 = 9x^2 - x + 3$$

التفكير من محض

استعمل طريقة الجدول لإيجاد ناتج كل من:

أ) $(x^2 + 6x^2 - 9x - 14) \div (x + 1)$

ب) $(2x^2 - x^2 + 3) \div (x - 3)$

نظرية الباقي

ألاحظ ماذا سبق أنه يُمكن إيجاد باقي قسمة كثير الحدود مثل: $P(x) = 2x^2 - 7x + 5$ على كثير حدود من الدرجة 1، مثل: $(x-3)$ بطريقة:

الطريقة الأولى: طريقة الجدول:

x	$2x^2$	$-x$	-3	
x	$2x^2$	$-x^2$	$-3x$	$=4$
-3	$-6x^2$	$3x$	9	



$$\begin{array}{r}
 2x^2 - x - 3 \\
 x - 3 \overline{) 2x^2 - 7x + 0x + 5} \\
 \underline{(-) 2x^2 - 6x} \\
 -x + 0x \\
 \underline{-x + 3x} \\
 -3x + 5 \\
 \underline{-3x + 9} \\
 -4
 \end{array}$$

ولكن، هل يُمكن إيجاد باقي قسمة كثير حدود على كثير حدود من الدرجة 1 بطريقة أبسط؟ في المثال أعلاه، أقرن بين باقي القسمة، وهو (-4) ، وقيمة $P(3)$:

$$P(x) = 2x^2 - 7x + 5$$

كثير الحدود المعطى

$$P(3) = 2(3)^2 - 7(3) + 5$$

تعوّل $x=3$

$$= 54 - 63 + 5$$

بالعرب

$$= -4$$

بالتسطير

المفكر

إذا كان $f(x)$ ، $h(x)$ كثيري حدود، ولتجان تابع قسمة $f(x)$ على $h(x)$ هو $Q(x)$ والباقي $R(x)$ لدينا:
 $f(x) = Q(x)h(x) + R(x)$
 وتكون درجة $R(x)$ أقل من درجة $h(x)$

ألاحظ أن قيمة $P(3)$ تساوي باقي قسمة كثير الحدود $P(x)$ على $(x-3)$ ، وهذا يقودنا إلى **نظرية الباقي (remainder theorem)**.

نظرية الباقي

مفاهيم أساسية

بالفي قسمة كثير الحدود $P(x)$ على $(x-c)$ هو $P(c)$ بوجه عام، فإن باقي قسمة $P(x)$ على $(ax-b)$ هو $P(\frac{b}{a})$ حيث $a \neq 0$.

أستعمل نظرية الباقي لإيجاد باقي قسمة $P(x)$ على $h(x)$ في كل منا يأتي :

1 $P(x) = x^3 + 7x^2 - 6x + 2, h(x) = x - 3$

باقي قسمة $P(x)$ على $h(x) = (x-3)$ هو $P(3)$

$$\begin{aligned}
 P(x) &= x^3 + 7x^2 - 6x + 2 && \text{نكتب الحد المفقود} \\
 P(3) &= (3)^3 + 7(3)^2 - 6(3) + 2 && \text{نصير } x=3 \\
 &= 27 + 63 - 18 + 2 && \text{نحسب} \\
 &= 74 && \text{نتيجة}
 \end{aligned}$$

إذن باقي قسمة $P(x)$ على $h(x)$ يساوي 74

2 $P(x) = 2x^4 - 5x^2 - 4x + 9, h(x) = x + 2$

لإيجاد باقي قسمة $P(x)$ على $h(x) = x + 2$ نكتب $h(x)$ في

صورة: $h(x) = x - (-2)$ ليكون الباقي $P(-2)$

$$\begin{aligned}
 P(x) &= 2x^4 - 5x^2 - 4x + 9 && \text{نكتب الحد المفقود} \\
 P(-2) &= 2(-2)^4 - 5(-2)^2 - 4(-2) + 9 && \text{نصير } x=-2 \\
 &= 32 - 20 + 8 + 9 && \text{نحسب} \\
 &= 29 && \text{نتيجة}
 \end{aligned}$$

إذن باقي قسمة $P(x)$ على $h(x)$ يساوي 29

3 $P(x) = 2x^3 - 4x^2 - 2x + 1, h(x) = 2x - 1$

لإيجاد باقي قسمة $P(x)$ على $h(x) = 2x - 1$ نكتب $h(x)$ في

صورة: $h(x) = 2(x - \frac{1}{2})$ ليكون الباقي $P(\frac{1}{2})$

$$\begin{aligned}
 P(x) &= 2x^3 - 4x^2 - 2x + 1 && \text{نكتب الحد المفقود} \\
 P(\frac{1}{2}) &= 2(\frac{1}{2})^3 - 4(\frac{1}{2})^2 - 2(\frac{1}{2}) + 1 && \text{نصير } x=\frac{1}{2} \\
 &= \frac{1}{4} - 1 - 1 + 1 && \text{نحسب} \\
 &= -\frac{3}{4} && \text{نتيجة}
 \end{aligned}$$

إذن باقي قسمة $P(x)$ على $h(x)$ يساوي $-\frac{3}{4}$

التحقق من فهمي

استعمل نظرية الباقي لإيجاد باقي قسمة $P(x)$ على $h(x)$ في كلِّ مما يأتي:

- a) $P(x) = 4x^4 - 7x^3 + 5x^2 + 2, h(x) = x - 1$
- b) $P(x) = 3x^3 + 8x^2 - 3x - 6, h(x) = x + 3$
- c) $P(x) = -2x^3 - 5x^2 + 10x + 9, h(x) = 2x + 8$

نظرية العوامل

إذا كان باقي قسمة كثير الحدود $f(x)$ على $(x - k)$ يساوي 0، فإن:

$$\frac{f(x)}{x - k} = q(x)$$

حيث $q(x)$ كثير الحدود الناتج من القسمة. ومنه، فإن:

$$f(x) = (x - k)q(x)$$

أي إن $(x - k)$ عامل من عوامل $f(x)$ وهذا يُوسَّع **نظرية العوامل (factor theorem)** التي تُعدُّ حالة خاصة من نظرية الباقي.

نظرية العوامل

مفهوم أساسي

يكون $(x - c)$ عاملاً من عوامل $P(x)$ إذا وقطع (c) كان $P(c) = 0$.
 يوجد عام، ويكون $(ax - b)$ عاملاً من عوامل $P(x)$ إذا وقطع إذا كان $P\left(\frac{b}{a}\right) = 0$.
 حيث: $a \neq 0$.

إذا عُلِّم أخذ عوامل كثير الحدود، فإنه يُمكن تحليله تحليلاً كاملاً، وذلك بكتابة في صورة حاصل ضرب مجموعة من كثيرات الحدود التي لا يُمكن تحليلها.

مثال 3

إذا كان: $P(x) = x^3 + 6x^2 + 5x - 12$ ، فأجب عن السؤالين الآتيين:

أ) أي $(x + 4)$ عامل من عوامل $P(x)$.

ب) يكون $(x + 4)$ عاملاً من عوامل $P(x)$ إذا كان $P(-4) = 0$ ، لذا نجد $P(-4)$.

$$\begin{aligned}
 P(x) &= x^2 + 6x^2 + 5x - 12 \\
 P(-4) &= (-4)^2 + 6(-4)^2 + 5(-4) - 12 \\
 &= -64 + 96 - 20 - 12 \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

تجزئة الحدود لتعطى

$$x = -4$$

بالمعنى

تحت

إذن، $(x + 4)$ عامل من عوامل $P(x)$.

2 أحصل $P(x)$ تحليلًا كاملاً.

\times	x^2	$2x$	-3	
x	x^2	$2x^2$	$-3x$	0
$+4$	$4x^2$	$8x$	-12	

بما أن $(x + 4)$ عامل من عوامل $P(x)$

فإنه يُمكن إيجاد العوامل الأخرى بقسمة

$P(x)$ على $(x + 4)$ ، ثم تحليل كثير

الحدود الناتج (إن أمكن).

$$\begin{aligned}
 P(x) &= x^2 + 6x^2 + 5x - 12 \\
 &= (x + 4)(x^2 + 2x - 3) \\
 &= (x + 4)(x + 3)(x - 1)
 \end{aligned}$$

تجزئة الحدود لتعطى

تحليل بمصطلح نفسه

تتبع ثلاثي الحدود


إذن، $P(x) = (x + 4)(x + 3)(x - 1)$.

ع انظر من نصي

إن كان $P(x) = x^2 - 2x^2 - 13x - 10$ ، فأجب عن السؤالين الآتيين:

(أ) أجب لأن $(x - 5)$ عامل من عوامل $P(x)$. (ب) أحصل $P(x)$ تحليلًا كاملاً.

الاحتمال النسبية



أعداد **مميز للحدود** (zeros of a polynomial)

هي قيم x التي يكون عندها $P(x) = 0$. وعند تحليل

كثير الحدود نيوتن، فإن أسفاره هي إحداثيات x لنقاط

تقاطع منحنى $P(x)$ مع المحور x . فمثلًا، لكثير الحدود $Q(x)$

المعطى تمثيله البياني جانيًا، توجد 4 أسفار، هي:

$5, 1, 0, -3$ ، ويقطع عندها منحنى المحور x .

يُمكن استخدام **نظرية الأسفار النسبية** (rational zero theorem) لإيجاد بعض الأسفار

المختلفة لكثيرات الحدود. يُعنى اختبار

نظرية الأعداد النسبية

مفهوم أساسي

إذا كان: $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ كثير الحدود معاملاته أعداد صحيحة، فإن كل صفر نسبي لـ $P(x)$ يكون في صورة $\frac{p}{q}$ ، حيث p أحد عوامل الحد الثابت (a_0) ، و q أحد عوامل المعامل الرئيس (a_n) .

النسخة من نظرية الأعداد النسبية


إذا كان: $a_n = 1$ ، فإن كل صفر نسبي لـ $P(x)$ يكون أحد عوامل الحد الثابت (a_0) .

هذا إيجاد أحد الأعداد النسبية لكثير الحدود فإنه يمكن إيجاد أصفاره الأخرى باستعمال القسمة والتخيل.

مثال 4

أوجد جميع أصفار كثير الحدود: $P(x) = 2x^3 + x^2 - 13x + 6$

الحجم البياني



يمكنني استعمل برصية جبرجيرا لتخيل $P(x)$ في \mathbb{R} وتحديد هذه أصفاره. ألاحظ أن منحني $P(x)$ يقطع محور x في 3 نقاط، ما يعني أن $P(x)$ له 3 أصفار، ويمكنني التحقق من ذلك جبرياً.

الخطوة 1: أجد الأصفار النسبية المختلفة لكثير الحدود.

أجد عوامل الحد الثابت (6) ، وهي: $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$

أجد عوامل المعامل الرئيس (2) ، وهي: $\pm 1, \pm 2$

إذن، الأصفار النسبية المختلفة لكثير الحدود $P(x)$ هي:

$$\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6, \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{3}{2}$$

الخطوة 2: أشرى جدولاً لاخبار عن الأصفار النسبية المختلفة

$\frac{p}{q}$	$P\left(\frac{p}{q}\right)$	هل $\frac{p}{q}$ صفر لكثير الحدود؟
-1	$P(-1) = 2(-1)^3 + (-1)^2 - 13(-1) + 6 = 10$	✗
1	$P(1) = 2(1)^3 + (1)^2 - 13(1) + 6 = -4$	✗
2	$P(2) = 2(2)^3 + (2)^2 - 13(2) + 6 = 0$	✓

بعد أن: $P(2) = 0$ ، فإنه يوجد لكثير الحدود صفر عندما $x = 2$ ، إذن، $(x-2)$ عامل من عوامل $P(x)$.

أفكر

لماذا يكون عدد الأصفار لكثير الحدود التي من نوع $P(x)$ زوجية؟ أم لا؟ اشرح.

التذكر

لإيجاد الأصفار النسبية المختلفة لكثير الحدود، أجد الثابت على عوامل المعامل الرئيس، ثم أكتب الأصفار النسبية المختلفة لأي بسط صوري.

اعلم

أنت لست وحدك من يعرف عدد الأصفار التي من نوع $P(x)$ لكثير الحدود.

الخطوة 1: أحلل كثير الحدود تخليداً كاملاً.

بدأت أن $(x-2)$ عامل من عوامل $P(x)$ ، فإنه يُمكن إيجاد العوامل الأخرى بقسمة $P(x)$ على $(x-2)$ ثم تحليل كثير الحدود الناتج (إن أمكن).

x	$2x^2$	$5x$	-3	
x	$2x^2$	$5x$	$-3x$	0
-2	$-4x^2$	$-10x$	6	

ناتج القسمة يساوي $(2x^2 + 5x - 3)$ ، ومنه، يُمكن تحليل كثير الحدود كما يأتي:

$$P(x) = 2x^2 + x^2 - 13x + 6$$

كثير الحدود الناتج

$$= (x-2)(2x^2 + 5x - 3)$$

تحليل المتعدد القسمة

$$= (x-2)(2x-1)(x+3)$$

تحليل ثلاث الحدود

$$P(x) = (x-2)(2x-1)(x+3)$$

ومنه، فإن أصفار $P(x)$ الناتجة من تحليله هي: $2, \frac{1}{2}, -3$.

أخذ جميع أصفار كثير الحدود: $P(x) = x^3 - 3x + 2$

الدعم البياني


يُمكنني استخدام برمجية جيو جبرا لتحليل $P(x)$ بيانياً وتحديد عدد أصفاره. الأجد أن كثير الحدود يقطع محور x في ثلاث نقاط، ما يعني أن $P(x)$ له صفران، ويُمكنني التحقق من ذلك جبرياً.

العلم

لتجد أصفار كثير الحدود بمسؤولنا عن عامل من عوامله بصفر:

$$x-2=0 \rightarrow x=2$$

$$2x-1=0 \rightarrow x=\frac{1}{2}$$

$$x+3=0 \rightarrow x=-3$$


الخطوة 2: أجد الأصفار النسبية المختلفة لكثير الحدود

بما أن معامل الحد الرئيسي 1، فإن الأصفار النسبية المختلفة هي عوامل الحد الثابت الذي يساوي (2).

إذن، الأصفار النسبية المختلفة لكثير الحدود $P(x)$ هي:

$$\pm 1, \pm 2$$

الخطوة 3: أبتبر جدولاً لاختبار بعض الأصفار النسبية المختلفة:

p	$P(p)$	هل p صفر لكثير الحدود؟
-1	$P(-1) = (-1)^3 - 3(-1) + 2 = 4$	✗
1	$P(1) = (1)^3 - 3(1) + 2 = 0$	✓

بما أن $P(1) = 0$ ، فإنه يوجد لكثير الحدود صفر عندما $x = 1$ ، إذن، $(x-1)$ عامل من عوامل $P(x)$.

الخطوة 4: أحل كثير الحدود تحليلًا كاملاً.

بما أن $(x-1)$ عامل من عوامل $P(x)$ ، فإنه يمكن إيجاد العوامل الأخرى بقسمة $P(x)$ على $(x-1)$. تم تحليل كثير الحدود الناتج (إن أمكن):

x	x^2	x	-2	
x	x^2	x^2	$-2x$	0
-1	$-x^2$	$-x$	2	

نتج القسمة يساوي $(x^2 + x - 2)$ ، ومنه يمكن تحليل كثير الحدود كما يأتي:

$$P(x) = x^3 - 3x + 2$$

$$= (x-1)(x^2 + x - 2)$$

$$= (x-1)(x+2)(x-1)$$

كثير الحدود المنقسم

التحليل باستخدام القسمة

تحليل كثير الحدود

$$P(x) = (x+2)(x-1)(x-1)$$

ومنه، فإن أصفار $P(x)$ الناتجة من تحليله هي: $1, -2$.

التحقق من تفحص

أحل جميع أصفار كثير الحدود في ما يأتي:

a) $P(x) = 5x^3 - x^2 - 5x + 1$

b) $Q(x) = x^4 + 6x^3 + 7x^2 - 6x - 8$

العلم

إن العلم وجود الصفار نسبة لكثير الحدود لا يعني أن ليس له أصفار، وإنما يعني أن هذا الأصفار في الحالة الحرجية.

حل مسألة كثيرات الحدود

معادلة كثير الحدود (polynomial equation) هي معادلة يمكن كتابتها في صورة:

$P(x) = 0$ ، حيث $P(x)$ كثير حدود من أي درجة، ويسمى كثير الحدود المرتبط بالمعادلة.

يمكن حل بعض معادلات كثيرات الحدود باستخدام طرق التحليل البسيطة التي تعلمتها سابقاً، مثل التحليل بإخراج عامل مشترك أو باستخدام التجميع، لكن بعض معادلات كثيرات

الحدود لا يمكن حلها باستخدام هذه الطرق، عندئذ يمكن استعمال نظرية الأصفار النسبية

لتحليل كثير الحدود المرتبط بالمعادلة، ثم حل المعادلة.

العلم

المعادلات الخطية والرباعية والتكعبة التي تعلمتها سابقاً هي حالات خاصة من معادلة كثير الحدود.

نحل المعادلة: $x^2 - x^2 - 14x + 24 = 0$

كثير الحدود المرتبط بالمعادلة هو: $P(x) = x^2 - x^2 - 14x + 24$. وبما أنه لا توجد طريقة واضحة لتحليله، مثل استخراج العوامل المشتركة أو استعمال النجيم، فيأتي أحد أحد أساليب التيسر، ثم أخذ.

الخطوة 1: نجد الأعداد النسبية المحتملة لكثير الحدود المرتبط بالمعادلة.

بما أن معامل الحد الرئيس هو (1)، فإن الأعداد النسبية المحتملة هي عوامل الحد الثابت الذي يساوي (24).

يقين، الأعداد النسبية المحتملة لكثير الحدود $P(x)$ هي

$+1, +2, +3, +4, +6, +8, +12, +24$

الخطوة 2: أتيرو جدولاً لاختبار بعض الأعداد النسبية المحتملة:

p	$P(p)$	هل p عنصر كثير الحدود؟
1	$P(1) = (1)^2 - (1)^2 - 14(1) + 24 = 10$	✗
2	$P(2) = (2)^2 - (2)^2 - 14(2) + 24 = 0$	✓

بما أن $P(2) = 0$ ، فإننا نوجد لكثير الحدود صفر عندما $x = 2$ ، إذن، $(x-2)$ عامل من عوامل $P(x)$.

الخطوة 3: نحلل كثير الحدود باستعمال الأعداد النسبية، ثم نحل المعادلة.

بما أن $(x-2)$ أحد عوامل كثير الحدود، فإنه يمكن إيجاد العوامل الأخرى بقسمة $P(x)$ على $(x-2)$ ، ثم تحليل كثير الحدود الناتج (إن أمكن):

x	x^2	x	-12	
x	x^2	x^2	$-12x$	0
-2	$-2x^2$	$-2x$	24	

ناتج القسمة يساوي $(x^2 + x - 12)$. وبما، يمكن تحليل كثير الحدود وحل المعادلة كما يأتي:

$x^2 - x^2 - 14x + 24 = 0$	المعادلة الأصلية
$(x-2)(x^2 + x - 12) = 0$	التحليل بالقسمة
$(x-2)(x+4)(x-3) = 0$	تحليل ثلاث الحدود
$x-2=0$ or $x+4=0$ or $x-3=0$	تسمية العرب المتطوري
$x=2$ $x=-4$ $x=3$	حل للمعادلة

إذن، حلول المعادلة هي: $x=2, x=-4, x=3$

حلّ المعادلات من مجموعي الشكلين التاليين:

أ) $x^2 - x^2 - 9x + 9 = 0$

ب) $x^2 + 3x^2 - 4 = 0$

أنتخب وطبق المسائل

استعمل طريقة الجدول لإيجاد ناتج القسمة والباقي في كل من التاليين:

1) $(6x^4 - 5x^3 + 8x^2 - 7x - 12) \div (3x - 4)$

2) $(2x^4 - 5x^3 + 9x^2 - 10x + 15) \div (1 - 2x)$

استعمل نظرية الباقي لإيجاد باقي قسمة $f(x)$ على $h(x)$ في كل من التاليين:

3) $f(x) = 8x^4 + 2x^3 - 53x^2 + 37x - 6, h(x) = x + 1$

4) $f(x) = 4x^3 + 2x^2 - 6x - 8, h(x) = 3x + 4$

أبشّر أنّ $h(x)$ عامل من عوامل $f(x)$ في كل من التاليين:

5) $f(x) = x^2 - 37x + 84, h(x) = x + 7$

6) $f(x) = 2x^3 - 5x^2 - x + 6, h(x) = 2x - 3$

أحلّل كل اثنين من التاليين فتحليلاً كاملاً:

7) $f(x) = x^3 + 3x^2 - 13x - 15$

8) $g(x) = x^4 - 7x^3 + 13x^2 + 3x - 18$

9) $h(x) = 2x^3 - 13x^2 + 17x + 12$

10) $q(x) = 3x^3 - 18x^2 + 2x - 12$

أحلّل كلًا من المعادلات الآتية:

11) $x^2 - 4x^2 - 7x + 10 = 0$


12) $5x^2 - 15x^2 - 47x - 15 = 2x^3 - 10x^2$

13) $3x^3 + 3x^2 - 14x - 8 = 0$


14) $6x^3 - 13x^2 + x + 2 = 0$

استعمل التعطيل البشري المنطقي كل الاكزبان عتبا بائي لا ييجاد أحد أصفاره النسبية، ثم ليخترنا جميع أصفار الاكزبان:

15 $f(x) = 4x^2 - 20x + 16$



16 $f(x) = 4x^2 - 12x - x + 15$



17 إذا كان $x = 1, x = 4$ جذرا حقيقي للمعادلة: $ax^2 - 3x^2 + ax + b = 0$ فأوجد الحل الثالث لهذا

18 إذا كان باقي قسمة $f(x) = x^2 + ax^2 + x + 5$ على $x - 1$ يساوي باقي قسمة $x + 1$ بقا قيمة a

19 إذا كان: $f(x) = ax^3 + bx^2 - 9x - 9$ حيث a, b لثان، و $a, b \neq 0$ ، فأجيب عن الأسئلة الآتية:

20 إذا كان $(x - 3)$ عاملا من عوامل الاكزبان $f(x)$ فأثبت أن: $3a + b = 4$

21 إذا كان باقي قسمة $f(x)$ على $x - 2$ يساوي -15 ، فأثبت أن: $2a + b = 3$

22 أوجد قيمة كل من a و b .

23 أنحل المسألة الواردة في بداية الدرس.

مجموعات التمرين الخاصة

24 مسألة مفتوحة: يجب انكزبان من الدرجة الثالثة يكون $(x - 3)$ أحد عوامله، ويكون باقي قسمة على $(x + 1)$ يساوي -8 .

25 أكتشف الخطأ: أرادت سهام إيجاد الأصفار النسبية للمخترقة للاكزبان:

$$f(x) = -8x^5 + 7x^4 - 3x^3 + 45x^2 - 1500x + 16x$$

$$f(x) = -8x^5 + 7x^4 - 3x^3 + 45x^2 - 1500x + 16x$$

$$\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 8, \pm \frac{1}{4}, \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{1}{16}, \pm \frac{1}{8} \quad \times$$

أين الخطأ الذي وقعت فيه سهام، ثم أصححه.

26 تبيناً إذا كان باقي قسمة كثير الحدود $f(x)$ على $(x - 3)$ يساوي 4 ، وباقي قسمة على $(x + 2)$ يساوي 9 ، فأوجد

$$\text{باقي قسمة } f(x) \text{ على } (x - 3)(x + 2).$$

الكسور الجزئية

Partial Fractions

كتابة المقدار الجبري النسبي الذي يُمكن تحليل مقامه في صورة مجموع مقادير جزئية نسبة بسطه

فترة الدرس

تجزئة المقادير النسبية، كسر جزئي

المعادلات

يُمثل الاكتران: $v = \frac{t^2 - 5t + 6}{(t+2)(t-1)}$ العلاقة بين سرعة

مسألة اليوم

سيارة v بالكيلومتر لكل ساعة والزمن t بالساعات. هل

يُمكن كتابة الاكتران v في صورة مجموع مقادير جزئيين

تسعين، مقام أحدهما $(t+2)$ ، ومقام الآخر $(t-1)$ ؟



تعلمتُ سابقاً أن المقدار الجبري النسبي هو مقدار جبري يُمكن كتابته في صورة كسر بسطه ومقامه كثيرات حدود. وتعلمتُ أيضاً أنه عند جمع مقادير نسبيين مختلفي المقام أو طرحهما، فإنه يجب أولاً توحيد مقاميهما باستخدام المضاعف المشترك الأصغر (م. م. أ) للمقامين كما يأتي:

$$\frac{3}{x-4} - \frac{2}{x+2} = \frac{3(x+2)}{(x-4)(x+2)} - \frac{2(x-4)}{(x+2)(x-4)}$$

بحرث المقام

$$= \frac{3x+6-2x+8}{(x-4)(x+2)}$$

بحرث البسط

$$= \frac{x+14}{(x-4)(x+2)}$$

النتيجة

تجزئة المقادير النسبية (decomposition of rational expressions) هي عملية حكيمة

للمعملية السابقة، يتبع منها كتابة المقدار النسبي في صورة مجموع مقادير جزئية نسبة بسطه

تُحلّ منها في صورة $\frac{P(x)}{Q(x)}$ ، حيث P و Q كثيرات حدود لا يوجد بينهما عوامل مشتركة، ودرجة P

إرشاد

يشير مصطلح المقادير النسبي إلى المقدار الجبري النسبي لها صورة في هذه الوحدة.

أقل من درجة Q ، وتُسمى تكلّ من هذه المقادير النسبية **كسوراً جزئياً (partial fraction)**.

$$\frac{x+14}{(x-4)(x+2)} = \frac{3}{x-4} + \frac{-2}{x+2}$$

كسر جزئي كسر جزئي
تجزئة المقام النسبي

- تعتمد عملية تجزئة المقادير الجبرية النسبية على عوامل المقام. سنأخذ في هذا الدرس حالتين مختلفتين من التجزئة تعاليج عوامل المقام. وعند:
- عوامل المقام كثيرات حدود خطية مختلفة.
 - عوامل المقام كثيرات حدود أخذها ترمي غير متكرر، ولا يمكن تحليله (مميزه سالبة).

تجزئة المقادير النسبية عوامل مقامه كثيرات حدود خطية مختلفة

إذا كانت جميع عوامل كثير الحدود في مقام المقادير النسبية خطية، فإنه يتبع من نقل منها كسر جزئي بسطه ثابت ومقامه العامل الخطي في الصورة الآتية:

$$\frac{\text{ثابت}}{ax+b} \leftarrow \text{عامل خطي}$$

تجزئة مقادير نسبية عوامل مقامه كثيرات حدود خطية مختلفة

مفهوم أساسي

إذا كان $Q(x)$ كثير حدود يمكن تحليله تحليلًا كاملًا من دون تكرار أي عامل له الصورة الآتية:

$$Q(x) = (a_1x + b_1)(a_2x + b_2)(a_3x + b_3) \dots (a_nx + b_n)$$

فإن يمكن تجزئة المقادير الجبرية النسبية $\frac{P(x)}{Q(x)}$ ، حيث درجة P أقل من درجة Q ، في الصورة الآتية:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A_1}{a_1x + b_1} + \frac{A_2}{a_2x + b_2} + \frac{A_3}{a_3x + b_3} + \dots + \frac{A_n}{a_nx + b_n}$$

مثال 7

أجرى $\frac{2x-13}{x^2-x-2}$ إلى كسور جزئية.

الخطوة 1: أحلل المقام تحليلًا كاملاً:

$$\frac{2x-13}{x^2-x-2} = \frac{2x-13}{(x-2)(x+1)}$$

تحليل المقام التحليل

الخطوة 2: أبدأ بإعداد تجزئة المقادير التي باستخدام رموز مثل A و B كما يلي:

أكتب كسرين جزئيتين متطابقتي العددين الخطين في مقام الكسر التي الأصلي، ثم أكتب رموزاً في بسط كل كسر:

$$\frac{2x-13}{(x-2)(x+1)} = \frac{A}{(x-2)} + \frac{B}{(x+1)}$$

الخطوة 3: أطرب طرفي المعادلة في المقام المشترك الأصغر لنظامي الكسرين الجزئيتين:

بطرف طرفي المعادلة في (م.م.) لنظامي الكسرين الجزئيتين وهو $(x-2)(x+1)$ ، نحصل:

$$(x-2)(x+1) \cdot \frac{2x-13}{(x-2)(x+1)} = (x-2)(x+1) \left(\frac{A}{(x-2)} + \frac{B}{(x+1)} \right)$$

باستعمال خاصية التوزيع في الطرف الأيمن من المعادلة والاختصار، تصبح المعادلة الآتية:

$$2x-13 = A(x+1) + B(x-2)$$

الخطوة 4: أجد قيمة كل من الثابت A والثابت B باستخدام التعويض:

• تعويض $x=2$ في المعادلة الناتجة:

$$2(2)-13 = A(2+1) + B(2-2)$$

بمجرد $x=2$

$$-9 = 3A$$

بالتبسيط

$$A = -3$$

بمجرد طرفي المعادلة طرفي

النتيجة

تعويض $x=2$ يحل

المعنى A ، ونحصل

المعادلة بمخرج واحد

وهو A ، يتعين إيجاد

لديه نتيجة

نعوض $x = -1$ في المعادلة الناتجة:

$$2(-1) - 13 = A(-1 + 1) + B(-1 - 2) \quad \text{نعوض } x = -1$$

$$-15 = -3B \quad \text{تبسيط}$$

$$B = 5 \quad \text{قسمة طرفي المعادلة على } -3$$

إذن، يمكن تجزئة المقادير النسبية في الصيغة الأتية:

$$\frac{2x - 11}{(x - 2)(x + 1)} = \frac{-3}{(x - 2)} + \frac{5}{(x + 1)}$$

في المخطوط من نصي

أجزئي كل مقدار نسبي حقا يأتي إلى كسور جزئية:

$$a) \frac{x}{x^2 - 5x + 6}$$

$$b) \frac{x + 10}{x^2 + 2x^2 - 8x}$$

التعلم

نعوض $x = -1$ بحل المقادير النسبية A ونحصل المعادلة الخطية ونأخذ وهو B ما يجعل الحد يساوي صفرًا.

التعلم

إذا كان مقام المقادير النسبية يمر بحدود من الدرجة الثالثة لتحليله يكون إما خروج عامل مشترك، وإما الاتصال الشجيع، وإما الاتصال نظرية الأصفار النسبية ونظرية العوامل.

تجزئة مقدار نسبي عوامل مقامه كثيرات الحدود، أضعها ترتيبها غير فترز، ولا يمكن تحليله تعقبت في المثال السابق تجزئة مقادير نسبية، جميع عوامل مقاماتها كثيرات حدود خطية، ولكن في بعض الحالات، قد يحوي تحليل المقام عوامل تربيعية لا يمكن تحليله، عندئذ يتج من العامل التربيعي كسر جزئي بسطه كثير حدود خطي في صورة $Ax + B$ ومقامه العامل التربيعي.

مفهوم أساسي

إذا كان $\frac{P(x)}{Q(x)}$ مقدارًا جزئيًا نسبيًا، وكان التحليل الكامل لـ $Q(x)$ يحتوي على عامل تربيعي غير مكتمل، ولا يمكن تحليله وهو $(ax^2 + bx + c)$ بدرجة P أقل من درجة Q ، فإن تجزئة $\frac{P(x)}{Q(x)}$ تعطينا الحد $\frac{Ax + B}{ax^2 + bx + c}$.

مثال 2

أجزئ $\frac{x^2 - 3x + 16}{x^2 + x^2 + 9x + 9}$ إلى كسور جزئية.

الخطوة 1: أحلل المقام تحليلاً كاملاً.

$$\frac{x^2 - 3x + 16}{x^2 + x^2 + 9x + 9} = \frac{x^2 - 3x + 16}{(x + 1)(x^2 + 9)}$$

حلل كسر الحدود باستخدام الاستدلال

وبما أن هذا المقدمار النسبي يحتوي في مقامه على عامل تربيعي لا يمكن تحليله، فإن بسط أحد الكسور الجزئية سيكون ثابتاً، وبسط الآخر سيكون مقدراً خطياً.

الخطوة 2: أبدأ بإيجاد تجزئة المقدمار النسبي باستخدام ثوابت غير معروفة، فكتب شيئاً في بسط العامل الخطي، ومقدراً خطياً في بسط العامل التربيعي.

$$\frac{x^2 - 3x + 16}{(x + 1)(x^2 + 9)} = \frac{A}{x + 1} + \frac{Bx + C}{x^2 + 9}$$

الخطوة 3: أحلر طرفي المعادلة في المقامات المشترك الأضغر لعقاسي الكسرين الجزئيين.

حسب طرفي المعادلة في (م.م.أ) لعقاسي الكسرين الجزئيين، وهو $(x + 1)(x^2 + 9)$. فإن:

$$(x + 1)(x^2 + 9) \frac{x^2 - 3x + 16}{(x + 1)(x^2 + 9)} = (x + 1)(x^2 + 9) \left(\frac{A}{x + 1} + \frac{Bx + C}{x^2 + 9} \right)$$

بمساعد خاصية التوزيع على الطرف الأيمن من المعادلة والاختصار، تصبح المعادلة الآتية:

$$x^2 - 3x + 16 = A(x^2 + 9) + (Bx + C)(x + 1)$$

أفكر

يتم طريقة يمكن تحليل المقام في المثال 12

الخطوة 4 : أوجد قيمة كلٍّ من الثوابت A و B و C باستعمال التعويض.

• بتعويض $x = -1$ في المعادلة الناتجة:

$$(-1)^2 - 3(-1) + 16 = A((-1)^2 + 9) + (B(-1) + C)(-1+1) \quad \text{بتعويض } x = -1$$

$$20 = 10A \quad \text{بالتبسيط}$$

$$A = 2 \quad \text{بقسمة طرفي المعادلة على 10}$$

• بتعويض $x = 0$ وقيمة A في المعادلة الناتجة:

$$(0)^2 - 3(0) + 16 = 2((0)^2 + 9) + (B(0) + C)(0+1) \quad \text{بتعويض } x = 0, A = 2$$

$$16 = 18 + C \quad \text{بالتبسيط}$$

$$C = -2 \quad \text{بترحيل 18 من طرفي المعادلة}$$

• بتعويض أي قيمة أخرى للمتغير x (مثل $x = 1$) في المعادلة الناتجة، إضافة إلى تعويض

قيمتي A و C الناتجتين:

$$(1)^2 - 3(1) + 16 = 2((1)^2 + 9) + (B(1) + (-2))(1+1) \quad \text{بتعويض } x = 1, A = 2, C = -2$$

$$14 = 2B + 16 \quad \text{بالتبسيط}$$

$$-2 = 2B \quad \text{بترحيل 16 من طرفي المعادلة}$$

$$B = -1 \quad \text{بقسمة طرفي المعادلة على 2}$$

إذن، يمكن تجزئة المقادير النسبي في الصورة الآتية:

$$\frac{x^2 - 3x + 16}{(x+1)(x^2+9)} = \frac{2}{x+1} + \frac{-x-2}{x^2+9}$$

النتيجة من قصص

أجزئي $\frac{18+7x}{x^2-2x-3}$ إلى مجموع جزئية

لدرجة مقام البسط، درجة كثير الحدود في بسطه مساوية لدرجة كثير الحدود في مقامه أو أكبر منها.

تعلقت في الأمتحان السابقة تجزئة مقامين نسبة مختلفة في صورة $\frac{P(x)}{Q(x)}$ ، حيث P و Q كثيرات حدود، ولا يوجد بينهما عوامل مشتركة، ودرجة P أقل من درجة Q ، ولكن، إذا كانت درجة P مساوية لدرجة Q أو أكبر منها، فيجب أولاً تجهيز المقادير النسبية باستعمال القسمة الطويلة، وذلك بقسمة P على Q .

مثال 3

أجزئ $\frac{2x^2 + 13x + 6}{x^2 + 6x - 16}$ إلى كسور جزئية.

بما أن درجة البسط مساوية لدرجة المقام، فإني أقسم أولاً البسط على المقام، ثم أجزئ.

الخطوة 1: أقسم البسط على المقام باستعمال القسمة الطويلة، ثم أكتب الكسر في صورة مجموع ناتج القسمة مع كسر يُعبر عن باقي القسمة.

$$\begin{array}{r} 2 \\ x^2 + 6x - 16 \overline{) 2x^2 + 13x + 6} \\ \underline{(-) 2x^2 + 12x - 32} \\ x + 38 \end{array}$$

إذن، ناتج القسمة 2، والباقي $x + 38$ ومنه، فإن:

$$\frac{2x^2 + 13x + 6}{x^2 + 6x - 16} = 2 + \frac{x + 38}{x^2 + 6x - 16}$$

الخطوة 2: أحلل مقام باقي القسمة تحليلًا كاملاً، وأبدأ بأعداد تجزئة للمقام النسبي باستعمال رموز تُعبر عن مجزئاته. أكتب كسرين جزئيين مقامهما عوامل مقام الكسر النسبي الأصلي، ثم أكتب رمزاً في بسط كل منهما:

$$\frac{x + 38}{x^2 + 6x - 16} = \frac{x + 38}{(x + 8)(x - 2)}$$

$$\frac{x + 38}{(x + 8)(x - 2)} = \frac{A}{x + 8} + \frac{B}{x - 2}$$

الخطوة ١: أحريب طرفي المعادلة في المقام المشترك الأصغر المقام:

تصريف طرفي المعادلة في (م.م.أ) المقام، وهو $(x+8)(x-2)$ ، فإن:

$$(x+8)(x-2) \frac{x+38}{(x+8)(x-2)} = (x+8)(x-2) \left(\frac{A}{x+8} + \frac{B}{x-2} \right)$$

باستعمال خاصية التوزيع على الطرف الأيمن من المعادلة والاختصار، تصبح المعادلة الآتية:

$$x+38 = A(x-2) + B(x+8)$$

الخطوة ٢: أجد قيمة كلٍّ من الثابت A والثابت B باستخدام التعويض.

• يتعويض $x = -8$ في المعادلة الناتجة:

$$-8 + 38 = A(-8-2) + B(-8+8) \quad \text{تعويض } x = -8$$

$$30 = -10A \quad \text{تبسيط}$$

$$A = -3 \quad \text{قيمة طرفي المعادلة على } -10$$

• يتعويض $x = 2$ في المعادلة الناتجة:

$$2 + 38 = A(2-2) + B(2+8) \quad \text{تعويض } x = 2$$

$$40 = 10B \quad \text{تبسيط}$$

$$B = 4 \quad \text{قيمة طرفي المعادلة على } 10$$

إذن، يمكن تبسيط المقدم النسبي في الصورة الآتية:

$$\frac{2x^2 + 13x + 6}{x^2 + 6x - 16} = 2 + \frac{-3}{x+8} + \frac{4}{x-2}$$

✓ انطق من ههنا

أجوب: $\frac{3x^2 + 12x + 4}{x^2 + x}$ إلى كسور جزئية

أجزئ كلًا من المقادير النسبية الآتية إلى كسور جزئية:

1 $\frac{2x-5}{(x+2)(x+3)}$

2 $\frac{2x+22}{x^2+2x}$

3 $\frac{4x-30}{x^2-8x+15}$

4 $\frac{6x^2-7x+10}{(x-2)(x^2+1)}$

5 $\frac{2-3x-4x^2}{x(x-1)(1-2x)}$

6 $\frac{x}{6x^2-10x+3}$

7 $\frac{1}{2x^2-3x^2-32x-15}$

8 $\frac{9x^2-9x+9}{2x^2-x^2-4x+4}$

9 $\frac{5+3x-x^2}{-x^2+3x^2+4x-12}$

10 $\frac{(x-3)^2}{x^2-16x}$

11 $\frac{7x-3}{x^2-2x-8}$

12 $\frac{3x^2-9x-3}{x^2-5x-6}$

13 $\frac{x^2+2x^2-17}{x^2-x-6}$

14 $\frac{x-3}{x^2+3x}$

15 $\frac{x^2+2x+40}{x^2-125}$

16 $\frac{-2x^2-30x^2+38x+216}{x^2+216}$

17 $\frac{x^2+12x^2+33x+2}{x^2+8x+15}$

18 $\frac{x^2-2x^2+x^2+x+5}{x^2-2x^2+x-2}$

19 أثن أن لا يمكن كتابة $\frac{1}{x-a}$ في صورة $\frac{1}{2a(x-a)} - \frac{1}{2a(x+a)}$ ، حيث a عدد حقيقي لا يساوي صفرًا.

20 إذا كان $\frac{x^2+8x+7}{(x-1)(x^2+2)} = \frac{px-37}{9(x^2+2)} - \frac{p}{9(x-1)}$ ، فأوجد قيمة p .



هندسة ميكانيكية، يُستغل الاحتراق الآلي لتقدير درجة الحرارة لعدم المحرك ذيلاً:

$$R(x) = \frac{2000(4-3x)}{(11-7x)(7-4x)}, \quad 0 \leq x \leq 1$$

حيث x مقدار جهد المحرك و $R(x)$ درجة الحرارة بالنهر لهايت:

11 أجزئ الاحتراق الآلي $R(x)$ إلى كسور جزئية.

12 إذا كان $R(x)$ يُعطي الفرق بين احتراق أعلى درجة حرارة للمعدن واحتراق أقل درجة حرارة للمعادن، فليجد مُحللي الاحتراقين، وأستعين بالسؤال السابق في عملية الحُل.

13 أحل المسألة الواردة في بداية الدرس.

14 مهارات التفكير العليا

14 تحلل أجزئ المقدار الآلي إلى كسور جزئية: $\frac{3x^3+12x-20}{x^2-4x^2+0x-0}$

15 اكتشف الخطأ بدأت رسم خطوات تجزئة المقدار $\frac{x^2+3x+1}{(x+3)(x-2)}$ كالآتي:

$$\frac{x^2+3x+1}{(x+3)(x-2)} = \frac{A}{x+3} + \frac{B}{x-2}$$

أحد الخطأ الذي وقعت فيه ربيم، ثم أصححه.

16 تبرهن: إذا كان: $\frac{ax+b}{x^2-1} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1}$ ، فأجد قيمة كل من A و B بدلالة المتغيرين a و b ، ثم أذكر إجابتني.

أختار من الإجابة الصحيحة في كل ما يأتي:

1) يأتي قسمة: $f(x) = x^2 - 2x^2 - 5x + 9$ على $(x+2)$ يساوي:

- a) 3 b) -1 c) 9 d) 27

2) إذا كان $(x-3)$ عاملاً من عوامل:

$$g(x) = 2x^2 + x^2 + px - 6$$

- a) -17 b) -3 c) 10 d) -19

3) إذا كان: $\frac{x-4}{x^2-5x-2k} = \frac{2}{x-2} + \frac{1}{x+k}$ ، فإن k يساوي:

- a) -3 b) -2 c) 2 d) 3

4) إذا كان: $\frac{5x-12}{x^2-3x-4} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-4}$ ، فإن قيمة $A+B$ هي:

- a) -12 b) -7 c) 3 d) 5

5) إذا كان باقي قسمة كثير الحدود $f(x)$ على $(x-1)$

هو 2، وباقي قسمة $f(x)$ على $(x-2)$ هو 5، فإن باقي قسمة

$$f(x) \text{ على } (x-1)(x-2) \text{ هو:}$$

- a) 10 b) $1-x$
c) $2x-1$ d) $3x-1$

أحل كل مسألة مما يأتي تحليلًا كاملاً:

6) $3x^2 - 10x^2 - 9x + 4$

7) $8x^2 + 2x^2 - 53x^2 + 37x - 6$

أحل كل معادلة مما يأتي:

8) $x^4 - 7x^2 + 13x^2 + 3x - 18 = 0$

9) $x^4 + 16x^2 - 3x = 5x^2 - 18x + 27$

10) إذا كان باقي قسمة كل من المقادير:

$$2x^2 - 4x^2 + mx + 8 \text{ و } mx^2 + x^2 - 10x - 6$$

على $(x-2)$ متساويًا، فأوجد قيمة الثابت m .

أخرجي شكلًا من المقادير النسبة الآتية إلى كسور جزئية:

11) $\frac{6}{(x+3)(x+1)}$

12) $\frac{5x^2-6}{2x^2+x}$


13) $\frac{3x^2+x-4}{x^2-2x}$

14) $\frac{4x^2-x-2}{x^2+2x}$

15) إذا كان: $\frac{7x-5}{(x-a)(x-3)} = -\frac{9}{x-a} + \frac{b}{x-3}$ ، فأوجد قيمة كل من a و b .

16) إذا كان العدد (-2) هو أحد جذور المعادلة:

$$x^2 + 5x^2 + 5x - 2 = 0$$
، فأوجد حلولها الأخرى.



17) أتمعمل التشغيل التالي

المتناظر للاختزال:

$$f(x) = -x^2 + 32x^2 - 224x + 768$$

أحلله تحليلًا كاملاً.

18) يريد حمد أن يصنع خزان ماء على هيئة متوازي

مستطيلات، بحيث يزيد طوله 1 m على طلي عرضه،

ويريد أن يتحاطه 1 m على عرضه، ويكون حجمه

30 m³. كم مترًا مربعًا من الحديد يلزمه لصنع خزان

الماء؟

ما أهمية هذه
الوحدة؟

يُعدُّ حساب أطوال الأضلاع وقياسات الزوايا من أهم تطبيقات الأخرات المثلثية ومعادلاتها. يُستعمل هذا التطبيق على نطاق واسع في العلوم المختلفة، مثل: علم المساحة، وعلم الملاحة، وقد يُستعمل أيضًا في تفسير بعض الظواهر الفيزيائية، مثل: ظاهرة انكسار الضوء الأبيض، أي انحراف الضوء عن مساره عند انتقاله من وسط شفاف إلى وسط شفاف آخر.

تعلمت سابقاً:

- ✓ ماهية دائرة الوحدة، ووضع الزاوية القياسي.
- ✓ إيجاد قيم الأضلاع المثلثية لأي زاوية.
- ✓ حلّ معادلات مثلثية، بحيث تكون مجموعة الحلّ ضمن الدورة الواحدة:
- ✓ استعمال العلاقة الأثمية لحلّ المثلث القائم
- الزوية: $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$

سأتعلم في هذه الوحدة:

- استعمال المعطيات المثلثية لإيجاد قيم الأضلاع المثلثية.
- استعمال المعطيات المثلثية لتبسيط التقدير المثلثية، وإيجاد قيمة معادلات مثلثية أخرى.
- حلّ المعادلات المثلثية.

تستعمل تدريبات (أستعد للدراسة الواحدة) في الصفحات (19-13) من كتاب التمارين والمراجعة هذه العروض من قبل الأئمة بدراسة الوحدة

المتطابقات المثلثية 1


Trigonometric Identities 1

- استعمال المتطابقات المثلثية لإيجاد قيم الأضلاع المثلثية.
 - استعمال المتطابقات المثلثية لتبسيط المقادير المثلثية، وإثبات صحة متطابقات مثلثية.
 - إيجاد قيم الأضلاع المثلثية لجميع زوايا وترتبط بالوترين والوتر.
 - إثبات صحة المتطابقات المثلثية باستعمال متطابقات المجموع والفرق.
- متطابقة مثلثية.

فترة الدرس


المصطلحات

مسألة اليوم



تُكثَّفُ المِرْوَنَةُ الشَّمْسِيَّةُ أَوَّلَ سَاعَةٍ اجْتَرَعَهَا الْإِنْسَانُ، وَقَدْ اسْتَعْمَلَهَا الْمَسْلُومُونَ لِتَحْدِيدِ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ. يُشِيرُ الشَّكْلُ الْمَجْرُوبُ مِرْوَنَةً شَمْسِيَّةً ارْتِفَاعُهَا h وَجِدَتْ وَتُحْتَلَى الْمَعْدَنَةُ: $e = \frac{h \sin(\frac{\pi}{2} - \theta)}{\sin \theta}$ جُولَ هَيْئَلِ المِرْوَنَةِ حَتَّى يَكُونُ قِيَامُ زَاوِيَةِ مَقْوَعِ أَشْعَاءِ الشَّمْسِ θ . هَلْ يُسَكِنُ بِحَيْثُ مَعَادَلَةُ جُولَ الْفُتْلِ بِعَوْرَةِ أَيْسَرٍ؟

المتطابقات المثلثية الأساسية



تَعَرَّفْنَا سَابِقًا أَنَّهُ إِذَا تَرَسَّعْتَ الزَاوِيَةَ θ فِي الْوَهَجِ الْقِيَاسِيِّ، فَإِنَّ مَسَلَعِ الثَّنَائِيَّاتِ يَقَطَعُ دَائِرَةَ الْوَحْدَةِ فِي نَقْطَةٍ وَحِيدَةٍ هِيَ $P(x, y)$ كَمَا

يُظْهِرُ فِي الشَّكْلِ الْمَجْرُوبِ. وَمِنْهُ، فَإِنَّ $x = \cos \theta$ وَ $y = \sin \theta$

أَلَا حِظُّ أَنْ النِّقْطَةَ $P(x, y)$ تَقَعُ عَلَى دَائِرَةٍ مَرَكَزُهَا النِّقْطَةُ الْأَصْلُ، وَتَمَلِكُ قَطْرًا وَوَحْدَةً وَاحِدَةً لِذَا تَسِحُّ الْمَعَادَلَتَانِ الْأَمْتِيَانِ:

$$x^2 + y^2 = 1, \quad \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$$

أَلَا حِظُّ أَيْضًا أَنَّ الْمَعَادَلَةَ: $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$ صَحِيحَةٌ لِجَمِيعِ قِيَمِ θ ، لِذَا تُسَمَّى **مُطَابَقَةً**

مُثَلَّثِيَّةً (trigonometric identity).

فِي مَا دَأَى الْمُطَابَقَاتِ الْمُثَلَّثِيَّةِ الْأَسَاسِيَّةِ النَّاتِجَةُ بِعَوْرَةٍ مُبَاشِرَةٍ مِنْ تَعْرِيفِ الْأَضْرَاعِ الْمُثَلَّثِيَّةِ الَّتِي دَرَسْنَا سَابِقًا.

رموز رياضية

$\sin^2 \theta$ تعني $(\sin \theta)^2$.

$\cos^2 \theta$ تعني $(\cos \theta)^2$.

المطابقات المثلثية الأساسية

مفهوم أساسي

• **مطابقات المقرب:**

$$\csc \theta = \frac{1}{\sin \theta}$$

$$\sec \theta = \frac{1}{\cos \theta}$$

$$\cot \theta = \frac{1}{\tan \theta}$$

• **المطابقات العكس:**

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$

$$\cot \theta = \frac{\cos \theta}{\sin \theta}$$

• **مطابقات فيثاغورس:**

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

$$1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$$

$$1 + \cot^2 \theta = \csc^2 \theta$$

• **مطابقات الزاوية المتتامتين:**

$$\sin \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right) = \cos \theta$$

$$\tan \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right) = \cot \theta$$

$$\sec \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right) = \csc \theta$$

$$\cos \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right) = \sin \theta$$

$$\cot \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right) = \tan \theta$$

$$\csc \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right) = \sec \theta$$

• **مطابقات الزاوية العكس:**

$$\sin (-\theta) = -\sin \theta$$

$$\cos (-\theta) = \cos \theta$$

$$\tan (-\theta) = -\tan \theta$$

التلم

يمكن أيضًا كتابة
مطابقات الزاوية
المتتامتين بالزوايا
مثل:

$$\sin (90^\circ - \theta) = \cos \theta$$

يمكن استعمال المطابقات الأساسية لإيجاد قيم الاختلافات المثلثية.

مثال 1

أوجد قيمة $\sec \theta$ إذا كان: $-\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$, $\sin \theta = \frac{3}{5}$

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

$$\left(\frac{3}{5}\right)^2 + \cos^2 \theta = 1$$

$$\cos^2 \theta = \frac{16}{25}$$

$$\cos \theta = \pm \frac{4}{5}$$

$$\cos \theta = -\frac{4}{5}$$

$$\frac{1}{\cos \theta} = -\frac{5}{4}$$

$$\sec \theta = -\frac{5}{4}$$

مطابقات فيثاغورس

عوض

بالتعويض

إيجاد الخط الذي يملك الطرفين

عوضه بالقيمة التي نريد

إيجاد المقرب كالاتي

مطابقات المقرب

الدكر

<p>الربع الثاني</p> <p>$\sin \theta, \cos \theta$ (+)</p> <p>$\tan \theta, \cot \theta$ (-)</p> <p>$\sec \theta, \csc \theta$ (-)</p>	<p>الربع الأول</p> <p>$\sin \theta, \cos \theta$ (+)</p> <p>$\tan \theta, \cot \theta$ (+)</p> <p>$\sec \theta, \csc \theta$ (+)</p>
<p>الربع الثالث</p> <p>$\sin \theta, \cos \theta$ (-)</p> <p>$\tan \theta, \cot \theta$ (+)</p> <p>$\sec \theta, \csc \theta$ (-)</p>	<p>الربع الرابع</p> <p>$\sin \theta, \cos \theta$ (-)</p> <p>$\tan \theta, \cot \theta$ (-)</p> <p>$\sec \theta, \csc \theta$ (-)</p>

المفرد من مهملي

أوجد قيمة $\tan \theta$ إذا كان $\sec \theta = -\frac{3}{2}$ ، $\pi < \theta < \frac{3\pi}{2}$.

تبسيط المقادير المثلثية وإعادة كتابتها

تبسيط المقادير المثلثية غير كتابة المقادير باللائحة أكثر من مثلي واحد فقط (إن أمكن)، وتذكر ذلك باستخدام المعطيات المثلثية.

مثال 2

أبسط مخلاص المقادير المثلثية الآتية:

1) $\sin x \cos^2 x - \sin x$

$$\begin{aligned} \sin x \cos^2 x - \sin x &= \sin x (\cos^2 x - 1) \\ &= -\sin x (1 - \cos^2 x) \\ &= -\sin x \sin^2 x \\ &= -\sin^3 x \end{aligned}$$

أخرج العامل المشترك

باستعمال هوية الترميز

مطابقت لياقوتوس

بالتربيع

2) $\frac{\sin x}{\cos x} + \frac{\cos x}{1 + \sin x}$

$$\begin{aligned} \frac{\sin x}{\cos x} + \frac{\cos x}{1 + \sin x} &= \frac{\sin x (1 + \sin x) + \cos^2 x}{\cos x (1 + \sin x)} \\ &= \frac{\sin x + \sin^2 x + \cos^2 x}{\cos x (1 + \sin x)} \\ &= \frac{\sin x + 1}{\cos x (1 + \sin x)} \\ &= \frac{1}{\cos x} = \sec x \end{aligned}$$

أخرج المقام

باستعمال هوية الترميز

مكتملت لياقوتوس

بتبسيط واستعمال علاقات الترميز

3) $\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \cot x$

$$\begin{aligned} \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \cot x &= \sin x \cot x \\ &= \sin x \left(\frac{\cos x}{\sin x}\right) \\ &= \cos x \end{aligned}$$

مطابقت (الرض المتكافئ)

مطابقت هوية

بالتبسيط

التحقق من فهمي

أبسط شكلاً من المقادير المثلثية الآتية:

a) $\sin x (\csc x - \sin x)$ b) $1 + \frac{\sin x}{\cos x} + \frac{\cos x}{1 + \sin x}$ c) $\sin \left(\frac{\pi}{2} - x\right) \sec x$

أحلج في بعض المسائل إلى إعادة كتابة المقادير المثلثية بحيث لا تحتوي كسراً، ويمكن جعل ذلك أحياناً باستعمال الضرب في المرافق. فعشأن عندما يكون المقام في صورة $1 + M$ أو $1 - M$ ، فإني أضرب البسط والمقام في مرافق المقام، ثم أطبق متطابقات فيثاغورس.

مثال 3

أعيد كتابة $\frac{1}{1 + \sin x}$ بحيث لا يحتوي كسراً.

$$\frac{1}{1 + \sin x} = \frac{1}{1 + \sin x} \times \frac{1 - \sin x}{1 - \sin x}$$

$$= \frac{1 - \sin x}{1 - \sin^2 x}$$

$$= \frac{1 - \sin x}{\cos^2 x}$$

$$= \frac{1}{\cos^2 x} - \frac{\sin x}{\cos^2 x}$$

$$= \frac{1}{\cos^2 x} - \frac{\sin x}{\cos x} \times \frac{1}{\cos x}$$

$$= \sec^2 x - \tan x \sec x$$

ضرب البسط والمقام في مرافق $1 + \sin x$ و $1 - \sin x$

الضرب

متطابقات فيثاغورس

كتابة الكسرين في صورة
كسور كسرية

التبسيط

متطابقات المقادير
والمتطابقات المتكافئة

التحقق من فهمي

أعيد كتابة $\frac{1}{1 + \cos x}$ بحيث لا يحتوي كسراً.

إثبات صحة متطابقة مثلثية

يمكن استعمال المتطابقات المثلثية الأساسية، إضافة إلى تعريف الأضلاع المثلثية، لإثبات صحة متطابقات مثلثية أخرى، عن طريق تحويل أحد طرفي المتطابقة المثلثية المراد إثبات صحتها إلى الطرف الآخر بإيجاز سلسلة من الخطوات، وكل منها مُعتمد متطابقة.

التذكير

يُعدّ \sin من المثلثين
بجانب $a - b$ و $a + b$ مرافقاً
لأخرى وينتج عن ضربهما
الفرق بين التمامين:
 $a^2 - b^2$

لا بد من الإشارة إلى أن صحة المتطابقة تعني أنه يمكن تطبيقها لجميع قيم المتغير التي يكون طرفها معرفين عند استخدامها.

وفي ما يأتي بعض العبادات العامة التي تساعدني على إثبات صحة المتطابقات المتطابقة:

- البدء بأحد طرفي المتطابقة: أختار أحد طرفي المتطابقة، الذي يكون أكثر تعقيداً فيها غالباً، أو يمكن تحويل كل طرف إلى مقدار مثلثي بسيط.
- استعمال المتطابقات المتطابقة المعروفة: يُمكن استعمال المتطابقات المتطابقة التي أحرقتها، إضافة إلى بعض المهذبات الجبرية، لتحويل الطرف الذي اخترته بدايةً.
- التحويل إلى اقتران الجيب أو جيب التمام: من المفيد أحياناً إعادة كتابة جميع الاقترانات بدلالة اقتران الجيب أو جيب التمام.

المفهوم

هذا القيم التي لا تحقق
عنها المتطابقة

$$1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$$

مثال 4

أثبت صحة كلٍّ من المتطابقات الآتية:

$$1) \sin x \tan x = \sec x - \cos x$$

الأول: أن طرف المتطابقة الأيسر أكثر تعقيداً، لذا أبدأ بالمقدار المتطابق الموجود فيه:

$$\sin x \tan x = \sin x \left(\frac{\sin x}{\cos x} \right)$$

تصحيحات الجيب

$$= \frac{\sin^2 x}{\cos x}$$

بالتعويض

$$= \frac{1 - \cos^2 x}{\cos x}$$

صحيحات الجيب

$$= \frac{1}{\cos x} - \cos x$$

كتابة الكسور في صورة فرق بين كسور

$$= \sec x - \cos x \quad \checkmark$$


صحيحات الجيب

التعليق

ليس شرطاً البدء
بالطرف الأيسر
في حالة التعقيد:

في التمرين 1 من المثال
يُمكنني إثبات صحة
المتطابقة بدءاً بالطرف
الأيسر.

أتمتع بصفحة
التدوين الإلكتروني



الدعم البياني

يُمكنني أيضاً إثبات صحة متطابقة بيانياً عن طريق تشغيل كل طرف منها بيانياً باستعمال برمجية جيو جبرا، والتحقق من تطابق التشغيل البياني. ألاحظ تطابق التشغيل البياني للمعادلتين: $y = \sec x - \cos x$ و $y = \sin x \tan x$. ما يعني أن المتطابقة صحيحة.

2 $\sec x + \tan x = \frac{\cos x}{1 - \sin x}$

ألاحظ أن طرف المعادلة الأيمن أكثر تعقيداً، لذا أبدأ بالمقام المثلثي الموجود فيه:

$$\begin{aligned} \frac{\cos x}{1 - \sin x} &= \frac{\cos x}{1 - \sin x} \times \frac{1 + \sin x}{1 + \sin x} && \text{بحرف البسط والمقام في كسر} \\ &= \frac{\cos x (1 + \sin x)}{1 - \sin^2 x} && \text{بصيغة } (1 - \sin^2 x) \\ &= \frac{\cos x (1 + \sin x)}{\cos^2 x} && \text{صيغة باينوريث} \\ &= \frac{1 + \sin x}{\cos x} && \text{بكتلة على العامل المشترك } (\cos x) \\ &= \frac{1}{\cos x} + \frac{\sin x}{\cos x} && \text{كتابة الكسر في صورة مجموع كسرين} \\ &= \sec x + \tan x \quad \checkmark && \text{مطابقتان المقادير والمطابقتان الصيا$$

3 $\frac{\sin x}{1 + \cos x} + \frac{1 + \cos x}{\sin x} = 2 \csc x$

ألاحظ أن طرف المعادلة الأيسر أكثر تعقيداً، لذا أبدأ بالمقام المثلثي الموجود فيه:

$$\begin{aligned} \frac{\sin x}{1 + \cos x} + \frac{1 + \cos x}{\sin x} &= \frac{\sin^2 x + (1 + \cos x)^2}{(1 + \cos x) \sin x} && \text{توحيد المقادير} \\ &= \frac{\sin^2 x + 1 + 2 \cos x + \cos^2 x}{(1 + \cos x) \sin x} && \text{توسيع مربع الحاصل} \\ &= \frac{\sin^2 x + \cos^2 x + 1 + 2 \cos x}{(1 + \cos x) \sin x} && \text{صيغة الجيب} \\ &= \frac{2 + 2 \cos x}{(1 + \cos x) \sin x} && \text{مطابقتان المقادير} \\ &= \frac{2(1 + \cos x)}{(1 + \cos x) \sin x} && \text{إخراج العامل المشترك } (1 + \cos x) \\ &= \frac{2}{\sin x} && \text{بمضروب العامل المشترك } (1 + \cos x) \\ &= 2 \csc x \quad \checkmark && \text{مطابقتان المقادير}$$

أفكار

هل تُشغل المعادلة الآتية
 معادلة؟
 $\frac{\sin x}{1 + \cos x} + \frac{1 + \cos x}{\sin x} = 2 \csc x$
 انظر من ذلك بطريقة
 عقلية وأخرى جوية.

أفكار

احلّ المسألة بطريقة
 أخرى.

تحقق من قصتي

أثبت صحة كل من المتطابقات الآتية:

$$a) \cot x \cos x = \csc x - \sin x$$

$$b) \frac{1 - \cos x}{\sin x} = \frac{\sin x}{1 + \cos x}$$

$$c) \frac{1}{1 - \cos x} + \frac{1}{1 + \cos x} = 2 \csc^2 x$$

يُفضل اختياراً تحويل كل طرف من المتطابقة العنثية المراد إثبات بحيثها إلى مقدار مثلثي بسيط.

مثال 5

$$\text{أثبت صحة المتطابقة: } \frac{1 + \cos x}{\cos x} = \frac{\tan^2 x}{\sec x - 1}$$

الأفضل أن نطرق المتطابقة بمعقدان؛ لهذا أحول كلا الطرفين إلى مقدار مثلثي وبسيط، ثم أبدأ بالطرف الأيسر:

$$\begin{aligned} \frac{1 + \cos x}{\cos x} &= \frac{1}{\cos x} + \frac{\cos x}{\cos x} \\ &= \sec x + 1 \end{aligned}$$

كتابة الكسور في صورة المخرج المشترك

بالتخصيص، واستخدام متطابقات المقلوب

الآن، أحول الطرف الأيمن إلى المقدار المثلثي البسيط $\sec x + 1$:

$$\frac{\tan^2 x}{\sec x - 1} = \frac{\sec^2 x - 1}{\sec x - 1}$$

متطابقات بطوروس

$$= \frac{(\sec x - 1)(\sec x + 1)}{\sec x - 1}$$

تحليل الفرق بين مربعين

$$= \sec x + 1 \quad \checkmark$$

بالتصاري العامل المشترك: $\sec x - 1$

بعد أن الطرفين يساويان المقدار المثلثي نفسه، إذن المتطابقة صحيحة.

تحقق من قصتي

$$\text{أثبت صحة المتطابقة: } (\tan x + \cot x)^2 = \sec^2 x + \csc^2 x$$

مطابقات المجموع والفرق

تعلمتُ في الأمانة السابقة كيفية استعمال المطابقات المثلثية لإيجاد قيم زواياك مطابقة، وتبسيط عبارات مثلثية، وإثبات صحة مطابقات أخرى. وسأستعمل الآن كيفية استعمال مجموعة من المطابقات لإيجاد قيمة اقتران مثلثي لمجموع زاويتين أو الفرق بينهما.

مطابقات المجموع والفرق

مفهوم أساسي

مطابقات المجموع

- $\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$
- $\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$
- $\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}$

مطابقات الفرق

- $\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$
- $\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$
- $\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta}$

مثال 1

أوجد قيمة كل مما يأتي من دون استعمال الآلة الحاسبة:

1 $\sin 15^\circ$

$$\sin 15^\circ = \sin(60^\circ - 45^\circ)$$

$$15^\circ = 60^\circ - 45^\circ$$

$$= \sin 60^\circ \cos 45^\circ - \cos 60^\circ \sin 45^\circ$$

طريقة إيجاد الفرق بين الزوايا

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

التعويض

$$= \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}}$$

النتيجة

العلم

يمكنني التحقق من صحة إجابتي باستعمال الآلة الحاسبة. تمثلاً، نسي الرقم 1 من المثال الأول.

$$\sin 15^\circ = 0.2598$$

$$\frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}} = 0.2588$$

2 $\tan \frac{5\pi}{12}$

$$\tan \frac{5\pi}{12} = \tan \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6} \right)$$

$$\frac{5\pi}{12} = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6}$$

$$= \frac{\tan \frac{\pi}{4} + \tan \frac{\pi}{6}}{1 - \tan \frac{\pi}{4} \tan \frac{\pi}{6}}$$

صيغة الجمل المجمع زاوية

$$= \frac{1 + \frac{1}{\sqrt{3}}}{1 - 1 \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right)}$$

التبسيط

$$= \frac{\sqrt{3} + 1}{\sqrt{3} - 1}$$

توحيد المقامات

$$= \frac{\sqrt{3} + 1}{\sqrt{3} - 1}$$

بالمسك

3 $\cos 20^\circ \cos 40^\circ - \sin 20^\circ \sin 40^\circ$

$$\cos 20^\circ \cos 40^\circ - \sin 20^\circ \sin 40^\circ = \cos (40^\circ + 20^\circ)$$

صيغة جيب التمام

تجميع الزاوية

$$= \cos (60^\circ) = \frac{1}{2}$$

النتيجة

انتقل من نصفي - أوجد قيمة كل مما يأتي من دون استعمال الآلة الحاسبة:

a) $\cos 75^\circ$

b) $\tan \frac{\pi}{12}$

c) $\sin 80^\circ \cos 20^\circ - \cos 80^\circ \sin 20^\circ$

يُمكنني أيضًا استعمال مطابقات المجموع والفرق لإثبات صحة مطابقات مثلثة أخرى.

مثال 7 أثبت صحة كل مطابقة مما يأتي:

1 $\cos \left(\frac{\pi}{2} - x \right) = \sin x$

الأخط أن نترك المطابقة الأيسر كما هي، لذا نبدأ بالمقدار الخلفي الموجود فيه:

$$\cos \left(\frac{\pi}{2} - x \right) = \cos \frac{\pi}{2} \cos x + \sin \frac{\pi}{2} \sin x$$

صيغة جيب التمام

الفرق بين الزاوية

$$= (0) \cos x + (1) \sin x$$

التبسيط

$$= \sin x$$

النتيجة

أفكار

كيف يُمكن إثبات صحة المطابقة:

$$\cos \left(\frac{\pi}{2} - x \right) = \sin x$$

بتطبيق التعريفات

الجسدية على الأضلاع

$$f(x) = \cos x$$

$$1 \quad \frac{1 + \tan x}{1 - \tan x} = \tan\left(\frac{\pi}{4} + x\right)$$

أبدأ بالعدد العكسي الموجود في طرف المتطابقة الأيمن:

$$\begin{aligned} \tan\left(\frac{\pi}{4} + x\right) &= \frac{\tan\frac{\pi}{4} + \tan x}{1 - \tan\frac{\pi}{4} \tan x} \\ &= \frac{1 + \tan x}{1 - \tan x} \end{aligned}$$

طريقة كل المبرهنات

بالمساواة

التحقق من النتيجة  أثبت صحة كل متطابقة مما يأتي

a) $\tan\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cot x$

b) $\frac{\tan x - 1}{\tan x + 1} = \tan\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$

 التدرّب وأخذ المسائل

أجد قيمة كلٍّ من النسب المتطابقة الآتية ضمن الفترة المعطاة:

1 $\cot \theta, \sin \theta = \frac{1}{3}, 0 < \theta < \frac{\pi}{2}$

2 $\sec \theta, \tan \theta = -\frac{3}{7}, \frac{\pi}{2} < \theta < \pi$

3 $\tan \theta, \csc \theta = -\frac{5}{3}, \pi < \theta < \frac{3\pi}{2}$

4 $\sin \theta, \sec \theta = \frac{9}{4}, \frac{3\pi}{2} < \theta < 2\pi$

أثبت كلاً من العبارات المتساوية:

5 $\cos x \tan x$

6 $\frac{\sec x - \cos x}{\sin x}$

7 $\frac{\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)}{\csc x} + \cos^2 x$

8 $\frac{\sin x - \cos x}{\cos x} + \frac{\cos x - \sin x}{\sin x}$

9 $\frac{(\sin x + \cos x)^2 - 1}{\sin x \cos x}$

10 $\frac{\sec x - \cos x}{\tan x}$

أثبت صحة كلٍّ من المتطابقات الآتية:

11 $\cot(-x) \cos(-x) + \sin(-x) = -\csc x$

12 $(\sin x + \cos x)^2 = 1 + 2 \sin x \cos x$

13 $\frac{(\sin x + \cos x)^2}{\sin^2 x - \cos^2 x} = \frac{\sin^2 x - \cos^2 x}{(\sin x - \cos x)^2}$

14 $\frac{1 - \sin x}{1 + \sin x} = (\sec x - \tan x)^2$

15 $\sin^4 x - \cos^4 x = \sin^2 x - \cos^2 x$

16 $\frac{1}{1 - \sin x} - \frac{1}{1 + \sin x} = 2 \sec x \tan x$

17 $\ln |\tan \theta| = \ln |\sin \theta| - \ln |\cos \theta|$

18 $\ln |\sec \theta + \tan \theta| + \ln |\sec \theta - \tan \theta| = 0$

أوجد قيمة كلٍّ من النسب المثلثية الآتية من دون استعمال الآلة الحاسبة:

١١) $\sin 165^\circ$



١٢) $\tan 195^\circ$

١٣) $\sec\left(-\frac{\pi}{12}\right)$

١٤) $\sin \frac{17\pi}{12}$

١٥) $\sin \frac{\pi}{18} \cos \frac{5\pi}{18} + \cos \frac{\pi}{18} \sin \frac{5\pi}{18}$

١٦) $\frac{\tan 40^\circ - \tan 10^\circ}{1 + \tan 40^\circ \tan 10^\circ}$



استعمل الشكل المجاور لإيجاد قيمة كلٍّ من الاكتريلات الآتية، غفلاً بأن:

$$f(x) = \sin x, g(x) = \cos x, h(x) = \tan x$$

١٧) $f(\alpha + \beta)$

١٨) $g(\alpha - \beta)$

١٩) $h(\alpha + \beta)$



٢٠) مستور يُمكن قياس معامل انكسار الهواء الأبيض في المستور باستعمال المعادلة الآتية:

$$n = \frac{\sin\left(\frac{\theta}{2} + \frac{\alpha}{2}\right)}{\sin \frac{\theta}{2}}$$

إذا كانت $\alpha = 60^\circ$ ، فأثبت أن معادلة معامل الانكسار تُكتب في صورة:

$$n = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} \cot \frac{\theta}{2}$$

٢١) إذا كان: $g(x) = \cos x$ ، فأثبت أن:

$$\frac{g(x+h) - g(x)}{h} = -\cos x \left(\frac{1 - \cos h}{h} \right) - \sin x \left(\frac{\sin h}{h} \right)$$

٢٢) إذا كان: $\sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) = a \sin x + b \cos x$ ، فأوجد قيمة كلٍّ من a و b .


أثبت صحة كلٍّ من المتطابقات الآتية:

٢٣) $\sin(A+B) + \sin(A-B) = 2 \sin A \cos B$


٢٤) $\sin A + \cos A = \sqrt{2} \sin\left(A + \frac{\pi}{4}\right)$

٢٥) $\frac{\sin(A-B)}{\cos A \cos B} + \frac{\sin(B-C)}{\cos B \cos C} + \frac{\sin(C-A)}{\cos C \cos A} = 0$

٢٦) $\cos(x+y) \cos(x-y) = \cos^2 x - \sin^2 y$



35 زاوية الميل: إذا كان l مستقيمًا في المستوى الإحداثي، و θ الزاوية التي يصنعها المستقيم مع المحور x الموجب، فإن الزاوية θ تُسمى زاوية ميل المستقيم l . أثبت أن ميل المستقيم m يعطى بالعلاقة: $m = \tan \theta$ ، حيث: $0 < \theta < \pi$.




36 إذا كان l_1 و l_2 مستقيمين غير متوازيين في المستوى الإحداثي، وميل كل منهما m_1 و m_2 على الترتيب، وكانت ψ هي الزاوية الناتجة من تقاطع المستقيمين كما في الشكل المجاور، فأثبت أن:
النتيجة من السؤال السابق لايات أن:

$$\tan \psi = \frac{m_2 - m_1}{1 + m_1 m_2}$$

تبرر ذلك ψ لا يزيد على $\frac{\pi}{2}$.

37 اخذنا على الشكل الأتي، أثبت أن: $\alpha + \beta = \gamma$ ، ثم أوجد $\tan \gamma$.



مسابقات التفكير العليا

38 تبرر: إذا كان $\tan \alpha = x + 1$ و $\tan \beta = x - 1$ ، فأثبت أن: $2 \cot(\alpha - \beta) = x^2$ ، ثم أوجد $\sin \alpha$.

39 تبرر: أوجد قيمة $(\sin(\cos^{-1} \frac{1}{2}) + \sin^{-1} \frac{1}{\sqrt{2}})$ ، ثم أوجد $\sin \alpha$.

40 اكتب الخطأ، أكتشف الخطأ في المسألة الآتية، ثم أصححها:

$$\begin{aligned} \sin(x - \frac{\pi}{4}) &= \sin \frac{\pi}{4} \cos x - \cos \frac{\pi}{4} \sin x \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \cos x - \frac{\sqrt{2}}{2} \sin x \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} (\cos x - \sin x) \end{aligned}$$

المتطابقات المثلثية 2

Trigonometric Identities 2

- إيجاد قيم الأضلاع المثلثية باستخدام المتطابقات المثلثية لضلع الزاوية وتصفها.
- إعادة كتابة المقادير المثلثية من صورة الضرب إلى صورة الجمع والعكس.

فترة الدرس



صيانة اليوم



يختلف ميل منحدرات الترتُّج المُصنَّعة للمدنية باختلاف مستوى مهارة المتسابقين؛ فميل المنحدر للمتسابقين المحترفين هو $\tan \theta = \frac{5}{9}$ ، حيث θ الزاوية التي يصنعها المنحدر مع سطح الأرض. أما المتسابقون المبتدئون فميل منحدراتهم بزاوية قياسها نصف قياس الزاوية θ . ما ميل المنحدر للمتسابقين المبتدئين؟

المتطابقات المثلثية لضلع الزاوية

تُستعمل متطابقات ضلع الزاوية لإيجاد قيمة اقتران مثلثي عند الزاوية 2θ باستخدام قيمة الاقتران عند الزاوية θ .

المتطابقات المثلثية لضلع الزاوية

مفهوم أساسي

صيغة الظل

$$\tan 2\theta = \frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta}$$

صيغة جيب التمام

$$\cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta$$

$$\cos 2\theta = 1 - 2 \sin^2 \theta$$

$$\cos 2\theta = 2 \cos^2 \theta - 1$$

صيغة الجيب

$$\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$$

مثال 1

إذا كان $\sin \theta = \frac{3}{5}$ ، حيث $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ ، فأوجد قيمة كلِّ مما يأتي.

1) $\sin 2\theta$

بما أن $\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$ ، وقيمة $\sin \theta$ معلومة، إذن أوجد أولاً قيمة $\cos \theta$.

الخطوة 1: أوجد قيمة $\cos \theta$.

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

$$\left(\frac{3}{5}\right)^2 + \cos^2 \theta = 1$$

متطابقات الضرب

صيغة $\sin \theta = \frac{3}{5}$

$$\cos^2 \theta = \frac{16}{25}$$

$$\cos \theta = \pm \frac{4}{5}$$

بما أن جيب الزاوية في الربع الثاني سالبة، إذن: $\cos \theta = -\frac{4}{5}$

$$\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$$

$$= 2 \left(\frac{3}{5} \right) \left(-\frac{4}{5} \right)$$

$$= -\frac{24}{25}$$

2 $\cos 2\theta$

$$\cos 2\theta = 2 \cos^2 \theta - 1$$

$$= 2 \left(-\frac{4}{5} \right)^2 - 1$$

$$= \frac{7}{25}$$

3 $\tan 2\theta$

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$

$$= \frac{\frac{3}{5}}{-\frac{4}{5}}$$

$$= -\frac{3}{4}$$

$$\tan 2\theta = \frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta}$$

$$= \frac{2 \left(-\frac{3}{4} \right)}{1 - \left(-\frac{3}{4} \right)^2}$$

$$= -\frac{24}{7}$$

بتجربة

المثلث المبرهن كالتالي:

الخطوة 1: أوجد قيمة $\sin 2\theta$.

صيغة مضاعفة الزاوية

$$\cos \theta = -\frac{4}{5}, \sin \theta = \frac{3}{5}$$

تكون

صيغة مضاعفة الزاوية

$$\cos \theta = -\frac{4}{5}$$

بتجربة

الخطوة 1: أوجد قيمة $\tan \theta$

المطابقات المثلثية

$$\cos \theta = -\frac{4}{5}, \sin \theta = \frac{3}{5}$$

بتجربة

الخطوة 2: أوجد قيمة $\tan 2\theta$

صيغة مضاعفة الزاوية

$$\tan \theta = -\frac{3}{4}$$

بتجربة

التذكير

يمكن إيجاد قيمة $\cos \theta$ بوجود إحداثيين نقطة تقع على محيط الدائرة الزاوية θ



التذكير

من الممكن إيجاد $\tan 2\theta$ بطريقة أخرى

تحقق من فهمي

إذا كان: $\cos \theta = -\frac{2}{3}$ ، حيث: $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ ، فأوجد قيمة كل من:

a) $\sin 2\theta$

b) $\cos 2\theta$

c) $\tan 2\theta$

يُمكنني استعمال مطابقات هـ نصف الزاوية ومطابقات مجموع والفرق لإيجاد قيمة كل من $\sin 2\theta$ و $\cos 2\theta$ و $\tan 2\theta$ عند $\theta = 30^\circ$ باستعمال قيمة $\cos \theta = \frac{1}{2}$.

مثال 2

أكتب $\cos 3\theta$ بدلالة $\cos \theta$.

$$\cos 3\theta = \cos (2\theta + \theta)$$

$$3\theta = 2\theta + \theta$$

$$= \cos 2\theta \cos \theta - \sin 2\theta \sin \theta$$

مطابقة جيب التمام

لمجموع الزاوية

$$= (2\cos^2 \theta - 1)\cos \theta - (2\sin \theta \cos \theta)\sin \theta$$

مطابقات هـ نصف الزاوية

$$= 2\cos^3 \theta - \cos \theta - 2\sin^2 \theta \cos \theta$$

بالتعويض خاصة التربيع

$$= 2\cos^3 \theta - \cos \theta - 2\cos \theta (1 - \cos^2 \theta)$$

مطابقة الجيب

$$= 2\cos^3 \theta - \cos \theta - 2\cos \theta + 2\cos^3 \theta$$

بالتعويض خاصة التربيع

$$= 4\cos^3 \theta - 3\cos \theta$$

نتيجة

تحقق من فهمي

أكتب $\sin 3\theta$ بدلالة $\sin \theta$ و $\cos \theta$.

المطابقات المثلثية لنصف الزاوية

يُمكنني استعمال المطابقات المثلثية لنصف الزاوية في كتابة المقادير المثلثية التي تتضمن قوى الجيب وجيب التمام والظل بدلالة القوة الأولى لجيب التمام فقط.

المطابقات المثلثية لتانجس الزاوية

مفهوم أساسي

$$\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2}$$

$$\cos^2 \theta = \frac{1 + \cos 2\theta}{2}$$

$$\tan^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{1 + \cos 2\theta}$$

التعلم

القوة الأولى لجيب التمام تعني جيب التمام لزاوية 30° ولا يظهر الأس 1 عند كتابة التانجس والمقدور الجبرية مثل:

$$\cos x, \cos 3x, \cos 8x, \cos(5x+4)$$

مثال 3

أعيد كتابة $\sin^2 x \cos^2 x$ بدلالة القوة الأولى لجيب تمام

$$\sin^2 x \cos^2 x = \left(\frac{1 - \cos 2x}{2} \right) \left(\frac{1 + \cos 2x}{2} \right) \quad \text{تطبيق نظرية الفرق}$$

$$= \frac{1 - \cos^2 2x}{4} \quad \text{بمضاعف خاصة التوزيع}$$

$$= \frac{1}{4} - \frac{1}{4} \cos^2 2x \quad \text{كتابة الجذر في صورة الفرقين كسور}$$

$$= \frac{1}{4} - \frac{1}{4} \left(\frac{1 + \cos 4x}{2} \right) \quad \text{تطبيق نظرية الفرق}$$

$$= \frac{1}{4} - \frac{1}{8} - \frac{\cos 4x}{8} \quad \text{بمضاعف خاصة التوزيع}$$

$$= \frac{1}{8} - \frac{\cos 4x}{8} \quad \text{تبسيط}$$

$$= \frac{1}{8} (1 - \cos 4x) \quad \text{إخراج العامل المشترك}$$

التحقق من الجواب

أعيد كتابة $\cos^4 x$ بدلالة القوة الأولى لجيب تمام

تعدّ المتطابقات المثلثية نصف الزاوية نتيجة مباشرة للمتطابقات تقليص القوى، وذلك بأخذ

الجذر التربيعي لغيرتي كل متطابقة واستبدال الزاوية $\frac{\theta}{2}$ بدلالة الزاوية θ .

المتطابقات المثلثية لنصف الزاوية

مفهوم أساسي

$$\sin \frac{\theta}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \theta}{2}}$$

$$\cos \frac{\theta}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \theta}{2}}$$

$$\tan \frac{\theta}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \theta}{1 + \cos \theta}}$$

العلم

تعتبر كل حثقة الزاوية \pm ، وتُختار الإشارة المناسبة بحسب الربع الذي يقع فيه اتجاه الزاوية $\frac{\theta}{2}$.

العلم

يمكن حل المثال السابق باستعمال حقيقة جيب نصف الزاوية على النحو التالي:

$$\sin^2 x \cos^2 x = \frac{1}{4} \sin^2 2x$$

$$= \frac{1}{4} (1 - \cos 4x)$$

$$= \frac{1}{8} (1 - \cos 4x)$$

مثال 4 أوجد قيمة $\sin 22.5^\circ$ من دون استعمال الآلة الحاسبة.

بما أن 22.5° هي نصف 45° ، فإنه يُمكننا استعمال متطابقة جيب نصف الزاوية، حيث $x = 45^\circ$ وبما أن ضلع انتهاء الزاوية 22.5° يقع في الربع الأول، فإني أختار الإشارة الموجبة للمتطابقة:

$$\sin \frac{45^\circ}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos 45^\circ}{2}}$$

متطابقة نصف الزاوية

$$= \sqrt{\frac{1 - \frac{1}{\sqrt{2}}}{2}}$$

$$\cos 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$= \sqrt{\frac{\sqrt{2} - 1}{2\sqrt{2}}}$$

بالتبسيط

$$= \sqrt{\frac{2 - \sqrt{2}}{4}}$$

لإطلاق المقام

$$= \frac{1}{2} \sqrt{2 - \sqrt{2}}$$

بالتبسيط

التفكير من فضاء أوجد قيمة $\cos 112.5^\circ$ من دون استعمال الآلة الحاسبة.

التعلم

تضع المتطابقات المثلثة نصف الزاوية في خطافات فضاءي القوة.

التفكير

بما أن الزاوية $\frac{\pi}{2}$ تقع في الربع الثاني، فإني أختار الإشارة الموجبة للمتطابقة جيب نصف الزاوية.

مثال 5

إذا كان $\cos x = -\frac{3}{5}$ ، حيث $\pi < x < \frac{3\pi}{2}$ ، فأوجد قيمة $\sin \frac{x}{2}$ ما يلي:

1. $\sin \frac{x}{2}$

بما أن $\pi < x < \frac{3\pi}{2}$ ، فإن $\frac{\pi}{2} < \frac{x}{2} < \frac{3\pi}{4}$ ، وهذا يعني أن ضلع انتهاء الزاوية $\frac{x}{2}$ يقع في الربع الثاني، فإني أختار الإشارة الموجبة للمتطابقة جيب نصف الزاوية:

$$\sin \frac{x}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos x}{2}}$$

متطابقة نصف الزاوية

$$= \sqrt{\frac{1 - (-\frac{3}{5})}{2}}$$

$$\cos x = -\frac{3}{5}$$

$$= \sqrt{\frac{\frac{8}{5}}{2}} = \frac{2}{\sqrt{5}}$$

بالتبسيط

$$= \frac{2\sqrt{5}}{5}$$

لإطلاق المقام

2 $\cos \frac{x}{2}$

$$\cos \frac{x}{2} = \sqrt{\frac{1 + \cos x}{2}}$$

صيغة نصف الزاوية

$$= \sqrt{\frac{1 + (-\frac{3}{5})}{2}}$$

$$\cos x = -\frac{3}{5}$$

$$= \sqrt{\frac{\frac{2}{5}}{2}} = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

تبسيط

$$= -\frac{\sqrt{5}}{5}$$

بتطابق المقام

الخطأ

بعد أن الزاوية $\frac{x}{2}$ تقع في الربع الثاني، لا ينبغي اختيار الإشارة السالبة لمطابقة جيب تمام نصف الزاوية.

3 $\tan \frac{x}{2}$

$$\tan \frac{x}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos x}{1 + \cos x}}$$

صيغة نصف الزاوية

$$= \sqrt{\frac{1 - (-\frac{3}{5})}{1 + (-\frac{3}{5})}}$$

$$\cos x = -\frac{3}{5}$$

$$= \sqrt{\frac{\frac{8}{5}}{\frac{2}{5}}} = \sqrt{\frac{8}{2}}$$

تبسيط

$$= -\sqrt{4} = -2$$

ربط الجذر التربيعي

في النطاق من $-\frac{\pi}{2}$ إلى $\frac{\pi}{2}$

الخطأ

بعد أن الزاوية $\frac{x}{2}$ تقع في الربع الثاني، لا ينبغي اختيار الإشارة السالبة لمطابقة جيب نصف الزاوية.

الخطأ

من الممكن حساب الفرق 3 من المثال 5 بطريقة أخرى! أوجد إجابتني.

إذا كان: $\sin x = \frac{2}{5}$ ، حيث $\frac{\pi}{2} < x < \pi$ ، فأوجد قيمة كل مما يأتي:

a) $\sin \frac{x}{2}$

b) $\cos \frac{x}{2}$

c) $\tan \frac{x}{2}$

مناظرة تحويل الجيوب إلى مجموع أو فرق

يمكن كتابة مقدار ضرب مثل $\sin M \cos N$ في صورة حاصل جمع الترانزات مثلثية أو طرحها، وذلك باستخدام منطقتي تحويل الجيوب إلى جمع.

متطابقات تحويل الفرق إلى مجموع أو فرق

مفهوم أساسي

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\cos (\alpha - \beta) - \cos (\alpha + \beta)]$$

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin (\alpha - \beta) + \sin (\alpha + \beta)]$$

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos (\alpha - \beta) + \cos (\alpha + \beta)]$$

مثال ٥

أعيد كتابة $\sin 3x \sin 5x$ في صورة مجموع أو فرق

$$\sin 3x \sin 5x = \frac{1}{2} [\cos (3x - 5x) - \cos (3x + 5x)]$$

$$= \frac{1}{2} [\cos (-2x) - \cos 8x]$$

$$= \frac{1}{2} \cos 2x - \frac{1}{2} \cos 8x$$

متطابقات تحويل الفرق إلى مجموع أو فرق

ببساطة

متطابقات الفرق

المثلثة وعدمية التوزيع

التحقق من فهمي

أعيد كتابة $\sin 7x \cos x$ في صورة مجموع أو فرق

ترتبط كل من متطابقات تحويل الفرق إلى مجموع والتي معكوبة إلى مجموع أو فرق بإحدى متطابقات تحويل المجموع أو الفرق إلى فرق.

متطابقات تحويل المجموع أو الفرق إلى فرق

مفهوم أساسي

$$\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \cos \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right)$$

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \cos \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right)$$

$$\sin \alpha - \sin \beta = 2 \cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \sin \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right)$$

$$\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \sin \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right)$$

مثال 7

أعيد كتابة $\sin 5x - \sin 3x$ في صورة ضرب.

$$\sin 5x - \sin 3x = 2 \cos \left(\frac{5x + 3x}{2} \right) \sin \left(\frac{5x - 3x}{2} \right)$$

مطابقة تحويل المجموع
أو الفرق إلى ضرب

$$= 2 \cos \left(\frac{8x}{2} \right) \sin \left(\frac{2x}{2} \right) = 2 \cos(4x) \sin(x)$$

نتيجة

التحقق من صحة: أريد كتابة $\cos 3x + \cos 2x$ في صورة ضرب.

يمكن استعمال المطابقات المثلثية المحذف الزاوية، والمطابقات المثلثية لعصف الزاوية، ومطابقات تحويل الضرب إلى مجموع أو فرق، في إثبات مطابقات مثلثة أخرى.

مثال 8

أثبت صحة كل مطابقة منطوق:

$$\frac{\sin 3x}{\sin x \cos x} = 4 \cos x - \sec x$$

الأنظ أن طرف المطابقة الأيسر أكثر تعقيداً؛ لذا نبدأ بالمقدار المثلثي الموجود فيه:

$$\frac{\sin 3x}{\sin x \cos x} = \frac{\sin(x + 2x)}{\sin x \cos x}$$

$$3x = x + 2x$$

$$= \frac{\sin x \cos 2x + \cos x \sin 2x}{\sin x \cos x}$$

مطابقة تحويل المجموع
أو الفرق

$$= \frac{\sin x (2 \cos^2 x - 1) + \cos x (2 \sin x \cos x)}{\sin x \cos x}$$

مطابقة عصف الزاوية

$$= \frac{\sin x (2 \cos^2 x - 1)}{\sin x \cos x} + \frac{\cos x (2 \sin x \cos x)}{\sin x \cos x}$$

كتابة الكسور في صورة
مجموع كسرين

$$= \frac{2 \cos^2 x - 1}{\cos x} + 2 \cos x$$

اختصار العامل المشترك في البسط والمقام

$$= 2 \cos x - \frac{1}{\cos x} + 2 \cos x$$

كتابة الكسور في صورة الفرق بين كسرين

$$= 4 \cos x - \sec x$$

مطابقات المقرب

$$2 \frac{\sin 3x - \sin x}{\cos 3x + \cos x} = \tan x$$

ألاحظ أن طرف المتطابقة الأيسر أكثر تعقيداً، لذا أبدأ بالمقادير المتشابهة الموجودة فيه:

$$\begin{aligned} \frac{\sin 3x - \sin x}{\cos 3x + \cos x} &= \frac{2 \cos \left(\frac{3x+x}{2} \right) \sin \left(\frac{3x-x}{2} \right)}{2 \cos \left(\frac{3x+x}{2} \right) \cos \left(\frac{3x-x}{2} \right)} && \text{تطبيقات تحويل الجيب} \\ &= \frac{2 \cos 2x \sin x}{2 \cos 2x \cos x} && \text{بالتبسيط} \\ &= \frac{\sin x}{\cos x} && \text{بإلغاء العامل المشترك} \\ &= \tan x \quad \checkmark && \text{التطابقات المتبادلة} \end{aligned}$$

انتقل من خصصي: أثبت صحة كل مطابقة مما يأتي:

a) $\frac{2 \tan x}{1 + \tan^2 x} = \sin 2x$

b) $\frac{\sin x + \sin y}{\cos x + \cos y} = \tan \left(\frac{x+y}{2} \right)$

أدب وطول المساق

أوجد قيمة كلٍّ من $\cos 2\theta$, $\sin 2\theta$, $\sin \frac{\theta}{2}$, $\cos \frac{\theta}{2}$ للزاوية θ في الفترة المعطاة:

1 $\sin \theta = \frac{5}{13}$, $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$

2 $\cos \theta = -\frac{\sqrt{6}}{3}$, $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$

3 $\tan \theta = \frac{1}{2}$, $\pi < \theta < \frac{3\pi}{2}$

4 $\csc \theta = -\sqrt{5}$, $\cos \theta < 0$

5 $\cot \theta = \frac{2}{3}$, $\sin \theta > 0$

6 $\sec \theta = 3$, $\sin \theta > 0$

استعمل المتطابقات المتطابقة لتقليل القوة في كتابة المقادير الآتية بدلالة القوة الأولى لتجيب التمام:

7 $\sin^4 x$


8 $\tan^4 x$

أوجد قيمة كلٍّ مما يأتي من دون استعمال الآلة الحاسبة:

9 $\cos 22.5^\circ$

10 $\sin 195^\circ$

11 $\tan \frac{7\pi}{8}$



استعمل الشكل المجاور لإيجاد قيمة كلٍّ من الاثلاثاء الآتية، عتدًا بأن:

$$f(x) = \sin x, g(x) = \cos x, h(x) = \tan x$$

12 $g(2\theta)$

13 $g\left(\frac{\theta}{2}\right)$

14 $f(2\pi)$

15 $h\left(\frac{\pi}{2}\right)$

أوجد كتابة كل مقدار عتدًا يأتي في صورة مجموع أو فرق:

16 $\sin 2x \cos 3x$

17 $\sin x \sin 5x$


18 $3 \cos 4x \cos 7x$

أوجد كتابة كل مقدار عتدًا يأتي في صورة ضرب:

19 $\sin x - \sin 4x$

20 $\cos 9x - \cos 2x$

21 $\sin 3x + \sin 4x$



الأوريغامي: يقوم فن الأوريغامي (فن طي الورق) الياباني على طي قطعة واحدة من الورق بصورة متكررة لصنع أشكال ثرية. فعدّ طي الجزء الأيمن إلى الأسفل من ورقة مستطيلة، يُعدها 21.6 cm و 28 cm ، كما في الشكل المجاور، فإنّ

طول خطّ الطي L يرتبط بالزاوية θ عن طريق العلاقة:

$$L = \frac{10.8}{\sin \theta \cos^2 \theta}$$

22 أثبت أن علاقة طول خطّ الطي تُكافئ العلاقة:

$$L = \frac{21.6 \sec \theta}{\sin 2\theta}$$

23 أجد طول خطّ الطي L إذا كانت $\theta = 30^\circ$



معلومة

استعمل فن الأوريغامي للتصليّة في حياتنا اليومية. تؤلّف خطّات يصنّفونهمون الزمن حتى أصبح فنّه أصوله وتوابعه الخاصة.

أرشد تصفح البرقي
المتوازي التوازي



أثبت صحة كلٍ من المتطابقات الآتية:

27 $\cos^2 5x - \sin^2 5x = \cos 10x$

28 $\cos x = \frac{1}{2} (\sin x \sin 2x + 2 \cos^2 x)$

29 $\cos 2x + 2 \cos x + 1 = 2 \cos x (\cos x + 1)$

29 $\sin 3x = 3 \sin x - 4 \sin^3 x$

30 $\tan 3x = \frac{3 \tan x - \tan^3 x}{1 - 3 \tan^2 x}$

30 $\sin x = 4 \cos \frac{x}{2} \cos \frac{x}{4} \sin \frac{x}{4}$

31 $\frac{\cos 2x}{\cos^2 x} + \tan^2 x = 1$

31 $\cos^2 2x = 4 \cos^4 x - 4 \cos^2 x + 1$


32 $\frac{2(\tan x - \cot x)}{\tan^2 x - \cot^2 x} = \sin 2x$

32 $\tan^2 \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right) = \frac{1 + \sin x}{1 - \sin x}$

33 $\cot^2 \frac{x}{2} = \frac{\sec x + 1}{\sec x - 1}$

33 $\ln |\sin x| = \frac{1}{2} (\ln |1 - \cos 2x| - \ln 2)$

تمارين الاختبار الحثي



تبرهن صحة المتطابقات الآتية:
 1. $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$
 2. $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$
 3. $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$

24 أعتبر دائرة بديلة الزاوية θ عن المساحة A للمسطط الموضح في الشكل المجانب، ثم أوجد إجابتني.

25 أبت أن: $A(\theta) = \sin 2\theta$ ثم أوجد إجابتني.

تحذير: أبت صحة كلٍ مما يأتي:

34 $\cos 4x = 1 - 8 \sin^2 x \cos^2 x$

35 $\cos^2 x \sin^4 x = \frac{1}{32} (2 - \cos 2x - 2 \cos 4x + \cos 6x)$

حلُّ المعادلات المثلثية

Solving Trigonometric Equations

حلُّ المعادلات المثلثية

مراجعة الدرس



المعادلة المثلثية، المعادلة المثلثية الأساسية

المصطلحات



مسألة تطبيق



يُحلَّن مدفع قذيفة بسرعة ابتدائية مقدارها v_0 قدمًا

لكل ثانية، وبزاوية مقدارها θ ، حيث $0^\circ < \theta < 90^\circ$.

وُضعت الاخترازين: $M(\theta) = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{64}$ لأجل أن أقصى ارتفاع تبلغه القذيفة بالاخترازين بدأ الترفُّش

أن $v_0 = 400$ ft/s، فأوجد قياس الزاوية θ ، علمًا بأن أقصى ارتفاع للقذيفة هو 625 ft.

يُطلق على المعادلة التي تحوي اخترازين مثلثة اسم **المعادلة المثلثية**

(trigonometric equation). وتُعدُّ المتطابقات المثلثية التي تعرَّفناها سابقًا حالة خاصة

من المعادلات المثلثية؛ لأنها صحيحة لجميع قيم المتغيرات المُعرَّفة عندما نحلُّ المعادلة،

ولكنَّ بعض هذه المعادلات تكون صحيحة فقط عند قيم مُحدَّدة مُلْتَقِطَةٍ. سأنعلم في هذا

الدرس كيفية إيجاد حلِّ لهذا النوع من المعادلات.

حلُّ المعادلات المثلثية الأساسية

المعادلة المثلثية الأساسية (basic trigonometric equation) هي معادلة في صورة


$T(\theta) = c$ ، حيث $T(\theta)$ اخترازين مثلثي، و c ثابت. نحلُّ أيَّ معادلة مثلثية، يجب تبسيطها بحيث

تصبح معادلة مثلثية أساسية للثامن المُهمِّم أولاً إنَّهنا نحلُّ المعادلات المثلثية الأساسية.

مثال 1

أحلُّ كل معادلة فيما يأتي:

$$\textcircled{1} \sin x = \frac{1}{2}$$



الحل: نجد الحل ضمن دورة واحدة.

بدأنا طول دورة اخترازين الجيب هو 2π ، فإنَّي أبدأ أولاً بإيجاد

حلِّ المعادلة ضمن الفترة $[0, 2\pi)$. وبالنزول إلى دائرة

الوحدة، نجد أن $\sin x = \frac{1}{2}$ في الربعين الأول، والثاني،

حيث يكون اخترازين الجيب موجبة.

إذن، يوجد حلان للمعادلة في الفترة $[0, 2\pi)$ ، هما:

$$x = \frac{\pi}{6} \quad , \quad x = \frac{5\pi}{6}$$


الخطوة ١: أجد جميع حلول المعادلة.

بما أن قيم الجيب تتكرر كل 2π وحدة، فإني أجد جميع حلول المعادلة بإضافة مضاعفات العدد 2π الصحيحة إلى كل من الحلين السابقين على النحو الآتي:


$$x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \quad , \quad x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$$

الدعم البياني

يُبين الشكل الآتي الشكل البياني للحلول:



2 $\cos x = -\frac{1}{\sqrt{2}}$



الخطوة ١: أجد الحل ضمن دورة واحدة.

بما أن طول دورة الجيب الكامل هو 2π ، فإني أبدأ أولاً بإيجاد حل المعادلة ضمن الفترة $[0, 2\pi)$ ، وبالرجوع إلى دائرة الوحدة، أجد أن $\cos x = -\frac{1}{\sqrt{2}}$ في الربعين الثاني والثالث، حيث يكون إشارة جيب التمام سالبة.

إذن، يوجد حلان للمعادلة في الفترة $[0, 2\pi)$ ، هما:

$$x = \frac{3\pi}{4} \quad , \quad x = \frac{5\pi}{4}$$

التلميح

لإيجاد الحل الربع الثاني والربع الثاني، أستخدم الزاوية المرجعية $\frac{\pi}{6}$.

$$\pi - \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}$$

التلميح

لإيجاد الحل الربع الثاني والربع الثالث، أستخدم الزاوية المرجعية $\frac{\pi}{4}$.

$$\pi + \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{4}$$


الخطوة 2 أوجد جميع حلول المعادلة

بما أن قيم الزاوية حيث التمام تتكرر كل 2π وحدة، فإنني أجد جميع حلول المعادلة بإضافة ملاحظات العدد 2π الصحيحة إلى كل من الحالتين السابقتين على النحو الآتي:

$$x = \frac{3\pi}{4} + 2k\pi \quad , \quad x = \frac{5\pi}{4} + 2k\pi \quad \text{حيث } k \text{ عدد صحيح}$$

العمق البياني

رسم الشكل الآتي التمثيل البياني للخطوة:



3 $\tan x = \sqrt{3}$

الخطوة 1 أجد الحل ضمن دورة واحدة

بما أن طول دورة الزاوية الفسل هو π ، فإنني أبدأ أولاً بإيجاد حل للمعادلة ضمن الفترة $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$. أعلم أن الزاوية التي ظلها $\sqrt{3}$ هي $\frac{\pi}{3}$ ، إذن فإن الحل الواقع ضمن هذه الفترة لهذه المعادلة هو $x = \frac{\pi}{3}$.


الخطوة 2 أجد جميع حلول المعادلة

بما أن قيم الزاوية الفسل تتكرر كل π وحدة، فإنني أجد جميع حلول المعادلة بإضافة ملاحظات العدد π الصحيحة إلى الحل السابق على النحو الآتي:

$$x = \frac{\pi}{3} + k\pi \quad \text{حيث } k \text{ عدد صحيح}$$



مِنَ الشَّكْلِ الْأَعْيُنِي التَّحْلِيلَ الَّتِي تَلْحَقُ بِهَا:



استخدم من خصي: أوجد كل معادلة متباينة:

a) $\sin x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

b) $\cos x = \frac{1}{2}$

c) $\tan x = -1$

تعلّمك في المثال السابق حول معادلات مثلثية أساسية نسب متساوية ذات زوايا خاصة. ولكن، إذا لم تكن الزوايا معروفة، فيمكنك استخدام الآلة الحاسبة لإيجادها.

مثال 2

أوجد كل معادلة متباينة:

1) $\cos x = 0.65$

الحل: أوجد الزاوية المرجعية باستخدام الآلة الحاسبة.

$\cos x = 0.65$

المعادلة الأصلية

$x = \cos^{-1}(0.65)$

بالاعتماد على نظرية المثلثات

≈ 0.86

استخدام الآلة الحاسبة

بما أن طول دورة الفترة ان جيب التمام هو 2π ، فإنّ أيّ زاوية أولاً يوجد حلّ المعادلة ضمن الفترة $(0, 2\pi)$ ، وبالترجوع إلى دائرة الوحدة، نجد أنّ $\cos x = 0.65$ في الربعين الأول والثاني. إذن، يوجد حلان للمعادلة في الفترة $(0, 2\pi)$ ، هما:

$x \approx 0.86$ $x \approx 5.42$

الذكر

لإيجاد قيم الزاوية، نستخدم الآلة الحاسبة حتى نصل إلى النتيجة.

التعلم

لإيجاد الحلّ الواقع في الربع الرابع، نخرج الزاوية المرجعية 0.86 من 2π :

$2\pi - 0.86 = 5.42$

الخطوة 2: أوجد جميع حلول المعادلة.

بما أن قيم الزاوية جيب التمام تتكرر كل 2π وحدة، فإنني أجد جميع حلول المعادلة بواسطة مطابقات العدد 2π الصحيحة إلى كل من الحلين السابقين على النحو الآتي:

$$x = 0.86 + 2k\pi \quad , \quad x = 5.42 + 2k\pi$$

حيث k عدد صحيح

1 $\tan x = -2$

الخطوة 1: أوجد الزاوية المرجعية باستخدام الآلة الحاسبة.

$$\tan x = -2$$

$$x = \tan^{-1}(-2) \\ = -1.11$$

أوجد القيمة

بخط \tan^{-1} على الآلة الحاسبة
بمستعمل الآلة الحاسبة

بما أن طول الدورة الزاوية 2π ، فإنني أجد حل المعادلة ضمن الفترة $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ للمعادلة حل واحد ضمن هذه الفترة، هو: $x = -1.11$

الخطوة 2: أوجد جميع حلول المعادلة.

بما أن قيم الزاوية الظل تتكرر كل π وحدة، فإنني أجد جميع حلول المعادلة بواسطة مطابقات العدد π الصحيحة إلى الحل السابق على النحو الآتي:

$$x = -1.11 + k\pi$$

حيث k عدد صحيح

التحقق من الحل: الخُلُوعُ كحل معادلة مثل ما يأتي:

a) $\sin x = 0.23$

b) $\tan x = -10$

حل معادلتين مثلثية تحتويان على مثلثية واحدة

يُمكن حل معادلات مثلثية تحتويان على مثلثية واحدة من طريق فصل هذا الاختزان في طرفي المعادلة أولاً، ثم إيجاد حل للمعادلة.

مثال 3 الخُلُوعُ كحل معادلة مثل ما يأتي:

1 $3 \sin x - 2 = 5 \sin x - 1$

الخطوة 1: أوجد الاختزان المتشابه في أحد طرفي المعادلة.

$$3 \sin x - 2 = 5 \sin x - 1$$

$$-2 \sin x - 2 = -1$$

أوجد القيمة

أخرج $5 \sin x$ من كلا الطرفين

التذكير

لإيجاد قيم الزاوية،
أعط الآلة الحاسبة على
نظام الزاويين

$$-2 \sin x = 1$$

$$\sin x = -\frac{1}{2}$$

الخطوة 1: أوجد الحلين

تقسمة طرفي المعادلة على -2

الخطوة 2: أوجد الحلين ضمن دورة واحدة:

بما أن طول دورة الفترة الجيب هو 2π ، فإني أبدأ أولاً بإيجاد حل للمعادلة ضمن الفترة $(0, 2\pi)$.
ويشترجني إلى دائرة الوحدة، أجد أن $\sin x = -\frac{1}{2}$ في الربعين الثالث والرابع.

إذن، يوجد حلان للمعادلة في الفترة $(0, 2\pi)$ ، هما:

$$x = \frac{7\pi}{6} \quad , \quad x = \frac{11\pi}{6}$$

الخطوة 3: أوجد جميع حلول المعادلة.

بما أن يتم اكتشافان الجيب تتكرر كل 2π وحدة، فإني أجد جميع حلول المعادلة بإضافة مضاعفات العدد 2π الصحيحة إلى كل من الحلين السابقين على النحو الآتي:

$$x = \frac{7\pi}{6} + 2k\pi \quad , \quad x = \frac{11\pi}{6} + 2k\pi$$

حيث k عدد صحيح

1 $\tan^2 x - 3 = 0$

الخطوة 1: أنقل الاكتران المثالي في أحد طرفي المعادلة.

$$\tan^2 x - 3 = 0$$

المعادلة تصبح:

$$\tan^2 x = 3$$

بإضافة 3 إلى طرفي المعادلة

$$\tan x = \pm \sqrt{3}$$

بأخذ الجذر التربيعي لكلا الطرفين

الخطوة 2: أوجد الحلين ضمن دورة واحدة:

بما أن طول دورة الفترة الظن هو π ، فإني أجد حل للمعادلة ضمن الفترة $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$.

إذن، يوجد حلان للمعادلة ضمن هذه الفترة، هما:

$$x = \frac{\pi}{3} \quad , \quad x = -\frac{\pi}{3}$$

التعلم

إيجاد الحل الواقع في

الربع الثالث، أضيف

الزاوية المرجعية $\frac{\pi}{6}$

إلى π

$$\pi + \frac{\pi}{6} = \frac{7\pi}{6}$$

ولأيجاد الحل الواقع

في الربع الرابع، أخرج

الزاوية المرجعية $\frac{\pi}{6}$ من

2π

$$2\pi - \frac{\pi}{6} = \frac{11\pi}{6}$$

الخطوة 4 أوجد جميع حلول المعادلة.

بما أن قيم الزوايا الظل تتكرر لكل π وحدة، فإنني أجد جميع حلول المعادلة بإضافة مضاعفات العدد π الصحيحة إلى كلٍّ من الحلين السابقين حتى النجوى التالي:

$$x = \frac{\pi}{3} + k\pi \quad ; \quad x = -\frac{\pi}{3} + k\pi \quad \text{حيث } k \text{ عدد صحيح}$$

التحقق من بعض

أحل كل معادلة مما يأتي:

a) $5 \sin x = 3 \sin x + \sqrt{3}$

b) $2 \cos^2 x - 1 = 0$

حل المعادلات التالفة بالتحليل

يمكن حل بعض المعادلات التالفة باستعمال التحليل، مثل المعادلات التي في صورة معادلة تربيعية، والمعادلات التي تتطلب إخراج عامل مشترك.

مثال 4

أحل كل معادلة مما يأتي في الفترة $(0, 2\pi)$:

1) $2 \sin^2 x - 3 \sin x + 1 = 0$

$$2 \sin^2 x - 3 \sin x + 1 = 0 \quad \text{المعادلة}$$

$$(2 \sin x - 1)(\sin x - 1) = 0 \quad \text{التحليل}$$

$$2 \sin x - 1 = 0 \quad \text{أو} \quad \sin x - 1 = 0 \quad \text{إضافة الثابت الطرفي}$$

$$\sin x = \frac{1}{2} \quad ; \quad \sin x = 1 \quad \text{وهذا الأخير طرفي حل معناه، وكذا طرفي المعادلة الأول على 2}$$

$$x = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6} \quad ; \quad x = \frac{\pi}{2} \quad \text{بحل المعادلة لكل في الفترة } (0, 2\pi)$$

إذن حلول المعادلة في الفترة $(0, 2\pi)$ هي: $x = \frac{\pi}{6}, x = \frac{5\pi}{6}, x = \frac{\pi}{2}$

1 $\cos x \sin x = 3 \cos x$

$$\cos x \sin x = 3 \cos x$$

المعادلة الخطية

$$\cos x \sin x - 3 \cos x = 0$$

بإضافة ترتيباً للمعادلة

$$\cos x (\sin x - 3) = 0$$

بتفريع العامل المشترك

$$\cos x = 0 \quad \text{or} \quad \sin x - 3 = 0$$

خاصية الضرب الصفرية

$$\cos x = 0$$

$$\sin x = 3$$

بإضافة 3 إلى طرفي المعادلة الثانية

$$x = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$$

حل المعادلة $\sin x$ في الفترة $[0, 2\pi)$

لا يوجد حل للمعادلة $\sin x = 3$ لأن القيمة العظمى لـ $\sin x$ هي 1

إذن، يوجد حلان للمعادلة في الفترة $[0, 2\pi)$ ، هما: $x = \frac{\pi}{2}, x = \frac{3\pi}{2}$

تحقق من فحوص

الحل كحل معادلة متنا يأتي في الفترة $[0, 2\pi)$

a) $2 \sin^2 x - \sin x - 1 = 0$

b) $\sin x \cos x = 2 \sin x$

حل المعادلات التفاضلية باستخدام التفاضل التفاضلية

تحتوي بعض المعادلات التفاضلية التفاضلية التفاضلية أو التفاضلية، ولكن يمكن فصل المتغيرات الأخرى عن المتغير التفاضلي والتفاضل باستخدام المتطابقات التفاضلية، وبهذه الطريقة يمكن حل بعض المعادلات التفاضلية.

أخطاء شائعة

تتبع الأخطاء الشائعة عند حل معادلات مثل $\cos x \sin x = 3 \cos x$ قسمة طرفي المعادلة على $\cos x$ ، وهذا يؤدي إلى افتراض الحلين فقط $\cos x = 0$ ، وهذا $x = \frac{\pi}{2}, x = \frac{3\pi}{2}$

التعميم

عند استخدام المتطابقات والتفاضل التفاضلية في حل المعادلات التفاضلية التفاضلية، يجب التحقق من صحة الحل بالتعويض في المعادلة الأصلية أو التحقق التفاضلية باستخدام المتطابقات التفاضلية.

أحلّ كل معادلة مثلًا يأتي في الفترة $(0, 2\pi)$:

1 $2 \cos^2 x + 3 \sin x = 0$

$$2 \cos^2 x + 3 \sin x = 0$$

احذف الجيب

$$2(1 - \sin^2 x) + 3 \sin x = 0$$

تطبيقات القانون

$$2 - 2 \sin^2 x + 3 \sin x = 0$$

تجميع الحدود

$$2 \sin^2 x - 3 \sin x - 2 = 0$$

حسب طريق الصفا في -1

$$(2 \sin x + 1)(\sin x - 2) = 0$$

تفكيك

$$2 \sin x + 1 = 0 \quad \text{or} \quad \sin x - 2 = 0$$

كتابة الحدود المنفرد

$$\sin x = -\frac{1}{2} \quad \sin x = 2$$

حلّ كل معادلة منفردة

$$x = \frac{7\pi}{6}, \frac{11\pi}{6}$$

حلّ المعادلة لكل في الفترة $(0, 2\pi)$

لا يوجد حلّ للمعادلة $\sin x = 2$ لأن القيمة العظمى لأي $\sin x$ هي 1

النتيجة

التحقق، أعرّض قيمتي x في المعادلة الأصلية

عندما $x = \frac{11\pi}{6}$

عندما $x = \frac{7\pi}{6}$

$$2 \cos^2 \left(\frac{11\pi}{6}\right) + 3 \sin \left(\frac{11\pi}{6}\right) \stackrel{?}{=} 0$$

$$2 \cos^2 \left(\frac{7\pi}{6}\right) + 3 \sin \left(\frac{7\pi}{6}\right) \stackrel{?}{=} 0$$

$$2 \left(\frac{3}{4}\right) + 3 \left(-\frac{1}{2}\right) \stackrel{?}{=} 0$$

$$2 \left(\frac{3}{4}\right) + 3 \left(-\frac{1}{2}\right) \stackrel{?}{=} 0$$

$$\frac{3}{2} + -\frac{3}{2} \stackrel{?}{=} 0$$

$$\frac{3}{2} + -\frac{3}{2} \stackrel{?}{=} 0$$

$$0 = 0 \quad \checkmark$$


$$0 = 0 \quad \checkmark$$

إذن، يوجد حلّان للمعادلة في الفترة $(0, 2\pi)$ ، هما: $x = \frac{7\pi}{6}$ ، $x = \frac{11\pi}{6}$

الدعم اليتاني



تحقق من صحة الحلّ من خلال المعادلة: $y = 2 \cos^2 x + 3 \sin x$ باستخدام برمجية جيبية، وملاحظة نقاط تقاطع منحنى المعادلة مع المحور x في الفترة: $[0, 2\pi)$.



2 $\sin 2x - \cos x = 0$

$$\sin 2x - \cos x = 0$$

المعادلة الأصلية

$$2 \sin x \cos x - \cos x = 0$$

صكبت صيغة الزاوية

$$\cos x(2 \sin x - 1) = 0$$

أخرج العامل المشترك

$$\cos x = 0 \quad \text{or} \quad 2 \sin x - 1 = 0$$

علمنا نظرية الضرب

$$\cos x = 0$$

$$\sin x = \frac{1}{2}$$

بمبدأ المعادلة التفاضلية

$$x = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$$

$$x = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}$$

بمبدأ حل معادلتين في الفترة $[0, 2\pi)$

التحقق:

للتحقق، أحوط يتم π في المعادلة الأصلية:

$$x = \frac{3\pi}{2} \text{ عندما}$$

$$x = \frac{\pi}{2} \text{ عندما}$$

$$x = \frac{5\pi}{6} \text{ عندما}$$

$$x = \frac{\pi}{6} \text{ عندما}$$

$$\sin 2\left(\frac{3\pi}{2}\right) - \cos\left(\frac{3\pi}{2}\right) \stackrel{?}{=} 0$$

$$\sin 2\left(\frac{\pi}{2}\right) - \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) \stackrel{?}{=} 0$$

$$\sin 2\left(\frac{5\pi}{6}\right) - \cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) \stackrel{?}{=} 0$$

$$\sin 2\left(\frac{\pi}{6}\right) - \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) \stackrel{?}{=} 0$$

$$0 - 0 \stackrel{?}{=} 0$$

$$0 - 0 \stackrel{?}{=} 0$$

$$-\frac{\sqrt{3}}{2} - \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \stackrel{?}{=} 0$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \stackrel{?}{=} 0$$

$$0 = 0 \quad \checkmark$$

$$0 = 0 \quad \checkmark$$


$$0 = 0 \quad \checkmark$$

$$0 = 0 \quad \checkmark$$

إذن، حلول المعادلة في الفترة $[0, 2\pi)$ هي: $x = \frac{\pi}{6}$, $x = \frac{5\pi}{6}$, $x = \frac{\pi}{2}$, $x = \frac{3\pi}{2}$.

العمق التالي

يمكن التحقق من صحة الحلّ بتعويض المعادلة: $y = \sin 2x - \cos x$ باستخدام برمجية جيبوجسار، وملاحظة تقاطع منحني المعادلة مع المحور x في الفترة $(0, 2\pi)$.



التحقق من الحل

أحل كل معادلة متناهي في الفترة $(0, 2\pi)$:

a) $2 \sin^2 x - 3 \cos x = 0$

b) $2 \sin 2x - 3 \sin x = 0$

صُلب حل بعض المعادلات المتناهي في الفترة $(0, 2\pi)$ لأنهم استعملوا المطابقات وقد لا يُحقق الناتج المعادلة الأصلية؛ لذا يجب التحقق من صحة الحل.

مثال 6

أحل المعادلة: $\cos x + 1 = \sin x$ في الفترة $(0, 2\pi)$

$\cos x + 1 = \sin x$

المراد المتطابق

$\cos^2 x + 2 \cos x + 1 = \sin^2 x$

تربيع الطرفين

$\cos^2 x + 2 \cos x + 1 = 1 - \cos^2 x$

مطابقات الجيبوجسار

$2 \cos^2 x + 2 \cos x = 0$

بالتبسيط

$2 \cos x (\cos x + 1) = 0$

بإخراج $2 \cos x$

$2 \cos x = 0$ or $\cos x + 1 = 0$

خاصية الضرب الصفرية

$\cos x = 0$

$\cos x = -1$

حل كل معادلة مستقلة

$x = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$

$x = \pi$

الحل كل معادلة في الفترة $(0, 2\pi)$

التلميح

أربع طرفي المعادلة متساوية لا تصدق المتطابقة:

$\cos^2 x + \sin^2 x = 1$


التحقق:

لتتحقق، أختبر في قيم x في المعادلة الأصلية:

عندما $x = \pi$:	عندما $x = \frac{\pi}{2}$:	عندما $x = \frac{3\pi}{2}$:
$\cos(\pi) + 1 \stackrel{?}{=} \sin(\pi)$	$\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + 1 \stackrel{?}{=} \sin\left(\frac{\pi}{2}\right)$	$\cos\left(\frac{3\pi}{2}\right) + 1 \stackrel{?}{=} \sin\left(\frac{3\pi}{2}\right)$
$-1 + 1 \stackrel{?}{=} 0$	$0 + 1 \stackrel{?}{=} 1$	$0 + 1 \stackrel{?}{=} -1$
$0 = 0$ ✓	$1 = 1$ ✓	$1 \neq -1$ ✗

إذن، يوجد حلان للمعادلة في الفترة $(0, 2\pi)$ ، هما: $x = \frac{\pi}{2}$ ، $x = \pi$.

التحقق
الحل المتكهن هو حل
لا يتحقق المعادلة
الأصلية.



التعميم البياني:

يمكنني التحقق من صحة الحل بتسجيل المعادلتين: $y = \cos x + 1$ و $y = \sin x$. باستخدام برمجية جبر جبراء وملاحظة نقاط تقاطع منحنى المعادلتين في الفترة $(0, 2\pi)$.

انتقل من هنا: أنحل المعادلة: $\cos x - \sin x = 1$ في الفترة $(0, 2\pi)$.

حل معادلات مثلثية تحتوي على الزاوية ضعف الزاوية

يمكن حل معادلات مثلثية تحتوي على الزاوية ضعف الزاوية، بحل المعادلة لإيجاد قيمة النسبة المثلثية لضعف الزاوية أولاً ثم إجراء عملية القسمة لإيجاد قياس الزاوية.

مثال 7

أنحل المعادلة: $\cos x \sin x = -\frac{1}{2}$ في الفترة $(0, 2\pi)$.

$\cos x \sin x = -\frac{1}{2}$	المعادلة المبدأ
$2 \cos x \sin x = -1$	بحسب طرفي المعادلة في 2
$\sin 2x = -1$	استخدمت هوية التوافق

بما أن الحلّ الوحيد للمعادلة $\sin \theta = -1$ في الفترة $[0, 2\pi)$ هو $\frac{3\pi}{2}$ ، فإن $2x = \frac{3\pi}{2}$.
ومن ثمّ فإنّ جميع حلول المعادلة $\sin 2x = -1$ تُكتب في صورة:

$$2x = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi \quad \text{كل عدد صحيح}$$

$$x = \frac{3\pi}{4} + k\pi \quad \text{كل عدد صحيح}$$

يمكن إيجاد حلول المعادلة $\sin 2x = -1$ في الفترة $[0, 2\pi)$ على المحور الآتي:

$$x = \frac{3\pi}{4} + (0)\pi = \frac{3\pi}{4}, \quad x = \frac{3\pi}{4} + (1)\pi = \frac{7\pi}{4}, \quad x = \frac{3\pi}{4} + (2)\pi = \frac{11\pi}{4}$$

إذن، يوجد حلان للمعادلة في الفترة $[0, 2\pi)$ ، هما: $x = \frac{3\pi}{4}$ ، $x = \frac{7\pi}{4}$.

التحقّق من إجابتي

أحلّ المعادلة: $2 \cos 2x = 1$ في الفترة $[0, 2\pi)$.

حلّ معادلات مثلثية لحواف مثلث قائم الزاوية

يمكن حلّ معادلة مثلثية تحوي الحواف مثلثاً لصف الزاوية، بحلّ المعادلة لإيجاد قيمة النسبة المثلثية نصف الزاوية أولاً، ثم إجراء عملية العكس لإيجاد قياس الزاوية.

مثال 6

أحلّ المعادلة: $2 \sin \frac{x}{2} - \sqrt{3} = 0$ في الفترة $[0, 2\pi)$.

$$2 \sin \frac{x}{2} - \sqrt{3} = 0 \quad \text{المعادلة}$$

$$2 \sin \frac{x}{2} = \sqrt{3} \quad \text{جمع الطرفين للمعادلة}$$

$$\sin \frac{x}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \text{بقسمة طرفي المعادلة على 2}$$

بما أن حلّ المعادلة $\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ في الفترة $[0, 2\pi)$ هما $\frac{\pi}{3}$ و $\frac{2\pi}{3}$ ، فإنّ

$$\frac{x}{2} = \frac{\pi}{3} \quad , \quad \frac{x}{2} = \frac{2\pi}{3}$$

التلميح

استمر في تعويض قيم x في المعادلة حتى تجد الحل على زاوية أكبر من 2π .

الدعم البياني

أوجد جذور المعادلتين:

$$y = \cos x \sin x$$

و $y = \frac{1}{2}$ بيانياً، باستخدام برمجية جبر جبراء التفاضل. تخيّل المعادلتين عندما $x = \frac{3\pi}{4}$ ، $x = \frac{7\pi}{4}$ في الفترة $[0, 2\pi)$.



وبناءً على ذلك فإن جميع حلول المعادلة: $\sin \frac{x}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ يُكتب في صورة:

$$\frac{x}{2} = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$$

$$\frac{x}{2} = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi$$

النتيجة

$$x = \frac{2\pi}{3} + 4k\pi$$

$$x = \frac{4\pi}{3} + 4k\pi$$

المرحلة الثانية

ألاحظ أنه عند تعويض $k=0$ في المعادلتين: $x = \frac{2\pi}{3} + 4k\pi$, $x = \frac{4\pi}{3} + 4k\pi$ فإن الناتج هو $x = \frac{2\pi}{3}$, $x = \frac{4\pi}{3}$ على الترتيب، ضمن الفترة $[0, 2\pi)$. أما عند تعويض قيم أخرى فإن الناتج يكون خارج الفترة.

إذن، يوجد حلان للمعادلة في الفترة $[0, 2\pi)$ ، هما: $x = \frac{2\pi}{3}$, $x = \frac{4\pi}{3}$.

التحقق من الحلين

الحل للمعادلة: $2 \cos \frac{x}{2} - 1 = 0$ في الفترة $[0, 2\pi)$.

التحليل البياني

ألاحظ من الشكل

التالي للمعادلة:

$$y = 2 \sin \frac{x}{2} - \sqrt{3}$$

بالصورة يوجد

جذوران تقاطع منحنى

المعادلة مع المحور x

$$x = \frac{2\pi}{3}, x = \frac{4\pi}{3}$$

في الفترة $[0, 2\pi)$.



أنتبه! وأظن المسائل

أحلّ كلًا من المعادلات الآتية لقيم x جميعها:

1 $2 \sin x + 3 = 2$

2 $1 - \cos x = \frac{1}{2}$

3 $\sin x = -0.3$

4 $\cos x = 0.32$

5 $\tan x = 5$

6 $\sec^2 x - 2 = 0$

7 $\cot x + 1 = 0$

8 $\csc^2 x - 4 = 0$

9 $3\sqrt{2} \cos x + 2 = -1$

أحلّ كلًا من المعادلات الآتية في الفترة $[0, 2\pi)$:

10 $\cos^2 x - \sin^2 x + \sin x = 0$

11 $3 \sin^2 x - 7 \sin x + 2 = 0$

12 $2 \cos^2 x + \cos x = 0$

13 $\tan^4 x - 13 \tan^2 x + 36 = 0$

14 $\sin x + 2 \sin x \cos x = 0$

15 $\tan^2 x \cos x = \tan^2 x$

أحلّ كلًا من المعادلات الآتية في الفترة $[0, 2\pi)$:

16 $2 \cos^2 x + \sin x = 1$

17 $\tan^2 x - 2 \sec x = 2$

18 $\csc^2 x = \cot x + 3$

19 $\sin 2x = 3 \cos 2x$

20 $4 \sin x \cos x + 2 \sin x - 2 \cos x - 1 = 0$



أطوار القمر: عندما يتغير القمر حول الأرض، فإن الخناب المواجه للأرض يتكون في الغالب من ثلاثة أجزاء بواسطة الشمس. تُعرف أطوار القمر بمقدار الجزء الظاهر من سطحه بسبب سقوط ضوء الشمس عليه، ويعطى مقياس لكي للطور بالعلاقة: $F = \frac{1}{2}(1 - \cos \theta)$ ، حيث θ الزاوية بين الأرض والشمس والقمر ($0^\circ \leq \theta \leq 360^\circ$). أوجد قياس الزاوية θ لكل طور منطابقاً:

1 القمر الجديد ($F = 0$)

2 الهلال ($F = 0.25$)

3 القمر المكتمل ($F = 1$)

أحلّ تَمَّلاً من المعادلات الآتية في الفترة $[0, 2\pi)$:

33 $\sin 2x + \cos x = 0$

34 $\tan \frac{x}{2} - \sin x = 0$

35 $2 \sin^2 x = 2 + \cos 2x$

36 $2 \sin^2 \frac{x}{2} - 3 \cos \frac{x}{2} = 0$

37 $\sin x - \sqrt{3} \cos x = 0$

38 $\cos 2x = \cos x$

مهارات التفكير العليا

تبرير: إذا كان: $\tan x + \frac{k}{\tan x} = 2$ ، حيث k ثابت، فأجيب عما يأتي:

39 أثبت عدم وجود حل للمعادلة عندما $k > 1$ ، ثم أذكر إجابتني.

40 أتحلّ المعادلة عندما $k = -8$ ، حيث: $-\pi < x < \pi$ ، ثم أذكر خطوات الحل.

41 تبرير: أجد جميع الحلول الممكنة للمعادلة: $\sin(\cos x) = 0$ ، ثم أذكر إجابتني.

42 تحلّ أتحلّ المعادلة: $\tan x + \cot x = 5$ ، حيث: $0 \leq x < 2\pi$.

6. أوجد الأتيه ليكني: $\sin x + \cot x \cos x$

- a) $2 \sin x$ b) $\frac{1}{\sin x}$
 c) $\cos^2 x$ d) $\frac{\sin x \cos x}{\sin^2 x}$

7. أوجد الأتيه لا يُعَدُّ حلاً للمعادلة:

$$\sin x + \cos x \tan^2 x = 0$$

- a) $\frac{3\pi}{4}$ b) $\frac{7\pi}{4}$
 c) 2π d) $\frac{5\pi}{2}$

8. أوجد الأتيه يُعَدُّ حلاً للمعادلة: $2 \cos x = 1$

- a) $\frac{8\pi}{3}$ b) $\frac{13\pi}{3}$
 c) $\frac{10\pi}{3}$ d) $\frac{15\pi}{3}$

9. أوجد الأتيه ليكني للمقدار: $\frac{\cos x (\cot^2 x + 1)}{\csc x}$

- a) $\tan x$ b) $\cot x$
 c) $\sec x$ d) $\csc x$

10. أوجد المقادير الأتيه ليكني استعماله ليكني متطابقة مع المقادير: $\frac{\sec x + \csc x}{1 + \tan x}$ ، حيث: $\tan x \neq -1$

المقادير: $\frac{\sec x + \csc x}{1 + \tan x}$ ، حيث: $\tan x \neq -1$

- a) $\sin x$ b) $\cos x$
 c) $\tan x$ d) $\csc x$

أوجد قيمة كل مما يأتي من دون استعمال الآلة الحاسبة:

- (A) $3 \cos 37.5^\circ \sin 37.5^\circ$
 (B) $\cos \frac{\pi}{12} + \cos \frac{5\pi}{12}$
 (C) $\cos 255^\circ - \cos 195^\circ$

أختار رمز الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي:

11. إذا كان $\cot \theta = 1$ ، فإن $\tan \theta$ يسوي:

- a) -1 b) 1
 c) 0 d) 3

12. إذا كان $\cos x = -0.45$ ، فإن قيمة $\sin(\frac{\pi}{2} - x)$ هي:

- a) -0.55 b) -0.45
 c) 0.45 d) 0.55

13. المعادلة غير الصحيحة مما يأتي هي:

- a) $\tan(-x) = -\tan x$
 b) $\tan(-x) = \frac{1}{\cot(-x)}$
 c) $\tan(-x) = \frac{\sin(-x)}{\cos(-x)}$
 d) $\tan(-x) + 1 = \sec(-x)$

14. أوجد الأتيه ليكني للمقدار: $\frac{1 - \sin^2 x}{1 - \cos^2 x} \times \tan x$

- a) $\tan x$ b) $\sin x$
 c) $\cot x$ d) $\cos x$

15. أوجد الأتيه لا يُكني $\cos x$ ، حيث: $0 < x < \frac{\pi}{2}$

- a) $\frac{\cos x}{\cos^2 x + \sin^2 x}$ b) $\cot x \sin x$
 c) $\frac{1 - \sin^2 x}{\cos x}$ d) $\tan x \csc x$

أوجد قيمة كل مما يأتي من دون استعمال الآلة الحاسبة:

25 $\tan(-15^\circ)$ 26 $\sin \frac{7\pi}{12}$


27 $\frac{\tan 20^\circ + \tan 25^\circ}{1 - \tan 20^\circ \tan 25^\circ}$

28 $\cos \frac{5\pi}{12} \cos \frac{7\pi}{12} - \sin \frac{5\pi}{12} \sin \frac{7\pi}{12}$

29 أنحل المعادلة الآتية، وأضعين بالشكل التالي في عملية التحل:

$$\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) - \sin\left(\frac{\pi}{4} - x\right) = 0$$

حيث $0 \leq x \leq 2\pi$



أبسط كلًا من المقدارين الآتية باستعمال المطابقات المتشابهة لأضعف الزاوية، أو المطابقات المتشابهة لضعف الزاوية:

30 $\cos^2 5x - \sin^2 5x$

31 $2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}$ 32 $\sqrt{\frac{1 - \cos 2x}{2}}$

أنحل كلًا من المعادلات الآتية في الفترة $(0, 2\pi)$:

33 $4 \sin x - 3 = 0$ 34 $\frac{1 - \cos x}{1 + \cos x} = 3$

35 $\cos x \sin x - \sin x = 0$

36 $\sin x - 2 \sin^2 x = 0$


37 $\sin x - \cos x - \tan x = -1$

38 $\sin x - \cos x = \frac{1}{2}$

39 $\tan 3x + 1 = \sec 3x$

40 عارضة خشبية يراود قوس قطعة خشبية على شكل

منشور قاعدة مسطوية من قطعة خشب على شكل أسطوانة، طول قطرها 20 in كما هو مبين في الشكل



المجاور. أبت أن يُمكن تحييل مساحة المقطع العرضي لقطعة الخشبية باستعمال الآخرة:

$$A(\theta) = 200 \sin 2\theta$$

أبت صحة كل من المطابقات الآتية:

41 $\tan y = \frac{\sin(x+y) - \sin(x-y)}{\cos(x+y) + \cos(x-y)}$

42 $4(\sin^4 x + \cos^4 x) = 4 - 3 \sin^2 2x$

43 $\ln |\cos x| = \frac{1}{2} (\ln |1 + \cos 2x| - \ln 2)$

44 $\sec 2x = \frac{\sec^2 x}{2 - \sec^2 x}$

45 $\tan \frac{x}{2} = \csc x - \cot x$

46 إذا كانت θ الزاوية حادة، وكان $\cos \theta = \frac{4}{5}$ ، فأثبت أن:

$$\cos\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{10}$$

أبت صحة كل من المطابقات الآتية:

47 $\frac{\sin x - \cos x}{\sec x} = \sin^2 x$

48 $(\sin x + \cos x)^4 = (1 + 2 \sin x \cos x)^2$

49 $\cot(x+y) = \frac{\cot x \cot y - 1}{\cot x + \cot y}$

50 $\frac{\sin x \sec x}{\tan x} = 1$

51 $\ln |\sec \theta| = -\ln |\cos \theta|$

ما أهمية هذه
الوحدة؟

يُعدُّ التفاضل أحد أكثر فروع الرياضيات استخدامًا في التطبيقات العلمية إذ يُمكن عن طريقه حساب معدل تغير كمية ما بالنسبة إلى كمية أخرى، مثل سرعة الجسم المتحرك وتساوره بالنسبة إلى الزمن. يُستعمل التفاضل أيضًا في الحسابات الكيميائية لإيجاد معدل تغير كتلة المادة المشعة بالنسبة إلى الزمن، وتحديد مقدار الكتلة في أيّ زمن.

سأتعلم في هذه الوحدة:

- إيجاد مشتقات التفاضل مختلفة.
- إيجاد مشتقة ضرب التفاضل، ومشتقة قسمة التفاضل.
- إيجاد مشتقات التفاضل باستخدام قاعدة السلسلة.
- إيجاد المشتقات للعلاقات الضمنية.
- حل مسائل هندسية وفيزيائية وتطبيقات حياتية على المشتقات.
- حل مسائل وتطبيقات حياتية على المعدلات المتغيرة بالتزامن.

تعلمت سابقاً:


- ✓ إيجاد مشتقة التفاضل التفاضل.
- ✓ استعمال قاعدة السلسلة لإيجاد مشتقة تركيب التفاضل.
- ✓ حل مسائل هندسية وفيزيائية وتطبيقات حياتية على المشتقات.

استعمل تدريبات (أستخذ لدراسة الوحدة) في الصفحات (28-23) من كتاب المتارين المرجعة هذه الموضوعات قبل البدء بدراسة الوحدة.

مشتقة اقترانات خاصة Differentiation of Special Functions

- إيجاد مشتقات الاقترانات الأسي، اللوغاريتمي، الطبيعي، الجيب، جيب التمام.
- إيجاد ميل المماس ومعادلة كل من المماس والعمودي على المماس عند نقطة ما على منحنى الاقتران.
- إيجاد السرعة والمسار لجسيم يتحرك في مسار مستقيم.

فترة الدرس



بين الشكل المجاور منحنى الاقتران: $f(x) = x^2 - 2x$

مسألة اليوم



(1) أوجد معادلة المماس لمنحنى الاقتران f عند النقطة A .

(2) أوجد معادلة العمودي على المماس لمنحنى


الاقتران f عند النقطة A .

مشتقة الاقتران الأسي الطبيعي

تعلمت سابقاً إيجاد مشتقة الاقتران الثابت ومشتقة اقتران القوة باستخدام قواعد خاصة.

وسأتعلم الآن إيجاد مشتقة الاقتران الأسي الطبيعي، ومشتقة الاقتران اللوغاريتمي الطبيعي، ومشتقة اقتران الجيب، ومشتقة اقتران جيب التمام.

أختر من أن (x, y) و $(x + \Delta x, y + \Delta y)$ نقطتان، كل منهما قريبة من الأخرى، وأهبطا نقطتان:



على منحنى الاقتران: $f(x) = e^x$

إذن، الفرق بين الإحداثي y للنقطتين هو:

$$\Delta y = e^{x+\Delta x} - e^x$$

ومن هنا فإن ميل المماس عند (x, y) والنقطتين

(x, y) و $(x + \Delta x, y + \Delta y)$ هو:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{e^{x+\Delta x} - e^x}{\Delta x} = \frac{e^x(e^{\Delta x} - 1)}{\Delta x}$$

التذكير

يسمى العدد الأسي الطبيعي، أو العدد اليوري، وهو عدد غير نسبي، ويسمى الاقتران $f(x) = e^x$ الاقتران الأسي الطبيعي.

إذن ميل المماس عند النقطة (x, y) هو:

$$m = f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{e^{x+\Delta x} - e^x}{\Delta x} = e^x \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{e^{\Delta x} - 1}{\Delta x}$$

ولكن، ما قيمة: $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{e^{\Delta x} - 1}{\Delta x}$ ؟

يمكن الاستعانة بجداول القيم الأسي لإيجاد قيمة: $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{e^{\Delta x} - 1}{\Delta x}$

Δx	-0.1	-0.01	-0.001	0	0.001	0.01	0.1
$\frac{e^{\Delta x} - 1}{\Delta x}$	0.9516	0.9950	0.9995		1.0005	1.0050	1.0517

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{e^{\Delta x} - 1}{\Delta x} = 1$$

الأرجح من الجدول السابق أن

إذن ميل المماس عند النقطة (x, y) هو:

$$m = f'(x) = e^x \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{e^{\Delta x} - 1}{\Delta x} = e^x$$

وبما يعني أن ميل المماس عند أي نقطة تقع على منحنى الاقتران الأسي الطبيعي هو الإختالي لهذه النقطة.

مشكلة الاقتران الأسي الطبيعي

نظرة

إذا كان $f(x) = e^x$ ، حيث e العدد البيري، فإن:

$$f'(x) = e^x$$

تنبه

لا تُعَدُّ الأضربوت التي سبقه النظرية وهاتان عليه، وأما هذه النظرية، وتُعدُّ محوريها.

مثال 1

أوجد مشتقة كل اقتران مما يأتي:

1 $f(x) = 3e^x$

$f(x) = 3e^x$

$f(x) = 3e^x$

الفرق الحصر

توجد مشتقة لمعادلات الاقتران ومشتقة الاقتران الأسي الطبيعي

المفرد

- $(af(x))' = af'(x)$
- $(x^n)' = nx^{n-1}$
- $(f \pm g)'(x) = f'(x) \pm g'(x)$

2) $f(x) = x^2 + e^x$

$f(x) = x^2 + e^x$

الاتزان المبسط

$f'(x) = 2x + e^x$

الربط بين مشتقات التفاضل والنسبة، والاتزان الأسي الطبيعي

3) $y = \frac{\sqrt{x} - 2e^x}{x}$

$y = \frac{\sqrt{x} - 2e^x}{x} = \frac{\sqrt{x}}{x} - \frac{2e^x}{x}$

توزيع المقام على البسط

$= \frac{x^{1/2}}{x} - \frac{2e^x}{x}$

كتابة الأجزاء في صورة أسية

$= x^{-1/2} - 2e^x$

ببساطة

$\frac{dy}{dx} = -\frac{2}{3}x^{-3/2} - 2e^x$

الربط بين مشتقات التفاضل، والاتزان الأسي

الطبيعي، ومساومات الاتزان

$= -\frac{2}{3\sqrt{x}} - 2e^x$

تحريف الأثر السالب والصورة العكسية

في التفاضل من مخصص

أوجد مشتقة كل اقتران مما يأتي:


a) $f(x) = 5e^x + 3$

b) $f(x) = \sqrt{x} - 4e^x$

c) $y = 8e^x + \frac{4}{\sqrt{x}}$

مشتقة الاقتران اللوغاريتمي الطبيعي

في الشكل الأسي متحلي الاقتران: $f(x) = e^x$, $g(x) = \ln x$



التفاضل

الاتزان اللوغاريتمي

$y = \ln x$ الطبيعي

هو الاقتران العكسي

للاقتران الأسي الطبيعي

$y = e^x$

الأرجح من التمثيل البياني أن ميل المماس عند النقطة A الواقعة على منحنى الأثران: $f(x) = \ln x$ هو: $\frac{CH}{AB}$ إذن:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{CH}{AB}$$

بما أن المثلث DEF هو انعكاس للمثلث ABC حول المصنف $y = x$ ، فإنهما متطابقان، لذا فإن:

$$\frac{CH}{AB} = \frac{FE}{DE}$$

وبما أن $\frac{DE}{FE}$ هو ميل المماس لمنحنى الأثران: $f(x) = e^x$ عند النقطة D ، فإن:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{CH}{AB} = \frac{FE}{DE} = \frac{1}{\frac{DE}{FE}}$$

وبما أن ميل المماس عند أي نقطة تقع على منحنى الأثران الأسي الطبيعي هو الإحداثي y لهذه النقطة، فهذا يعني أن ميل المماس عند النقطة D هو الإحداثي y للنقطة D ، وبسبب الانعكاس، فإن الإحداثي y للنقطة D هو الإحداثي x للنقطة A ، وبذلك، فإن:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{CH}{AB} = \frac{FE}{DE} = \frac{1}{\frac{DE}{FE}} = \frac{1}{x}$$

مشكلة الأثران اللوغاريتمي الطبيعي

نقطة

إذا كان: $f(x) = \ln x$ حيث: $x > 0$ ، فإن:

$$f'(x) = \frac{1}{x}$$

يتميز هذا المنحنى بأنه متصل، لا يتقاطع مع نفسه، يمر في كل ربع من الأرباع الأربعة.

تعلقتك، مدافعاً في الزين الضرب والتقسمة والقوة اللوغاريتمات، وتُمكنني استعمال هذه القوانين مع النظرية السابقة لإيجاد مشتقة الأثران يحوي اللوغاريتم الطبيعي.

قوانين اللوغاريتمات

مراجعة المفهوم

إذا كانت x, y, b أعداد حقيقية موجبة، وكان p عدداً حقيقياً، حيث: $b \neq 1$ ، فإن:

$\log_b xy = \log_b x + \log_b y$ ✓ قانون الضرب

$\log_b \frac{x}{y} = \log_b x - \log_b y$ ✓ قانون القسمة

$\log_b x^p = p \log_b x$ ✓ قانون القوة

التفكير

الانعكاس هو تحويل هندسي يحول الشكل من إحدى جهتي محور الانعكاس إلى الجهة الأخرى على المسافة من محور الانعكاس، من دون تغيير أبعاد الشكل أو تدويره، بوجه عام، فإن الأثران f والأثران العكسي له متطابقان حول المحور $y = x$.

التفكير

مجال الأثران $\ln x$ هو $(0, \infty)$.

التفكير

لعدداً يشترط أن $b \neq 1$.

مثال 2

أوجد مشتقة كل اقتران منا يأتي:

1) $f(x) = \ln(x^4)$

$$f(x) = \ln(x^4)$$

$$= 4 \ln x$$

$$f'(x) = \frac{4}{x}$$

الاقتران البسيط

تحويل القوة في القواعد

قاعدة مشتقة معاملات الاقتران

ومشتقة الاقتران البسيط هي الطبيعي

التذكر

المعادلة الطبيعية $\ln x$
هو لو كان رقم أساس العدد
الطبيعي e ومن الشكل
كتابة في صورة $\log_a x$

2) $f(x) = \ln(xe^x) + \ln(7x)$

$$f(x) = \ln(xe^x) + \ln(7x)$$

$$= \ln x + \ln e^x + \ln 7 + \ln x$$

$$= 2 \ln x + x + \ln 7$$

$$f'(x) = \frac{2}{x} + 1$$

الاقتران البسيط

لأن الاقتران في القواعد

بالتبسيط والتبسيط الخاص بالأسس

القواعد

لوحده مشتقات الاقتران البسيط الطبيعي

والاقتران القوة والتبسيط

استفاد من التبسيط

أوجد مشتقة كل اقتران منا يأتي:


a) $f(x) = \sqrt{x} + \ln(4x)$

b) $f(x) = \ln(2x^3)$

مشاهدة اقتران الجيب، ومشتقة اقتران جيب التمام

تعلمت سابقاً أن الاقتران ذات العكسية هي قواعد معطاة باستخدام النسب العكسية، وسأتعلم الآن إيجاد مشتقة كل من الاقتران الجيب، والاقتران جيب التمام.

يتمثل الشكل الآتي كلاً من التمثيل البياني لمنحني الاقتران: $f(x) = \sin x$ حيث x قياس الزاوية بالراديان، والتمثيل البياني لمنحني $f'(x)$ الذي يُرسم باستخدام ميل النقطتين لمنحني $f(x)$.



يظهر من الشكل السابق أن منحدر $f'(x)$ مطابق تمامًا لمنحني جيب التمام ما يعني أن:
 $f'(x) = \cos x$ ويمكن بطريقة مشابهة استنتاج أن مشتقة القوس جيب التمام هي العكس
 منحني القوس الجيب حول المحور x .

تنبه
 لا يوجد الرسم أدناه وإنما
 للظلال ولكنه يعطي
 تصورًا جيدًا

مشتقة القوس الجيب، ومشتقة القوس جيب التمام

نظرة

- إذا كان: $f(x) = \sin x$ ، فإن: $f'(x) = \cos x$
- إذا كان: $f(x) = \cos x$ ، فإن: $f'(x) = -\sin x$

مثال 3

أوجد مشتقة كل اقتران من الأتي:

- 1 $f(x) = 3 \sin x + 4$
- $f(x) = 3 \sin x + 4$
- $f(x) = 3 \cos x$

الاقتران الخطي
 لإيجاد مشتقات القوس الجيب، ومشتقات القوس
 جيب التمام، والمضروب

$$3) y = \frac{1}{2} e^x - 7 \cos x$$

$$y = \frac{1}{2} e^x - 7 \cos x$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2} e^x + 7 \sin x$$

الانكسار المنظم

توجد مشتقات الانكسار الأسي (الخطي) والمثلثات
الانكسار، والفرق بين الصواب والخطأ

من المنقول من المهم

أوجد مشتقة كل فقرتين معنا يأتي:

$$\Rightarrow y = \frac{\sin x}{2} + 3 \cos x$$

$$b) f(x) = x^2 + \cos x + \sin \frac{\pi}{2}$$

الملاحظة: معادلة المماس والعمودي عند النقطة \ln

يمكن استعمال أي من قواعد الاشتقاق التي تعلمتها في هذا القسم لإيجاد معادلة المماس
عند نقطة ما على منحنى الانكسار.

مثال 4

إذا كان الانكسار: $f(x) = \ln\left(\frac{x}{e}\right)$ ، فأستعمل المشتقة لإيجاد كل ما يأتي:

معادلة المماس عند النقطة $(1, -1)$.

الخطوة 1: أوجد ميل المماس عند النقطة $(1, -1)$.

$$f(x) = \ln\left(\frac{x}{e}\right)$$

$$= \ln x - \ln e$$

$$= \ln x - 1$$

$$f'(x) = \frac{1}{x}$$

$$f'(1) = \frac{1}{1} = 1$$

الانكسار المنظم

القواعد الخاصة باللوغاريتمات

الخاصة الأسية في التفاضل

توجد مشتقات الانكسار التفاضلي الطبيعي، والخطي والفرق

يصير $e = 1$

إذن، ميل المماس هو 1

انكسار

بمعنى $a \neq b$

حيث $b > 0$ ، $b \neq 1$

$\log_b b = 1$

الخطوة 1 إيجاد معادلة المماس:

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y - (-1) = 1(x - 1)$$

$$y = x - 2$$

معادلة المماس عند النقطة (1, -1)

$$x_1 = 1, y_1 = -1, m = 1$$

بالتعويض

إذن، معادلة المماس هي: $y = x - 2$.

2 معادلة العمودي على المماس عند النقطة (1, -1):

بما أن ميل المماس عند النقطة (1, -1) هو 1، فإن ميل العمودي على المماس هو -1.

ومن هنا، فإن معادلة العمودي على المماس عند النقطة (1, -1) هي:

$$y - (-1) = -1(x - 1)$$

$$y = -x$$

التحقق من قصدي

إذا كان الاقتران $f(x) = \ln \sqrt{x}$ ، فاستعمل المشتقة لإيجاد كلٍ مما يأتي:

(a) معادلة المماس عند النقطة $(e, \frac{1}{2})$.

(b) معادلة العمودي على المماس عند النقطة $(e, \frac{1}{2})$.

التذكير

إذا تعادلت مستقيمان، فكلٍ منهما ليس رأسياً، لأنَّ حاصل ضرب ميليهما هو -1، أي أن ميل أحدهما هو سالب عكس الآخر.

تطبيقات: الحركة في مسار مستقيم

تعلمت سابقاً أنه يمكن تمثيل حركة جسم في مسار مستقيم على خط أعداد انطلاقاً من موقع ابتدائي، وأنَّ موقعه بالنسبة إلى الزمن يُعبر عنه بالاقتران $s(t)$. وتعلمت أيضاً أنَّ المشتقة الأولى لاقتران الموقع $s(t)$ هي الاقتران السرعة المتجهة $v(t)$ ، والتي تمثل معدل تغير الموقع بالنسبة إلى الزمن، وتحدد مقدار السرعة واتجاه الحركة (موجبة أو سالبة أو مسكونة) عندما تساوي صفراً، وأنَّ القيمة المطلقة للسرعة المتجهة تمثل السرعة القياسية التي تُعبر عن المقدار فقط دون الاتجاه. كما تعلمت أنَّ المشتقة الثانية لاقتران الموقع $s(t)$ هي الاقتران التسارع $a(t)$ ، إذ تمثل معدل تغير السرعة المتجهة بالنسبة إلى الزمن.

مراجعة المفهوم

الدركة في مسار مستقيم

إذا مثل الاكتران $s(t)$ موقع جسم يتحرك في مسار مستقيم، فإن سرعة المنحبة $v(t)$ تعطى بالعلاقة: $v(t) = s'(t)$ وتسارعه $a(t)$ يعطى بالعلاقة: $a(t) = v'(t) = s''(t)$. أما سرعته القياسية فهي $|v(t)|$.

يمكن توظيف قواعد الاشتقاق التي تعلمتها في هذا القسم في مواقف فيزيائية كدراسة حركة الأجسام وتحليل سلوكها الحركي عند لحظات زمنية معينة.

مثال 3

يُعطى الاكتران $s(t) = 4 \sin t, t \geq 0$ موقع جسم يتحرك في مسار مستقيم، حيث s الموقع بالأمثارة، و t الزمن بالثواني.

أوجد سرعة الجسم وتسارعه عندما $t = \frac{\pi}{4}$.

سرعة الجسم

أوجد مشتقة الموضع في $t = \frac{\pi}{4}$ في المشتقة:

$$v(t) = 4 \cos t$$

التران السرعة

$$v\left(\frac{\pi}{4}\right) = 4 \cos\left(\frac{\pi}{4}\right)$$

بمضروب $t = \frac{\pi}{4}$

$$= 2\sqrt{2}$$

بسيط

تسارع الجسم

أوجد مشتقة التران السرعة، ثم أختره في $t = \frac{\pi}{4}$ في المشتقة:

$$a(t) = v'(t) = s''(t) = -4 \sin t$$

التران تسارع

$$a\left(\frac{\pi}{4}\right) = -4 \sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$$

بمضروب $t = \frac{\pi}{4}$

$$= -2\sqrt{2}$$

بسيط

إذن سرعة الجسم عندما $t = \frac{\pi}{4}$ هي $2\sqrt{2} \text{ m/s}$ ، وتسارعه هو $-2\sqrt{2} \text{ m/s}^2$.

إرشاد

تغير كلمة (السرعة) إلى
السرعة المتجهة لأنها
ورد ذكرها في الكتاب.

أوجد قيمة t التي يكون خلالها الجسم في حالة سكون لحظي أول مرة بعد انطلاقه.

يكون الجسم في حالة سكون لحظي إذا كانت سرعته $v = 0$ أي عندما $v(t) = 0$:

$$4 \cos t = 0 \quad \text{بمسألة الزمان السرعة بالحرف}$$

$$\cos t = 0 \quad \text{بقسمة طرفي المعادلة على 4}$$

$$t = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}, \dots \quad \text{بمحل المعادلة 1}$$

إذن يكون الجسم في حالة سكون لحظي أول مرة بعد انطلاقه عندما $t = \frac{\pi}{2}$.

في أي اتجاه يتحرك الجسم عندما $t = \frac{2\pi}{3}$ ؟

$$v(t) = 4 \cos t \quad \text{بمحل السرعة الموجبة}$$

$$v\left(\frac{2\pi}{3}\right) = 4 \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -2 \quad \text{بمحل القيمة}$$

بما أن إشارة السرعة سالبة، فإن الجسم يتحرك في الاتجاه السالب عندما $t = \frac{2\pi}{3}$.

متى يعود الجسم إلى موقعه الابتدائي أول مرة بعد انطلاقه؟

يكون الجسم في موقعه الابتدائي أول مرة عندما $t = 0$ ، ومنه فإن $s(0) = 4 \sin(0) = 0$.

لإيجاد الوقت الذي يعود فيه الجسم إلى هذه النقطة، نحل المعادلة: $s(t) = 0$.

$$4 \sin t = 0 \quad \text{بمسألة الزمان السرعة بالحرف}$$


$$\sin t = 0 \quad \text{بقسمة طرفي المعادلة على 4}$$

$$t = 0, \pi, 2\pi, \dots \quad \text{بمحل المعادلة 1}$$

إذن يعود الجسم إلى موقعه الابتدائي أول مرة بعد انطلاقه عند $t = \pi$.

الدعم البياني

يُبين المخطط الآتي اتجاهات حركة الجسم في المسار المستقيم.



التلم

الآن بعد أن أصبحت تعلم سرعة الجسم، يمكنك إيجاد موقعه عند اللحظة $t = \frac{2\pi}{3}$ ، وأن موقعه عند اللحظة $t = \frac{2\pi}{3}$ موجب $(s(\frac{2\pi}{3}) = 2\sqrt{3})$ ما يعني علم وجود علاقة بين موقع الجسم واتجاه حركته.

التلم

يبدأ الزمن $s(0)$ على الموقع الابتدائي للجسم يتحرك في مسار مستقيم، في حين تبدأ الحركة $s = 0$ تخلياً عن موقع الجسم من نقطة الأصل.

التفكير من مهمين

يُحسب الاقتران: $x(t) = 3 - \cos t, t \geq 0$ موقع جسم يتحرك في مسار مستقيم، حيث x الموقع بالأمتار و t الزمن بالثواني.

(a) أوجد سرعة الجسم وتسارعه عندما $t = \frac{\pi}{3}$.

(b) أوجد قيمة t التي يكون عندها الجسم في حالة سكون لحظي لأول مرة بعد انطلاقه.

(c) في أي اتجاه يتحرك الجسم عندما $t = \frac{3\pi}{4}$ ؟

(d) متى يعود الجسم إلى موقعه الابتدائي لأول مرة بعد انطلاقه؟

تدريب واظن المسائل

أوجد مشتقة كل اقتران هنا يأتي:

1 $f(x) = 2 \sin x - e^x$

2 $f(x) = \frac{\ln x}{4} - \pi \cos x$

3 $f(x) = \ln\left(\frac{1}{x^2}\right) + x^4$

4 $f(x) = e^{e^{x+1}} + 1$

5 $f(x) = e^x + x^x$

6 $f(x) = \ln\left(\frac{10}{x^2}\right)$

إذا كان: $f(x) = \sin x + \frac{1}{2}e^x$ فأجب عن السؤالين الآتيين كتابةً:

7 أوجد معادلة المماس لمتحنى الاقتران f عند النقطة $(\pi, \frac{1}{2}e^\pi)$.

8 أوجد معادلة العمودي على المماس لمتحنى الاقتران f عند النقطة $(\pi, \frac{1}{2}e^\pi)$.

9 أوجد قيمة x التي يكون عندها المماس أفقياً لمتحنى الاقتران: $f(x) = e^x - 2x$

13 اختيار من متعدد: أي الأتيّة تمثل معادلة العمودي على المماس لمنحنى الاقتران: $f(x) = 3\sin x + \cos x$ عند $x = \pi$ ؟

- a) $y = -x + \pi - 1$ b) $y = x - \pi - 1$ c) $y = x - \pi + 1$ d) $y = x + \pi + 1$

14 إذا كان $f(x) = \ln(kx)$ حيث k عدد حقيقي موجب، و $x > 0$ ، فأثبت أن $f'(x) = \frac{1}{x}$

15 (0) كان الاقتران: $f(x) = \ln x$ ، فأجب عن السؤالين الآتيين تالياً:

a) أثبت أن مماس منحنى الاقتران عند النقطة $(e, 1)$ يمر بنقطة الأصل.

b) أثبت أن المنقطع x للعمودي على المماس لمنحنى الاقتران عند النقطة $(e, 1)$ يمر بـ $e + \frac{1}{e}$.

يُمثل الاقتران: $s(t) = 4 - \sin t, t \geq 0$ موقع جُسيم يتحرك في مسار مستقيم، حيث s الموقع بالأمتار و t الزمن بالثواني:

16 أوجد سرعة الجُسيم واستارحه بعد t ثانية.

17 أوجد موقع الجُسيم عندما كان في حافة سكونٍ لحظي لأول مرّة بعد انطلاقه.

18 أوجد موقع الجُسيم عندما يكون تسارعه صفراً.

يُمثل الاقتران: $s(t) = e^t - 4t, t \geq 0$ موقع جُسيم يتحرك في مسار مستقيم، حيث s الموقع بالأمتار و t الزمن بالثواني:

19 أوجد الموقع الابتدائي للجُسيم.

20 أوجد تسارع الجُسيم عندما يكون سرعته صفراً.

١٤) برسم إذا كان الاكتران: $y = e^x - ax$ ، حيث a عدد حقيقي، فأوجد مداداة المناس عند نقطة تقاطع الاكتران مع المحور y ، ثم أورد إجابتني.

١٥) أثبت عدم وجود مماس ميله 2 للاكتران: $y = 2e^x + 3x + 5x^2$.

برسم إذا كان الاكتران: $y = kx^2$ ، حيث: $k > 0$ وكان مماساً، يقطع المحور y عند النقطة P ، فأجب عن السؤالين الآتيين بإختار:

١٦) أوجد نقطة تقاطع مماس منحنى الاكتران عند النقطة P مع المحور x .

١٧) إذا كان العمودي على المماس عند النقطة P يقطع المحور x عند النقطة $(100, 0)$ ، فأوجد قيمة k ، ثم أورد إجابتني.

برسم يُعطي الاكتران: $s(t) = 3 - \cos t - \sin t, t \geq 0$ موقع جسم يتحرك في مسار مستقيم، حيث s الموقع بالأمتار، و t الزمن بالثواني.

١٨) أوجد قيمة t التي يكون عندها الجسم في حالة سكون لحظي، ثم أورد إجابتني.

١٩) متى يعود الجسم إلى موقعه الابتدائي لأول مرة بعد انطلاقه؟ أورد إجابتني.

نفس إذا كان الاكتران: $y = \log x$ ، فأجب عن السؤالين الآتيين بإختار:

٢٠) أثبت أن: $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x \ln 10}$

٢١) اعتماداً على النتيجة من السؤال السابق، أوجد $\frac{dy}{dx}$ للاكتران: $y = \log ax^2$ ، حيث a عدد حقيقي موجب.

مشتقتا الضرب والقسمة والمشتقات العليا

Product and Quotient Rules and Higher-Order Derivatives

فكرة الدرس



- إيجاد مشتقة ضرب اثنائين، ومشتقة قسمة اثنائين
- إيجاد مشتقات الأخرى ذات المقلوب
- إيجاد المشتقات العليا

المصطلحات



المشتقة الثالثة، المشتقة (n)

مسألة اليوم



تخيلنا أن لدينا سطح الضوء الساقط على بؤبة العين فنقلعت مساحة البؤبة $A(b) = \frac{40 + 24b^{0.8}}{1 + 4b^{0.8}}$ لحساب مساحة بؤبة العين بالخطوات المرفوعة، حيث b مقدار سطح الضوء بوحدة اللومين (lm) وتعرف حسابية العين للضوء بأنها مشتقة الخزان مساحة البؤبة بالنسبة إلى السطح. أوجد اثنائاً لمثل حسابية العين للضوء.

مسألة ضرب اثنائين

تعلمت سابقاً إيجاد مشتقات اثنائات مختلفة، مثل: اثنائات القوى، والاثنان الأسي الطبيعي، والاثنان اللوغاريتمي الطبيعي، واثنان الجيب، واثنان جيب التمام. تعلمت أيضاً إيجاد مشتقات مفردات هذه الاثنائات والاثنائات الناتجة من جمعها و طرحها. ولكن، كيف يمكن إيجاد مشتقات الاثنائات الناتجة من ضرب هذه الاثنائات؟ فعلى إذا كان $f(x)$ و $g(x)$ اثنائين، كيف يمكن إيجاد مشتقة $f(x)g(x)$ ؟

لتفكر نحن أن: $y = f(x)g(x) = uv$ ، $f(x) = u$ ، $g(x) = v$ ، وأن Δx هي زيادة صغيرة في x ، يصبح منها تغير في y, u, v مقدار $\Delta y, \Delta u, \Delta v$ على الترتيب. ومنه نجد:

$$f(x + \Delta x) = u + \Delta u, g(x + \Delta x) = v + \Delta v, f(x + \Delta x)g(x + \Delta x) = y + \Delta y$$

إذن:

$$y + \Delta y = (u + \Delta u)(v + \Delta v)$$

$$\Delta y = (u + \Delta u)(v + \Delta v) - y$$

$$= (u + \Delta u)(v + \Delta v) - uv$$

$$= uv + u\Delta v + v\Delta u + \Delta u \Delta v - uv$$

بتوسيع

شرح من طرفي المعادلة

نحو $y = uv$

بتوسيع الحاصل الناتج

$$\begin{aligned}
 &= u\Delta v + v\Delta u + \Delta u \Delta v && \text{بالتبسيط} \\
 \frac{\Delta y}{\Delta x} &= u \frac{\Delta v}{\Delta x} + v \frac{\Delta u}{\Delta x} + \Delta u \frac{\Delta v}{\Delta x} && \text{بحسب صيغ الفرق المثلثة من (1)} \\
 \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} &= u \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta x} + v \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta u \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta x} && \text{مبدأ القسمة عند القفا (2)} \\
 \frac{dy}{dx} &= u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx} + (\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta u) \frac{dv}{dx} && \text{باعتبار تعريف المشتقة} \\
 &= u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx} + (0) \frac{dv}{dx} && \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta u = 0 \\
 \frac{dy}{dx} &= u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx} && \text{بالتبسيط} \\
 (fg)'(x) &= f(x)g'(x) + g(x)f'(x) && \text{بالتبسيط}
 \end{aligned}$$

إذن: $(fg)'(x) = f(x)g'(x) + g(x)f'(x)$

ملاحظة هامة

نظرية

بالكلمات: مشتقة ضرب دالتين هي الاكتران الأول مضروباً في مشتقة الاكتران الثاني، تُرابط إلى الاكتران الثاني مضروباً في مشتقة الاكتران الأول.

بالرموز: إذا كان $f(x)$ و $g(x)$ دالتين، فإنه يمكن إيجاد مشتقة $f(x)g(x)$ على النحو الآتي:

$$(fg)'(x) = f(x)g'(x) + g(x)f'(x)$$

العلم

يمكنني حلّ التمرين 1 من المثال 1 باستخدام خاصية التوزيع لأنّ المشتقة الاكتران الضرب بالمتغير لا تحده مشتقة المجموع، لأنّ قاعدة مشتقة الفرق

مثال 1

أوجد مشتقة كل اقتران مما يأتي:

1) $f(x) = (3x - 2x^2)(5 + 4x)$

$f(x) = (3x - 2x^2)(5 + 4x)$ الاقتران الضرب

$f'(x) = (3x - 2x^2) \frac{d}{dx}(5 + 4x) + (5 + 4x) \frac{d}{dx}(3x - 2x^2)$ القاعدة مشتقة الفرق

$= (3x - 2x^2)(4) + (5 + 4x)(3 - 4x)$ القاعدة مشتقة الفرق، المشتقة التوزيع

$= (12x - 8x^2) + (15 - 8x - 16x^2)$ باعتبار خاصية التوزيع

$= -24x^2 + 4x + 15$ بالتبسيط

② $f(x) = xe^x$

$f(x) = xe^x$

الإجراء الصحيح

$f'(x) = x \frac{d}{dx}(e^x) + e^x \frac{d}{dx}(x)$

تقنية مشتقة ضرب

$= xe^x + e^x \times 1$

تقنية مشتقة القدر الأول ومشتقة القدر الثاني الضربي

$= xe^x + e^x$

بالسبب

التحقق من فهمي

أوجد مشتقة كل اقتران مما يأتي:

أ) $f(x) = (x^3 - 2x^2 + 3)(7x^2 - 4x)$

ب) $f(x) = \ln x \cos x$

أخطاء شائعة

- من الأخطاء الشائعة عند إيجاد مشتقة حاصل ضرب اقترانين، ضرب مشتقة القدر الأول بالي
- مشتقة القدر الثاني الضربي
- مشتقة القدر الثاني الضربي

مشكلة مشتقة اقترانين

مشتقة قسمة اقترانين ليست حاصل قسمة مشتقتي كل منهما، مثلاً أن مشتقة ضرب اقترانين ليست حاصل ضرب مشتقتي كل منهما، فمثلاً إذا كان $f(x)$ و $g(x)$ اقترانين، فكيف يُمكن إيجاد مشتقة $\frac{f(x)}{g(x)}$ ؟

التفكير أن: $y = \frac{f(x)}{g(x)}$ ، ومنه $f(x) = y \cdot g(x)$ ، وبما أن الاقتران u هو حاصل ضرب اقترانين، فإنه يُمكن إيجاد مشتقته باستخدام قاعدة مشتقة الضرب على النحو الآتي:

$$\frac{du}{dx} = u \frac{dy}{dx} + y \frac{dv}{dx}$$

ومن ثم، فإنه يُمكن إيجاد $\frac{dy}{dx}$ هكذا يأتي:

$$u \frac{dy}{dx} = \frac{du}{dx} - y \frac{dv}{dx}$$

بمضروبنا بسبب

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{du}{dx} - y \frac{dv}{dx}}{u}$$

بقسمة طرفي النسبة على u

$$= \frac{\frac{du}{dx} - \frac{u}{v} \times \frac{dv}{dx}}{v^2}$$

ببساطة $\frac{u}{v}$

$$= \frac{v \frac{du}{dx} - u \frac{dv}{dx}}{v^2}$$

البسط

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{g(x)f'(x) - f(x)g'(x)}{(g(x))^2}$$

النتيجة

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{g(x) \times f'(x) - f(x) \times g'(x)}{(g(x))^2}$$

تذكر

ملاحظة هامة

تكريرة

بالكلمات: مشتقة نسبة الترتين هي المقام في مشتقة البسط مطروحاً منه البسط

لهي مشتقة المقام، ثم نسبة الجميع على مربع المقام.

بالرموز: إذا كان $f(x)$ و $g(x)$ فنرتين، وكان $g(x) \neq 0$ فإنة يمكن إيجاد مشتقة $\frac{f(x)}{g(x)}$ على النحو الآتي:

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{g(x) \times f'(x) - f(x) \times g'(x)}{(g(x))^2}$$

مثال ٥

أجد مشتقة كل فنرتين منأ يأتي:

① $f(x) = \frac{1-x^2}{1+x^2}$

$$f(x) = \frac{1-x^2}{1+x^2}$$

الفرق المثلث

$$f'(x) = \frac{(1+x^2) \frac{d}{dx}(1-x^2) - (1-x^2) \frac{d}{dx}(1+x^2)}{(1+x^2)^2}$$

القانون الثاني

$$= \frac{(1+x^2)(-2x) - (1-x^2)(2x)}{(1+x^2)^2}$$

لإيجاد معدلات التغير القريب
والفرج والجمع

$$= \frac{-2x - 2x^2 - 2x + 2x^2}{(1+x^2)^2}$$

بإستعمال خاصية التوزيع

$$= \frac{-4x}{(1+x^2)^2}$$

ببساطة

1 $f(x) = \frac{\ln x}{x+1}$

$$f(x) = \frac{\ln x}{x+1}$$

الافتراق الخطي

$$f'(x) = \frac{(x+1) \frac{d}{dx}(\ln x) - (\ln x) \frac{d}{dx}(x+1)}{(x+1)^2}$$

قاعدة مشتق النسبة

$$= \frac{(x+1)\left(\frac{1}{x}\right) - (\ln x)(1)}{(x+1)^2}$$

لإيجاد معدلات التغير القريب والفرج
والافتراق التفاضلي الطبيعي

$$= \frac{1 + \frac{1}{x} - \ln x}{(x+1)^2}$$

بإستعمال خاصية التوزيع

$$= \frac{x+1 - x \ln x}{x(x+1)^2}$$

ببساطة

✓ **التدقيق من المعنى**

أوجد مشتقة كل افتراق متسا يأتي:

a) $f(x) = \frac{x+1}{2x+1}$

b) $f(x) = \frac{\sin x}{e^x}$

تعلمت سابقاً أن المشتقة هي معدل تغير كمية بالنسبة إلى كمية أخرى عند لحظة معينة. فمثلاً، إيجاد $\frac{dy}{dx}$ يعني إيجاد معدل تغير y بالنسبة إلى x .

تغير القيم في كثير من المواقف المتواجدة بالحياة بالنسبة إلى الزمن. فمثلاً، إذا كان t كمية معينة فإن معدل تغيرها بالنسبة إلى الزمن t هو $\frac{dt}{dt}$.

مثال 3 : من الحياة



مرضى : تعطي درجة حرارة مريض أثناء مرضه بالاقتران:

$$T(t) = \frac{4t}{1+t^2} + 98.6$$

تظهر أعراض المرض، و T درجة الحرارة بالفهرنهايت.

أوجد المعدل تغير درجة حرارة المريض بالنسبة إلى الزمن:

أوجد $T'(t)$:

$$T(t) = \frac{4t}{1+t^2} + 98.6$$

الاقتران الخطي

$$T'(t) = \frac{(1+t^2) \frac{d}{dt}(4t) - (4t) \frac{d}{dt}(1+t^2)}{(1+t^2)^2}$$

قاعدة مشتقة النسبة

ومشتقة ثابت

$$= \frac{(1+t^2)(4) - (4t)(2t)}{(1+t^2)^2}$$

قاعدة مشتقة القوي،

ومشتقة المجموع

$$= \frac{4+4t^2-8t^2}{(1+t^2)^2}$$

بإستعمال قاعدة التوزيع

$$= \frac{4-4t^2}{(1+t^2)^2}$$

بالتبسيط

$$T'(t) = \frac{4-4t^2}{(1+t^2)^2}$$

إذن، المعدل تغير درجة حرارة المريض بالنسبة إلى الزمن هو:

أوجد المعدل تغير درجة حرارة المريض عندما $t = 2$ ، ثم أفسر معنى الناتج.

أوجد $T'(2)$:

$$T'(t) = \frac{4-4t^2}{(1+t^2)^2}$$

مشتقة $T(t)$

$$T'(2) = \frac{4-4(2)^2}{(1+(2)^2)^2}$$

عوض $t=2$

$$= -0.48$$

بالتبسيط

إذن، عندما يكون الزمن 2 h، فإن درجة حرارة المريض تقل بمقدار 0.48 درجة فهرنهايت

لكل ساعة.

التحقق من فهمي

سكان: يعطي عدد سكان مدينة صغيرة بالاقتران: $P(t) = \frac{500t^2}{2t+9}$ ، حيث t الزمن بالسنوات،

و P عدد السكان بالآلاف.

(أ) أوجد مُعدَّل تغيُّر عدد السكان في المدينة بالنسبة إلى الزمن.

(ب) أوجد مُعدَّل تغيُّر عدد السكان في المدينة عندما $t = 12$ ، ثم أفسِّر المعنى الناتج.

ملاحظة المفهوم

يمكن إيجاد قاعدة عامة للمنطقة مقلوب أيِّ اقتران باستخدام قاعدة القسمة. فنقول: إذا كان

$f(x)$ اقتراناً حيث $f(x) \neq 0$ وكان: $A(x) = \frac{1}{f(x)}$ ، فإن:

$$A'(x) = \frac{f(x) \times 0 - 1 \times f'(x)}{(f(x))^2}$$

تقودنا النتيجة

$$= \frac{-f'(x)}{(f(x))^2}$$

فإن:

$$A'(x) = \frac{-f'(x)}{(f(x))^2}$$

ملاحظة المفهوم

نظرة

بالكلمات: مشتقة مقلوب اقتران هي سالب مشتقة الاقتران مقسوماً على مُربع الاقتران.

بالرموز: إذا كان $f(x)$ اقتراناً، حيث $f(x) \neq 0$ فإنه يمكن إيجاد مشتقة $\frac{1}{f(x)}$ على النحو الآتي:

$$\left(\frac{1}{f}\right)'(x) = \frac{-f'(x)}{(f(x))^2}$$

التلميح

إذا كان f مشتقةً ومقلوباً

ويكون $f(x)$ اقتراناً، ويكون:

$A(x) = \frac{1}{f(x)}$ حيث:

$f(x) \neq 0$ ، فإن:

$$A'(x) = \frac{-f'(x)}{(f(x))^2}$$

مثال 4

أوجد مشتقة كل الآتيين مما يأتي:

$$1) f(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

$$f(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

الآتيين المثلثين

$$f'(x) = \frac{-\frac{d}{dx}(1+x^2)}{(1+x^2)^2}$$

القاعدة مشتقة المقام

$$= \frac{-2x}{(1+x^2)^2}$$

القاعدة مشتقة البسط الآتيين والقوة ومشتقة الجيع

$$2) f(t) = \frac{1}{t+\frac{1}{t}}$$

$$f(t) = \frac{1}{t+\frac{1}{t}}$$

الآتيين المثلثين

$$f'(t) = \frac{-\frac{d}{dt}(t+\frac{1}{t})}{(t+\frac{1}{t})^2}$$

القاعدة مشتقة المقام

$$= \frac{-1+\frac{1}{t^2}}{(t+\frac{1}{t})^2}$$

القاعدة مشتقة الآتيين القوة ومشتقة المقام

$$= \frac{1-t^2}{t^2(t+\frac{1}{t})^2}$$

القاعدة

مخرج المنطق من المقام

أوجد مشتقة كل الآتيين مما يأتي:

$$\Rightarrow f(x) = \frac{1}{5x-2}$$

$$1) f(x) = \frac{1}{x+\sqrt{x}}$$

أفكار

هل توجد طريقة أخرى
لإيجاد مشتقة الآتيين
في الفقرة 2 من المثال 4؟

مشتقات الاقترانات المثلثية

تعلمت في الدرس السابق كيفية إيجاد مشتقة اقتران الجيب، ومشتقة اقتران جيب التمام. وستتعلم الآن كيف تجد مشتقات الاقترانات المثلثية باستخدام مشتقة القسمة. فمثلاً لإيجاد مشتقة اقتران الظل، أخرجي أن $f(x) = \tan x$. واستعمل مشتقة القسمة، فإن:

$$f(x) = \tan x = \frac{\sin x}{\cos x} \quad \text{تطبيق النسبة}$$

$$f'(x) = \frac{(\cos x) \frac{d}{dx}(\sin x) - (\sin x) \frac{d}{dx}(\cos x)}{(\cos x)^2} \quad \text{قاعدة مشتقة القسمة}$$

$$= \frac{(\cos x)(\cos x) - (\sin x)(-\sin x)}{(\cos x)^2} \quad \begin{array}{l} \text{قاعدة مشتقة اقتران الجيب} \\ \text{ومشتقة اقتران جيب التمام} \end{array}$$

$$= \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{(\cos x)^2} \quad \text{بالتعويض بحقيقة التوحد}$$

$$= \frac{1}{\cos^2 x} \quad \text{حقيقة التوحد}$$

$$= \sec^2 x \quad \text{حقيقة القرب}$$

مشتقات الاقترانات المثلثية

تظيرة

$$\frac{d}{dx}(\tan x) = \sec^2 x$$

$$\frac{d}{dx}(\cot x) = -\csc^2 x$$

$$\frac{d}{dx}(\sec x) = \sec x \tan x$$

$$\frac{d}{dx}(\csc x) = -\csc x \cot x$$

يوجد مشتقات مشتقات الاقترانات المثلثية الأخرى كما يلي:

مطل

أوجد مشتقة كل اقتران من الاقترانات التالية:

1 $f(x) = x^2 \sec x$

$$f(x) = x^2 \sec x \quad \text{اقتران الضرب}$$

$$f'(x) = x^2 \frac{d}{dx}(\sec x) + \sec x \frac{d}{dx}(x^2) \quad \text{قاعدة مشتقة الضرب}$$

$$= x^2 \sec x \tan x + 2x \sec x \quad \begin{array}{l} \text{قاعدة مشتقة اقتران جيب التمام} \\ \text{ومشتقة اقتران القوة} \end{array}$$

الذكر

القاطع ($\sec x$) متساوي

مقلوب جيب التمام

وقاطع التمام ($\csc x$)

هو مقلوب الجيب

$$2) f(x) = \frac{\csc x}{1 + \tan x}$$

$$f(x) = \frac{\csc x}{1 + \tan x}$$

الافتراق المثلثي

$$f'(x) = \frac{(1 + \tan x) \frac{d}{dx}(\csc x) - (\csc x) \frac{d}{dx}(1 + \tan x)}{(1 + \tan x)^2}$$

القاعدة لاشتقاق النسبة

$$= \frac{(1 + \tan x)(-\csc x \cot x) - (\csc x)(\sec^2 x)}{(1 + \tan x)^2}$$

قواعد اشتقاق التمام

الظل، وال cosec، و

وال sec، والتام

$$= \frac{-\csc x \cot x - \csc x \cot x \tan x - \csc x \sec^2 x}{(1 + \tan x)^2}$$

استبدال قيم

التمام

$$= \frac{-\csc x \cot x - \csc x - \csc x \sec^2 x}{(1 + \tan x)^2}$$

بالتبسيط

انتقل من نصفي

أخذ مشتقة كل افتراق منا يأتي:

$$a) f(x) = x \cot x$$

$$b) f(x) = \frac{\tan x}{1 + \sin x}$$

المشتقات العليا

تعلمت سابقاً أنه إذا كان $f(x)$ افتراقاً، فإن المشتقة $f'(x)$ هي افتراق أيضاً ومن الممكن إيجاد مشتقة التي يُرمز إليها بالرمز $f''(x)$ ، وفي هذه الحالة، يُطلق على الافتراق الجديد $f''(x)$ اسم المشتقة الثانية للافتراق $f(x)$.

إذا كان $f''(x)$ افتراقاً، فإنه يُرمز إلى مشتقته بالرمز $f'''(x)$ ، ويسمى **المشتقة الثالثة** (third derivative) للافتراق $f(x)$. ويستخدم الحاد المشتقات وتسميتها على النحو التالي:

وُسميت الرمز $f^{(n)}(x)$ للدلالة على **المشتقة (n)** (n^{th} derivative).

رموز رياضية

تُستعمل الرموز:

$$f(x), \frac{dy}{dx}, y', y''$$

لتعبير عن المشتقة

الثانية، وتُستعمل الرموز:

$$f(x), \frac{d^2y}{dx^2}, y'', y'''$$

لتعبير عن المشتقة (n).

مثال 5

أوجد المشتقات الأربع الأولى للاقتران: $f(x) = x^2 - \frac{1}{x}$

$$f'(x) = 2x + \frac{1}{x^2}$$

المشتقة الأولى:

$$f''(x) = 2 - \frac{2}{x^3}$$

المشتقة الثانية:

$$f'''(x) = \frac{6}{x^4}$$

المشتقة الثالثة:

$$f^{(4)}(x) = -\frac{24}{x^5}$$

المشتقة الرابعة:

تحقق من خطئنا: أوجد المشتقات الثلاث الأولى لكل اثنان مما يأتي:

أ) $f(x) = x \sin x$

ب) $g(x) = x^2 \ln x$

التعلم

يشير الرمز $f^{(n)}$ إلى المشتقة (n) للاقتران f أي حين يشير الرمز f' إلى الاقتران f مرة واحدة وإلى $f^{(n)}$ n مرة.

التدريب وأفضل الحاصل

أوجد مشتقة كل اثنان مما يأتي:

1 $f(x) = \frac{x^2}{2x-1}$

2 $f(x) = x^2 \sec x$

3 $f(x) = \frac{x+1}{\cos x}$

4 $f(x) = e^x (\tan x - x)$

5 $f(x) = \frac{\sin x + \cos x}{e^x}$

6 $f(x) = x^2 \sin x + x^2 \cos x$

7 $f(x) = \sqrt[3]{x}(\sqrt{x} + 3)$

8 $f(x) = \frac{1 + \sec x}{1 - \sec x}$

9 $f(x) = \frac{2 - \frac{1}{x}}{x-3}$

10 $f(x) = (x^2 - x)(x^2 + 2)(x^2 + x + 1)$

11 $f(x) = (\csc x + \cot x)^{-1}$

إذا كان $f(x)$ و $g(x)$ اثنان، وكان $f(0) = 5, f'(0) = -3, g(0) = -1, g'(0) = 2$ فأوجد كلاً مما يأتي:

12 $(fg)'(0)$

13 $\left(\frac{f}{g}\right)'(0)$

14 $(7f - 2fg)'(0)$

أوجد المشتقة الثانية لكل اثنان مما يأتي عند قيمة x المعطاة:

15 $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x^2 + 4}, x = -2$

16 $f(x) = \frac{1+x}{1+\sqrt{x}}, x = 8$

17 $f(x) = \frac{1-x}{1+\sqrt{x}}, x = 4$

أوجد معادلة المماس لكل التوابع مما يأتي عند النقطة المعطاة:

① $f(x) = \frac{1+x}{1+e^x}, (0, \frac{1}{2})$

② $f(x) = e^x \cos x + \sin x, (0, 1)$

أثبت صحة كل مما يأتي اعتماداً على أن $\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x, \frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$

③ $\frac{d}{dx}(\cot x) = -\csc^2 x$

④ $\frac{d}{dx}(\sec x) = \sec x \tan x$

⑤ $\frac{d}{dx}(\csc x) = -\csc x \cot x$

ألاحظ المشتقة المعطاة في كل مما يأتي، ثم أوجد المشتقة العليا المطلوبة:

⑥ $f''(x) = 2 - \frac{2}{x}, f'(x)$

⑦ $f''(x) = 2\sqrt{x}, f^{(4)}(x)$

⑧ $f^{(4)}(x) = 2x+1, f^{(6)}(x)$



⑨ نباتات عذبة، ونجد فريق بحث زراعي أنه يمكن التعبير عن ارتفاع نبتة كُثِّفَتْ من


نبات نسيج الشمس h بالأمتار باستخدام الاقتران: $h(t) = \frac{3t^2}{4+t}$ ، حيث t الزمن

بالأشهر بعد زراعة البذور. أوجد معدل تغير ارتفاع النبتة بالنسبة إلى الزمن.

إذا كان الاقتران: $y = e^x \sin x$ ، فأجيب عن السؤالين الآتيين تباعاً:

⑩ أوجد أن: $\frac{d^2y}{dx^2} = 2 \frac{dy}{dx} - 2y$

⑪ أوجد $\frac{dy}{dx}$ و $\frac{dy}{dx^2}$



المسار منافية. عندما نرصد الأعمار الصاعدة الأرض، فإنه يمكننا

مسح جزء فقط من سطح الأرض. وبعض الأعمار الصاعدة تحتوي

لمستحزمات أقياس الزاوية θ (بالراديان) الموضحة في الشكل المجاور.

إذا كان h يُعبر عن المسافة بين القمر الصناعي و سطح الأرض بالكيلومتر،

و r يُعبر عن نصف قطر الأرض بالكيلومتر، فأجيب عن السؤالين الآتيين

تباعاً:

⑫ أوجد أن: $h = r(\csc \theta - 1)$

⑬ أوجد معدل تغير h بالنسبة إلى θ عندما $\theta = \frac{\pi}{6}$ rad (أقرب إلى $r = 6371$ km)

يُمثل الاقتران: $s(t) = t^2 e^t, t \geq 0$ موقع جسم يتحرك في مسار مستقيم، حيث s الموقع بالأمتار، و t الزمن بالثواني.

31) أوجد سرعة الجسم وتسارعه بعد t ثانية.

32) أوجد سرعة الجسم وتسارعه عندما $t = 1$.

يُمثل الاقتران: $s(t) = \frac{9t}{9+t^2}, t \geq 0$ موقع جسم يتحرك في مسار مستقيم، حيث s الموقع بالأمتار، و t الزمن بالثواني.

33) أوجد سرعة الجسم وتسارعه بعد t ثانية.

34) أوجد سرعة الجسم وتسارعه عندما $t = 2$.

35) إذا كان: $f(x) = 9 \ln x + \frac{1}{2x^2}$ ، فأثبت أن: $f'(x) = \frac{(3x-1)(3x+1)}{x^2}$



36) التفاعلات الكيميائية تحتاج كمية معينة من المواد المتفاعلة لاستكمال الاقتران: $M(t) = \frac{5.8t}{t+1.9}$

حيث t الزمن بالثواني بعد بدء التفاعل، و M الكتلة بالغمم. أوجد معدل تغير كتلة المتكسر بعد t ثوانٍ من بدء التفاعل.

معدل إنتاج عدد الغزلان في غابة بالاقتران: $P(t) = \frac{2000}{4t+80}$ ، حيث t الزمن بالأشهر منذ الأنا.

37) أوجد معدل تغير عدد الغزلان في الغابة بالنسبة إلى الزمن t .


38) أوجد معدل تغير عدد الغزلان في الغابة عندما $t = 10$ ، بتفسير معنى الناتج.



39) دائرة يُستعمل الأكران: $m(t) = t \ln t + 1, 0 < t \leq 4$ لقياس قدرة الأطفال

على التذكر، حيث m مقياس من 1 إلى 7، و t عمر الطفل بشهور. أوجد معدل

تغير قدرة الأطفال على التذكر بالنسبة إلى عمر الطفل t .



ليكن الشكل المجاور متحني الاقتران $F(x)$ و $G(x)$.

إذا كان: $P(x) = F(x)G(x)$ ، وكان: $Q(x) = \frac{F(x)}{G(x)}$ ، فأوجد عملاً متما ياتي:

Ⓐ $P'(2)$

Ⓒ $Q'(7)$

مهارات التفكير العليا

تبرهن إذا كان: $y = \frac{1-e^{-x}}{1+e^{-x}}$ ، فأجيب عن السؤالين الآتيين بإيجاز:

Ⓐ أوجد ميل المماس عند نقطة الأصل.

Ⓑ أشر على عدم وجود مناسق أقصى للاقتران y ، ثم أشرح إجابتك.

مثال: إذا كان: $y = \frac{x+1}{x-1}$ ، حيث $x \neq 1$ ، فأجيب عن الأسئلة الثلاثة الآتية بإيجاز:

Ⓐ أوجد $\frac{dy}{dx}$

Ⓑ أوجد كتابة المعادلة بالنسبة إلى المتغير x (الاقتران بالنسبة إلى y)، ثم أوجد $\frac{dx}{dy}$

Ⓒ أثبت ذلك: $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}}$

تبرهن إذا كان: $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ ، فأجيب عن السؤالين الآتيين بإيجاز:

Ⓐ أثبت أن: $f''(x) = \frac{6 \ln x - 5}{x^3}$ ، ثم أشرح إجابتك.

Ⓑ أوجد قيمة المتكامل: $\int (x^3 f''(x) + 4x^2 f'(x) + 2x f(x) + 1) dx$

قاعدة السلسلة The Chain Rule

مقدمة الدرس



- إيجاد مشتقات التفاضل باستخدام قاعدة السلسلة.
- إيجاد مشتقات المعادلات الوسيطة.

التمارين




قاعدة السلسلة، قاعدة سلسلة القوة، المعادلة الوسيطة، المتغير الوسيط، مجال الوسيط.

مبدأ التبرير



يُمكن تمثيل انتشار الإنفلونزا في إحدى المدارس باستخدام
الافتراض: $P(t) = \frac{100}{1+t^2}$ ، حيث $P(t)$ العدد النسبي الكلي للظبية
المصابين بعد t يوماً من ملاحظة الإنفلونزا لأول مرة في المدرسة.
أوجد سرعة انتشار الإنفلونزا في المدرسة بعد 3 أيام، ثم أوجد إجمالي



قاعدة السلسلة

تعلمتُ سابقاً إيجاد مشتقة الاكتران الخارج من تركيب التفاضل قديماً وذلك
بإيجاد مشتقة الاكتران الداخلي وتعبته عند الاكتران الداخلي، ثم فرسه في
مشتقة الاكتران الداخلي. تحتاً هذه الطريقة إحدى أهم قواعد الاشتقاق، وتسمى
قاعدة السلسلة (the chain rule). فمثلاً، يُمكن إيجاد مشتقة الاكتران المركب:

$h(x) = (5x^2 - 2x)^4$ الذي فيه $u = 5x^2 - 2x$ اكتران داخلي، و $y = u^4$ اكتران
خارجي، على النحو الآتي:



$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \times \frac{du}{dx}$$

قاعدة السلسلة

$$= 4u^3 \times (15x^2 - 2)$$

$$\frac{dy}{du} = 4u^3, \frac{du}{dx} = 15x^2 - 2$$

$$= 4(5x^2 - 2x)^3 (15x^2 - 2)$$

$$u = 5x^2 - 2x$$

بوجه عام، يمكن إيجاد مشتقة الاقتران الناتج من تركيب القوسين كما يأتي:

قاعدة السلسلة

تفصيل

إذا كان $f(x)$ و $g(x)$ اقترانين، فإنه يمكن إيجاد مشتقة الاقتران المركب:

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

باستعمال القاعدة الآتية:

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

وبصيغة أخرى، إذا كان: $y = f(u)$ ، وكان: $u = g(x)$ ، فإن:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \times \frac{du}{dx}$$

حيث تُحسب قيمة $\frac{dy}{du}$ عندما $u = g(x)$.

الشرح

يُعتبر $\frac{dy}{dx}$ من $\frac{dy}{du}$ عن طريق
تغيير u بالنسبة إلى x ،
ويُعتبر $\frac{du}{dx}$ من $\frac{dy}{du}$ عن طريق
تغيير u بالنسبة إلى x .

وبكلمات أخرى، مشتقة الاقتران المركب $f(g(x))$ هي حاصل ضرب مشتقة الاقتران
الخارجي f عند الاقتران الداخلي $g(x)$ في مشتقة الاقتران الداخلي $g(x)$.

يمكن التوصل إلى النتائج الآتية عند تطبيق قاعدة السلسلة لإيجاد مشتقة القوسات الناتجة من
تركيب القوسين، أحدهما اقتران مقلبي، أو اقتران أسّي طبيعي، أو اقتران لوغاريتمي طبيعي:

قاعدة السلسلة والاقتران المشهور

نتائج

إذا كان $g(x)$ اقتراناً، فإن:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(\sin g(x)) &= \cos(g(x)) \times g'(x) & \frac{d}{dx}(\csc g(x)) &= -\csc(g(x)) \cot(g(x)) \times g'(x) \\ \frac{d}{dx}(\cos g(x)) &= -\sin(g(x)) \times g'(x) & \frac{d}{dx}(\sec g(x)) &= \sec(g(x)) \tan(g(x)) \times g'(x) \\ \frac{d}{dx}(\tan g(x)) &= \sec^2(g(x)) \times g'(x) & \frac{d}{dx}(\cot g(x)) &= -\csc^2(g(x)) \times g'(x) \\ \frac{d}{dx}(e^{g(x)}) &= e^{g(x)} \times g'(x) & \frac{d}{dx}(\ln g(x)) &= \frac{g'(x)}{g(x)} \end{aligned}$$

مثال 1

أوجد مشتقة كل اقتران مما يأتي:

1 $f(x) = \cos 2x$

$$f(x) = \cos 2x$$

$$f'(x) = \frac{d}{dx}(\cos 2x) = -\sin 2x \times 2$$

$$= -2 \sin 2x$$

(اقتران المقلبي)

مشتقة $(\cos g(x))$ حيث $g(x) = 2x$

النتيجة

2 $f(x) = e^{(1+2x)}$

$f(x) = e^{(1+2x)}$

الافتراق المتكامل

$f'(x) = \frac{d}{dx}(e^{(1+2x)}) = e^{(1+2x)} \times (1 + 2x)$ **مشتقة القوة** حيث $u = 1 + 2x$

3 $f(x) = \ln(\sin x)$

$f(x) = \ln(\sin x)$

الافتراق المتكامل

$f'(x) = \frac{d}{dx}(\ln(\sin x)) = \frac{\cos x}{\sin x}$ **مشتقة (log) (log) حيث $u = \sin x$**

$= \cot x$

المشتقات المتتالية

التحقق من فهمي

أوجد مشتقة كل افتراق مما يأتي:

a) $f(x) = \tan 3x^2$

b) $f(x) = e^{nx}$

c) $f(x) = \ln(\cot x)$

قاعدة متسلسلة القوة

يُعدُّ الافتراق المُركَّب الذي يكون في صورة $f(x) = (g(x))^n$ أحد أكثر الافتراقات المُركَّبة شيوعاً، ويُشكِّل مشتقة حالة خاصة من قاعدة المتسلسلة، ويُسمى **قاعدة متسلسلة القوة** (power chain rule)، حيث الافتراق الخارجي هو الافتراق القوة.

قاعدة متسلسلة القوة

مفهوم أساسي

إذا كان n أيُّ عدد حقيقي، وكان $u = g(x)$ افتراقاً، فإنه يُمكن إيجاد مشتقة $(g(x))^n$ على النحو الآتي:

$$\frac{d}{dx}(g(x))^n = n(g(x))^{n-1} \times g'(x)$$

وهيئة أخرى: فإن:

$$\frac{d}{dx}(u^n) = nu^{n-1} \times \frac{du}{dx}$$

الذكر

$$\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$$

الذكر

$$\frac{d}{dx}(\ln x) = \frac{1}{x}$$

أوجد مشتقة كل اقتران مما يأتي:

1) $f(x) = \sqrt[3]{(x^2 - 1)^2}$

$$f(x) = (x^2 - 1)^{2/3}$$

$$f'(x) = \frac{2}{3}(x^2 - 1)^{-1/3} \times \frac{d}{dx}(x^2 - 1)$$

$$= \frac{2}{3}(x^2 - 1)^{-1/3} \times 2x$$

$$= \frac{4x}{3\sqrt[3]{x^2 - 1}}$$

يكتب الاقتران في صورة القوة

القاعدة بقسمة القسمة

بالضرب في -1

الصورة الجذرية

2) $f(x) = \tan^4 x$

$$f(x) = \tan^4 x = (\tan x)^4$$

$$f'(x) = 4(\tan x)^3 \times \frac{d}{dx}(\tan x)$$

$$= 4 \tan^3 x \times \sec^2 x$$

يكتب القوة الاقتران في صورة

القاعدة بقسمة القسمة

بالضرب في $\tan x$

أفكار

ما وجه الاختلاف بين
الاقتران

$$f(x) = \tan^4 x$$

والاقتران

$$h(x) = \tan x^4$$

3) $f(x) = \sqrt{\ln x}$

$$f(x) = \sqrt{\ln x} = (\ln x)^{1/2}$$

$$f'(x) = \frac{1}{2}(\ln x)^{-1/2} \times \frac{d}{dx}(\ln x)$$

$$= \frac{1}{2}(\ln x)^{-1/2} \times \frac{1}{x}$$

$$= \frac{1}{2x\sqrt{\ln x}}$$

يكتب الاقتران في صورة القوة

القاعدة بقسمة القسمة

بالضرب في $\ln x$

الصورة الجذرية

التحقق من خصص

أوجد مشتقة كل اقتران مما يأتي:

a) $f(x) = \sqrt[3]{(x^2 - 1)^2}$

b) $f(x) = \sqrt{\cos x}$

c) $f(x) = (\ln x)^4$

تعلم

بالضرب في $(\sqrt{g(x)})'$

$$(\sqrt{g(x)})' = \frac{g'(x)}{2\sqrt{g(x)}}$$

الاستعمال المتكرر للقاعدة التفاضلية

الحاج أحياناً إلى استعمال قاعدة السلسلة أكثر من مرة لإيجاد المشتقة. فمثلاً، إذا كان $y = f(u)$, $u = g(x)$, $x = h(t)$ حيث f و g و h أكثر الدالة، فإنه يمكن إيجاد مشتقة y بالنسبة إلى t باستعمال قاعدة السلسلة مرتين كالتالي:

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{du} \times \frac{du}{dx} \times \frac{dx}{dt} = \frac{dy}{du} \times \frac{du}{dx} \times \frac{dx}{dt}$$

مثال 3

أوجد مشتقة كل اقتران مما يأتي:

1 $f(x) = e^{\sec 4x}$

$$f(x) = e^{\sec 4x}$$

الاقتران المعطى

$$f'(x) = e^{\sec 4x} \times \frac{d}{dx} (\sec 4x)$$

مشتقة $\sec g(x)$ حيث $g(x) = 4x$

$$= e^{\sec 4x} \times -\csc 4x \times \cot 4x \times \frac{d}{dx} (4x)$$

مشتقة $\csc g(x)$ حيث $g(x) = 4x$

$$= -4e^{\sec 4x} \csc 4x \cot 4x$$

النتيجة

2 $f(x) = \sin (\tan \sqrt{3x^2 + 4})$

$$f(x) = \sin (\tan \sqrt{3x^2 + 4})$$

الاقتران المعطى

$$f'(x) = \cos (\tan \sqrt{3x^2 + 4}) \times \frac{d}{dx} (\tan \sqrt{3x^2 + 4})$$

مشتقة $\sin g(x)$ حيث

$$g(x) = \tan \sqrt{3x^2 + 4}$$

$$= \cos (\tan \sqrt{3x^2 + 4}) \times \sec^2 \sqrt{3x^2 + 4} \times \frac{d}{dx} (\sqrt{3x^2 + 4})$$

مشتقة $\tan g(x)$ حيث

$$g(x) = \sqrt{3x^2 + 4}$$

$$= \cos (\tan \sqrt{3x^2 + 4}) \times \sec^2 \sqrt{3x^2 + 4} \times \frac{d}{dx} (3x^2 + 4)^{\frac{1}{2}}$$

مشتقة $\sqrt{3x^2 + 4}$ برصوبتها

$$= \cos(\tan \sqrt{3x^2 + 4}) \times \sec^2 \sqrt{3x^2 + 4} \times \frac{1}{2} (3x^2 + 4)^{-1/2} \times \frac{d}{dx} (3x^2 + 4)$$

القاعدة السلسلة

$$= \cos(\tan \sqrt{3x^2 + 4}) \times \sec^2 \sqrt{3x^2 + 4} \times \frac{1}{2} (3x^2 + 4)^{-1/2} \times 6x$$

القاعدة $3x^2 + 4$

$$= \frac{3x \cos(\tan \sqrt{3x^2 + 4}) \times \sec^2 \sqrt{3x^2 + 4}}{\sqrt{3x^2 + 4}}$$

القاعدة السلسلة، والتبسيط

مع التفرقة من كليهما

أوجد مشتقة كل افتراض مما يلي:

a) $f(x) = \cos^2(7x^2 + 6x - 1)$

b) $f(x) = (2 + (x^2 + 1)^4)^2$

قواعد الاشتقاق الأساسية، وقاعدة المتكاملة

لإيجاد مشتقة افتراض في بعض الحالات، أحتاج إلى تطبيق قواعد الاشتقاق الأساسية، مثل: مشتقة المجموع، ومشتقة الفرق، ومشتقة الضرب، ومشتقة القسمة، ومضاعفات الافتراض، إضافة إلى تطبيق قاعدة السلسلة.

مثال 4

أوجد ميل المماس لمتجهي الافتراض $f(x) = e^{-0.2x} \sin 4x$ عندما $x = \frac{\pi}{8}$

$$f(x) = e^{-0.2x} \sin 4x$$

الافتراض الخطي

$$f'(x) = e^{-0.2x} \frac{d}{dx} (\sin 4x) + \sin 4x \frac{d}{dx} (e^{-0.2x})$$

القاعدة مشتقة الضرب

$$= e^{-0.2x} \times 4 \cos 4x + \sin 4x \times -0.2e^{-0.2x}$$

القاعدة السلسلة

$$= 4e^{-0.2x} \cos 4x - 0.2e^{-0.2x} \sin 4x$$

قاعدة مشتقة الافتراض

$$f'\left(\frac{\pi}{8}\right) = 4e^{-0.2(\pi/8)} \cos 4\left(\frac{\pi}{8}\right) - 0.2e^{-0.2(\pi/8)} \sin 4\left(\frac{\pi}{8}\right)$$

عوض $x = \frac{\pi}{8}$

$$= -0.2e^{-0.25\pi}$$

النتيجة

تفكير

هل يمكن إيجاد مشتقة

الافتراض:

$$f(x) = e^{-0.2x} \sin 4x$$

بطريقة أخرى؟

أوجد ميل العمودي على المماس لمنحنى الاقتران: $f(x) = \left(\frac{3x-1}{x^2+3}\right)^2$ عندما $x=0$

$$f(x) = \left(\frac{3x-1}{x^2+3}\right)^2 \quad \text{الاقتران المعطى}$$

$$f'(x) = 2 \left(\frac{3x-1}{x^2+3}\right) \times \frac{d}{dx} \left(\frac{3x-1}{x^2+3}\right) \quad \text{قاعدة مشتق الكسور}$$

$$= 2 \left(\frac{3x-1}{x^2+3}\right) \times \left(\frac{(x^2+3)(3) - (3x-1)(2x)}{(x^2+3)^2}\right) \quad \text{قاعدة مشتق الكسور}$$

$$= \frac{2(3x-1)(-3x^2+2x+9)}{(x^2+3)^2} \quad \text{بالتبسيط}$$

$$f'(0) = \frac{2(3(0)-1)(-3(0)^2+2(0)+9)}{(0)^2+3)^2} \quad \text{تعيين } x=0$$

$$= \frac{-18}{27} = -\frac{2}{3} \quad \text{بالتبسيط}$$

إذن، ميل المماس لمنحنى الاقتران $f(x)$ عندما $x=0$ هو: $-\frac{2}{3}$. ومنه فإن ميل العمودي على المماس عندما $x=0$ هو: $\frac{3}{2}$.

التحقق من الحل

أ) أوجد ميل المماس لمنحنى الاقتران: $f(x) = (2x+1)^2(x^2-x+1)^4$ عندما $x=1$

ب) أوجد ميل العمودي على المماس لمنحنى الاقتران: $f(x) = \frac{\cos^2 x}{\sin x}$ عندما $x = \frac{\pi}{2}$

مثال 5: من الحياة



أعمال شركة إحدى الشركات تمسكًا جديدًا في الأسواق، تم إصدار عدد القطع القيمة من طرحة.

$$\text{إذا حُصل الاقتران: } N(t) = \frac{25000t^2}{(2t+1)^2}, t > 0 \text{ عند القطع}$$

التيعة من طرحة هذا المنتج، حيث t الزمن بالأسابيع، فأجب عن السؤالين الآتيين تبعاً:

معلومة

تعتبر كل من المراجع الخارجية إلى أن العلماء المسلمين ثابتين في أنهم من هذا العلم العظيم والتكامل في القرن الثالث الهجري.

1 أوجد معدل تغير عدد القطع الخبثية بالنسبة إلى الزمن

أوجد $N'(t)$:

$$N(t) = \frac{250000t}{(2t+1)^2} \quad \text{الاجزاء البسط}$$

$$N'(t) = \frac{(2t+1)^2 \frac{d}{dt}(250000t) - (250000t) \frac{d}{dt}(2t+1)^2}{((2t+1)^2)^2} \quad \text{القاعدة لاجزاء الكسور}$$

$$= \frac{(2t+1)^2 (500000t) - (250000t) 2(2t+1) \times 2}{(2t+1)^4} \quad \text{القاعدة لاجزاء الكسور}$$

$$= \frac{(2t+1)^2 (500000t) - (1000000t)(2t+1)}{(2t+1)^4} \quad \text{البسط}$$

$$= \frac{(2t+1)(500000t) - (1000000t)}{(2t+1)^3} \quad \text{بإخراج العامل المشترك}$$

$$= \frac{500000t}{(2t+1)^3} \quad \text{بإلغاء البسط والبقا على (2t+1)^3}$$

2 أوجد $N'(52)$ ، ثم أفسر معنى الناتج.

أوجد $N'(52)$:

$$N'(t) = \frac{500000t}{(2t+1)^3} \quad \text{بمسة الاجزاء (N)}$$

$$N'(52) = \frac{500000(52)}{(2(52)+1)^3} \quad \text{بموضع t=52}$$

$$= 22 \quad \text{بالتعويض في البسط}$$

بما أن $N'(52) = 22$ ، وهذا يعني أن إجمالي عدد القطع الخبثية من المشيخ يزداد بمعدل

22 قطعة لكل أسبوع بعد مرور 52 أسبوعاً على طرح المشيخ في الأسواق.

المستخلص من المثال

لحساب قيمة بدل الخدمة لأحد المشيخات بالدينار باستخدام الاقتران:

$$U(x) = 80 \sqrt{\frac{2x+1}{3x+4}} \quad \text{حيث x عدد القطع الخبثية من المشيخ}$$

(1) أوجد معدل تغير قيمة بدل الخدمة بالنسبة إلى عدد القطع الخبثية من المشيخ.

(2) أوجد $U'(20)$ ، ثم أفسر معنى الناتج.

مشقة $a^{f(x)}$

تعلمتُ سابقاً كيف أجد مشقة الاكتران الأسي الطبيعي: $f(x) = e^x$ ولكن، كيف يُمكنني

إيجاد مشقة الاكتران: $f(x) = a^x$ ، حيث a عدد حقيقي موجب؟

يُمكن استعمال خصائص اللوغاريتمات لكتابة a^x بدلالة e^x ، حيث a عدد حقيقي موجب،

و $a \neq 1$ ، كما يأتي:

$$a^x = e^{x \ln a}$$

الخصيص الأسي في اللوغاريتمات

$$a^x = e^{x \ln a}$$

قانون التفاضل في اللوغاريتمات

يُمكن إيجاد مشقة a^x باستعمال قاعدة السلسلة كما يأتي:

$$\frac{d}{dx}(a^x) = \frac{d}{dx}(e^{x \ln a})$$

مشقة e^u

$$= e^{x \ln a} \times \ln a$$

مشقة e^u ، حيث $u = x \ln a$

$$= a^x \times \ln a$$

$e^u = e^x$

$$\frac{d}{dx}(a^x) = a^x \times \ln a$$

بناءً على ما سبق، يُمكن إيجاد مشقة $a^{g(x)}$ ، حيث $g(x)$ اكتران، كما يأتي:

مشقة $a^{g(x)}$

نظرية

إذا كان a عدداً حقيقياً موجباً، و $a \neq 1$ ، وكان $g(x)$ اكتراناً، فإن:

$$\frac{d}{dx}(a^u) = a^u \times \ln a$$

$$\frac{d}{dx}(a^{g(x)}) = \ln a \times a^{g(x)} \times g'(x)$$

أضطر

من سطر النظرية

ستجده $a \neq 1$

مثال 6

أجد مشقة كل اكتران مما يأتي:

① $f(x) = 8^{2x}$

$$f(x) = 8^{2x}$$

الاكتران البسيط

$$f'(x) = (\ln 8)8^{2x} (2) = (2 \ln 8)8^{2x}$$

مشقة e^u

2) $f(x) = 6^{2x}$

$f(x) = 6^{2x}$

الاحترار المتغير

$f'(x) = (\ln 6)6^{2x} (2x) = (2x \ln 6) 6^{2x}$

المتغير

3) $f(x) = e^{3x} + 2^{3x}$

$f(x) = e^{3x} + 2^{3x}$

الاحترار المتغير

$f'(x) = 3e^{3x} + (3 \ln 2)2^{3x}$

المتغير $f(x) = 3x$ حيث $f(x) = 3x$

والمتغير $f(x) = 3x \ln 2$ حيث $f(x) = 3x$

التحقق من قسمة

أوجد مشتقة كل اقتران مما يأتي:

⇒ $f(x) = \pi^{xx}$

⇒ $f(x) = 6^{1-x^2}$

⇒ $f(x) = e^{4x} + 4^{2x}$

log_a g(x) مشتقة

لايجاد مشتقة $\log_a x$ حيث a عدد حقيقي موجب، و $a \neq 1$ و $x > 0$ ، استخدمنا صيغة تغيير الأساس في اللوغاريتمات كتابة $\log_a x$ بدلالة اللوغاريتم الطبيعي، ثم أوجد المشتقة كما يأتي:

$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$

صيغة تغير الأساس

$\frac{d}{dx} (\log_a x) = \frac{d}{dx} \left(\frac{\ln x}{\ln a} \right)$

بمبدأ المشتقة

$= \frac{1}{\ln a} \times \frac{d}{dx} (\ln x)$

بمبدأ المشتقة $\frac{1}{x}$

$= \frac{1}{\ln a} \times \frac{1}{x}$

مشتقة الاحترار اللوغاريتم الطبيعي

$= \frac{1}{x \ln a}$

بالتبسيط

⇒ $\frac{d}{dx} (\log_a x) = \frac{1}{x \ln a}$

التذكير

$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$

بناءً على ما سبق، يمكن إيجاد مشتقة $\log_a g(x)$ ، حيث $g(x)$ اقتران، كما يأتي:

مشتقة $\log_a g(x)$

نظرية

إذا كان a عدداً حقيقياً موجباً، و $a \neq 1$ ، وكان $g(x)$ اقتراناً، حيث $g(x) > 0$ ، فإن:

$$\frac{d}{dx} (\log_a x) = \frac{1}{x \ln a} \quad \frac{d}{dx} (\log_a g(x)) = \frac{g'(x)}{(\ln a)g(x)}$$

مثال 7

أوجد مشتقة كل اقتران مما يأتي:

1) $f(x) = \log \cos x$

$$f(x) = \log \cos x$$

الاقتران البسيط

$$f'(x) = \frac{-\sin x}{(\ln 10) \cos x}$$

$$= -\frac{\tan x}{\ln 10}$$

مشتقة $\log_a g(x)$

المشتقة البسيطة

2) $f(x) = \log_2 \left(\frac{x^2}{x-1} \right)$

$$f(x) = \log_2 \left(\frac{x^2}{x-1} \right) = \log_2 x^2 - \log_2 (x-1)$$

قانون القسمة في
الاقتران

$$f'(x) = \frac{2x}{(\ln 2) x^2} - \frac{1}{(\ln 2)(x-1)}$$

$$= \frac{2}{(\ln 2) x} - \frac{1}{(\ln 2)(x-1)}$$

مشتقة $\log_a g(x)$
وقانون مشتقة الخرج

بسيطة

التحقق من النتيجة

أوجد مشتقة كل اقتران مما يأتي:

أ) $f(x) = \log \sec x$

ب) $f(x) = \log_3 (x^2 + 3x)$

الذكر

يُمكنك التوصل إلى
الاجابة عن طريق
قانون القسمة، حيث إن
10


انتبه

اختيار شغل الرأس هو
وسيلة صريحة لمعرفة ما إذا
كان منحنى قطبي يمثل
الترس أو لا. لا يمكن قطع خط
رأس المنحنى في أكثر من
نقطة واحدة لأن المنحنى لا
يشق الحركة، وإنما يمكن أن
خط رأس قطع المنحنى
في نقطة واحدة فقط، فإن
المنحنى يمثل الترس.

العلم

ليس ضرورياً أن يمثل
المُتغير t الزمن.

مشكلة المعادلات الوسيطة



يمثل الشكل المجاور منحنى P الذي يتحرك

على المنحنى C لحظة مرورها بالنقطة (x, y) .

ألاحظ أن المنحنى C لا يحقق اختبار الخط

الرأس لهذا لا يمكن إيجاد علاقة واحدة فقط

في صورة $y = f(x)$ لأن جميع قيم y المتطابقة لها على المنحنى، ولكن، يمكن كتابة

مثل من الإحداثي x والإحداثي y في صورة الحركة بالنسبة إلى الزمن t كما يأتي:

$$x = h(t), \quad y = g(t)$$

يمثل هذان الاكترتان معاً **معادلة وسيطة** (parametric equation) للمنحنى C .

ويعرف t **المُتغير الوسيط** (parameter)، لأن كل قيمة له تُحدد قيمة للمتغير x وقيمة أخرى

للمتغير y . وعند تعيين الأزواج العنصرية (x, y) في المستوى الإحداثي، يتبع المنحنى C .

يمكن تحديد قيم المُتغير t عن طريق تحرك المُتغير x في **مجال الوسيط** (parametric domain)


لأن النقاط على المنحنى قد تتكرر بعد هذه الفترة.

$$x = h(t), \quad y = g(t)$$

معادلة وسيطة

$$t_1 \leq t \leq t_2$$

مجال الوسيط



يمثل الشكل المجاور منحنى المعادلة الوسيطة:

$$x = 3 \cos t, \quad y = 2 \sin 2t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

يمكن إيجاد $\frac{dy}{dx}$ لهذه المعادلة الوسيطة بإيجاد مشتقة

كل من x و y بالنسبة إلى الوسيط t أولاً، ثم استعمال

قاعدة السلسلة على النحو الآتي:

$$\frac{dx}{dt} = -3 \sin t$$

إيجاد مشتقة x بالنسبة إلى المُتغير t

$$\frac{dy}{dt} = 4 \cos 2t$$

إيجاد مشتقة y بالنسبة إلى المُتغير t

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \times \frac{dt}{dx}$$

بالتصديق لقاعدة السلسلة

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}$$

$$= \frac{4 \cos 2t}{-3 \sin t}$$

نحسب الموتر المماس من $\frac{dy}{dx}$ عندما $t = 0$

$$\frac{dy}{dx} = 4 \cos 2t, \frac{dy}{dx} = -3 \sin t$$

بناءً على ما سبق، يمكن إيجاد مشتقة أي معادلة وسيطة كما يأتي:

مشتقة المعادلة الوسيطة

مفهوم أساسي

إذا كان h و g دالتين دالتين بالنسبة إلى المتغير الوسيط t ، وكان $dx = h(t)$ و $dy = g(t)$ فإن:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}, \frac{dx}{dt} \neq 0$$

مثال ٥

أوجد معادلة مماس منحنى المعادلة الوسيطة الآتية عندما $t = \frac{\pi}{4}$

$$x = 2 \sin t, \quad y = 3 \cos t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

الخطوة ١: أوجد ميل المماس عندما $t = \frac{\pi}{4}$

$$\frac{dx}{dt} = 2 \cos t$$

يوجد مشتقة x بالنسبة إلى المتغير t

$$\frac{dy}{dt} = -3 \sin t$$

يوجد مشتقة y بالنسبة إلى المتغير t

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}$$

مشتقة المعادلة الوسيطة

$$= \frac{-3 \sin t}{2 \cos t}$$

$$\frac{dy}{dx} = -3 \sin t, \frac{dx}{dt} = 2 \cos t$$

المشتقات المتبادلة

$$= -\frac{3}{2} \tan t$$

$$\text{عندما } t = \frac{\pi}{4}$$

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{\pi}{4}} = -\frac{3}{2} \tan \frac{\pi}{4}$$

$$= -\frac{3}{2}$$

قيمة المماس

المماس

يُحسب الزاوية $\theta = \tan^{-1} \left(\frac{dy}{dx} \right)$

لإدلاء على قيمة المشتقة

عندما $t = \frac{\pi}{4}$

الخطوة 1: أوجد x و y عندما $t = \frac{\pi}{4}$.

$$x = 2 \sin \frac{\pi}{4} = \frac{2}{\sqrt{2}}$$

$$t = \frac{\pi}{4}$$

$$y = 3 \cos \frac{\pi}{4} = \frac{3}{\sqrt{2}}$$

$$t = \frac{\pi}{4}$$

$$\text{إذن } x = \frac{2}{\sqrt{2}}, y = \frac{3}{\sqrt{2}}$$

الخطوة 2: أوجد معادلة المماس.

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

معادلة المماس عند النقطة P

$$y - \left(\frac{3}{\sqrt{2}}\right) = -\frac{3}{2} \left(x - \frac{2}{\sqrt{2}}\right)$$

$$\text{حيث } x_1 = \frac{2}{\sqrt{2}}, y_1 = \frac{3}{\sqrt{2}}, m = -\frac{3}{2}$$

$$2y + 3x = 6\sqrt{2}$$


معادلة المماس

التذكر

المماس عند النقطة P

$$\frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$$

الدعم التالي



يُبين الشكل المحاور التمثيل التالي المنحني

المعادلة الوسيطة: $x = 2 \sin t, y = 3 \cos t$.

حيث: $0 \leq t \leq 2\pi$, ومماس المنحني عند النقطة

$$P\left(\frac{2}{\sqrt{2}}, \frac{3}{\sqrt{2}}\right)$$

يمكن تحليل المعادلة الوسيطة باستخدام برمجية

جوجورا، عن طريق كتابة الصيغة الآتية في شرط الإدخال، ثم الضغط على **↵**:

$$\text{curve}(2 \sin t, 3 \cos t, t, 0, 2\pi)$$

التفكير من المنحني

أوجد معادلة مماس منحنى المعادلة الوسيطة الآتية عندما $t = \frac{\pi}{4}$

$$x = \sec t, \quad y = \tan t, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$$

أوجد مشتقة كل اقتران مما يأتي:

1 $f(x) = e^{2x+2}$

2 $f(x) = 50e^{2x-10}$

3 $f(x) = \cos(x^2 - 3x - 4)$

4 $f(x) = 10x^2 e^{-x^2}$

5 $f(x) = \sqrt{\frac{x+1}{x}}$

6 $f(x) = x^2 \tan \frac{1}{x}$

7 $f(x) = 3x - 5 \cos(\pi x)^2$

8 $f(x) = \ln\left(\frac{1+e^x}{1-e^x}\right)$

9 $f(x) = (\ln x)^4$

10 $f(x) = \sin \sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{\sin x}$

11 $f(x) = \sqrt[3]{x^2 + 8x}$

12 $f(x) = \frac{3^x}{x}$

13 $f(x) = 2^{-x} \cos \pi x$

14 $f(x) = \frac{10 \log_2 x}{x}$

15 $f(x) = \left(\frac{\sin x}{1 + \cos x}\right)^4$

16 $f(x) = \log_2(1 + x \ln x)$

17 $f(x) = e^{\sin 2x} + \sin(e^{2x})$

18 $f(x) = \tan^4(\sec(\cos x))$

أوجد معادلة المماس لكل اقتران مما يأتي عند قيمة x المعطاة:

19 $f(x) = 4e^{-4x^2}, x = -2$

20 $f(x) = x + \cos 2x, x = 0$


21 $f(x) = 2^x, x = 0$

22 $f(x) = \sqrt{x+1} \sin \frac{\pi x}{2}, x = 3$

23 إذا كان $A(x) = f(g(x))$ وكان: $f(-2) = 8, f'(-2) = 4, f'(5) = 3, g(5) = -2, g'(5) = 6$ فأوجد

$A'(5)$

24 إذا كان $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$ فأثبت أن: $f'(x) = \frac{1}{\sqrt{(x^2+1)^3}}$



يكثريا. يُعْطَى الاكتران: $A(t) = Ne^{kt}$ عند الخلايا اليكثرية بعد t ساعة في مجتمع يكتري.

25) أوجد مُعدَّل نمو المجتمع بعد 3 ساعات بدلالة الثابت N .

26) إذا كان مُعدَّل نمو المجتمع بعد t ساعة هو 0.2 خلية لكل ساعة، فما قيمة k

بدلالة الثابت N !

أوجد المشتقة العليا المطلوبة في كلِّ مما يأتي:

27) $f(x) = \sin \pi x, f'(x)$ 28) $f(x) = \cos(2x + 1), f'''(x)$ 29) $f(x) = \cos x^2, f'(x)$

30) إذا كان الاكتران: $y = e^{3x}$ فأوجد ميل مماس منحنى الاكتران عند النقطة $(0, 1)$.



31) مواد كيميائية يُمكن تملأها الكمية A (بالغرام) الممتلئة من عينة محتوية الاكتران 20 g من

عنصر البلوتونيوم بعد t يوما باستخدام الاكتران: $A(t) = 20\left(\frac{1}{2}\right)^{kt}$ أوجد مُعدَّل تحلُّل

عنصر البلوتونيوم عندما $t = 2$.

يُعطَى الاكتران: $s(t) = \sqrt{3 + t - t^2}, 0 \leq t \leq 2$ موقع جسم يتحرك في مسار مستقيم، حيث t الموقع بالأمتر، و t الزمن بالثواني:

32) أوجد سرعة الجسم ومسارعه بعد t ثانية.

33) أوجد الموقع الابتدائي للجسم.

34) في أيّ اتجاه يتحرك الجسم عندما $t = 1$!



35) يُمكن معالجة ضغط الدم لمرضى في حالة الراحة باستخدام الاكتران:

$P(t) = 100 + 20 \sin 2\pi t$ حيث P ضغط الدم بالمليمتر من الزئبق و t الزمن

بالثواني. أوجد مُعدَّل تغيُّر ضغط دم المرضى بالنسبة إلى الزمن t .



- ٢٤ يستعمل خبراء علم الاجتماع المعادلة: $N = P(1 - e^{-kt})$ لتقدير عدد الأشخاص الذين سيعفوا شائعة التشرت في مجتمع عدد أفراد P نسبة بعد t يوماً من انطلاقها. أوجد مُعدّل تغير عدد الأشخاص الذين يسمعون شائعة بالنسبة إلى الزمن t في مجتمع عدد أفراد 10000 نسمة.

أوجد معادلة المماس للمنتهى كل معادلة وسيطية مما يأتي عند النقطة المُحددة بقيمة t المعطاة:

٢٥ $x = t + 2, y = t^2 - 1, t = 1$

٢٦ $x = \frac{t}{2}, y = t^2 - 4, t = -1$


٢٧ $x = t - \sin t, y = 1 - \cos t, t = \frac{\pi}{3}$

٢٨ $x = \sec^2 t - 1, y = \tan t, t = -\frac{\pi}{4}$



- ٢٩ غزالان يُحشِل الاغزالان: $D(t) = 1500 + 400 \sin 0.4t$ عدد الغزالان في إحدى الغابات بعد t سنة من بدء دراسة لأحد الباحثين عليها. أوجد مُعدّل تغير عدد الغزالان في الغابة بالنسبة إلى الزمن t .

- ٣٠ يعطى منحنى بالمعادلة الوسيطة: $x = 2(t - \sin t), y = 2(1 - \cos t)$ حيث $0 \leq t \leq 2\pi$. أثبت أن ميل المماس وميل العمودي على المماس للمنتهى هذه العلاقة عندما $t = \frac{\pi}{4}$ هما $1 + \sqrt{2}$ و $1 - \sqrt{2}$ على الترتيب.



يُبين الشكل المجاور منحنى الاخرتين $f(x)$ و $g(x)$ إذا كان: $h(x) = f(g(x))$ وكان: $p(x) = g(f(x))$ فأوجد كلاً مما يأتي:

٣١ $h(1)$


٣٢ $p'(1)$

تبرر: إذا كان الاقتران: $y = \ln(ax + b)$ ، حيث a و b ثابتان موجبان، وكان ميل المماس لمنحنى الاقتران عند النقطة P هو a ، فأجيب عن الأسئلة التالية بإيجاز:

- ١) أثبت أن الإحداثي x للنقطة P أقل من a .
- ٢) أوجد قيمة كل من a و b ، علماً بأن P هي النقطة $(0, 2)$ ، ثم أذكر إحداثي y لهذا الإحداثي.
- ٣) أوجد إحداثي النقطة التي يكون عندها ميل المماس $\frac{1}{2}$.
- ٤) تبرر: يعطى منحنى بالمعادلة الوسيطة: $x = t^2, y = 2t$.
- ٥) أوجد $\frac{dy}{dx}$ بدلالة t .
- ٦) أوجد معادلة العمودي على مماس المنحنى عند النقطة $(a^2, 2a)$.
- ٧) أثبت أن مساحة المثلث المتكون من العمودي على المماس، والمحورين الإحداثيين، هي $\frac{1}{2} |a| (2 + a^2)^2$.
- ٨) حدد أبعاد $\frac{dy}{dx}$ لكل متباين.

٥١) $y = \sqrt{\sin \sqrt{x}}$

٥٢) $y = e^x \sin^2 x \cos x$



تحدد: يبين الشكل المجاور منحنى المعادلة الوسيطة:

$$x = \sin 2t, \quad y = \sin 3t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

- ٥٣) إذا كان مماس منحنى المعادلة أعلاه عند النقطة A الواقعة في الربع الأول، فأوجد إحداثي A .
- ٥٤) إذا كان مماس المنحنى موازاً للمحور y عند النقطة B ، فأوجد إحداثي B .
- ٥٥) إذا تمزق برجان من المنحنى بنقطة الأصل كما هو موضح في الشكل، فأوجد ميل المماس لكل منهما عند هذه النقطة.

تبرر: يعطى الاقتران: $s(t) = \ln(t^2 - 2t + 1.9), t \geq 0$ موقع الجسم يتحرك في مسار مستقيم، حيث s الموقع بالأمتار، و t الزمن بالثواني:

- ٥٦) أوجد سرعة الجسم وتسارعه بعد t ثانية.
- ٥٧) أوجد موقع الجسم وتسارعه عندما تكون مسافته صفراً.
- ٥٨) متى يعود الجسم إلى موقعه الابتدائي؟

الاشتقاق الضمني Implicit Differentiation


إيجاد مشتقات العلاقات الضمنية.

مفكرة التوليد

العلاقة الضمنية، الاشتقاق الضمني.

المصطلحات

مساحة اليوم




يتحرك سائق سيارته في اتجاه لافتة على طريق سريع كذا في الشكل المجاور. إذا كانت θ زاوية رؤية السائق للافتة، و x المسافة بينه وبين اللافتة بالأمتار، وكانت العلاقة التي تربط θ بـ x هي $\tan \theta = \frac{4x}{x^2 + 25}$ ، فبما تُعطي تغير θ بالنسبة إلى x ؟



العلاقة الضمنية والاشتقاق

جميع الاقترانات التي درستها مشتقاتها حتى الآن هي اقترانات تُكتب في صورة $y = f(x)$ بوجه عام، أي أنه يُمكن فيها التعبير عن مُتغيرٍ صراحةً بدلالة مُتغيرٍ آخر مثل الاقترانات الآتية:

$$y = x^2 - 8x, \quad y = \frac{7x}{x+4}, \quad y = \sqrt{x-1}$$



الأجظ أنه يوجد معادلات، مثل: $x^2 + y^2 - 9xy = 0$ يصعب (أو لا يُمكن) كتابتها بصورة صريحة كما يأتي: $y = f(x)$ لأنها حقيقةً تحوي داخلها أكثر من اقتران. فمثلاً، تكون المعادلة: $x^2 + y^2 - 9xy = 0$ من ثلاثة اقترانات، هي: f_1, f_2, f_3 كما في الشكل المجاور. ولكن، لا يُمكن كتابة هذه الاقترانات بصورة صريحة لما تُعطي هذه المعادلة **علاقة ضمنية** (implicit relation).

التحذير

تعلّقتُ في التمرين السابق إيجاد مشتقات المعادلات الوسيطة التي لا يُمكن فيها كتابة y صراحةً في صورة اقتران بدلالة x .

ولكن، كيف يُمكن إيجاد $\frac{dy}{dx}$ لعلاقة ضمنية، ولا يُمكن - في الوقت نفسه - كتابتها في صورة اقتران بصورة صريحة كما يأتي: $y = f(x)$ ؟

يُعطى على عملية إيجاد $\frac{dy}{dx}$ لعلاقة ضمنية اسم **الاشتقاق الضمني** (implicit differentiation).
 ويمكن تلخيص خطوات إجرائها كما يأتي:

الاشتقاق الضمني

مفهوم أساسي

باتخاذ أن معادلة تُعرف لا ضمنيًا بوصفها علاقة بالنسبة إلى المتغير x فإنه يُمكن إيجاد $\frac{dy}{dx}$ بالتبع الخطوات الآتية:

- **الخطوة 1:** نُشتق طرفي المعادلة بالنسبة إلى x ، مراعيًا استعمال قاعدة التفاضل عند الاشتقاق حدود تتضمن المتغير y .
- **الخطوة 2:** نُرتب حدود المعادلة بحيث تصبح جميع الحدود التي تحوي $\frac{dy}{dx}$ في طرف المعادلة الأيسر، والحدود الأخرى في طرف المعادلة الأيمن.
- **الخطوة 3:** نُخرج $\frac{dy}{dx}$ عاملًا مشتركًا من حدود طرف المعادلة الأيسر.
- **الخطوة 4:** نُحل المعادلة بالنسبة إلى $\frac{dy}{dx}$.

مثال 1

أوجد $\frac{dy}{dx}$ لكل ما يأتي:

1 $x^2 + y^2 = 4$

$$\frac{d}{dx}(x^2 + y^2) = \frac{d}{dx}(4)$$

بالتفاضل طرفي المعادلة بالنسبة إلى المتغير x

$$\frac{d}{dx}(x^2) + \frac{d}{dx}(y^2) = 0$$

لأنه مشتق المجموع، ومشتق الثابت

$$2x + 2y \frac{dy}{dx} = 0$$

لأنه مشتق القوة، ومشتق التفاضل

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$$

بحل المعادلة

2 $\sin x + \cos y = 2x - 3y$

$$\frac{d}{dx}(\sin x + \cos y) = \frac{d}{dx}(2x - 3y)$$

بالتفاضل طرفي المعادلة

بالنسبة إلى المتغير x

$$\frac{d}{dx}(\sin x) + \frac{d}{dx}(\cos y) = \frac{d}{dx}(2x) - \frac{d}{dx}(3y)$$

لأنه مشتق المجموع

ومشتق طرف

التعلم

الآن بعد أن أصبحت متأكدًا من فهمك للمعادلة في صورة التفاضل بشكل صحيح

$$\cos x - \sin y \frac{dy}{dx} = 2 - 3 \frac{dy}{dx}$$

قاعدة مشتقة التفاضل ومشتقة الجيب
ومشتقة جيب التمام، وقاعدة النسبة

$$3 \frac{dy}{dx} - \sin y \frac{dy}{dx} = 2 - \cos x$$

بجمع ترتيب الحدود

$$\frac{dy}{dx} (3 - \sin y) = 2 - \cos x$$

إخراج $\frac{dy}{dx}$ عاملًا مشتركًا

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2 - \cos x}{3 - \sin y}$$

حل المعادلة

التحقق من الحل

أوجد $\frac{dy}{dx}$ لكل مما يأتي:

a) $x^2 + y^2 = 13$

b) $2x + 5y^2 = \sin y$

أخرج في بعض المسائل إلى استعمال قاعدة مشتقة الضرب ومشتقة القسمة إضافة إلى قاعدة النسبة؛ لإيجاد مشتقة علاقة معينة.

مثال 3

أوجد $\frac{dy}{dx}$ لكل مما يأتي:

1) $2xy - y^3 = 1$

$$\frac{d}{dx}(2xy - y^3) = \frac{d}{dx}(1)$$

التحقن طرفي المعادلة بالنسبة إلى المتغير x .

$$\frac{d}{dx}(2xy) - \frac{d}{dx}(y^3) = 0$$

قاعدة مشتقة الضرب، ومشتقة الجيب

$$2x \frac{d}{dx}(y) + y \frac{d}{dx}(2x) - \frac{d}{dx}(y^3) = 0$$

قاعدة مشتقة الضرب

$$2x \frac{dy}{dx} + 2y - 3y^2 \frac{dy}{dx} = 0$$

قاعدة مشتقة التفاضل، ومشتقة النسبة

$$2x \frac{dy}{dx} - 3y^2 \frac{dy}{dx} = -2y$$

بجمع ترتيب الحدود

$$\frac{dy}{dx} (2x - 3y^2) = -2y$$

إخراج $\frac{dy}{dx}$ عاملًا مشتركًا

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-2y}{2x - 3y^2}$$

حل المعادلة

2 $\sin(x+y) = y^2 \cos x$

$$\frac{d}{dx}(\sin(x+y)) = \frac{d}{dx}(y^2 \cos x)$$

$$\frac{d}{dx}(\sin(x+y)) = y^2 \frac{d}{dx}(\cos x) + \cos x \frac{d}{dx}(y^2)$$

$$\cos(x+y) \left(1 + \frac{dy}{dx}\right) = -y^2 \sin x + \cos x \left(2y \frac{dy}{dx}\right)$$

$$\cos(x+y) + \cos(x+y) \frac{dy}{dx} = -y^2 \sin x + 2y \cos x \frac{dy}{dx}$$

$$\cos(x+y) \frac{dy}{dx} - 2y \cos x \frac{dy}{dx} = -y^2 \sin x - \cos(x+y)$$

$$\frac{dy}{dx}(\cos(x+y) - 2y \cos x) = -y^2 \sin x - \cos(x+y)$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-y^2 \sin x - \cos(x+y)}{\cos(x+y) - 2y \cos x}$$

الاشتقاق جزئي للمعادلة بالنسبة إلى المتغير x

المعادلة مشتقة الطرفين

ضربنا الجيب وضربنا جيب التمام والتربيع الطرف الأيمن وحلنا المعادلة

استخدمنا خاصية التوزيع

دعنا الآن نعيد المعادلة

نخرج $\frac{dy}{dx}$ من كلا الطرفين

أضربنا المعادلة في $\frac{dy}{dx}$

3 $y^2 = \frac{x-1}{x+1}$

$$\frac{d}{dx}(y^2) = \frac{d}{dx}\left(\frac{x-1}{x+1}\right)$$

$$2y \frac{dy}{dx} = \frac{(x+1) \frac{d}{dx}(x-1) - (x-1) \frac{d}{dx}(x+1)}{(x+1)^2}$$

$$2y \frac{dy}{dx} = \frac{(x+1)(1) - (x-1)(1)}{(x+1)^2}$$

$$2y \frac{dy}{dx} = \frac{x+1-x+1}{(x+1)^2}$$

$$2y \frac{dy}{dx} = \frac{2}{(x+1)^2}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2}{2y(x+1)^2}$$

$$= \frac{1}{y(x+1)^2}$$

الاشتقاق جزئي للمعادلة بالنسبة إلى المتغير x

المعادلة مشتقة الطرفين وضربنا الجيب

المعادلة مشتقة الطرفين

استخدمنا خاصية التوزيع

النتيجة

أضربنا المعادلة في $\frac{dy}{dx}$

النتيجة

✓ التحقق من تحقق

أوجد $\frac{dy}{dx}$ لكل مما يأتي:

a) $3xy^2 + y^3 = 8$ b) $\tan(x-y) = 2xy^2 + 1$ c) $x^2 = \frac{x-y}{x+y}$

المسئ

هل يمكن إيجاد $\frac{dy}{dx}$ في القسوم من المثال 2 بطريقة أخرى؟

قبل المعاميل لتحديد علاقة ضمنية

يمكن إيجاد ميل المعاميل المنحني علاقة ضمنية عند أي نقطة تحقق المعادلة، وذلك بإيجاد $\frac{dy}{dx}$ أولاً، ثم تعويض قيمتي x و y للنقطة المطلوب إيجاد قيمة الميل عندها.

مثال 3

أوجد ميل مماس منحنى العلاقة: $e^{2x} \ln y = x + y - 2$ عند النقطة $(1, 1)$.

الخطوة 1: أوجد $\frac{dy}{dx}$

$\frac{d}{dx}(e^{2x} \ln y) = \frac{d}{dx}(x + y - 2)$ يشتق طرفي المعادلة بحسب قاعدة التفاضل

$e^{2x} \frac{d}{dx}(\ln y) + \ln y \frac{d}{dx}(e^{2x}) = \frac{d}{dx}(x) + \frac{d}{dx}(y) - \frac{d}{dx}(2)$ قواعد اشتقاق اللوغاريتم والتمديد والتفاضل

$e^{2x} \times \frac{1}{y} \times \frac{dy}{dx} + \ln y \times 2e^{2x} = 1 + \frac{dy}{dx}$ قواعد اشتقاق اللوغاريتم الطبيعي والتمديد والتفاضل

$\frac{e^{2x}}{y} \times \frac{dy}{dx} - \frac{dy}{dx} = 1 - 2e^{2x} \ln y$ بمحاذاة ترتيب الحدود

$\frac{dy}{dx} \left(\frac{e^{2x}}{y} - 1 \right) = 1 - 2e^{2x} \ln y$ إخراج $\frac{dy}{dx}$ عندنا مشتركاً

$\frac{dy}{dx} = \frac{1 - 2e^{2x} \ln y}{\frac{e^{2x}}{y} - 1}$ حل المعادلة لـ $\frac{dy}{dx}$

الخطوة 2: أوجد $\frac{dy}{dx}$ عند النقطة $(1, 1)$.

$\frac{dy}{dx} \Big|_{(1,1)} = \frac{1 - 2e^{2(1)} \ln(1)}{e^{2(1)} - 1}$ بمجرد $x=1, y=1$

$= \frac{1}{e^2 - 1}$ بالتبسيط

إذن، ميل المماس لمنحنى العلاقة عند النقطة $(1, 1)$ هو $\frac{1}{e^2 - 1}$.

المعلم

يمكن إيجاد المماس عند النقطة المطلوبة بالمعنى في المعادلة الناتجة عند إيجاد مشتقة الطرفين، ما لم تكن المعادلة $\frac{dy}{dx}$

أوجد ميل مماس منحنى العلاقة: $y^2 = x$ عندما $x = 4$

الخطوة 1: أوجد $\frac{dy}{dx}$

$$\frac{d}{dx}(y^2) = \frac{d}{dx}(x)$$

$$2y \frac{dy}{dx} = 1$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2y}$$

استخدم طرق التفاضل الضمني أو التفاضل

مستلزم من التفاضل الضمني

معلمة التفاضل

الخطوة 2: أوجد $\frac{dy}{dx}$ عندما $x = 4$

أعوض قيمة x في العلاقة الأصلية لإيجاد قيمة y المقابلة لها

$$y^2 = x$$

$$y^2 = 4$$

$$y = \pm 2$$

علاقة الأصلية

عوض $x = 4$


أوجد الجذور من الطرفين

إذن، أوجد الميل عند النقطتين: $(4, 2)$ و $(4, -2)$:

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{(4, 2)} = \frac{1}{4}$$

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{(4, -2)} = -\frac{1}{4}$$

الدعم البياني



الأجف من التعليل البياني المتجاوز لمنحنى العلاقة: $x = y^2$ أو جزء تقاطع منحنى العلاقة، والإحداثي x لكل منهما 4، ما يعني أن لكل نقطتين مماساً مختلفاً لها، وهذا يؤكد منطقتنا الحل الجبري.

اشترك من فضلكم

(a) أوجد ميل مماس منحنى العلاقة: $y = \ln x$ عند النقطة $(e, 1)$

(b) أوجد ميل مماس منحنى العلاقة: $(y - 3)^2 = 4(x - 5)$ عندما $x = 6$

اشكر

لقد استفدت من
التعليق في الموقع من
المعلمين والمعلمين
والمتعلمين $x = 4$

معادلة المماس لمعادلة علاقة ثنائية

يمكن إيجاد معادلة المماس لمنحنى علاقة ثنائية بإيجاد ميله ثم التعويض في الصورة العامة

لمعادلة المنحنى.

مثال 4

أوجد معادلة المماس لمنحنى العلاقة $x^2 - xy + y^2 = 7$ عند النقطة $(-1, 2)$.

الخطوة 1: أوجد $\frac{dy}{dx}$.

$$\frac{d}{dx}(x^2 - xy + y^2) = \frac{d}{dx}(7)$$

اشتق طرفي المعادلة
بالنسبة إلى المتغير x .

$$\frac{d}{dx}(x^2) - \frac{d}{dx}(xy) + \frac{d}{dx}(y^2) = 0$$

تواجد مشتقات المجموع
والفرق، والتبسيط.

$$2x - (x \frac{dy}{dx} + y) + 2y \frac{dy}{dx} = 0$$

تواجد مشتقات كل حد
والحريه والتبسيط.

$$2x - x \frac{dy}{dx} - y + 2y \frac{dy}{dx} = 0$$

بالتعويض بحسبة التوزيع

$$2y \frac{dy}{dx} - x \frac{dy}{dx} = y - 2x$$

تجميع $\frac{dy}{dx}$ في الحد

$$(2y - x) \frac{dy}{dx} = y - 2x$$

تخراج $\frac{dy}{dx}$ معزولاً

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y - 2x}{2y - x}$$

بملي تبسيط $\frac{dy}{dx}$

الخطوة 2: أوجد $\frac{dy}{dx}$ عند النقطة $(-1, 2)$.

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{(-1, 2)} = \frac{2 - 2(-1)}{2(2) - (-1)}$$

$$= \frac{4}{5}$$

بملي $x = -1, y = 2$

بالتبسيط

إيجاد ميل المماس لمنحنى العلاقة عند النقطة $(-1, 2)$ هو $\frac{4}{5}$.

الخطوة 3: أوجد معادلة المماس عند النقطة $(-1, 2)$.

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

معاد المماس بميله m ونقطة

$$y - (2) = \frac{4}{5}(x - (-1))$$

بملي $x_1 = -1, y_1 = 2, m = \frac{4}{5}$

$$y = \frac{4}{5}x + \frac{14}{5}$$

بالتبسيط

التحقق من فهمي

أوجد معادلة المماس لمنحني العلاقة: $x^2 + y^2 - 3xy = 17$ عند النقطة $(2, 3)$.

المشكلة III المماس للمنحني

تعلمت في الأداة السابقة استعمال الاشتقاق الضمني لإيجاد $\frac{dy}{dx}$ ، وستعلم الآن كيف أجد $\frac{d^2y}{dx^2}$ باستعمال الاشتقاق الضمني، وذلك بإشتقاق $\frac{dy}{dx}$ بالنسبة إلى المتغير عند حلها بأنه إذا كانت المشتقة الأولى على y فإن $\frac{d^2y}{dx^2}$ ستحتوي على الرمز $\frac{dy}{dx}$ الذي يمكن حذفه بتعويض قيمته.

مثال 5

إذا كان: $2x^2 - 3y^2 = 8$ ، فأوجد $\frac{d^2y}{dx^2}$.

الخطوة 1: أجد $\frac{dy}{dx}$

$$\frac{d}{dx}(2x^2 - 3y^2) = \frac{d}{dx}(8) \quad (8)$$

$$\frac{d}{dx}(2x^2) - \frac{d}{dx}(3y^2) = 0$$

$$6x^2 - 6y \frac{dy}{dx} = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x^2}{y}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{(y) \frac{d}{dx}(x^2) - (x^2) \frac{d}{dx}(y)}{(y)^2}$$

$$= \frac{2xy - x^2 \frac{dy}{dx}}{y^2}$$

$$= \frac{2xy - x^2 \left(\frac{x^2}{y}\right)}{y^2}$$

$$= \frac{2xy^2 - x^3}{y^3}$$

الاشتقاق طرفي المعادلة بالنسبة إلى المتغيرات

لإيجاد المشتقات الضمنية، والفرق والتفاضل

إيجاد مشتقة التفاضل والنسبة

حل المشتقة $\frac{dy}{dx}$

الخطوة 2: أجد $\frac{d^2y}{dx^2}$

إيجاد مشتقة النسبة

إيجاد مشتقة التفاضل والنسبة

تبسيط $\frac{dy}{dx} = \frac{x^2}{y}$

تبسيط

تحقق من فهمي

إذا كان: $y + y^2 = 2x$ فأوجد $\frac{d^2y}{dx^2}$

المشكلة الثانية للمعادلة الوسيطة

تعلمت في الدرس السابق كيفية إيجاد مشتقة المعادلات الوسيطة. وسنُعلم الآن كيف نجد المشتقة الثانية للمعادلات الوسيطة باستخدام الاشتقاق الضمني.

المشكلة الثانية للمعادلة الوسيطة

مفهوم أساسي

إذا كان: $x = h(t)$ و $y = g(t)$ حيث h و g اقترانان، وكان $\frac{dy}{dx}$ اقتراناً بالنسبة إلى المتغير t ، فإن:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{\frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right)}{\frac{dx}{dt}} \neq 0$$

التعلم

يماثل $\frac{d^2y}{dx^2}$ في المعادلة الوسيطة هي التمران بالنسبة إلى المتغير t ، فإن إيجاد المشتقة الثانية يكون عملياً بالنسبة إلى المتغير t .

مثال 6

أوجد $\frac{d^2y}{dx^2}$ للمعادلة الوسيطة الآتية عندما $t = 1$:

$$x = t^3 + 3t^2, y = t^4 - 8t^2$$

الخطوة 1: أوجد $\frac{dy}{dx}$

$$\frac{dx}{dt} = 3t^2 + 6t$$

إيجاد مشتقة x بالنسبة إلى المتغير t

$$\frac{dy}{dt} = 4t^3 - 16t$$

إيجاد مشتقة y بالنسبة إلى المتغير t

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}$$

مشتقة المعادلة الوسيطة

$$= \frac{4t^3 - 16t}{3t^2 + 6t}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{4t^3 - 16t}{3t^2 + 6t}, \frac{dx}{dt} = 3t^2 + 6t$$

تخراج العامل المشترك من البسط والمقام

$$= \frac{4t(t^2 - 4)}{3t(t + 2)}$$

تحليل الحدود من الثورتين

$$= \frac{4(t + 2)(t - 2)}{3(t + 2)}$$

$$= \frac{4}{3}(t - 2)$$

بالتبسيط

التعلم

توجد المشتقة الأولى يُسهل عملية إيجاد المشتقة الثانية

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{4}{3} (t-2) \right) = \frac{4}{3}$$

$$\frac{d^2y}{dt^2} = \frac{d}{dt} \left(\frac{4}{3} \right)$$

$$= \frac{4}{3t^2 + 6t} = \frac{4}{3(3t^2 + 6t)}$$

$$\left. \frac{d^2y}{dt^2} \right|_{t=1} = \frac{4}{3(3(1)^2 + 6(1))}$$

$$= \frac{4}{27}$$

الخطوة 3: أوجد $\frac{d^2y}{dt^2}$ عندما $t = 1$

ويتم ذلك عن طريق التفاضل الجزئي:

المعادلة التفاضلية الجزئية:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{4}{3} \right) = \frac{4}{3} \cdot \frac{dt}{dt} = 3t^2 + 6t$$

عند $t = 1$:

نتيجة:

التحقق من النتيجة:

أوجد $\frac{d^2y}{dt^2}$ للمعادلة التفاضلية الآتية عندما $t = 2$

$$x = 3t^2 + 1, y = t^3 - 2t^2$$

أجابوا بالمثل المسائل

أوجد $\frac{dy}{dx}$ لكل من الآتي:

1 $x^2 - 2y^2 = 4$

2 $\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} = \frac{1}{10}$

3 $(x^2 + y^2)^2 = 50(x^2 - y^2)$

4 $e^x y = \pi x^2$

5 $3^x = y - 2xy$

6 $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 5$

7 $x = \sec \frac{1}{y}$

8 $(\sin \pi x + \cos \pi y)^2 = 2$

9 $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} = 5$

10 $x + y = \cos(xy)$

11 $x^2 + y^2 = \ln(x + y)^2$

12 $\sin x \cos y = x^2 - 5y$

أوجد $\frac{dy}{dx}$ لكل من الآتي عند القيمة المعطاة:

13 $2y^2 + 2xy - 1 = 0, x = \frac{1}{2}$

14 $y^2 + 2x^2 = 11y, y = 1$

أوجد ميل العماس المنحني كل علاقة مما يأتي عند النقطة المعطاة:

15. $x^2 + y^2 = 25$, (3, -4)

16. $x^2 y = 4(2 - y)$, (2, 1)

17. $e^{\sin x} + e^{\cos y} = e + 1$, $(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$

18. $\sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{y} = 5$, (8, 1)

أوجد معادلة العماس المنحني كل علاقة مما يأتي عند النقطة المعطاة:

19. $x^2 + xy + y^2 = 13$, (-4, 3)

20. $x + y - 1 = \ln(x^2 + y^2)$, (1, 0)

أوجد $\frac{dy}{dx}$ لكل مما يأتي:

21. $x + y = \sin y$

22. $4y^3 = 6x^2 + 1$

23. $xy + e^y = e$

24. إذا كان $x^2 + y^2 = 3xy + 19$ فأوجد قيمة $\frac{dy}{dx}$ عندما $x = -1$

25. أوجد معادلة العماس المنحني على العماس المنحني العلاقة $(x - 6)(y + 4) = 2$ عند النقطة $(7, -2)$

26. أثبت أن المنحني العلاقة $3x^2 + 2xy + y^2 = 6$ مماسي أفقي، ثم أوجد إحداثي نقطتي العماس.

27. أوجد إحداثي نقطة على المنحني $x + y = 1$ بحيث يكون عمدها مماس المنحني موازاً للمستقيم $x + 2y = 0$

28. أوجد إحداثي نقطة عمدة (تقاطع) على المنحني $y = x^2$ بحيث يكون عمدها مماس المنحني عمودياً على المستقيم $y + 3x - 5 = 0$ حيث $y > 0$

29. إذا كان $x^2 + y^2 = 25$ فأثبت أن $y' = -\frac{25}{y}$

30. إذا كان $\sqrt{\frac{x}{y}} + \sqrt{\frac{y}{x}} = 10$ ، حيث $x > 0, y > 0$ فأثبت أن $\frac{dy}{dx} = \frac{x}{y}$

31. أوجد إحداثيات جميع النقاط على منحنى الدائرة $x^2 + y^2 = 100$ التي يكون عمدها ميل العماس $\frac{3}{4}$

32. إذا كان $y = \ln x$ ، حيث $x > 0$ فأثبت أن $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x}$ باستخدام الاشتقاق الضمني.

أوجد $\frac{dy}{dx}$ لكل معادلة وسيطة مما يأتي عند قيمة t المعطاة:


٤٤ $x = \sin t, y = \cos t, t = \frac{\pi}{4}$

٤٥ $x = t^3, y = t^2 + t + 1, t = 0$

إذا كانت العلاقة $x^2 + y^2 = 6xy$ فأجيب عن السؤالين الآتيين تبعاً:

٤٦ أوجد معادلة المماس عند نقطة تقاطع منحنى المعادلة مع منحنى $y = x$ في الربع الأول.

٤٧ أوجد إحداثي نقطة على منحنى العلاقة في الربع الأول، بحيث يكون عندما مماس المنحنى أفقياً.



٤٨ ليكن الشكل المجاور منحنى العلاقة $x^2 + y^2 = 2$ والمستقيم l الذي

يُعطى معادته المنحنى العلاقة في الربع الأول. أوجد معادلة المستقيم

بإستعمال المشتقة.

٩٥ مهارات التحليل العليا

تبرهن: إذا كان $x^2 - y^2 = 1$ فأجيب عن الأسئلة الأربعة الآتية تبعاً:

٤٩ أوجد $\frac{dy}{dx}$

٥٠ ليكن التعبير عن منحنى العلاقة $x^2 - y^2 = 1$ بالمعادلة الوسيطة: $x = \sec t, y = \tan t$ حيث $-\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$

أستعمل هذه الحقيقة لإيجاد $\frac{dy}{dx}$ بدلالة t .

٥١ أثبت أن المعقدتين العكسيتين اللذين يُعطيان $\frac{dy}{dx}$ الناتجين في السؤالين السابقين متكافئان، ثم أقرره إيجابياً.

٥٢ أوجد إحداثيات النقاط التي يكون عندها ميل المماس لمنحنى العلاقة يساوي 2.

٥٣ تبرهن: إذا مثل l أي مماس لمنحنى المعادلة $\sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{k}$ ، حيث k عدد حقيقي موجب، فأثبت أن مجموع

المقطع x والمقطع y للمستقيم l يساوي k ، ثم أقرره إيجابياً.

المُعدَّلات المرتبطة

Related Rates

حلّ مسائل وتطبيقات حياتية على المُعدَّلات المرتبطة بالزمن.

معرفة الدرس



تُستعمل المعادلة: $S = \frac{\sqrt{hm}}{19}$ لحساب المساحة العرضية لسطح جسم الإنسان، حيث h ثابت يُقاس بطوله بالسنتيمتر، و m كتلته بالكيلوغرام.

مسألة اليوم



يُباع عذبة غذائية تتجمد بنحو 2 kg شهرياً. ما المعدّل التغيّر في مساحة سطح جسمه عندما تصبح كتلته 70 kg ، علماً بأن طوله 170 cm ؟



عند استعمال معادلة ما لترتيب بين كميات تتغيّر كلّ منها بنسبة إلى الزمن، فإنه يُمكن استعمال قاعدة السلسلة لاشتقاق هذه المعادلة بالنسبة إلى الزمن، فنضع معادلة جديدة تربط بين مُعدَّلات تغيّر هذه الكميات بالنسبة إلى الزمن، ونُحدد قيمة مُعدّل التغيّر لأيّ من هذه الكميات في لحظة ما إذا عُرفت مُعدَّلات تغيّر الكميات الأخرى، ونقيم الكميات جميعها في هذه اللحظة.

استراتيجية حل مسائل المُعدَّلات المرتبطة

مفهوم أساسي

- 1) أفهم المسألة: اقرأ المسألة جيداً، ثم أحدّد المتغيّر الذي أريد إيجاد مُعدّل تغيّره، ومُعدَّلات التغيّر المعطاة.
- 2) ارسم مخططاً: ارسم مخططاً يُعكس المسألة، ثم أدوّن عليه المعلومات المُهمّة لحلّ المسألة، مثل: الكميات الثابتة، والكميات المتغيّرة بمرور الزمن.
- 3) اكتب معادلة: اكتب معادلة تربط بين المتغيّر الذي أريد إيجاد مُعدّل تغيّره والمتغيّرات التي حلقت مُعدَّلات تغيّرها.
- 4) اشتق بالنسبة إلى الزمن: استعمل قاعدة السلسلة والاشتقاق التفاضلي لإيجاد مشتقة كلٍّ من المُعدَّلات المرتبطة بالنسبة إلى المتغيّر الوسيط.
- 5) ابدؤي، ثم أوجد مُعدّل التغيّر المطلوب: احرّصي في المعادلة الناتجة جميع القيم المعروفة للمتغيّرات ومُعدَّلات تغيّرها، ثم حلّ المعادلة لتبيّن مُعدّل التغيّر المطلوب إيجاد.

تُعدّل قطر المساحة والحجم بالنسبة إلى الزمن

يُطلب حلّ بعض المسائل الجبرية إيجاد مُعدّل تغيّر المساحة أو الحجم بالنسبة إلى الزمن، مثل تغيّر مساحة موجات الماء الدائرية المتكوّنة على سطح ماء عند قَطْر المطر.

مثال 1



عند سقوط قطرة ماء على مُسطّح مائي، تتكوّن موجات دائرية مُتّحدة المركز. إذا كان نصف قطر إحدى الدوائر يزداد بمُعدّل 3 cm/s ، فابحث مُعدّل تغيّر مساحتها.

ف تُعدّل تغيّر محيط الدائرة عندما يكون نصف قطرها 5 cm

الخطوة 1: اكتب معادله، وأخذ المصطلحات والمطلوب.

المعادلة: أعرّف r هو نصف قطر الدائرة، وأن C هو محيطها. ومن ثمّ، يمكن الربط بين المُتغيّرين باستخدام المعادلة الآتية:

$$C = 2\pi r$$

تُعدّل القطر المُعطى: $\frac{dr}{dt} = 3$

المطلوب: $\left. \frac{dC}{dt} \right|_{r=5}$

الخطوة 2: أشتق طرفي المعادلة بالنسبة إلى t ثمّ أعرّف.

$$C = 2\pi r$$

المعادلة

$$\frac{d}{dt}(C) = \frac{d}{dt}(2\pi r)$$

يوجد مشتق طرفي المعادلة بالنسبة إلى t

$$\frac{dC}{dt} = 2\pi \times \frac{dr}{dt}$$

أخذ المشتق

$$= 2\pi(3)$$

$$= 6\pi$$

$$= 6\pi$$

المساحة

إذن، يزداد محيط الدائرة بمُعدّل $6\pi \text{ cm/s}$ عندما يكون نصف قطرها 5 cm

التعميم

الأجسام التي تتحرك بتغيّر محيط الدائرة لا يتأثر طول نصف القطر، وهذا يعني أنّ المحيط مُعدّل تغيّر ثابت.

تعدل تغير مساحة الدائرة عندما يكون نصف قطرها 9 cm

الخطوة 1: اكتب معادلتها، وأخذ المشتقات والمطلوب:

المعادلة التي هي أن A هي مساحة الدائرة ومن ثم، يُمكن الربط بين A و r باستخدام المعادلة الآتية:

$$A = \pi r^2$$

فعدّل التفاضل المعادلة

$$\left. \frac{dA}{dt} \right|_{r=9}$$

الخطوة 2: أشتق طرفي المعادلة بالنسبة إلى t كما تم أخيراً:

$$A = \pi r^2$$

المعادلة

$$\frac{d}{dt}(A) = \frac{d}{dt}(\pi r^2)$$

يجاد مشتق طرفي المعادلة بالنسبة إلى t

$$\frac{dA}{dt} = 2\pi r \times \frac{dr}{dt}$$

المعادلة

$$\left. \frac{dA}{dt} \right|_{r=9} = 2\pi(9)(3)$$

$$r = 9, \frac{dr}{dt} = 3$$

$$= 54\pi$$

النتيجة

إذن، لو زاد مساحة الدائرة بتعدل $54\pi \text{ cm}^2/\text{s}$ عندما يكون نصف قطرها 9 cm


✓ الناتج من فحوص

تبلغ حاجته بالوقت على شكل كروي في تاد حجومه بتعدل $80 \text{ cm}^3/\text{s}$. أوجد تعديل رايانه نصف قطر البالون عندما يكون نصف القطر 6 cm

فعدّل تغير المسافة بالنسبة إلى الزمن

يُعد إيجاد معدل تغير المسافة بين جسمين متحركين أحد التطبيقات الجيدة المهمة لعلم التفاضل، ومن ذلك إيجاد معدل تغير المسافة بين سيارتين أثناء حركتهما.

تتحرك السيارة A في اتجاه الغرب بسرعة 90 km/h ، وتتحرك السيارة B في اتجاه الشمال بسرعة 100 km/h ، وهما تتجهان نحو تقاطع مروري. أوجد المعدل تغير البعد بين السيارتين عندما تكون السيارة A والسيارة B على بُعد 0.3 km و 0.4 km (على الترتيب) من التقاطع.



الخطوة 1: أرسم مُخطَّطًا، ثم أكتب معادلة، وأحدِّد المطلوب.

أرسم المُخطَّط، وأحدِّد عليه المتغيرات الواردة في المسألة، ثم أكتب نقطة التقاطع المروري C .

المعادلة: أعرِّض أن z هو المسافة بين A و C ،

وأن y هو المسافة بين C و B ، وأن x هو المسافة بين A و B ، ومن ثمَّ يُمكن

الاستعانة بنظرية فيثاغورس للربط بين x و y وباستعمال المعادلة الآتية:

$$z = \sqrt{x^2 + y^2}$$

معدل التغير المعطى: $\frac{dx}{dt} = -90, \frac{dy}{dt} = -100$

المطلوب: $\left. \frac{dz}{dt} \right|_{\substack{x=0.3 \\ y=0.4}}$

الخطوة 2: أشتق طرفي المعادلة بالنسبة إلى t ، ثم أعرِّض.

$$z = \sqrt{x^2 + y^2}$$

المعادلة

$$\frac{d}{dt}(z) = \frac{d}{dt}(\sqrt{x^2 + y^2})$$

يجد مشتق طرفي المعادلة بالنسبة إلى t

$$\frac{dz}{dt} = \frac{2x \frac{dx}{dt} + 2y \frac{dy}{dt}}{2\sqrt{x^2 + y^2}}$$

أعده التفاضل، ولا تنس أن تضع النسبة

$$= \frac{2(0.3)(-90) + 2(0.4)(-100)}{2\sqrt{(0.3)^2 + (0.4)^2}}$$

بحرص $\frac{dz}{dt} = -128, x = 0.3$

$y = 0.4, \frac{dy}{dt} = -100$

$$= -128$$

النتيجة

إذاً، تتحرك السيارتان إحداهما من الأخرى بمعدل 128 km/h عندما تكون السيارة A والسيارة B على بُعد 0.3 km و 0.4 km (على الترتيب) من التقاطع.

التلميح

أنايظ أن حساب كل من x و y لا يحتاج إلى المثلث، فبمجرد تحديد كل من x و y يمكن حساب z .

المعنى من المعنى

تتحرك السيارة A والسيارة B في الوقت نفسه، ومن النقطة نفسها، بحيث تتجهت السيارة A نحو الشمال بسرعة 45 km/h ، والتجهت السيارة B نحو الشرق بسرعة 40 km/h . أوجد المعدل تغير البعد بين السيارتين بعد ساعتين من انطلاقهما.

معدل تغير الزاوية بالنسبة إلى الزمن

تعلقت سابقاً أن زاوية الارتفاع هي الزاوية المحصورة بين خط النظر إلى الأعلى والخط الأفقي، وأن زاوية الانخفاض هي الزاوية المحصورة بين خط النظر إلى الأسفل والخط الأفقي، والآن سنلتم حسب معدل تغير زاوية الارتفاع و زاوية الانخفاض بالنسبة إلى الزمن.

مثال 3: من الحياة

وجدت كاميرا مثبتة عند مستوى سطح الأرض لحظة إطلاق صاروخ رأسياً إلى الأعلى، وقد أعطى موقعه بالأكسار $f(t) = 50t^2$ حيث t الوقت بالأكسار، و θ الزاوية بالسراني. إذا كانت الكاميرا تبعد مسافة 2000 ft عن نقطة الإطلاق، فأوجد معدل تغير زاوية ارتفاع الصاروخ بعد 10 ثوانٍ من الطلاق.



الخطوة 1: ارسم مخططاً، ثم اكتب معادلتها وأحدد المطلوبين.
 ارسم المخطط، ثم أحدد عليه المعطيات الواردة في المسألة.

المعادلة: أعتبر أن θ هي زاوية ارتفاع الصاروخ، وأن s هو موقع الصاروخ. ومن ثم يمكن الربط بين s و θ باستعمال المعادلة الآتية:

$$\tan \theta = \frac{s}{2000}$$

معدل التغير المطلوب، بما أن موقع الصاروخ هو $s(t) = 50t^2$ ، فبالسرعة هي

$$v(t) = \frac{ds}{dt} = 100t$$

المطلوب: $\left. \frac{d\theta}{dt} \right|_{t=10}$

المصدر: [www.khanacademy.com](#)



الخطوة 2: نشتق طرفي المعادلة بالنسبة إلى t ، ثم نحولها

$$\tan \theta = \frac{s}{2000} \quad \text{المعادلة}$$

$$\frac{d}{dt} (\tan \theta) = \frac{d}{dt} \left(\frac{s}{2000} \right) \quad \text{الاشتقاق طرفي المعادلة بالنسبة إلى } t$$

$$\sec^2 \theta \times \frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{2000} \times \frac{ds}{dt} \quad \text{قاعدة المشتقة}$$

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{\cos^2 \theta}{2000} \times \frac{ds}{dt} \quad \text{بحل المعادلة لـ } \frac{d\theta}{dt}$$

لإيجاد $\cos^2 \theta$ ، نستعمل النسب المثلثية:

$$\cos \theta = \frac{2000}{\sqrt{s^2 + (2000)^2}} \quad \text{تجيب تمام الزاوية}$$

$$\cos \theta = \frac{2000}{\sqrt{(50t)^2 + (2000)^2}} \quad \text{بحل محل } s = 50t$$

$$= \frac{2000}{\sqrt{(50(10))^2 + (2000)^2}} \quad \text{بحل محل } t = 10$$

$$= \frac{2}{\sqrt{29}} \quad \text{بالتبسيط}$$

إذن: $\cos \theta = \frac{2}{\sqrt{29}}$ بعد 10 ثوانٍ من انطلاق الصاروخ.

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{\cos^2 \theta}{2000} \times \frac{ds}{dt} \quad \text{المعادلة الناتجة من الاشتقاق}$$

$$= \left(\frac{2}{\sqrt{29}} \right)^2 \times 100t \quad \text{بحل محل } \cos^2 \theta = \frac{2}{\sqrt{29}} \text{ ما هو } \frac{ds}{dt} = 100t$$

$$= \left(\frac{2}{\sqrt{29}} \right)^2 \times 100(10) \quad \text{بحل محل } t = 10$$

$$= \frac{2}{29} \quad \text{بالتبسيط}$$

إذن، معدل تغير زاوية ارتفاع الصاروخ عندما $t = 10$ هو $\frac{2}{29} \text{ rad/s}$.

المطلوب

هل توجد طريقة أخرى
لحل المسألة؟

المسألة من نصي




أمسك ولد بيكرة عويط طائرة ورقية تجلّق على ارتفاع 50 m فوق سطح الأرض، وتتحرك أفقيًا بسرعة 2 m/s. أوجد معدل تغير الزاوية بين الخيط والمسوى الأفقي عندما يكون طول الخيط 100 m، علمًا بأن ارتفاع يد الولد عن الأرض 1.5 m

معدل التغير بالنسبة إلى الزمن والحركة الدائرية

تعلمت سابقًا الحركة الدائرية، والآن سنُعلم حساب معدلات تغير زاوية مرتبطة بهذا النوع من الحركة:

مثال 4




يلوح مصباح لفتك بالأرض حول نفسه في دورات في الدقيقة، وبعد مسافة 4 m من جدار مستقيم كما في الشكل المجاور. أوجد متوسطة تحرك بقعة ضوء المصباح على الجدار عندما تكون على بُعد 8 m من أقرب نقطة إلى المصباح على الجدار أثناء حركتها لتبتعد عن هذه النقطة.

اليد تفتح قوس
التصوير كزوايا



الخطوة 1: ارسم المخطط، ثم فحّب معادلة، وأخذ المظروب.



ارسم المخطط، ثم أخذ عليه موقع المصباح، وموقع بقعة الضوء P، وأترب نقطة إلى المصباح على الجدار وهي النقطة A التي تبعد عنه مسافة 4 m

المعادلة: أنظر أن بقعة الضوء P تبعد مسافة x عن A، وأن θ هي الزاوية ALP ومن ثم، يمكن الرظ بين x و θ باستخدام المعادلة الآتية:

$$x = 4 \tan \theta$$

معدل التغير المسطح: معدل تغير الزاوية θ بالنسبة إلى الزمن، وهو يمثل السرعة الزاوية

أستعمل معطيات السؤال لإيجاد السرعة الزاوية كالتالي:

قياس الدورة الكاملة 2π ، وهذا يعني أن كل 3 دورات تُقابل زاوية الدوران التي قياسها $3 \times 2\pi$ أو 6π راديان.

$$\frac{d\theta}{dt} = \omega = \frac{\theta}{t}$$

$$= \frac{6\pi}{1 \text{ min}}$$

السرعة الزاوية

$$\theta = 6\pi, t = 1 \text{ min}$$

إذن، السرعة الزاوية لبقعة الضوء $\frac{d\theta}{dt} = 6\pi \text{ rad/min}$ ، وهي تُعطي مُعدل التغير المعطى.

$$\left. \frac{dx}{dt} \right|_{x=8}$$

الخطوة 5: أشتق طرفي المعادلة بالنسبة إلى t ثم أحوّل.

$$x = 4 \tan \theta$$

المعادلة

$$\frac{d}{dt}(x) = \frac{d}{dt}(4 \tan \theta)$$

توجد نقطة طرفي المعادلة بالنسبة إلى t

$$\frac{dx}{dt} = 4 \sec^2 \theta \times \frac{d\theta}{dt}$$

القاعدة الأولى، والأضرب بالصفر

أستعمل متطابقات فيثاغورس لإيجاد $\sec^2 \theta$ عندما $x = 8$

$$x = 4 \tan \theta$$

المعادلة الأصلية

$$8 = 4 \tan \theta$$

$$x = 8$$

$$\tan \theta = 2$$

يُحل المعادلة لـ θ ($\tan \theta = 2$)

$$\sec^2 \theta = 1 + \tan^2 \theta$$

هناك صيغة لتطوّر \sec

$$= 1 + 2^2$$

$$\tan \theta = 2$$

$$= 5$$

بالتبسيط

$$\text{إذن، } \sec^2 \theta = 5 \text{ عندما } x = 8$$

المعادلة الناتجة من الأضرب

$$\frac{dx}{dt} = 4 \sec^2 \theta \times \frac{d\theta}{dt}$$

$$\left. \frac{dx}{dt} \right|_{x=8} = 4(5) \times 6\pi$$

$$= 120\pi$$

بالتبسيط

إذن، تتحرك بقعة الضوء بسرعة $120\pi \text{ m/min}$ عندما تكون على بُعد 8 m عن النقطة A أثناء

حركتها المُتعددة عن هذه النقطة.

الذكر

السرعة الزاوية هي قيمة تُقاس في قياس الزاوية بالراديان مقسومة على الزمن المتغير، ويُقاس (بجانب الزاوية)

التحقق من فهمي



بدور مصباح مثبت على الأرض حول نفسه 4 دورات في الدقيقة، وبعد مسافة 3 m عن جدار مستقيم كما في الشكل المجاور. أوجد سرعة تحريك بقعة ضوء المصباح على الجدار عندما تكون على بُعد 1 m من أقرب نقطة إلى المصباح على الجدار أثناء تحريكها المتكررة من هذه النقطة.


معدل تغير حجم السائل بالنسبة إلى الزمن

من المفهوم أن السوائل تتخذ شكل الوعاء الذي توضع فيه لذا يمكن حساب معدل تغير حجم السائل بالنسبة إلى الزمن اعتماداً على شكل الوعاء ومعدل...

مثال 3

خزان ماء على شكل مخروط دائري قائم، ارتفاعه 5 m، ونصف قطره قاعدته 2 m، ورأسه إلى الأسفل.

تسرب الماء من الخزان بمعدل $\frac{1}{12} \text{ m}^3/\text{min}$. ما معدل تغير ارتفاع الماء في الخزان عندما يكون ارتفاعه 4 m؟



الخطوة 1: أرسم مخططاً، ثم أكتب معادته، وأحدد المتغيرات.
أرسم المخطط، ثم أحدد عليه المعطيات الواردة في المسألة.

المعادة: المتغير r هو نصف قطر سطح الماء في الخزان، و h ارتفاع الماء في الخزان. V حجم الماء في الخزان. ومن ثم، يمكن الربط بين V و h باستخدام المعاداة الآتية:

$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$

فخذ المشتق المعتمد:

$$\frac{dV}{dt} = -\frac{1}{12}$$

المتطلبه: $\left. \frac{dh}{dt} \right|_{h=4}$

أداة تصفح عربي
تقارير إلكترونية



العلم

أوجد أن حجم الماء المتدفق في الخزان إذا كان $\frac{dV}{dt}$ يساوي...

الخطوة ١: أكتب المعادلة بدلالة المتغير واحد

يُمكنني كتابة V بدلالة القطر الذي أريد إيجاد معدل تغيره، وهو h ، باستخدام
تساوي المسافات:

$$\frac{r}{h} = \frac{2}{5} \rightarrow r = \frac{2h}{5}$$

وبذلك، يُمكن كتابة المعادلة على النحو الآتي:

$$V = \frac{1}{3} \pi \left(\frac{2h}{5} \right)^2 h = \frac{4\pi}{75} h^3$$

الخطوة ٢: أشتق طرفي المعادلة بالنسبة إلى المتغير المطلوب

$$V = \frac{4\pi}{75} h^3$$

المعادلة

$$\frac{d}{dt}(V) = \frac{d}{dt} \left(\frac{4\pi}{75} h^3 \right)$$

اشتق كلا طرفي المعادلة بالنسبة إلى t

$$\frac{dV}{dt} = \frac{4\pi}{75} \times 3h^2 \times \frac{dh}{dt}$$

أضرب المشتق بالأضغاط المتساوية

$$-\frac{1}{12} = \frac{4\pi}{75} \times 3(4)^2 \times \frac{dh}{dt}$$

$$\frac{dh}{dt} = -\frac{1}{12} \cdot \frac{75}{48} = -\frac{25}{768}$$

حل المعادلة:

$$\frac{dh}{dt} = -\frac{25}{768\pi}$$

يُنزل، يتناقص ارتفاع الماء في الخزان بمعدل $\frac{25}{768\pi}$ m/min عندما يكون ارتفاع الماء 4 m

انتقل من نصيبي

خزان ماء على شكل مخروط دائري قائم، رأسه إلى الأسفل، وارتفاعه 10 m، ونصف
قطره قائده 5 m. حُثب الماء في الخزان بمعدل $\pi \text{ m}^3/\text{min}$. ما معدل تغير ارتفاع
الماء في الخزان عندما يكون ارتفاعه 78 m

انتظر

إذا طلبت زوايا في مثلث أو اثنين في مثلث
المحصور، فكل المسائل
مماثلين، وكانت أطوال
أضلاعها المتناظرة
متساوية

المحتوى
غير متاح
بإذننا



يزداد طول أحد أضلاع مستطيل بمعدل 2 cm/s ، ويقطع طول ضلعه الآخر بمعدل 3 cm/s ، بحيث يحافظ المستطيل على شكله، وفي لحظة معينة يبلغ طول الضلع الأول 20 cm ، وبلغ طول الضلع الثاني 50 cm :

- 1 ما معدل تغير مساحة المستطيل في تلك اللحظة؟
- 2 ما معدل تغير محيط المستطيل في تلك اللحظة؟
- 3 ما معدل تغير طول قطر المستطيل في تلك اللحظة؟
- 4 أي الكميات في المسألة متزايدة؟ أيها متناقصة؟ أيها ثابت؟

تكتفب طول ضلعه 10 cm ، بدأ التكتفب يتسده فزاد طول ضلعه بمعدل 6 cm/s ، وقطع الضلع الثاني على شكله:

- 5 أوجد معدل تغير حجم التكتفب بعد 4 s من بدء تسده.
- 6 أوجد معدل تغير مساحة سطح التكتفب بعد 6 s من بدء تسده.

وقود خزّان أسطوانتي الشكل، ارتفاعه 15 m ، وقطر قاعدته 2 m ، يُملئ الخزان بالوقود بمعدل 500 L/min :


- 7 أوجد معدل ارتفاع الوقود في الخزان عند أي لحظة.
- 8 أوجد معدل تغير المساحة الجانبية للوقود عند أي لحظة.

المحتوى
غير متاح
بإذننا



الآلة يسقط الرمل من حزام ناقل بمعدل $10 \text{ m}^3/\text{min}$ على قبة كمّونة مخروطية الشكل، إذا كان ارتفاع الكمّونة يساوي دائماً ثلاثة أثمان طول قطرها، فأوجد كلاً مما يأتي:

- 9 سرعة تغير ارتفاع الكمّونة عندما يكون ارتفاعها 4 m .
- 10 سرعة تغير طول نصف قطر قاعدة الكمّونة عندما يكون ارتفاعها 4 m .
- 11 سرعة تغير مساحة قاعدة الكمّونة عندما يكون ارتفاعها 4 m .



الزاوية عند مُراقِب الحركة الجوية في أحد المطارات الطائرتين مُتَحَدِّثان على الارتفاع نفسه، وتُقرسان من نقطة التقاء مسار حركتهما في زاوية قائمة كما في الشكل المجاور. كانت الطائرة الأولى تسير بسرعة 450 km/h ، في حين كانت الطائرة الثانية تسير بسرعة 600 km/h .

١٢ أوجد مُعدَّل تغيُّر المسافة بين الطائرتين في اللحظة التي تبعد فيها الطائرة الأولى مسافة 225 km عن نقطة التقاء مسار حركة الطائرتين، وتبعد فيها الطائرة الثانية مسافة 300 km عن النقطة نفسها، علمًا بأن الطائرتين مُتَحَدِّثان على الارتفاع نفسه.


١٣ هل يجب على مُراقِب الحركة الجوية توجيه إحدى الطائرتين لأحد مسارات مختلف الأضواء الجوية؟

١٤ دراجات نارمة تحركت في اتجاهين في الوقت نفسه، ومن النقطة نفسها، على الطريقتين مستقيمتين، قياس الزاوية بينهما $\frac{\pi}{3} \text{ rad}$. إذا كانت سرعة الدراجة الأولى 15 km/h ، وسرعة الدراجة الثانية 20 km/h ، فأوجد سرعة ابتعاد كلٍّ منهما عن الأخرى بعد ساعتين من انطلاقهما.



١٥ قوارب يسحب جمال قاربه إلى الرصيف الأصطفاف باستخدام ككرة سحب ترتفع 1 m عن مُنْقَلِبة القارب. إذا طورت الكرة جيل السحب بسرعة 1 m/s ، وكان القارب يبعد عن الرصيف مسافة 8 m في لحظة ما، فما سرعة القرباب القارب من الرصيف لحظةً؟

لمشاهدة عرض الفيديو التفاعلي



سيارات ترفع كاميرا عن الأرض مسافة 132 ft ، وترصد سيارة تتحرك على مخطط مسبق، وتبلغ سرعتها 264 ft/s كما في الشكل المجاور:


١٦ أوجد سرعة تغيُّر الزاوية θ عندما تكون السيارة أسفل الكاميرا تمامًا.

١٧ أوجد سرعة تغيُّر الزاوية θ بعد نصف ثانية من مرور السيارة أسفل الكاميرا تمامًا.

استخدم تطبيق
القياس الإلكتروني



- ١٦ ابدأ بتحرك الجسيم على منحنى الانحناء: $f(t) = 2 \sin \frac{\pi t}{2}$ وعند مرورهِ بالنقطة $(1, \frac{1}{3})$ فإن الإحداثي t لموقعه يزداد بمعدل $\sqrt{10}$ وحدة طول لكل ثانية. أوجد مُعدل تغير المسافة بين الجسيم ونقطة الأصل في هذه اللحظة.




سيارة. عجلة سيارة طول نصف قطرها الداخلي 30 cm، وهي تدور بمعدل 10 دورات في الثانية. رُسمت النقطة P على حافة العجلة كما في الشكل المجاور:

- ١٧ أوجد $\frac{dr}{dt}$ عندما $\theta = \frac{\pi}{4}$ ١٨ أوجد $\frac{dr}{dt}$ عندما $\theta = 0$

- ٢١ فسوف تصبح مُثبتة بالأرض، وهو يعني θ على جدار يحد عنه مسافة 12 m. إذا سار رجل طولُه 2 m من موقع المتصيح إلى الجدار بسرعة 1.6 m/s، فأوجد مُعدل تغير طول ظلّه على الجدار عندما يكون على بُعد 4 m من الجدار.

استخدم تطبيق
القياس الإلكتروني



- ٢٢ تيريس رُطبت العربة A و B بحبل طولُه 12 m، وهو يمرُّ بالبكرة P كما في الشكل المجاور. إذا كانت النقطة Q تقع على الأرض بين العرتين أسفل P مباشرة، وتبعد عنها مسافة 4 m، وكانت العربة A تتحرك بعيداً عن النقطة Q بسرعة 0.5 m/s، فأوجد سرعة اقتراب العربة B من النقطة Q في اللحظة التي تكون فيها العربة A على بُعد 3 m من النقطة Q . ثم أبرد إجابتك.

استخدم تطبيق
القياس الإلكتروني



- ٢٣ تيريس يركض قدامه في مضمار دائري، طول نصف قطره 100 m، بسرعة ثابتة مقدارها 7 m/s. ووقف صديقته على بُعد 200 m من مركز المضمار. أوجد مُعدل تغير المسافة بين الصديقته عندما تكون المسافة بينهما 200 m.

صيغ الجيب والظل

7. إذا كان: $y = 2^{1-x}$ ، فإن ميل المماس المنحني العلاقة

عندما $x = 2$ هو:

- a) $-\frac{1}{2}$ b) $\frac{1}{2}$ c) $\frac{\ln 2}{2}$ d) $-\frac{\ln 2}{2}$

8. إذا زاد حجم مكعب بمعدل $24 \text{ cm}^3/\text{min}$ ، وزادت

مساحة سطحه بمعدل $12 \text{ cm}^2/\text{min}$ ، فإن طول

ضلعه في تلك اللحظة هو:

- a) 2 cm b) $2\sqrt{2}$ cm
c) 4 cm d) 8 cm

أوجد مشتقة كل اقتران مما يأتي:

i) $f(x) = e^x(x + x\sqrt{x})$ ii) $f(x) = \frac{x}{\tan x}$

iii) $f(x) = \frac{1}{x} - 12 \sec x$ iv) $f(x) = \frac{e^x}{\ln x}$

v) $f(x) = \frac{\ln x}{x^x}$ vi) $f(x) = 5^{2-x}$

vii) $f(x) = 10 \sin 0.5x$

viii) $f(x) = \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}\right)^x \left(x + \frac{1}{x}\right)^x$

ix) $f(x) = e^{-\ln x} \cos x^2$

إذا كان $f(x)$ و $g(x)$ ائترائين، وكان

$$f(2) = 3, f'(2) = -4, g(2) = 1, g'(2) = 2$$

فأوجد كلاً مما يأتي:

i) $(fg)'(2)$ ii) $\left(\frac{f}{g}\right)'(2)$

iii) $(3f - 4fg)'(2)$

أختار رمز الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي:

1. يُمثل الاقتران $s(t) = 3 + \sin t$ موقع جسيم يتحرك

في مسار منظم. إحدى الآنية تُمثل الزمن الذي تكون

عنده سرعة الجسيم صفراً:

- a) $t = 0$ b) $t = \frac{\pi}{4}$ c) $t = \frac{\pi}{2}$ d) $t = \pi$

2. إذا كان: $y = uv$ ، وكان

$$u(1) = 2, u'(1) = 3, v(1) = -1, v'(1) = 1$$

فإن $y'(1)$ تساوي:

- a) 2 b) -1 c) 1 d) 4

3. إذا كان: $f(x) = x - \frac{1}{x}$ ، فإن $f''(x)$ هي:

- a) $1 + \frac{1}{x^2}$ b) $1 - \frac{1}{x^2}$ c) $\frac{2}{x^2}$ d) $-\frac{2}{x^2}$

4. إذا كان: $y = \tan 4t$ ، فإن $\frac{dy}{dt}$ هو:

a) $4 \sec 4t \tan 4t$ b) $\sec 4t \tan 4t$

c) $\sec^2(4t)$ d) $4 \sec^2(4t)$

5. إذا كان: $\sqrt{1-x^2} = 1$ ، فإن ميل المماس المنحني

العلاقة عند النقطة $(1, \sqrt{2})$ هو:

a) $-\frac{1}{\sqrt{2}}$ b) $-\sqrt{2}$

c) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ d) $\sqrt{2}$


6. إذا كان: $f(x) = \log(2x-3)$ ، فإن $f'(x)$ هي:

a) $\frac{2}{(2x-3) \ln 10}$ b) $\frac{2}{(2x-3)}$

c) $\frac{1}{(2x-3) \ln 10}$ d) $\frac{1}{(2x-3)}$

ليكن الشكل المجاور متحني الأقران: $f(x)$ و $g(x)$ إذا


كان: $p(x) = f(x)g(x)$ وكان: $q(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$ فأوجد كلا



- Ⓐ $p'(1)$
- Ⓑ $p'(4)$
- Ⓒ $q'(7)$

إعلانات: يمكن لفجوة مزرعة استجابة المستهلكين لتسويق ما عن طريق الإعلانات باستخدام الأقران: $N(a) = 2000 + 500 \ln a$, $a \geq 1$ الذي يمثل عدد الوحدات المنتجة من التسويق حيث a المبلغ الذي أنفق على الإعلانات بالآلاف الدنمارك:

- 38 أوجد معدل تغير عدد الوحدات المنتجة بالنسبة إلى المبلغ a الذي أنفق على الإعلانات بالآلاف الدنمارك.
- 39 أوجد معدل تغير عدد الوحدات المنتجة عندما $a = 10$.
- 40 يرتفع بالون وأسطح فوق مستوى طريق مستقيم أفقي بمعدل 10 m/s . وفي اللحظة التي كان فيها البالون على ارتفاع 65 m فوق الطريق، قررت أسطحة وزاوية تحريك بسرعة 17 m/s كما في الشكل المجاور. أوجد سرعة التغير الشعاعية البالون



على ارتفاع 65 m فوق الطريق، قررت أسطحة وزاوية تحريك بسرعة 17 m/s كما في الشكل المجاور. أوجد سرعة التغير الشعاعية البالون

والزاوية α تزاوي من هذه اللحظة.

أوجد المشتقة الثانية لكل اقران منا يأتي:

- 27 $f(x) = x^2 \ln x$ 28 $f(x) = \frac{\cos x}{x}$
- 29 $f(x) = \frac{x}{1+\sqrt{x}}$ 30 $f(x) = \frac{1-x^2}{1+x^2}$

أوجد معادلة المماس لتحتي كل معادلة ومنطقة منا يأتي عند النقطة المحددة بقيمة t المعطاة:

- 35 $x = t^2, y = t + 2, t = 4$
- 36 $x = 4 \cos t, y = 3 \sin t, t = \frac{\pi}{4}$

إذا كان: $y = x \ln x$ حيث: $x > 0$ فأجب عن السؤالين الآتيين بإختصار:

- 37 أجد معادلة المماس عند النقطة $(1, 0)$.
- 38 أجد إحداثي النقطة التي يكون ميل المماس خلالها 2

أوجد $\frac{dy}{dx}$ لكل منا يأتي:

- 39 $x(x+y) = 2y^2$ 40 $x = \frac{2y}{x^2 - y}$
- 41 $y \cos x = x^2 + y^2$ 42 $2x^2 + y^2 = 3$

33 أجد معادلة العمودي علىي المماس لتحتي العلاقة: $y^2 = \frac{x^2}{2-x}$ عند النقطة $(1, -1)$.

أوجد معادلة المماس لتحتي كل علاقة منا يأتي عند النقطة المعطاة:

- 34 $x^2 + 3xy + y^2 = x + 3y, (2, -1)$
- 35 $x^2 e^y = 1, (1, 0)$

ما أهمية هذه
الوحدة؟

تقدمت الأعداد المركبة حديثاً لاجل معادلة كثير الحدود
بصرف النظر عن نوعها، مما جعلها أحد أكثر الموضوعات
الرياضية استعمالاً في العلوم التطبيقية، مثل تصميم
الكاميرات الرقمية، وأجهزة الطائرات، وإشارات
الهواتف المحمولة، وحسابات الطيران
الكهربية.

سأتعلم في هذه الوحدة:

- مفهوم العدد المركب، وتمثيله في المستوى المركب، وإيجاد سعة الزاوية ومقياسه.
- إجراء العمليات الحسابية على الأعداد المركبة.
- تشغيل المعمل الهندسي لمعادلات ومجالات تخضع أحياناً لمركبة في المستوى المركب.

تعلمت سابقاً:

- حل المعادلات التربيعية والتحليل إلى العوامل، واستخدام القانون العام.
- حل معادلات كثيرات الحدود باستعمال نظرية الباقي، ونظرية الجذور.
- تمثيل المتجهات في المستوى الإحداثي، والعمليات الحسابية عليها.

استعمل تقنيات (أستعمل للدراسة الوحدة)، في الصفحتين 38 و 39 من كتاب المتغيرات والمركبة هذه الموجهات قبل البدء بدراسة الوحدة.

الأعداد المركبة Complex Numbers

تعريف العدد المركب، وإيجاد سعته ومقياسه، وتعبئته بيانياً في المستوى المركب.

قائمة الدرس



الوحدة التخيلية، العدد التخيلي، العدد المركب، الجزء الحقيقي، الجزء التخيلي، تعريف العدد

المصطلحات



المركب، مقياس العدد المركب، سعة العدد المركب، السعة الرئيسية

للعدد المركب، الصورة المتطابقة للعدد المركب.

اختر من عالم الرياضيات الإيطالي جيرولامو كاردانو قليلاً من القصة:

مسألة اليوم



$\sqrt{-1}$ تمثل حلاً للمعادلة: $x^2 + 1 = 0$ هل يبدو ذلك منطقياً؟



الوحدة التخيلية والعدد التخيلي

تعلمت سابقاً أنه لا يوجد حل حقيقي للمعادلة التربيعية: $x^2 = -1$ لأنني إذا حاولتُ حلها، فإن النتيجة ستكون:

$$x^2 = -1$$

$$x = \pm\sqrt{-1}$$

وهذا غير ممكن؛ لأن المربع أي عدد حقيقي لا يكون سالباً.

لكن علماء الرياضيات تمكنوا من حل هذه المعادلة بانكارهم سعة للنظام العددي. تشكلت في النهاية:

وحدة تخيلية (Imaginary unit) يُعز إليها بالرمز i ، وعُرفت لتُحقق المعادلة: $i^2 = -1$.

ببساطة على تعريف i ، فإن كلاً من i و $-i$ يُعدّ جذراً تربيعياً للعدد -1 ؛ لأن $(-i)^2 = i^2 = -1$ ؛ إلا أنه i يُسقى الجذر الرئيس للعدد -1 .

يُطلق على العدد الذي في صورة $\sqrt{-k}$ ، حيث k عدد حقيقي موجب، اسم **العدد التخيلي (Imaginary number)**، ويمكن إيجاد الجذر الرئيس للعدد الحقيقي السالب $(-k)$ على

النحو الآتي:

$$\sqrt{-k} = \sqrt{-1 \times k} = \sqrt{-1} \times \sqrt{k} = i\sqrt{k}$$

English

الحل الأعداد التخيلية

رموزة السعة في علم

هندسة الكهربية

مثال 1

أوجد قيمة الجذر الرئيس في كل مما يأتي بدلالة i :

1) $\sqrt{-16}$

$$\begin{aligned} \sqrt{-16} &= \sqrt{-1 \times 16} && \text{تفكيك} \\ &= \sqrt{-1} \times \sqrt{16} && \text{خاصية ضرب الجذور التربيعية} \\ &= i \times 4 = 4i && \text{تعريف الجذر الرئيس للعدد -1} \end{aligned}$$

2) $\sqrt{-72}$

$$\begin{aligned} \sqrt{-72} &= \sqrt{-1 \times 36 \times 2} && \text{تفكيك} \\ &= \sqrt{-1} \times \sqrt{36} \times \sqrt{2} && \text{خاصية ضرب الجذور التربيعية} \\ &= i \times 6 \times \sqrt{2} = 6i\sqrt{2} && \text{تعريف الجذر الرئيس للعدد -1} \end{aligned}$$

التحقق من محصل

أوجد قيمة الجذر الرئيس في كل مما يأتي بدلالة i :

3) $\sqrt{-75}$

4) $\sqrt{-49}$

ضرب الأعداد التخيلية

يُطلب ضرب الأعداد التخيلية كما تبين أولاً بدلالة i ، ثم استعمال خاصيتي التبديل والتجميع لكتابة الناتج في أبسط صورة، كما هو الحال في ما يأتي بالنسبة إلى الجذرين الرئيسين للعددين -9 و -4 (بالإضافة إلى أن $\sqrt{-1} = i$):

صحيح

$$\begin{aligned} \sqrt{-9} \times \sqrt{-4} &= i\sqrt{9} \times i\sqrt{4} \\ &= 3i \times 2i \\ &= 6i^2 = 6(-1) = -6 \end{aligned}$$

خطأ

~~$$\begin{aligned} \sqrt{-9} \times \sqrt{-4} &= \sqrt{-9(-4)} \\ &= \sqrt{36} \\ &= 6 \end{aligned}$$~~

التعلم

إذا كان a و b عددين تخيليين موجبين، فإن:

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$$

تلك غير صحيح للأعداد السالبة، والأعداد التخيلية.

التعلم

يُكتب الرتبة أعلى يسار العدد المطلوب ليه. أمّا إذا كان مطلوباً في الجذر أو جذراً، فإنه يُكتب على يسار الجذر أو الجذر من الأمتة على اليمين.

$5i, 4i, 2i\sqrt{11}$

مثال 2

أوجد ناتج كل مما يأتي في أبسط صورة بالتفرض أن $\sqrt{-1} = i$:

1) $\sqrt{-8} \times \sqrt{-18}$

$$\sqrt{-8} \times \sqrt{-18} = \sqrt{-1 \times 8} \times \sqrt{-1 \times 18}$$

$$= (\sqrt{-1} \times \sqrt{8}) \times (\sqrt{-1} \times \sqrt{18})$$

$$= (i \times \sqrt{8}) \times (i \times \sqrt{18})$$

$$= (i \times i) \times (\sqrt{8} \times \sqrt{18})$$

$$= i^2 \times \sqrt{144}$$

$$= -1 \times 12 = -12$$

بخطي

خاصية ضرب الجذور التربيعية

بفرض أن $\sqrt{-1} = i$

خاصية التبديل وتجميع الضرب

خاصية ضرب الجذور التربيعية

بمضيافة $i^2 = -1$

2) $5i \times \sqrt{-4}$

$$5i \times \sqrt{-4} = 5i \times \sqrt{-1 \times 4}$$

$$= 5i \times \sqrt{-1} \times \sqrt{4}$$

$$= 5i \times i \times 2$$

$$= (2 \times 5) \times i \times i$$

$$= 10i^2$$

$$= 10 \times -1 = -10$$

بخطي

خاصية ضرب الجذور التربيعية

بفرض أن $\sqrt{-1} = i$

خاصية التبديل وتجميع

الضرب

بمضيافة $i^2 = -1$

3) i^{16}

$$i^{16} = (i^4)^4 \times i$$

$$= (-1)^4 \times i$$

$$= -1$$

خاصية قوة القوة

بمضيافة $i^4 = -1$

بمضيافة $(-1)^4 = -1$

تحقق من فهمي

أوجد ناتج كل مما يأتي في أبسط صورة بالتفرض أن $\sqrt{-1} = i$:

a) $\sqrt{-27} \times \sqrt{-48}$

b) $\sqrt{-50} \times -4i$

c) i^{100}

العلم

• خاصية التبديل للضرب:
إذا كان a, b عددين
طبيين، فإن:

$$a \times b = b \times a$$

• خاصية التجميع للضرب:
إذا كانت a, b, c أعداداً
طبيعية، فإن:

$$(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$$

• خاصية $a \times 1 = a$ و $1 \times a = a$
وكان a و m عددين
صحيحة، فإن:

$$(a^m)^n = a^{m \times n}$$

• تبقى الخصائص الأخرى
لسلسلة صحيحة إذا
كانت a, b, c أعداداً
عشرية.

الذكر

العدد (-1) هو مربعاً إلى
أول (زوجي) يساوي (1) ،
والمربعاً إلى آخر (فرد)
يساوي (-1) .

الأعداد المركبة

العدد المركب (complex number) هو عدد يُمكن كتابته في صورة: $a + ib$ حيث a و b عددين حقيقيين، يتكوّن العدد المركب من **جزء حقيقي (real part)** هو العدد a و**جزء تخيّلِي (imaginary part)** هو العدد b .

العلم

الجزء الحقيقي هو a
رئيس b

جد كتابة العدد المركب في صورة $(a + ib)$ ، فإنه يكون مكافئاً بالصورة القياسية. الأخط من الصورة القياسية لتعدد المركب أن الأعداد الحقيقية هي أيضاً أعداد مركبة؛ لأنّ يُمكن كتابة أيّ عدد حقيقي a في صورة: $a + 0i$ وهو عدد مركب، فيه $b = 0$. الأخط أيضاً أن الأعداد التخيّلِيه هي أعداد مركبة؛ لأنّه يُمكن كتابة أيّ عدد تخيّلِي ib في صورة: $0 + ib$ وهو عدد مركب، فيه $a = 0$.



أستنتج منّا سابق أن الأعداد الحقيقية والأعداد التخيّلِيه تُعَدُّ مجموعتين جزئيتين من النظم العددي، وأنّ اتحادهما معاً، يُهدّاه إلى حاصل جمع أعدادهما، يتجمّع منه مجموعة الأعداد المركبة. يُنصّ المُخطّط الآتي العلاقات بين مجموعات الأعداد التي تعلّقناها سابقاً.

الأعداد المركبة (C) تشمل الأعداد الحقيقية والأعداد التخيّلِيه نظراً إلى أنّ حاصل جمع فلان الأعداد

<p>الأعداد النسبية (Q): $\{\frac{p}{q}, p, q \in \mathbb{Z}; q \neq 0\}$</p> <p>الأعداد الصحيحة (Z): $\{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$</p> <p>الأعداد الكليّة (N): $\{0, 1, 2, 3, \dots\}$</p>	<p>الأعداد غير النسبية (I): أعداد لا يُمكن كتابتها في صورة نسبة بين عددين صحيحين $\sqrt{2}, \sqrt{7}, -\sqrt{10}, \dots$</p>	<p>الأعداد التخيّلِيه (I): $\sqrt{-7}, \sqrt{-9}, \sqrt{-0.25}, i\sqrt{3}, -5i, \frac{3}{4}i$</p>
---	---	--

الأعداد العنقريّة (R) تشمل الأعداد النسبية والأعداد غير النسبية معاً

خاصية المساواة للأعداد المركبة

يتساوى العددان المركبان إذا تساوى جزأهما الحقيقيان، وتساوى جزأهما التخيليان.

تساوي العددين المركبين

مفهوم أساسي

يتساوى العددين المركبان $a + ib, c + id$ إذا و فقط إذا كان: $a = c, b = d$ حيث a, b, c, d أعداد حقيقية.

مثال 3

أوجد قيمة x وقيمة y الحقيقيين اللتين تجعلان المعادلة: $2x - 6 + (3y + 2)i = 4x + 8i$ صحيحة.

أساسي الجزئين الحقيقيين، وأساسى الجزئين التخيليين، ثم نُحل المعادلتين الناتجتين:

$2x - 6 = 4x$	نضرب الطرفين بالـ -1	$3y + 2 = 8$	نطرح 2 من الطرفين
$x = -3$	نحل المعادلة	$y = 2$	نحل المعادلة

وبن: $x = -3, y = 2$

انتقل من هنا


أوجد قيمة x وقيمة y الحقيقيين اللتين تجعلان المعادلة: $x + 5 + (4y - 9)i = 12 - 5i$ صحيحة.

معلومة


يسمى المستوى المركب أيضًا مستوى أرجانده نسبة إلى عالم الرياضيات جوردان أرجانده الذي ابتكره عام 1806م.

تطبيق العدد المركب ومراقبة بيانياً

يمكن تمثيل العدد المركب $a + ib$ في المستوى الإحداثي في صورة الزوج المركب (a, b) ، أو صورة المتجه (a, b) ، فنظراً إلى أن المحور الأفقي المحور الحقيقي، ويُرمز إليه بالرمز (Re) ، والمحور الرأسي المحور التخيلي، ويُرمز إليه بالرمز (Im) ، في حين يُسمى المستوى الإحداثي في هذه الحالة المستوى المركب.




صورة الزوج المركب



صورة المتجه

التعلم

يُمثّل الجزء الحقيقي
للعدد المركّب بوجه عمودي.



أما مُرافق العدد المركّب (conjugate) المكتوب بالعسوية القياسية $z = a + ib$ فهو العدد المركّب $\bar{z} = a - ib$ وحلّه تمثيله ومُرافقه بيانيًا في المستوى الإحداثي نفسه، ألاحظ أن كلا منهما هو انعكاس للآخر في المحور الحقيقي (Re) كما في الشكل المجاور.


مثال 4

أعط العدد المركّب ومُرافقه بيانيًا في المستوى المركّب في كلِّ منّا يأتي:

1) $z = -3 + 5i$

مُرافق العدد المركّب $z = -3 + 5i$ هو $\bar{z} = -3 - 5i$


يُمثّل الزوج المركّب $(-3, 5)$ العدد المركّب z ، ويُمثّل الزوج المركّب $(-3, -5)$ مُرافقه \bar{z}



2) $z = 6 - 4i$

مُرافق العدد المركّب $z = 6 - 4i$ هو $\bar{z} = 6 + 4i$


يُمثّل الزوج المركّب $(6, -4)$ العدد المركّب z ، ويُمثّل الزوج المركّب $(6, 4)$ مُرافقه \bar{z}



3) $z = 2i$

مُرافق العدد المركّب $z = 2i$ هو $\bar{z} = -2i$

يُمثّل الزوج المركّب $(0, 2)$ العدد z ، ويُمثّل الزوج المركّب $(0, -2)$ مُرافقه \bar{z}



مُحَمَّدُ الْحَقِيقُ مِنْ مَعْنَى

أعط العدد المركّب ومُرافقه بيانيًا في المستوى المركّب في كلِّ منّا يأتي:

a) $z = 2 + 7i$


b) $z = -3 - 2i$

c) $z = -3i$

أفكر

ما مُرافق العدد الحقيقي a ؟

مقياس العدد المركب



مقياس العدد المركب (modulus) المكتوب في الصورة

القياسية: $z = a + ib$ هو المسافة بين نقطة الأصل $(0, 0)$ والنقطة (a, b) ويرمز إليه عادة بالرمز $|z|$ أو الرمز r .

يُستعمل قانون المسافة بين نقطتين لإيجاد مقياس العدد المركب.

التعلم

عند تمثيل العدد المركب في صورة النقط، لمؤ مقياس العدد المركب هو طول النقط.

مقياس العدد المركب

مفهوم أساسي

مقياس العدد المركب: $z = a + ib$ هو: $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ حيث a, b عدنان حقيقيان.

مثال 3

أوجد مقياس كل عدد مركب هنا يأتي:

1) $z = 3 - 4i$

$$\begin{aligned} |z| &= \sqrt{a^2 + b^2} \\ &= \sqrt{3^2 + (-4)^2} \\ &= \sqrt{25} = 5 \end{aligned}$$

مبدأ مقياس العدد المركب
بحر من $a = 3, b = -4$
النتيجة

2) $z = 12i$

$$\begin{aligned} |z| &= \sqrt{a^2 + b^2} \\ &= \sqrt{0^2 + (12)^2} \\ &= \sqrt{144} = 12 \end{aligned}$$

مبدأ مقياس العدد المركب
بحر من $a = 0, b = 12$
النتيجة

التحقق من فهمي

أوجد مقياس كل عدد مركب هنا يأتي:

a) $z = -3 - 6i/\sqrt{2}$

b) $z = -2i$

c) $z = 4 + \sqrt{-20}$

التدرب

$$12i = 0 + 12i$$

سعة العدد المركب

سعة العدد المركب (argument) هي الزاوية θ المحصورة بين المحور الحقيقي الموجب

والقطعة المستقيمة التي تصل نقطة الأصل بالنقطة التي تمثل العدد المركب متخسمة بالزاوية. ويُرمز إلى سعة العدد المركب z بالرمز $\arg(z)$.

وبما أنه يوجد عدد لا نهائي من الزوايا المرسومة في الوضع القياسي التي لها ضلع الانتهاء نفسه، فقد حُفِظت

السعة الرئيسية (principal argument) للعدد

المركب بأنها السعة التي تقع في الفترة: $-\pi < \theta \leq \pi$ ، ويُرمز إلى السعة الرئيسية بالرمز $\text{Arg}(z)$ أي إن:

$$\arg(z) = \text{Arg}(z) + 2\pi n = \theta + 2\pi n, \quad n = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$$


ويُمكن استعمال النسب المثلثية في المثلث القائم الزاوية لإيجاد سعة العدد المركب: $z = a + ib$ الذي يقع في الربع الأول.

السعة في الربع الأول

مفاهيم أساسية

إذا كان $z = a + ib$ عددًا مركبًا يقع في الربع الأول، فإن سعته تعطى بالصيغة الآتية:

$$\theta = \text{Arg}(z) = \tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right)$$



عدد مركب في الربع الثاني

إذا وقع العدد المركب z في الربع الثاني، فإن سعة تكون زاوية متفرجة، لذا نستعمل مكملتها لإيجادها. إذا كانت سعة z هي الزاوية المتفرجة θ ، فإن مكملتها θ' هي زاوية حادة، لذا يُرسم في الربع الثاني مثلث قائم، أخذ رؤوسه O ، واجتدي زواياه θ' كما في الشكل المجاور، واستعمل النسب المثلثية لإيجاد قياس θ' .

إرشاد

تفسر كلمة (سعة) إلى سعة الزاوية أي زاوية دورية. ذكرها في الكفاية.


الذخيرة

يكون قياس الزاوية موجبة عند دوران ضلع نهايتها عكس اتجاه دوران عقارب الساعة، وسالبة عند دورانه في اتجاه دوران عقارب الساعة.

لذا إذا وقع العدد المركَّب في الربع الثالث أو الربع الرابع، فإنَّ سعته تساوي معكوسه من سعته مُرافقة السَّي يقع في الربع الأول أو الربع الثاني؛ لأنَّ قياس الزاوية بين المحور الحقيقي الموجب والقطعة المستقيمة التي تصل نقطة الأصل بالنقطة التي تُمثِّل العدد المركَّب يساوي قياس الزاوية بين المحور الحقيقي الموجب والقطعة المستقيمة التي تصل نقطة الأصل بالنقطة التي تُمثِّل مُرافقة العدد المركَّب، لكنَّ اتجاه كلٍّ من هاتين الزاويتين مختلف (إحدهما في اتجاه دوران عقارب الساعة والأخرى عكس اتجاه دوران عقارب الساعة).

الزاوية

لنبي الشكل المجاوره
 $a, b > 0$



عدد مركَّب في الربع الثالث

عدد مركَّب في الربع الرابع

سعة العدد المركَّب

ملخص المفهوم

إذا كان a و b عددين حقيقيين موجبين، فإنَّ:

العدد المركَّب z	الربع الذي يقع فيه z	$Arg(z)$
$z = a + ib$	الأول	$\tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right)$
$z = -a + ib$	الثاني	$\pi - \tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right)$
$z = -a - ib$	الثالث	$-\left(\pi - \tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right)\right)$
$z = a - ib$	الرابع	$-\tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right)$


أهم

يجب أن نجد السعة عندما
 $a = 0$

مثال 6

أوجد سعة كلٍّ من الأعداد المركبة الآتية، وأخرّب إجابتي إلى أقرب منزلتين عشريتين:

1 $z = 4 + 3i$



بالنظر إلى التمثيل البياني للعدد المركبة $z = 4 + 3i$ في الشكل المجاور، لاحظ أنه يقع في الربع الأول.

$$\begin{aligned} \text{Arg}(z) &= \tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right) \\ &= \tan^{-1}\left(\frac{3}{4}\right) \\ &= 0.64 \end{aligned}$$


سعة العدد المركب في الربع الأول

صيغته $a = 4, b = 3$

بصيغة الآلة الحاسبة

إذن: $\text{Arg}(z) = 0.64$

2 $z = -3 + 8i$



بالنظر إلى التمثيل البياني للعدد المركبة $z = -3 + 8i$ في الشكل المجاور، لاحظ أنه يقع في الربع الثاني.

$$\begin{aligned} \text{Arg}(z) &= \pi - \tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right) \\ &= \pi - \tan^{-1}\left(\frac{8}{3}\right) \\ &= 1.93 \end{aligned}$$

سعة العدد المركب في الربع الثاني

صيغته $a = -3, b = 8$


بصيغة الآلة الحاسبة

إذن: $\text{Arg}(z) = 1.93$

التذكير

يجب ضبط الآلة الحاسبة على نظام الراديان.

3) $z = -1 - 6i$



$$\begin{aligned} \text{Arg}(z) &= -\left(\pi - \tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right)\right) \\ &= -\left(\pi - \tan^{-1}\left(\frac{6}{1}\right)\right) \\ &= -1.74 \end{aligned}$$


حساب العدد المركب في الربع الثالث

عوض $a = 1, b = 6$

بالتعويض في الصيغة:

إذن: $\text{Arg}(z) = -1.74$

4) $z = 8 - 4i$



$$\begin{aligned} \text{Arg}(z) &= -\tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right) \\ &= -\tan^{-1}\left(\frac{4}{8}\right) \\ &= -0.46 \end{aligned}$$

حساب العدد المركب في الربع الرابع

عوض $a = 8, b = 4$

بالتعويض في الصيغة:

إذن: $\text{Arg}(z) = -0.46$

التحقق من تعميبي

أوجد سعة كل من الأعداد المركبة الآتية، وأكثرب إجابتي إلى أقرب مئتين عشرون:

a) $z = 8 + 2i$

b) $z = -5 + 12i$

c) $z = -2 - 3i$

d) $z = 8 - 8i\sqrt{3}$

التعلم

تتميز الأعداد المركبة مع المعجلات في بعض الخصائص، مثل وجود نظام واتجاه لكل من العدد المركب والمتجه، لكنها تختلف عن المتجهات من حيث النسبة والعمليات الجبرية.

الصورة المثلثية للعدد المركب

يُمكن تمثيل العدد المركب المعقد $(a + ib)$ الذي يُمثل العدد المركب $z = a + ib$ الذي مقداره:

$$|z| = r, \text{ وسنجد } \theta$$

ومن ثَمَّ نأخذ:

$$\cos \theta = \frac{a}{r}$$

$$a = r \cos \theta$$


$$\sin \theta = \frac{b}{r}$$

$$b = r \sin \theta$$

بمعنى قيمة كلٍّ من a و b في الصورة القياسية للعدد المركب $(a + ib)$ فإن:

$$\begin{aligned} z = a + ib &= r \cos \theta + i r \sin \theta \\ &= r(\cos \theta + i \sin \theta) \end{aligned}$$

سُمي الصيغة $r(\cos \theta + i \sin \theta)$ **الصورة المثلثية** (trigonometric form) للعدد المركب.



نجد قيمة $\cos \theta$

نجد قيمة $\sin \theta$

نجد قيمة a

نجد قيمة b

التعلم

إذا لم أستعمل الصيغة القياسية في هذه الصيغة، فإن العدد المركب لا يُمكنه مكتوب بالصورة المثلثية. عندئذٍ يتعين علينا إعادة 2π أو طرحه لأحد السعة الزاوية في الفترة $-\pi < \theta \leq \pi$

التعلم

عندما نكتب العدد المركب بالصورة المثلثية، فإنني أترك الإجابة في صورة $r(\cos \theta + i \sin \theta)$ من دون حساب قيمة $\sin \theta$ وقيمة $\cos \theta$

التعلم

يُمكن استعمال الصورة المثلثية لتحديد سعة العدد المركب وطوله بسهولة.

الصورة المثلثية للعدد المركب

مفهوم أساسي

إذا كان $z = a + ib$ ، فإن سعة العدد المركب $\text{Arg}(z) = \theta$ ، ومقداره $|z| = r$. يُستعملان لكلاهما بالصورة المثلثية كما يأتي:

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$$

مثال 7

اكتب العدد المركب z في كلٍّ مما يأتي بالصورة المثلثية:

1 $|z| = 4, \text{Arg}(z) = \frac{\pi}{6}$

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$$

$$= 4(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6})$$

إذن: الصورة المثلثية للعدد المركب z هي: $z = 4(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6})$

صورة العدد المركب z

$$r = 4, \theta = \frac{\pi}{6}$$

1 $z = -2 - 5i$

الخطوة 6: أوجد مقياس العدد المركب z .

$$r = \sqrt{(-2)^2 + (-5)^2} = \sqrt{29}$$

الخطوة 7: أوجد سعة العدد المركب z .

بما أن العدد المركب z يقع في الربع الثالث، فإن:

$$\begin{aligned} \text{Arg}(z) &= -\left(\pi - \tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right)\right) \\ &= -\left(\pi - \tan^{-1}\left(\frac{5}{2}\right)\right) \\ &\approx -1.95 \end{aligned}$$

سعة العدد المركب في الربع الثالث

حيث $a = -2$, $b = -5$

ينتصل إلى المحاور

إذن: $\text{Arg}(z) \approx -1.95$

الخطوة 8: أكتب العدد المركب z بالصورة القطبية.

$$z = \sqrt{29} (\cos(-1.95) + i \sin(-1.95))$$

انتقل من نصي

أكتب العدد المركب z في كلٍ مما يأتي بالصورة المناسبة:

a) $|z| = 4\sqrt{2}$, $\text{Arg}(z) = -\frac{3\pi}{4}$ b) $z = -4 - 4i$ c) $z = 2i$

أفكر

كيف يمكن تحديد الربع الذي يقع فيه العدد المركب من دون نقطة ياب في المستوى المركب؟

أحرب وأحل المسائل

أوجد قيمة الجذر الرئيس في كلٍ مما يأتي بدلالة i .

1 $\sqrt{-19}$

2 $\sqrt{\frac{-12}{25}}$

3 $\sqrt{\frac{-9}{32}}$

4 $\sqrt{-53}$

أوجد ناتج كلٍ مما يأتي في أبسط صورة بالفراص أو $i^2 = -1$:

5 i^8

6 i^9

7 $(i)(2i)(-7i)$

8 $\sqrt{-6} \times \sqrt{-6}$

9 $\sqrt{-4} \times \sqrt{-8}$

10 $2i \times \sqrt{-9}$

أكتب في كل متباينة العدد المركب z بالصورة القياسية بافتراض $i^2 = -1$:

11 $\frac{2+\sqrt{-4}}{2}$

12 $\frac{8+\sqrt{-16}}{2}$

13 $\frac{10-\sqrt{-50}}{5}$

أحد الجزء الحقيقي والجزء التخيلي لكل من الأعداد المركبة الآتية، ثم أكتبها جميعاً في المستوى المركب نفسه:

14 $z = 2 + 15i$

15 $z = 10i$

16 $z = -16 - 2i$

أمثل العدد المركب وموافقته بيانياً في المستوى المركب في كل متباينة:

17 $z = -15 + 3i$

18 $z = 8 - 7i$

19 $z = 12 + 17i$

20 $z = -3 - 25i$

21 $3i$

22 15

أجد z ، و \bar{z} لكل متباينة:

23 $z = -5 + 5i$

24 $z = 3 + 3i\sqrt{3}$

25 $z = 6 - 8i$

أجد قيم كل من x و y الحقيقية التي تجعل كلًا من المعادلات الآتية صحيحة:

26 $x^2 - 1 + i(2y - 5) = 8 + 9i$

27 $2x + 3y + i(x - 2y) = 8 - 3i$

28 $y - 3 + i(3x + 2) = 9 + i(y - 4)$

29 $i(2x - 5y) + 3x + 5y = 7 + 3i$

أجد قيمة كل من الأعداد المركبة الآتية، وأقرّب إجابتني إلى أقرب متوازي عشريتين:

30 1

31 $3i$

32 $-5 - 5i$

33 $1 - i\sqrt{3}$

34 $6\sqrt{3} + 6i$

35 $3 - 4i$

36 $-12 + 5i$

37 $-58 - 93i$

38 $2i - 4$

اكتب في كل ما يأتي العدد المركب z بالصورة القطبية:

Ⓐ $|z| = 2, \text{Arg } z = \frac{\pi}{2}$


Ⓐ $|z| = 3, \text{Arg } z = \frac{\pi}{3}$

Ⓑ $|z| = 7, \text{Arg } z = \frac{5\pi}{6}$

Ⓑ $|z| = 1, \text{Arg } z = \frac{\pi}{4}$

Ⓒ $z = 6$

Ⓒ $z = 1 + i$



Ⓓ **مسألة** الشكل المعطى التمثيل البياني للعدد المركب z في المستوى المركب. أوجد العدد المركب w الذي يُحقق ما يأتي:

$|z| = 40$ and $\text{Arg } z = \text{Arg } \bar{w}$

بالترتيب أوجد $x = a + ib$ حيث $|z| = 10\sqrt{2}$ ، وأن $\text{Arg}(z) = \frac{3\pi}{4}$.

Ⓐ أوجد قياس الزاوية العنقري المحصورة بين z و \bar{z} .

Ⓑ اكتب العدد المركب z بالصورة القياسية.

إذا كان $z = -8 + 8i$ ، فأوجد \bar{z} ما يأتي:

Ⓐ $|z|$

Ⓑ $\text{Arg}(z)$

Ⓒ $|z|$

Ⓓ $\text{Arg}(\bar{z})$

مسائل التطبيق

Ⓐ إذا كان $\text{Arg}(5 + 2i) = \alpha$ ، فأوجد متعة كل ما يأتي بدلالة α ، ثم أبرد إجابتي:

Ⓐ $-5 - 2i$

Ⓑ $5 - 2i$

Ⓒ $-5 + 2i$

Ⓓ $2 + 5i$

Ⓔ $-2 + 5i$

Ⓐ **حل** إذا كان $z = 5 + im$ حيث $|z| = 6$ ، و $0 < \text{Arg}(z) < \frac{\pi}{2}$ ، فأوجد قيمة العدد الحقيقي m .

Ⓑ **حل** إذا كان $z = 5 + 3ik$ حيث $|z| = 13$ ، فأوجد جميع قيم k الحقيقية الممكنة، ثم أبرد إجابتي.

Ⓒ **حل** بالترتيب أوجد عدد مركب مقايمة $4\sqrt{5}$ ، ومعة $\theta = \tan^{-1}(2)$.

Ⓓ اكتب العدد المركب z بالصورة القياسية.

Ⓔ إذا كان $z_1 = -5 + i$ ، $z_2 = 7 - 3i$ ، فأوجد مساحة المثلث الذي رؤوسه z_1 ، z_2 ، z_3 في المستوى المركب.


العمليات على الأعداد المركبة

Operations with Complex Numbers

• إجراء العمليات الحسابية الأربع (الجمع، الطرح، الضرب، القسمة) على الأعداد المركبة:

• إيجاد الجذر التربيعي لعدد مركب، وإيجاد الجذور المركبة لعدلات كثيرات الحدود.

مراجعة الدرس



• اعتماداً على المعرفى المركب المجاور الذي يفسر العددين المركبين A و B ، نجد السعة والمقدار للعدد المركب AB .

مسألة اليوم



جمع الأعداد المركبة وطرحها

تُسمى عملية جمع الأعداد المركبة وطرحها عمليتي جمع المقادير الحرة وطرحها، حيث تُجمع الحدود المتشابهة بعضها مع بعض.

لجمع عددين مركبين مُركبين أو طرحهما، نجمع جزأيهما الحقيقيين أو طرحهما ونجمع جزأيهما التخيليين أو طرحهما.

جمع الأعداد المركبة وطرحها

مفاهيم أساسية

إذا كان $z_1 = a + ib$, $z_2 = x + iy$ عددين مركبين، فإنه يُمكن إيجاد ناتج جمعهما أو طرحهما على النحو الآتي:

$$z_1 + z_2 = (a + x) + i(b + y)$$

$$z_1 - z_2 = (a - x) + i(b - y)$$

مثال 1

أوجد ناتج كل مما يأتي:

1 $(5 + 7i) + (-9 - 4i)$

$$\begin{aligned} (5 + 7i) + (-9 - 4i) &= 5 + 7i - 9 - 4i \\ &= (5 - 9) + (7 - 4)i \\ &= -4 + 3i \end{aligned}$$

خاصية التوزيع

خاصية التجميع والتجميع

الاشارة

التلميح

يُحذف جمع الأعداد المركبة خاصية التجميع. فلو كانت z و w عدديين مركبين، فإن:

$$z + (w + z) = (z + w) + z$$

التعلم

الطير الجمعي للعدد

الترتيب: $a = a + bi$

من: $-a = -a - bi$

2) $(8 - 5i) - (2 - 11i)$

$$(8 - 5i) - (2 - 11i) = 8 - 5i - 2 + 11i$$

عملية التوزيع

$$= (8 - 2) + (-5 + 11)i$$

عملية التبسيط والتجميع

$$= 6 + 6i$$

بالتبسيط

تحقق من فهمك

أوجد ناتج كل مما يأتي:

a) $(7 + 8i) + (-9 + 14i)$

b) $(11 + 9i) - (4 - 6i)$

غريب للأعداد المركبة

يمكن ضرب الأعداد المركبة بطريقة مشابهة لعملية ضرب المقادير الجبرية وذلك باستعمال خاصية التوزيع. فبعد إتمام عملية الضرب، يوضع العدد -1 بدل i^2 أينما ظهرت.

مطابق

أوجد ناتج كل مما يأتي، ثم أكتب بالصورة القياسية:

1) $5i(3 - 7i)$

$$5i(3 - 7i) = 5i(3) + (5i)(-7i)$$

عملية التوزيع

$$= 15i + (-35)i^2$$

بالضرب

$$= 15i + (-35)(-1)$$

استبدال العدد -1

$$= 35 + 15i$$

كتابة الناتج بالصورة القياسية

2) $(6 + 2i)(7 - 3i)$

$$(6 + 2i)(7 - 3i) = 6(7) + 6(-3i) + 2i(7) + 2i(-3i)$$

عملية التوزيع

$$= 42 - 18i + 14i - 6i^2$$

بالضرب

$$= 42 - 18i + 14i - 6(-1)$$

استبدال العدد -1

$$= (42 + 6) + (-18 + 14)i$$

تجميع الحدود المتشابهة

$$= 48 - 4i$$

بالتبسيط

1) $(5+4i)(5-4i)$

$$\begin{aligned} (5+4i)(5-4i) &= 5(5) + 5(-4i) + 4i(5) + 4i(-4i) \\ &= 25 - 20i + 20i - 16i^2 \\ &= 25 - 20i + 20i + 16 \\ &= 41 \end{aligned}$$

خاصية التوزيع

التعريف

محدد العدد i

جمع الحدود المتشابهة

تحقق من فهمي

أوجد ناتج كل مما يأتي، ثم أكتب بالصورة القياسية:

a) $= 3i(4-5i)$

b) $(5+4i)(7-4i)$

c) $(3+6i)^2$

قسمة الأعداد المركبة

لاحظت في الفرج الأخير من المثال السابق أن ناتج ضرب العدد المركب $5+4i$ في مرافقه يساوي عددًا حقيقيًا. وهذا صحيح دائمًا لأي عدد مركب $z = a + bi$ ، وناتج الضرب يكون دائمًا في صورة $a^2 + b^2$ أي إن $z\bar{z} = |z|^2$

يمكن استعمال هذه الحقيقة لإيجاد ناتج قسمة عددين مركبين، وذلك ب ضرب كل من المقوم والمقسوم عليه في مرافق المقوم عليه، فيصبح المقوم عليه عددًا حقيقيًا.

المفهوم

مرافق العدد المركب
 $z = a + bi$ هو العدد
 المركب: $\bar{z} = a - bi$

مثال 2

أوجد ناتج كل مما يأتي، ثم أكتب بالصورة القياسية:

1) $\frac{8-5i}{3-2i}$

$$\begin{aligned} \frac{8-5i}{3-2i} &= \frac{8-5i}{3-2i} \times \frac{3+2i}{3+2i} \\ &= \frac{24 + 16i - 15i - 10i^2}{9 + 4} \\ &= \frac{24 + 16i - 15i + 10}{13} \\ &= \frac{34 + i}{13} \\ &= \frac{34}{13} + \frac{1}{13}i \end{aligned}$$

تعريف في $3+2i$

مضروب خاصية التوزيع

العدد i

جمع الحدود المتشابهة

كتابة الناتج بصورة قياسية

$$2 \quad \frac{3+5i}{2i}$$

$$\frac{3+5i}{2i} = \frac{3+5i}{2i} \times \frac{i}{i}$$

$$= \frac{3i+5i^2}{2i^2}$$

$$= \frac{3i-5}{-2}$$

$$= \frac{5}{2} - \frac{3}{2}i$$

بالضرب في $\frac{i}{i}$

باستخدام خاصية التوزيع

باستخدام القسمة

كتابة الناتج بالصورة القياسية

تحقق من محضري

أوجد ناتج كلٍّ مما يأتي، ثمّ أكتبه بالصورة القياسية:

$$\Rightarrow \frac{-4+3i}{1+i}$$

$$\text{b) } \frac{2-6i}{-3i}$$

$$\Rightarrow \frac{7i}{4-4i}$$

التعلم

يمكن إيجاد ضرب كلٍّ من المقسوم والمقسوم عليه في $\frac{i}{i}$ ، لكي الأسهل من الضرب في $\frac{1}{i}$.

ضرب الأعداد المركبة المكتوبة بالصورة المثلثية واستنتاجها

إذا كان: $z_1 = r_1(\cos \theta_1 + i \sin \theta_1)$ و $z_2 = r_2(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2)$ فإن:

$$z_1 z_2 = r_1(\cos \theta_1 + i \sin \theta_1) \times r_2(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2)$$

$$= r_1 r_2 (\cos \theta_1 + i \sin \theta_1)(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2)$$

$$= r_1 r_2 (\cos \theta_1 \cos \theta_2 + i \cos \theta_1 \sin \theta_2 + i \sin \theta_1 \cos \theta_2 + i^2 \sin \theta_1 \sin \theta_2)$$

$$= r_1 r_2 (\cos \theta_1 \cos \theta_2 - \sin \theta_1 \sin \theta_2 + i(\sin \theta_1 \cos \theta_2 + \cos \theta_1 \sin \theta_2))$$

$$= r_1 r_2 (\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2))$$

التعلم

- $|z_1 z_2| = |z_1| \times |z_2|$
- $\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$ ، $z_2 \neq 0$

التعلم

إذا كان $-\pi < \theta_1 + \theta_2 \leq \pi$ فإن:

$$\text{Arg}(z_1 z_2) =$$

$$\text{Arg}(z_1) + \text{Arg}(z_2)$$

ضرب الأعداد المركبة المكتوبة بالصورة المثلثية

مفهوم أساسي

إذا كان: $z_1 = r_1(\cos \theta_1 + i \sin \theta_1)$ و $z_2 = r_2(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2)$ فإن:

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 (\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2))$$

يمكن بطريقة مشابهة إثبات أنه إذا كان $\theta_2 \neq 0$ فإن:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} (\cos(\theta_1 - \theta_2) + i \sin(\theta_1 - \theta_2))$$

قسمة الأعداد المركبة المكونة بالصورة المثلثية

مفهوم أساسي

إذا كان: $z_1 = r_1(\cos \theta_1 + i \sin \theta_1)$ وكان: $z_2 = r_2(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2)$ فإن:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} (\cos(\theta_1 - \theta_2) + i \sin(\theta_1 - \theta_2))$$

التعلم

ألاحظ أنه إذا كان:

$$-\pi < \theta_1 - \theta_2 \leq \pi$$

وكان $\theta_2 \neq 0$ فإن:

$$\text{Arg}\left(\frac{z_1}{z_2}\right) =$$

$$\text{Arg}(z_1) - \text{Arg}(z_2)$$

مثال 4

إذا كان: $z_1 = 10\left(\cos\left(-\frac{2\pi}{7}\right) + i \sin\left(-\frac{2\pi}{7}\right)\right)$ وكان: $z_2 = 2\left(\cos\frac{6\pi}{7} + i \sin\frac{6\pi}{7}\right)$ فابحث في كل حصة يأتي بالصورة المثلثية:

التذكر

في الصورة المثلثية

يجب أن تكون θ هي

المعيارية

1 $z_1 z_2$

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 (\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2))$$

صيغة ضرب عددين مركبين

تكتب بالصورة المثلثية

$$= 2 \times 10 \left(\cos\left(-\frac{2\pi}{7} + \frac{6\pi}{7}\right) + i \sin\left(-\frac{2\pi}{7} + \frac{6\pi}{7}\right) \right)$$

بالتعويض

$$= 20 \left(\cos\frac{4\pi}{7} + i \sin\frac{4\pi}{7} \right)$$

بالتبسيط

2 $\frac{z_1}{z_2}$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} (\cos(\theta_1 - \theta_2) + i \sin(\theta_1 - \theta_2))$$

صيغة قسمة عددين مركبين

تكتب بالصورة المثلثية

$$= \frac{10}{2} \left(\cos\left(-\frac{2\pi}{7} - \frac{6\pi}{7}\right) + i \sin\left(-\frac{2\pi}{7} - \frac{6\pi}{7}\right) \right)$$

بالتعويض

$$= 5 \left(\cos\left(-\frac{8\pi}{7}\right) + i \sin\left(-\frac{8\pi}{7}\right) \right)$$

بالتبسيط

$$= 5 \left(\cos\left(-\frac{8\pi}{7} + 2\pi\right) + i \sin\left(-\frac{8\pi}{7} + 2\pi\right) \right)$$

بحسب المعيارية

$$= 5 \left(\cos\frac{6\pi}{7} + i \sin\frac{6\pi}{7} \right)$$

بالتبسيط

التذكر

تقع السعة الرئيسية في

الفترة $-\pi < \theta \leq \pi$

وتمكن تحديدها بطرح

$2\pi n$ أو إضافته إلى

الزاوية الناتجة من الجمع

أو الطرح

✓ اتحقق من فهمي

أوجد ناتج كل مما يأتي بالصورة المتطابقة:

$$a) 6\left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}\right) \times 2\left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6}\right)$$

$$b) 6\left(\cos \left(-\frac{\pi}{3}\right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{3}\right)\right) \div 2\left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6}\right)$$

الجذر التربيعي للعدد المركب

يوجد لكل عدد مركب جهران تربيعيان، وعندما عددان مركبان أيضًا، فإذا كان: $\sqrt{z} = x + iy$ فإن: $z = (x + iy)^2$ ومن ثم، يمكن إيجاد قيمة كل من x و y الحقيقيين شريح الطرفين، ثم المقارنة بين الأجزاء الحقيقية والأجزاء التخيلية في طرفي المعادلة.

مثال 5

أوجد الجذرين التربيعين للعدد المركب: $z = 21 - 20i$

الحل: لن: $\sqrt{z} = x + iy$ ، حيث x و y عددان حقيقيان:

$$\sqrt{z} = x + iy \quad \text{التعويض}$$

$$z = (x + iy)^2 \quad \text{شريح الطرفين}$$

$$21 - 20i = (x + iy)^2 \quad \text{توضيح لـ } z$$

$$21 - 20i = x^2 + 2ixy + i^2y^2 \quad \text{بسط المربع}$$

$$21 - 20i = x^2 - y^2 + 2ixy \quad \text{تصغير } i^2 = -1$$

$$21 = x^2 - y^2 \quad \text{مساواة الجزئين الحقيقيين}$$

$$-20 = 2xy \quad \text{مساواة الجزئين التخيليين}$$

أيضًا، نتبع النظام الأمي الذي يجري معادلتين متعلقين، ويمكن حلّه بطريقة التعويض.

التذكير

θ	θ'	$\frac{\theta}{\pi}$	$+\pi$
$\sin \theta$	0	$\frac{1}{\pi}$	$\frac{1}{2\pi}$
$\cos \theta$	1	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$

θ	$\frac{\theta}{\pi}$	$\frac{2\theta}{\pi}$	π
$\sin \theta$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1	0
$\cos \theta$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	0	-1

التذكير

تساوي العددان المركبان:

$$a + bi = c + di \quad \text{و فقط}$$

$$\text{إذا كان: } a = c, b = d$$

$$x^2 - y^2 = 21$$

المعادلة الأولى

$$2xy = -20$$

المعادلة الثانية

$$y = -\frac{10}{x}$$

حل المعادلة الثانية في الأولى

$$x^2 - \left(-\frac{10}{x}\right)^2 = 21$$

نصنع $x = -\frac{10}{y}$ في المعادلة الأولى

$$x^2 - 100 = 21x^2$$

نحول طرفي المعادلة الثانية في الأولى

$$x^2 - 21x^2 - 100 = 0$$

نجمع طرفي المعادلة

$$(x^2 - 25)(x^2 + 4) = 0$$

نضرب

$$x^2 = 25 \text{ or } x^2 = -4$$

نحل المعادلتين

بما أن x عدد حقيقي، فإن $x = \pm 5$

وبعوض قيمتي x في المعادلة: $y = -\frac{10}{x}$ فإن الناتج:

$$x = 5 \Rightarrow y = -2$$

$$x = -5 \Rightarrow y = 2$$

إذن، الجذوران التربيعيان للعدد المركب: $21 - 20i$ هما: $5 - 2i$ و $-5 + 2i$

تحقق من ههنا

أوجد الجذورين التربيعيين لكل من الأعداد المركبة الآتية:

a) $-5 - 12i$

b) $-9i$

c) $-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$

التعلم

يمكن إيجاد الجذور الحقيقية لـ

التعلم

يمكن التحقق من صحة الحل بوضع كل من الجذورين التربيعيين الناتجين في معادلة الأصل.

الجذور المركبة لمعادلات كل من الحدود:

تعلمت سابقًا حل بعض المعادلات التربيعية في صورة: $ax^2 + bx + c = 0$ ، حيث a, b, c

أعداد حقيقية، باستخدام القانون العام الذي صيغته:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

المتعمد أيضًا المُعيَّر $(\Delta = b^2 - 4ac)$ لتحديد إذا كان للمعادلة التربيعية جذران حقيقيان أم لا، وإذا كان الجذران متساويين أم لا كما في الجدول الآتي:

$\Delta = b^2 - 4ac$	جذرا المعادلة التربيعية
$\Delta > 0$	حقيقيان مختلفان
$\Delta = 0$	حقيقيان متساويان
$\Delta < 0$	لا توجد جذور حقيقية

ولكن، وبعد تعريف الأعداد المركبة في هذه المرحلة ألاحظ أنه إذا كان المُعيَّر سالبًا، فإنه يتبع جذران مُركبان مُتوافقان من تعويض القيم a, b, c في القانون العام. إذن، يمكن القول إنه إذا كان المُعيَّر سالبًا، فإن للمعادلة التربيعية جذرين مُركبين، ومن ثم، يمكن تعديل الجدول السابق على النحو الآتي:

$\Delta = b^2 - 4ac$	جذرا المعادلة التربيعية
$\Delta > 0$	حقيقيان مختلفان
$\Delta = 0$	حقيقيان متساويان
$\Delta < 0$	مُركبان مُتوافقان في صورة: $f \pm ig, g \neq 0$

يشيء مما سبق أنه إذا كان $f + ig$ جذرًا لمعادلة تربيعية ذات معاملات حقيقية، فإن مُرافقته $f - ig$ هو أيضًا جذر للمعادلة نفسها، ويمكن تعميم هذا الاستنتاج ليشمل أي من معادلات كثيرات الحدود:

إذا كانت درجة معادلة كثير حدود أكبر من الصفر، فقد لا توجد لها جذور حقيقية، وإنما توجد لها جذور مُركبة.

عند التعامل مع الأعداد المُركبة، فإن أي معادلة كثير حدود، درجتها أكبر من الصفر، لها - على الأقل - جذر مُركب واحد في ما يُعرَف باسم النظرية الأساسية في الجبر.

العلم

درجة معادلة كثير الحدود هي الجذر المُركب لها.

النظرية الأساسية في الجبر

تكررة

يوجد جذر مُركب واحد - على الأقل - لأي معادلة كثير حدود، درجتها أكبر من الصفر.

الوحدة 4

صحيح أن النظرية الأساسية في الجبر تؤكد وجود صلب مُركَّب واحد - على الأقل - لأي معادلة كثير حدود، درجة أكبر من الصفر، لكنها لا تساعد على إيجاد هذا الصلب.

فمثلاً، إذا كانت: $p(x) = 0$ معادلة كثير حدود من الدرجة $n \geq 1$ ، فإن النظرية الأساسية في الجبر تضمن وجود جذر مُركَّب واحد - على الأقل - للمعادلة، وليكن: α .

نسمِّ إنظرية العوامل التي نتلمَّحُها سابقاً تضمن إمكانية تحليل $p(x)$ في صورة: $p(x) = (x - \alpha_1) q_1(x)$ حيث $q_1(x)$ كثير حدود درجة $n-1$.

فإذا كانت درجة $q_1(x)$ لا تساوي صفراً، فإنه يُمكن تطبيق النظرية الأساسية في الجبر عليه لإثبات وجود جذر مُركَّب آخر لكثير الحدود، وهكذا حتى إثبات وجود n من الجذور المُركَّبة لـ $p(x)$.

المُلم

$q(x)$ هو ناتج لقسمة $p(x)$ على $(x - \alpha)$.

للتأمل المُركَّب

نظرية

لأي معادلة كثير حدود من الدرجة n ، حيث: $n \neq 0$ ، يوجد n من الجذور المُركَّبة، يبدأ في ذلك الجذور المُركَّبة.

أمثلة:

$$x^2 - 4x + 4 = 0$$

4 جذور

$$5x^2 - x^3 + x - 19 = 0$$

3 جذور

$$x^4 + 2x^3 - x + 7 = 0$$

6 جذور

المُلم

لمعادلة: $x^2 = 0$
جذوران هما: $x = 0$ ، $x = 0$ أي أن لها جذراً مُركَّباً مُتكرراً.

تُستعمل نظرية التحليل المُركَّب، وحقيقة أن الجذور المُركَّبة تأتي في صورة أزواج من الأعداد المُركَّبة المُتقاربات، لتحديد أنواع الجذور المُمكنة لمعادلة كثير الحدود كما في الجدول الآتي:

أنواع الجذور المُمكنة	عدد الجذور	درجة معادلة كثير الحدود
جذر حقيقي واحد	1	1
جذوران حقيقيان أو جذوران مُركَّبان مُتقاربان	2	2
ثلاثة جذور حقيقية، أو جذر حقيقي واحد وجذوران مُركَّبان مُتقاربان	3	3
أربعة جذور حقيقية، أو جذران حقيقيان وجذوران مُركَّبان مُتقاربان، أو أربعة جذور مُركَّبة (أزواج من الجذور المُركَّبة المُتقاربات)	4	4
...

المُلم

يُطبق التحليل الجذور على معيّنات الحدود ذاتها المعادلات الحقيقية فقط.

يُمكن استعمال نظرتي الباقي والعوامل لتحليل كثير الحدود وحل معادته كما في المثال التالي:

مثال 6

أوجد جميع الجذور الحقيقية والجذور المركبة للمعادلة: $z^2 + 4z^2 + z - 26 = 0$

اجعل الطرف الأيمن طرفاً بطرح 26 من طرفي المعادلة:

$$z^2 + 4z^2 + z - 26 = 0$$

بحسب نظرية الأعداد الصحيحة، إذا كان لهذه المعادلة جذور صحيحة، فوُتة يكون أحد عوامل الحد:

$$\pm 1, \pm 2, \pm 13, \pm 26 \text{، وهي:}$$

بالعروض، أوجد أن العدد 2 يُحقّق هذه المعادلة:

$$2^2 + 4(2^2) + 2 - 26 = 0$$

إذن، $z - 2$ هو أحد عوامل كثير الحدود.

أقسم $z^2 + 4z^2 + z - 26$ على $z - 2$ لإيجاد العامل التربيعي باستخدام طريقة الجداول على النحو التالي:

\times	z^2	$6z$	13	
z	z^2	$6z^2$	$13z$	\parallel
-2	$-2z^2$	$-12z$	-26	

إذن، يُمكن كتابة المعادلة في صورة حاصل ضرب العامل الخطّي والعامل التربيعي كما يأتي:

$$z^2 + 4z^2 + z - 26 = (z - 2)(z^2 + 6z + 13) = 0$$

باستعمال خاصية الضرب الصفري، فوُتة:

$$z^2 + 6z + 13 = 0 \text{ or } z - 2 = 0$$


باستعمال القانون العام، فوُتة جذور المعادلة التربيعية هي:

$$z = \frac{-6 \pm \sqrt{36 - 52}}{2} = \frac{-6 \pm \sqrt{-16}}{2} = -3 \pm 2i$$

إذن، لهذه المعادلة 3 جذور، هي: $2, -3 + 2i, -3 - 2i$.

الذفر

تولّدنا في الوحدة الأولى من هذا الكتاب طريقة الجداول وهي طريقة تعتمد أساساً على ضرب كثيرات الحدود ببعضها لتلك العملية بحكمة لعملية القسمة.



التحقق من فهمي

أوجد جميع الجذور الحقيقية والجذور المركبة للمعادلة: $x^2 - x^2 - 7x + 15 = 0$

إذا علم أحد جذور المعادلة، فإنه يمكن السير بخطوات عكسية (كما بالجذر المعلوم) لإيجاد المعادلة الأصلية، أو أخذ معادلاتها.

مثال 7

إذا كان: $3 + 9i$ هو أحد جذور المعادلة: $x^2 + ax + b = 0$ فأوجد قيمة كل من a و b بما أن $3 + 9i$ من أحد جذور المعادلة، فإن مرافق هذا الجذر هو جذر آخر لهذه المعادلة.

أصح خطوات عكسية لإيجاد المعادلة التربيعية:

$$\begin{aligned} x &= 3 + 9i && \text{3 + 9i هو جذر للمعادلة} \\ x - 3 &= \pm 9i && \text{نطرح 3 من طرفي المعادلة} \\ (x - 3)^2 &= -81 && \text{نربع الطرفين} \\ x^2 - 6x + 90 &= 0 && \text{بسيطة} \end{aligned}$$

بعد مقارنة حدود المعادلة التربيعية الناتجة بالمعادلة المعطاة، نستج أن:

$$a = -6, b = 90$$

التحقق من فهمي

إذا كان: $2 - i$ هو أحد جذور المعادلة: $x^2 + ax + b = 0$ فأوجد قيمة كل من a و b .

التعلم

تستعمل هذه الطريقة أحياناً لإيجاد قيم معاملات معادلة في المعادلة:

التعلم

يمكن كتابة معادلة تربيعية جذورها معروفة a و b كما يأتي:
 $x^2 - (a + b)x + (ab) = 0$
 يمكن أيضًا استعمال هذه الفكرة لإيجاد هذا الجذر بطريقة أخرى مباشرة:

التدريب والتفكير الناقد

أوجد ناتج كل مما يأتي، ثم أكتب بالصور القياسية:

- 1 $(7 + 2i) + (3 - 11i)$
- 2 $(5 - 9i) - (-4 + 7i)$
- 3 $(4 - 3i)(1 + 3i)$
- 4 $(4 - 6i)(1 - 2i)(2 - 3i)$
- 5 $(9 - 2i)^2$
- 6 $\frac{10}{3 - i}$

أوجد ناتج كل مما يأتي بالصورة المتطابقة:

7 $6(\cos \pi + i \sin \pi) \times 2(\cos(-\frac{\pi}{4}) + i \sin(-\frac{\pi}{4}))$ 8 $(\cos \frac{3\pi}{10} + i \sin \frac{3\pi}{10}) \div (\cos \frac{2\pi}{5} + i \sin \frac{2\pi}{5})$

9 $12(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4}) \div 4(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3})$ 10 $11(\cos(-\frac{\pi}{6}) + i \sin(-\frac{\pi}{6})) \times 2(\cos \frac{3\pi}{2} + i \sin \frac{3\pi}{2})$

أوجد القيم الحقيقية للثابتين a و b في كل مما يأتي:

11 $(a + 6i) + (7 - ib) = -2 + 5i$

12 $(11 - ia) - (b - 9i) = 7 - 6i$

13 $(a + ib)(2 - i) = 5 + 5i$

14 $\frac{a - 6i}{i - 2i} = b + 4i$

15 أ ضرب أعداد المركبات $8(\cos \frac{\pi}{4} - i \sin \frac{\pi}{4})$ في مرافقه:

أوجد الجذور التربيعية لكل من الأعداد المركبة الآتية:

16 $3 - 4i$

17 $-15 + 8i$

18 $5 - 12i$

19 $-7 - 24i$

إذا كان: $z = 2(\cos \frac{\pi}{4} - i \sin \frac{\pi}{4})$, $w = 2(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3})$ ، فأوجد كل مما يأتي بالصورة المتطابقة:

20 zw

21 $\frac{z}{w}$

22 $\frac{w}{z}$

23 $\frac{1}{z}$

24 w^2

25 $5iz$

أوجد جميع الجذور الحقيقية والجذور المركبة لكل من المعادلات الآتية:

26 $z^2 + 104 = 20z$

27 $z^2 + 18z + 202 = 0$

28 $9z^2 + 68 = 0$

29 $3z^3 - 2z^2 + 2z + 1 = 0$

30 $z^2 + 4z + 10 = 5z^2$

31 $2z^3 = 8z^2 + 13z - 87$

أوجد معادلة تربيعية لها الجذور المركبتان المعطيان في كل مما يأتي:

32 $2 + 5i$

33 $7 + 4i$

34 $-8 + 20i$

35 $-3 + 2i$

إذا كان: $z_1 = \sqrt{12} - 2i$, $z_2 = \sqrt{5} - i\sqrt{15}$, $z_3 = 2 - 2i$ ، فأوجد المقاس والسعة لكل مما يأتي:

36 $\frac{z_1}{z_2}$

37 $\frac{1}{z_3}$

38 $\frac{z_2}{z_3}$

إذا كان: $z = 8\left(\cos \frac{2\pi}{3} - i \sin \frac{2\pi}{3}\right)$ ، فأجب عن السؤالين الآتيين تالفاً:

٤٣) أمثل العدد z بيانياً في المستوى المركب. ٤٤) أجد الجذور التربيعين للعدد z .

٤٥) إذا كان: $(a-3i)$ و $(b+4i)$ هما الجذورين التربيعين للعدد المركب: $55 - 48i$ ، وأجد قيمة كل من الثوابت الحقيقية: a و b و c .

أحل المعادلة المعطى أحد جذورها في كل من يأتي:

- ٤٦) $x^2 + x^2 + 15x = 225, 5$ ٤٧) $x^2 + 7x^2 - 13x + 45 = 0, -9$
 ٤٨) $3x(x^2 + 45) = 2(19x^2 + 37), 6 - i$ ٤٩) $x^2 + 10x^2 + 29x + 30 = 0, -2 + i$

إذا كان: $(4 + 11i)$ هو أحد جذري المعادلة: $-8z + k = 0$ ، فجد حيث k عدد حقيقي، فأجب عن السؤالين الآتيين تالفاً:

٥٠) أجد الجذر الآخر للمعادلة. ٥١) أجد قيمة الثابت k .

٥٢) مهارات التفكير العليا

٥٢) أجب عن الأسئلة الثلاثة الآتية تالفاً، ثم أدر إجابتك:

٥٣) أجد متج: $(p + iq)^2$ ، حيث p و q عدداً حقيقيين.

٥٤) إذا كان: $(p + iq)^2 = 45 + im$ ، حيث p و q عدداً صحيحان موجبان، و $p > q$ ، فأوجد ثلاث قيم ممكنة للعدد الحقيقي m .

٥٥) استعمل إجابة السؤال السابق لإيجاد الجذورين التربيعين للعدد المركب: $108i - 45$.

٥٦) برهان: أثبت أن: $|z\bar{z}| = |z|^2$ لأي عدد مركب z .

٥٧) برهان: إذا كان z عدداً مركباً، حيث: $\text{Arg}(z) = \tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$ ، $|z| = 5\sqrt{5}$ ، وكان:

$$p + iq = \frac{z}{3 + 4i}$$

فأثبت أن: $p + q = 1$.

٥٨) أجد العدد المركب: $z = (10 - i) - (2 - 7i)$ هو أحد جذور المعادلة: $x^2 - 20x + 164x - 400 = 0$

أجد بقية جذور هذه المعادلة، ثم أحل المعادلة الآتية: $x^2 + 164x^2 = 20(x^2 + 20)$

المحل الهندسي في المستوى المركَّب Locus in the Complex Plane

تعريف المحل الهندسي في المستوى المركَّب، ورسمه، وتمثيل منطقة محل متباينات في هذا المستوى.

فترة الدرس




المحل الهندسي، المُخَصَّف العمودي لقطعة مستقيمة، الشعاع

المعادلة



مكب متبينة بدلالة z تُحَقِّقها جميع الأعداد المركَّبة التي تقع في المنطقة المُظَلَّاة المُبَيَّنة في المستوى المركَّب في الشكل المجاور.


مساحة المثلث



الدائرة

المحل الهندسي (locus) هو مجموعة النقاط في المستوى المركَّب التي يُمكن لقطعة

مُتحرِّكة ضمن شروط أو شروط (معدَّنة، أو متباينة) أن تكون منها نقطة. الدائرة هي محل هندسي لقطعة تتحرك في مسال بعدد مسافة مُحدَّدة من نقطة ثابتة هي مركز الدائرة.



في المستوى المركَّب تبعد الأعداد المركَّبة التي تُحَقِّق المعادلة: $|z| = r$ مسافة r وحدة عن نقطة الأصل؛ لأنَّ مقياس كلِّ منها هو r وحدة. ومن ثَمَّ، فإنَّ المحل الهندسي الذي تُعَيِّنه هذه المعادلة هو دائرة مركزها نقطة الأصل، وطول نصف قطرها r كما في الشكل المجاور.

إذا كان مركز دائرة مرسومة في المستوى المركَّب هو العدد z_0 (يسمى نقطة الأصل)، وطول نصف قطرها r وحدة كما في الشكل المجاور، فإنه يُمكن استعمال نظرية فيتاغورس لكتابة معادلة تُمثِّل هذا المحل الهندسي على النحو الآتي:

$$\sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2} = r$$


نظرية فيتاغورس

ألاحظ أنَّ طرف المعادلة الأيسر يساوي $|z - z_0|$ ، حيث:

$$|z - z_0| = r$$

صيغة لـ $|z - z_0|$ في المعادلة

إذن، المحل الهندسي الذي تُعَيِّله المعادلة: $|z - z_0| = r$ هو دائرة مركزها z_0 ، وطول نصف قطرها r .



معادلة الدائرة في المستوى المركب

مفهوم أساسي

المحل الهندسي في المستوى المركب الذي تُعطيه المعادلة $|z - (a + bi)| = r$ هو دائرة مركزها (a, b) ، وطول نصف قطرها r وحدة.

مثال 1

أوجد المحل الهندسي الذي تُعطيه المعادلة: $|z - 2 + 8i| = 3$ ، ثم أكتب المعادلة بالصيغة الديكارتية.

الخطوة 1: أوجد المحل الهندسي.

نجد أن المعادلة في صورة: $|z - (a + bi)| = r$ ، حيث $a = 2$ ، $b = -8$ ، $r = 3$ ، وحدة معادلة دائرة، مركزها $(2, -8)$ ، وطول نصف قطرها 3 وحدات.

الخطوة 2: أكتب المعادلة بالصيغة الديكارتية.

أكتب هذه المعادلة بالصيغة الديكارتية على النحو الآتي:

$$|z - 2 + 8i| = 3$$

تعبارة مختصرة

$$|x + iy - 2 + 8i| = 3$$

استبدال z بالصيغة $x + iy$

$$|(x - 2) + (y + 8)i| = 3$$

تجميع الحدود المتشابهة

$$\sqrt{(x - 2)^2 + (y + 8)^2} = 3$$

تطبيق مبرهن اتحاد التركيب

$$(x - 2)^2 + (y + 8)^2 = 9$$

تجميع الطرفين

ألاحظ أن المعادلة: $(x - 2)^2 + (y + 8)^2 = 9$ هي أيضًا معادلة دائرة، مركزها $(2, -8)$ ، وطول نصف قطرها 3 وحدات.

التحقق من الحل

أوجد المحل الهندسي الذي تُعطيه المعادلة: $|z + 5 - 4i| = 7$ ، ثم أكتب المعادلة بالصيغة الديكارتية.

التذكير

العلاقة القياسية (الديكارتية) لمعادلة الدائرة التي مركزها (h, k) ونصف قطرها r هي:

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$




المُتَّخَف العمودي للقطعة المستقيمة

يُطلَق على المحل الهندسي للقطعة التي يحددها في المستوى المركَّب، وتُظَلَّ على مُعدَّتين متساويتين من النقطتين النابضتين. هذا وقد أُسِمَ **المُتَّخَف العمودي**

(perpendicular bisector) للقطعة المستقيمة

الواردة بين هاتين النقطتين النابضتين كما في الشكل المجاور.



تُعَدُّ $|z - z_1|$ المسافة بين z و z_1 وتُعَدُّ $|z - z_2|$

المسافة بين z و z_2 وبمَعْنَى أَنْ هَاتَيْنِ المسافتين

متساويتان يحدِّف الخط من موقع z ذاته يُعَبَّرُ عن ذلك بالمعادلة الآتية:

$$|z - z_1| = |z - z_2|$$

المُتَّخَف العمودي

مفاهيم أساسية

المحل الهندسي في المستوى المركَّب للنقطة z التي تُحَقِّق المعادلة:

$$|z - (a + ib)| = |z - (c + id)|$$

بين النقطتين: (a, b) و (c, d) .

مثال 2

أوجد المحل الهندسي الذي تُعَدُّه المعادلة: $|z - 3| = |z - 2i|$. ثم أكتب المعادلة بالصيغة الديكارية.

الحل: أوجد المحل الهندسي


عندما تُكتب المعادلة في صورة:

$$|z - (a + ib)| = |z - (c + id)| \text{ فإن:}$$

$$|z - (3 + 0i)| = |z - (0 + 2i)|$$

العمودي للقطعة المستقيمة التي تصل بين النقطتين: $(3, 0)$

و $(0, 2)$. وهو يظهر باللون الأحمر في الشكل المجاور.



الخطوة 3: أكتب المعادلة بالصيغة الديكارية.

لكل من المعادلتين بالصيغة الديكارية، أضحَ من $z = x + iy$ ثمَّ أجد مقياس العدد المركَّب، ثمَّ أُنظِّم:

$$|z - 3| = |z - 2i|$$

المعادلة بسيطة

$$|x + iy - 3| = |x + iy - 2i|$$

بإحداثيات واقعية و*y* خيالية

$$|(x - 3) + iy| = |x + (y - 2)i|$$

جميع الحدود الحقيقية

$$\sqrt{(x - 3)^2 + y^2} = \sqrt{x^2 + (y - 2)^2}$$

مبدأ مقياس العدد المركَّب

$$x^2 - 6x + 9 + y^2 = x^2 + y^2 - 4y + 4$$

تربيع الطرفين، وذلك لإزالة الجذور

$$-6x + 9 = -4y + 4$$

ننقل الحدود لإزالة الثوابت

$$6x - 4y - 5 = 0$$

يمكن كتابة المعادلة في صورة $Ax + By + C = 0$

إذن معادلة الخنثف العمودي للقطعة المستقيمة بالصيغة الديكارية هي $6x - 4y - 5 = 0$


التحقق من قصبي

أجد المحل الهندسي الذي تُعطيه المعادلة $|z + 1| = |z - 5i|$ ، ثمَّ أكتب المعادلة بالصيغة الديكارية.

المعلم

تتكون أسعة الأعداد المركَّبة الواقعة على المحاور، الأخرى حتى المسجَّبة هي $\pm \theta$ لما شكَّبت هذه الأعداد من المحل الهندسي للمعادلة: $\text{Arg}(z) = \theta$ فهي لا تُشكِّل أسعة.

الاشعاع الأمامي يبدأ من $(0, 0)$



إنَّ أسعة جميع الأعداد المركَّبة التي تُشكِّل المعادلتين $\text{Arg}(z) = \theta_0$ هي θ_0 ، لذا فإنَّها تقع على **الاشعاع (ray)** يتسع زاوية قياسها θ_0 وانزياح مع المحور الحقيقي الموجب، ويبدأ (الاشعاع) بنقطة الأصل، ويمتدُّ بصورة لا نهائية في أحد اتجاهيه كما في الشكل المجاور.

ومسَّ ثمَّ، فإنَّ المحل الهندسي الذي تُعطيه المعادلة: $\text{Arg}(z) = \theta_0$ هو اشعاع يبدأ بنقطة الأصل، وليس له نهاية.


بما أنَّ أسعة العدد المركَّب $z = 0$ غير مُعرَّفة، فإنَّ الشعاع لا يحتوي نقطة الأصل، ويُعرَّف عن ذلك بدائرة مُقرَّعة في بداية الشعاع.

الشعاع الذي يبدأ بالنقطة (a, b)


إذا كان $z_1 = (x_1 + iy_1)$ و $z_2 = (x_2 + iy_2)$ عددين مركبين، فإن $z_2 - z_1 = (x_2 - x_1) + i(y_2 - y_1)$ يمكن حساب سعة العدد المركب $z_2 - z_1$ الموضح في الشكل المجاور على المحور الحقيقي:

$$\text{Arg}(z_2 - z_1) = \tan^{-1} \left(\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \right) = \theta$$

ألاحظ من الشكل المجاور أن سعة العدد المركب $(z_2 - z_1)$ تساوي قياس الزاوية θ التي يصنعها المستقيم المواصل بين العددين z_1 و z_2 مع مستقيم يوازي المحور الحقيقي.



ومن ثم، فإن الأعداد المركبة z التي تحل المعادلة $\text{Arg}(z - (a + ib)) = \theta$ تقع جميعها على الشعاع الذي نقطته بدايته (a, b) ، وهو يصنع زاوية قياسها θ راديان مع مستقيم يوازي المحور الحقيقي كما في الشكل المجاور، وبما أن الناتج تعويض نقطة بداية الشعاع في المعادلة هو $\text{Arg}(0)$ (قيمة غير معروفة)، فإن نقطة بداية الشعاع تُستثنى، ويُعبر عنها بدائرة مُغلقة.



الشعاع

مفهوم أساسي

المحل الهندسي في المستوى المركب الذي تُعطيه المعادلة $\text{Arg}(z - (a + ib)) = \theta$ هو شعاع يبدأ بالنقطة (a, b) ، ويصنع زاوية قياسها θ راديان مع مستقيم يوازي المحور الحقيقي.


التذكر

$$-\pi < \text{Arg}(z) \leq \pi$$

مثال 3

أوجد المحل الهندسي الذي تُعطيه كل معادلة مما يأتي، ثم أرسمه في المستوى المركب:

1) $\text{Arg}(z - 4i) = 0$




تُحل هذه المعادلة شعاعاً يبدأ بالنقطة $(0, 4)$ ، ولا يشملها، ويصنع زاوية قياسها 0 مع المستقيم الذي يوازي المحور الحقيقي، أي أنه يوازي المحور الحقيقي كما في الشكل المجاور.

التعلم

ارسم الزاوية θ مع المستقيم في اتجاه المحور الحقيقي الموجب.

1 $\text{Arg}(z + 1 + 2i) = \frac{3\pi}{4}$



عندما نكتب المعادلة في صورة:

$\text{Arg}(z - (a + bi)) = \theta$ فإن:

$\text{Arg}(z - (-1 - 2i)) = \frac{3\pi}{4}$ وهذه معادلة شعاع

يبدأ بالنقطة $(-1, -2)$ ، ولا يشطبها، ويصنع

زاوية قياسها $\frac{3\pi}{4}$ مع المحطيم الذي يوازي المحور

الحقيقي عند في الشكل المجاور.

التحقق من فهمي

أجد المحل الهندسي الذي تمثله كل معادلة مما يأتي، ثم أرمعه في المستوى المركب:

أ) $\text{Arg}(z) = \frac{\pi}{3}$

ب) $\text{Arg}(z - 5) = -\frac{2\pi}{3}$

وتعد الأعمال الواردة لرسم المحل الهندسي في جزء من هذا الشكل.

تمثيل المتباينات في المستوى المركب

بعد حل المتباينة في المستوى المركب محلاً متممياً يمكن تمثيله بيانياً بصورة متميزة لتمثيل حل المتباينة في المستوى الإحداثي.

بدايةً يُرسم منحنى المعادلة المرتبطة بالمتباينة بعد استعمال رمز المساواة (=) بدلاً من رمز المتباينة (<، >، ≤، ≥)، حيث تمثل المعادلة الناتجة منحنى يُسمى المنحنى الحدودي، وهو منحنى يُقسم المستوى المركب إلى جزأين، أحدهما يحتوي جميع الأعداد المركبة التي تحقق المتباينة.

قد يكون المنحنى الحدودي جزءاً من المحل الهندسي إذا تضمنت المتباينة الرمز >، أو الرمز <، أو رسم المنحنى الحدودي متصلاً، وقد لا يكون المنحنى الحدودي جزءاً من المحل الهندسي إذا تضمنت المتباينة الرمز <، أو الرمز >، أو الرمز <، أو الرمز >، فيرسم المنحنى الحدودي منقطعاً.

العلم

قد يكون المنحنى الحدودي صحيحاً أو معكناً أو دائرة أو أي منحنى آخر.

أُعطى في المستوى المركب الهندسي للنقطة التي تُحقق كل عبارة مما يأتي:

1) $|z - 3| > 5$

الخطوة 1: أجد المسطح الحدودي

يُعطى مسطح المعادلة: $|z - 3| = 5$ المسطح الحدودي للمساوية: $|z - 3| > 5$ وهو دائرة مركزها $(3, 0)$ ، وبنصف قطرها 5 وحدات. وبما أنه لا توجد مساواة في رمز المساوية، فإنني أرسم المسطح الحدودي بخطوط

الخطوة 2: أجد منطقة الحلول الممكنة

تتعد الأعداد المركبة التي تُحقق المساوية: $|z - 3| = 5$ مسافة تزيد على 5 وحدات عن مركز الدائرة. إذن، منطقة الحلول الممكنة للمساوية تقع خارج محيط الدائرة. كما في الشكل المتخاير.



2) $|z - 7| \leq |z + 3|$

الخطوة 1: أجد المسطح الحدودي

يُعطى مسطح المعادلة: $|z - 7| = |z + 3|$ المسطح الحدودي للمساوية: $|z - 7| \leq |z + 3|$ وهو المُستطاب العمودي للقطعة المستقيمة الواصلة بين $(7, 0)$ و $(0, -3)$. وبما أنه توجد مساواة في رمز المساوية، فإنني أرسم المسطح الحدودي بخطوط

الخطوة 2: أجد منطقة الحلول الممكنة

يُحقق المساوية: $|z - 7| \leq |z + 3|$ في إحدى جهتي المسطح الحدودي، ويمكن تحديدها باختيار عدة مركب عشوائية في المساوية.

أختار العدد: $z = 0 + 0i$ الذي يُمثله نقطة الأصل:

$$|z - 7| \leq |z + 3|$$

فجاءت النتيجة

$$|0 - 7| \leq |0 + 3|$$

بصيغة $z = 0 + 0i$

$$\sqrt{49} \leq \sqrt{9}$$

فخطت

$$7 \leq 3 \quad \times$$




بعد أن العدد: $z = 0 + 0i$ لا يُحقق المتباينة، فإن منطقة الحلول المُمكنة في المنطقة التي لا تحوي نقطة الأصل كما في الشكل المجاور.

$$\frac{\pi}{6} \leq \text{Arg}(z) \leq \frac{\pi}{2}$$

الخطوة ١: أختد المنحنى القطبي:

يُمثل منحنى المعادلة: $\text{Arg}(z) = \frac{\pi}{6}$ شعاعاً يبدأ بنقطة الأصل، ولا يشملها، ويضع زاوية قياسها $\frac{\pi}{6}$ مع المحور الحقيقي الموجب، ويُمثل منحنى المعادلة: $\text{Arg}(z) = \frac{\pi}{2}$ شعاعاً آخر يبدأ بنقطة الأصل، ولا يشملها، ويضع زاوية قياسها $\frac{\pi}{2}$ مع المحور الحقيقي الموجب.

إذن، يُمثل الشعاعان معاً منحنى حدودياً للمعادلة: $\frac{\pi}{6} \leq \text{Arg}(z) \leq \frac{\pi}{2}$ ، وبما أنه لا يوجد مناطق في رمزي المتباينة، فإنني أرسم المنحنى القطبي متصلاً.



الخطوة ٢: أختد منطقة الحلول المُمكنة.

المنطقة التي تُمثّلها المتباينة: $\frac{\pi}{6} \leq \text{Arg}(z) \leq \frac{\pi}{2}$ هي جزء من المستوى المركب محفوفة بشعاعين كما في الشكل المجاور.

الخطو

تُسمى نقطة الأصل بدائرة محزونة لشي بداية الشعاع

تحقق من فهمي

أمثل في المستوى المركب المحل الهندسي للنقطة التي تُحقق كل متباينة مما يأتي:

$$a) |z + 3 + i| \leq 6 \quad b) |z + 3 + i| < |z - 4| \quad c) \frac{\pi}{4} < \text{Arg}(z + 5) \leq \frac{3\pi}{4}$$

لقد فصلت لك في الرسم كل المحل الهندسي للمعادلة التالية:

تمثيل نظام متباينات في المستوى المركب

يمكن أيضًا تمثيل منطقة حل نظام متباينات رياضية في المستوى المركب بصورة مشابهة لتمثيل أنظمة المتباينات في المستوى الإحداثي.

مثال 3

أمثل في المستوى المركب المحل الهندسي للنقطة التي تُحقق المتباينة: $|z - 1 - 2i| \leq 5$ والمتباينة: $-\frac{\pi}{4} < \text{Arg}(z - 1 - 2i) < \frac{2\pi}{3}$.

الخطوة 1: أجد المنحنى الحدودي لكل متباينة.


• تمثل المعادلة: $|z - 1 - 2i| = 5$ دائرة مركزها النقطة $(1, 2)$ ، وكون نصف قطرها 5 وحدات، وبما أنه توجد مساواة في رمز المتباينة، فإنني أرسم المنحنى الحدودي متصلًا.

• أمثل المعادلة: $\text{Arg}(z - 1 - 2i) = \frac{\pi}{4}$ شعاعًا يبدأ بالنقطة $(1, 2)$ ، ولا يشملها، ويصنع زاوية قياسها $\frac{\pi}{4}$ مع مستقيم يوازي المحور الحقيقي. وبما أنه لا توجد مساواة في رمز المتباينة، فإنني أرسم الشعاع منقطعًا.

• أمثل المعادلة: $\text{Arg}(z - 1 - 2i) = \frac{2\pi}{3}$ شعاعًا يبدأ بالنقطة $(1, 2)$ ، ولا يشملها، ويصنع زاوية قياسها $\frac{2\pi}{3}$ مع مستقيم يوازي المحور الحقيقي. وبما أنه لا توجد مساواة في رمز المتباينة، فإنني أرسم الشعاع منقطعًا.

الخطوة 2: أجد منطقة الحلول الممكنة.

تمثل المتباينة: $|z - 1 - 2i| \leq 5$ النطاق الواقعة داخل الدائرة وعليها، وتمثل المتباينة: $-\frac{\pi}{4} < \text{Arg}(z - 1 - 2i) < \frac{2\pi}{3}$ النطاق الواقعة بين الشعاعين



إثبات: المحل الهندسي للنقاط التي تُحقق المتباينتين معاً هو الجزء الواقع داخل القطع الدائري وعلى قوسه كما في الشكل المجاور.

التحقق من تفصيل

أعطّل في المستوى المركّب المحل الهندسي للنقاط التي تُحقق المتباينة: $|z + 3 - 2i| \geq 4$ والمتباينة: $-\frac{\pi}{2} < \text{Arg}(z - 2 + i) < \frac{\pi}{4}$

إثبات: اشرح الحل في ضوء ما سبق.

التعبير والمحل الهندسي

أوجد المحل الهندسي الذي أمثله كل معادلة مما يأتي، ثم أمثله في المستوى المركّب، ثم أجد معادلته الديكارية:

- 1 $|z| = 10$
- 2 $|z - 9i| = 4$
- 3 $|z + 2i| = 8$
- 4 $|z - 5 + 6i| = 2$
- 5 $|z + \sqrt{2} + i\sqrt{2}| = 2$
- 6 $|z + 6 - 4i| = 7$
- 7 $|z - 5| = |z - 3i|$
- 8 $|z + 3i| = |z - 7i|$
- 9 $|z + 5 + 2i| = |z - 7i|$
- 10 $|z - 3i| = |z - 2 - z|$
- 11 $\frac{|z + 6 - i|}{|z - 10 - 5i|} = 1$
- 12 $|z + 7 + 2i| = |z - 4 - 3i|$

أوجد المحل الهندسي الذي أمثله كل من المعادلات الآتية، ثم أرسده في المستوى المركّب:

- 13 $\text{Arg}(z + 2 - 5i) = \frac{\pi}{4}$
- 14 $\text{Arg}(z - 1 + i\sqrt{3}) = \frac{2\pi}{3}$
- 15 $\text{Arg}(z - 4i) = -\frac{3\pi}{4}$

أعطّل في المستوى المركّب المنطقة التي تحدّها كل معادلة مما يأتي:

- 16 $|z - 2| < |z + 2|$
- 17 $|z - 4 - 2i| \leq 2$
- 18 $|z - 4| > |z - 6|$
- 19 $0 < \text{Arg}(z - 2 - 2i) < \frac{\pi}{4}$
- 20 $-\frac{\pi}{4} \leq \text{Arg}(z - 3 + 4i) \leq \frac{\pi}{4}$
- 21 $2 \leq |z - 3 - 4i| \leq 4$

إثبات: اشرح الحل في ضوء ما سبق.

22 أمثل في المستوى المركب نمطه المحل الهندسي الذي يُعطيه كلٌّ من المعادلة: $|z - 3 + 2i| = \sqrt{10}$ ، والمعادلة: $|z - 6i| = |z - 7 + i|$. ثم أوجد الأعداد المركبة التي تُحقق المعادلتين معاً.

23 أوجد العدد المركب الذي يُحقق كلًّا من المحل الهندسي: $|z - 3i| = |z + 2i|$ ، والمحل الهندسي: $|z + 3 - i| = |z - 1 + 5i|$.

24 أمثل في المستوى المركب نمطه المحل الهندسي الذي يُعطيه كلٌّ من المعادلات الآتية:

$$\text{Arg}(z + 2 - 5i) = \frac{\pi}{4}, \text{Arg}(z + 2 - 5i) = \frac{-\pi}{2}, |z + 2 - 5i| = \sqrt{29}$$




25 أمثل في المستوى المركب المحل الهندسي للمنطق الذي تُحقق المتباينة: $|z - 3i| > |z + 2i|$ ، والمتباينة: $|z + 3 - i| < |z - 1 + 5i|$.

26 أمثل في المستوى المركب المحل الهندسي للمنطق الذي تُحقق المتباينة: $\frac{-\pi}{2} < \text{Arg}(z + 2 - 5i) < \frac{\pi}{4}$ ، والمتباينة: $|z + 2 - 5i| > \sqrt{29}$.

27 أمثل في المستوى المركب المحل الهندسي للنقاط التي تُحقق المتباينة: $\frac{-\pi}{4} \leq \text{Arg}(z - 2i) \leq \frac{\pi}{3}$ ، والمتباينة: $2 < |z - 3 + i| \leq 5$.




رشد السبع لوزي أرم النبي شيرجودي بهذا كتاب الصلوات.

أكتب (بدلالة z) معادلة المحل الهندسي المُعطى بيانياً في كلِّ مما يأتي:



30 أكتب معادلة في صورة: $\text{Arg}(z - a) = \theta$ ، حيث a عدد مركب و $-\pi < \theta \leq \pi$. أمثل المحل الهندسي المُعطى في الشكل المُحاور.

أكتب (بدلالة z) متباينة المحل الهندسي الذي تمثله المنطقة المظللة في كل مما يأتي:







13 أكتب (بدلالة z) نظام متباينات يمثل المحل الهندسي المثلث في الشكل المجاور.


مهارات التفكير العليا

14 تبرير: إذا كان العدد المركب z يحقق المعادلة: $|z - 3 + 4i| = 2$ ، فأوجد أكبر قيمة لـ $|z|$ وأقل قيمة له، ثم أوجد الجبرتي.

15 احلل: أوجد المعادلة: $|z - 6| = 2|z + 6 - 9i|$ معطى وتره، ثم أوجد مركزها ونحوس نصف قطرها.

16 تبرير: أجب الآتية عن المحل الهندسي الذي معادلته: $\text{Arg}(z - 2 + 3i) = \frac{\pi}{8}$ أذكر الجبرتي.





اختر الأية ليف
المضخة الثقيلة
الشكل المجاور:

- a) $|z - 1 + 2i| < |z + 3 + 4i|$
- b) $|z - 1 + 2i| > |z + 3 + 4i|$
- c) $|z + 1 - 2i| < |z - 3 - 4i|$
- d) $|z + 1 - 2i| > |z - 3 - 4i|$

7) أوجد الجذرين التربيعين للعدد المركب:

$$z = 45 - 28i$$

8) أوجد مقياس العدد المركب، $w = -\frac{\sqrt{3}}{3} - \frac{1}{2}i$ وصاحبه،
والمركب إجابتي إلى أقرب مائتين عشرون.

9) إذا كان $z = -8 + 8i$ وكان $w = a + 2i$ ، حيث

$$|z + w| = 26$$

أوجد قيمة a ، علماً بأن $a < 0$

10) إذا كان $w = \frac{14 - 31i}{3 - 2i}$ ، فأجب عن السؤالين الآتيين بإسقاط:

10) أكتب العدد w في صورة $x + iy$

11) إذا كان العدد w هو أحد جذور المعادلة:

$$z^2 + cz + d = 0$$

فأوجد قيمة كل من العددين

الحقيقيين c و d .

اختر رمز الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي:

1) إذا كان $\sqrt{-1} = i$ ، فإن i^{100} تساوي:

- a) -1
- b) 1
- c) $-i$
- d) i

2) ناتج $(1 - i)^2$ هو:

- a) $-2 + 2i$
- b) $-2 - 2i$
- c) $2 - 2i$
- d) $2 + 2i$

3) إذا كان $2i$ هو أحد جذور المعادلة:

$$az^2 + 5z + 8z + 20 = 0$$

فإن قيمة a هي:

- a) -8
- b) -2
- c) 2
- d) 8

4) الصورة القطبية للعدد المركب $z = -1 + i\sqrt{3}$ هي:

- a) $2(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3})$
- b) $2(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3})$
- c) $2(\cos \frac{\pi}{3} - i \sin \frac{\pi}{3})$
- d) $2(\cos \frac{2\pi}{3} - i \sin \frac{2\pi}{3})$

5) الصورة القياسية لناتج

$$8(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4}) \div 2(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4})$$

هي:

- a) $4i$
- b) -4
- c) $-4 + 4i$
- d) $4 - 4i$

تمثل النقاط: A و B و C و D جذور المعادلة:

$$z^4 - 6z^2 + 14z - 64z + 680 = 0$$

21 إذا كان العدد: $(-2 + 4i)$ هو أحد هذه الجذور، فأوجد


الجذور الثلاثة الأخرى لهذه المعادلة.

22 أمثل الجذور الأربعة في المستوى المركب، ثم أوجد

مساحة الشكل الرباعي $ABCD$.

23 أكتب (بدلالة x) متباينة تمثل المحل الهندسي المعطى

في الشكل الآتي:



24 إذا كان: $z^2 + 2z + 10 = 0$ فاجيب عن السؤالين الآتيين

تتابعاً:

24 أ) أجب عن تجزئة المعادلة اعطى من نفسه.

24 ب) أوجد مسة كل جذر من تجزئة المعادلة.

25 يُحقق العددين المركبان u و v المعادلة:

$$u + 2v = 2i \text{ و } u + v = 3$$

المعادلتين لإيجاد العدد u ، والعدد v .

26 أمثل في المستوى المركب المحل الهندسي للنقاط

التي تُحقق المتباينة:

$$|z - 2i| \leq 2, \text{ و } \frac{\pi}{2} \leq \text{Arg } z \leq \frac{2\pi}{3}$$

أمثل في المستوى المركب المنطقة التي تحددها كل متباينة
متباينة:

27 $|z - 6| \leq 3$

28 $\frac{\pi}{4} \leq \text{Arg}(z - 2) \leq \frac{2\pi}{3}$

29 $|z + 1 + i| > |z - 3 - 3i|$

إذا تمثلت النقطة M العدد: $z_1 = 1 - 8i$ وتمثلت النقطة N

العدد: $z_2 = 4 + 7i$ وكانت O هي نقطة الأصل، فأجيب

عن الأسئلة الآتية تتابعاً:

25 أجب عن المسك OMN مطابق الضلعين

26 أجب عن جيب تمام الزاوية MON يساوي $-\frac{4}{5}$

27 أجد مساحة المسك OMN

28 أمثل في المستوى المركب المحل الهندسي للنقاط

التي تُحقق المتباينة: $|z - 8i| > |z + 2i|$ ، والخطية:

$$-\frac{\pi}{4} < \text{Arg}(z + 3 - 6i) < \frac{\pi}{4}$$

إذا كانت: $z = 5 + 2i$ فاجيب عن السؤالين الآتيين تتابعاً:

29 أجب عن: $\frac{\pi}{3} = \frac{1}{20} (21 + 20i)$

30 عن طريق البحث في سعائر من الأعداد المركبة: z

وحدد $\frac{z}{5}$ ، أجب عن:

$$2 \tan^{-1}\left(\frac{2}{5}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{20}{21}\right)$$

ملحقات

الهندسة

الجبر

مساحة المثلث (المثلث الكائبة A ، والمضرب C ، والمضرب V)

العمليات الحسابية

$$A = \frac{1}{2}bh$$

$$= \frac{1}{2}ab \sin \theta$$



المثلث

$$a(b+c) = ab+ac$$

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}$$

$$\frac{a+c}{b} = \frac{a}{b} + \frac{c}{b}$$

$$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc}$$

$$A = \pi r^2$$

$$C = 2\pi r$$



الدائرة

القسمة والتجذير

لائي عددين حقيقيين x و y ، ولأي عددين صحيحين m و n :

$$x^m x^n = x^{m+n}$$

$$\frac{x^m}{x^n} = x^{m-n}$$

$$(x^m)^n = x^{mn}$$

$$x^{-n} = \frac{1}{x^n}, x \neq 0$$

المضلع المنتظم

$$A = \frac{1}{2}r^2\theta$$

$$s = r\theta \text{ (}\theta \text{ radian)}$$



$$(xy)^n = x^n y^n$$

$$\left(\frac{x}{y}\right)^n = \frac{x^n}{y^n}, y \neq 0$$

$$x^{1/n} = \sqrt[n]{x}$$

$$x^{m/n} = \sqrt[n]{x^m} = (\sqrt[n]{x})^m$$

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

$$A = 4\pi r^2$$



الكروي


$$\sqrt[n]{xy} = \sqrt[n]{x} \sqrt[n]{y} \text{ (المضروب المضروب المضروب المضروب المضروب)}$$

$$\sqrt[n]{\frac{x}{y}} = \frac{\sqrt[n]{x}}{\sqrt[n]{y}}, y \neq 0 \text{ (المضروب المضروب المضروب المضروب المضروب)}$$

حالات خاصة من نظرية كثيرات الحدود

$$V = \pi r^2 h$$

$$A = 2\pi r h + 2\pi r^2$$



الأسطوانة


$$x^2 - y^2 = (x+y)(x-y)$$

$$x^2 + y^2 = (x+y)(x^2 - xy + y^2)$$

$$x^3 - y^3 = (x-y)(x^2 + xy + y^2)$$

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$$

$$A = \pi r \sqrt{r^2 + h^2} + \pi r^2$$



المخروط

القانون العام

إن كان $ax^2 + bx + c = 0$ فإن

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

الدائرة

معادلة الدائرة التي مركزها (h, k) ونصف قطرها r هي:


$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$

المثلث


قياسات الزوايا

$$\pi = 180^\circ \quad 1^\circ = \frac{\pi}{180} \text{ rad}$$

$$1 \text{ rad} = \frac{180^\circ}{\pi}$$



الاحترامات المثلثية في المثلث قائم الزاوية:



$$\sin \theta = \frac{(\text{المقابل})}{(\text{الوتر})} \quad \csc \theta = \frac{(\text{الوتر})}{(\text{المقابل})}$$

$$\cos \theta = \frac{(\text{المجاور})}{(\text{الوتر})} \quad \sec \theta = \frac{(\text{الوتر})}{(\text{المجاور})}$$

$$\tan \theta = \frac{(\text{المقابل})}{(\text{المجاور})} \quad \cot \theta = \frac{(\text{المجاور})}{(\text{المقابل})}$$

الاحترامات المثلثية لأي زاوية:

$$\begin{aligned} \sin \theta &= \frac{y}{r} & \csc \theta &= \frac{r}{y} \\ \cos \theta &= \frac{x}{r} & \sec \theta &= \frac{r}{x} \\ \tan \theta &= \frac{y}{x} & \cot \theta &= \frac{x}{y} \end{aligned}$$



الهندسة التحليلية

المسافة بين نقطتين ونقطة المنتصف

المسافة بين النقطتين $P_1(x_1, y_1)$ و $P_2(x_2, y_2)$ هي:

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

إحداثيات نقطة منتصف القطعة المستقيمة P_1P_2 هما:

$$M\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$$

المستقيم

ميل المستقيم المار بالنقطتين $P_1(x_1, y_1)$ و $P_2(x_2, y_2)$ هو:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

معادلة المستقيم المار بالنقطة $P_1(x_1, y_1)$ وميله m هي:

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

إذا كان l مستقيماً في المستوى الإحداثي بزاوية θ التي

يحتلها المستقيم مع المحور x الموجب، فإن ميل المستقيم

m يعطى بالمعادلة: $m = \tan \theta$ ، حيث: $0 < \theta < \pi$.

المسافة بين نقطة ومستقيم

المسافة بين المستقيم d الذي معادته: $Ax + By + C = 0$

والنقطة $P(x_1, y_1)$ يعطى بالصيغة الآتية:

$$d = \frac{|Ax_1 + By_1 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

شرط ألا تكون A و B معاً صفراً.

المثلثات المثلثية المزدوج والفرق

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$$

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}$$

$$\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta}$$

المثلثات المثلثية لضعف الزاوية

$$\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta \quad \cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta$$

$$\cos 2\theta = 1 - 2 \sin^2 \theta \quad \cos 2\theta = 2 \cos^2 \theta - 1$$

$$\tan 2\theta = \frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta}$$

المثلثات المثلثية لنصف الزاوية

$$\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2} \quad \cos^2 \theta = \frac{1 + \cos 2\theta}{2}$$

$$\tan^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{1 + \cos 2\theta}$$

المثلثات (تحويل الفرق إلى مجموع أو فرق)

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$$

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha - \beta) + \sin(\alpha + \beta)]$$

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)]$$

قانون الجيوب

$$\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c}$$

قانون جيبس المماس

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$



المثلثات المثلثية للاساسية

مطابقات المقابلة

$$\csc \theta = \frac{1}{\sin \theta} \quad \sec \theta = \frac{1}{\cos \theta} \quad \cot \theta = \frac{1}{\tan \theta}$$

المطابقات نسبة

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \quad \cot \theta = \frac{\cos \theta}{\sin \theta}$$

مطابقات التمام

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \quad 1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$$

$$1 + \cot^2 \theta = \csc^2 \theta$$

مطابقات الزوايا المتتامتين

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cos \theta \quad \tan\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cot \theta$$

$$\sec\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \csc \theta \quad \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \sin \theta$$

$$\cot\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \tan \theta \quad \csc\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \sec \theta$$

مطابقات الزوايا العكسية

$$\sin(-\theta) = -\sin \theta \quad \cos(-\theta) = \cos \theta$$

$$\tan(-\theta) = -\tan \theta$$

المعادلات المثلثية للمضاعفة الزاوية

$$\sin \frac{\theta}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \theta}{2}}$$

$$\cos \frac{\theta}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \theta}{2}}$$

$$\tan \frac{\theta}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \theta}{1 + \cos \theta}}$$

المعادلات لتحويل المجموع أو الفرق إلى ضرب

$$\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \cos \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right)$$

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \cos \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right)$$

$$\sin \alpha - \sin \beta = 2 \cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \sin \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right)$$

$$\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \sin \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right)$$

قيم بعض الدوال المثلثية للزوايا الخاصة

θ°	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
θ rad	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\sin \theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
$\cos \theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
$\tan \theta$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	-	0	-	0

قواعد التفاضل

القواعد الأساسية

$$\frac{d}{dx}(c) = 0$$

$$\frac{d}{dx}(cf(x)) = cf'(x)$$

$$\frac{d}{dx}(f(x) + g(x)) = f'(x) + g'(x)$$

$$\frac{d}{dx}(f(x) - g(x)) = f'(x) - g'(x)$$

$$\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$$

$$\frac{d}{dx}(f(x)g(x)) = f(x)g'(x) + g(x)f'(x)$$

$$\frac{d}{dx}f(g(x)) = f'(g(x))g'(x)$$

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right) = \frac{g(x)f'(x) - f(x)g'(x)}{(g(x))^2}$$

مشاكل التفاضل الأسية واللوغاريتمية

$$\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$$

$$\frac{d}{dx} \ln |x| = \frac{1}{x}$$

$$\frac{d}{dx}(b^x) = b^x \ln b$$

$$\frac{d}{dx}(\log_b x) = \frac{1}{x \ln b}$$

مشاكل التفاضل المثلثية

$$\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$$

$$\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$$

$$\frac{d}{dx}(\tan x) = \sec^2 x$$

$$\frac{d}{dx}(\sec x) = \sec x \tan x$$

$$\frac{d}{dx}(\csc x) = -\csc x \cot x$$

$$\frac{d}{dx}(\cot x) = -\csc^2 x$$

العلاقات الأسية واللوغاريتمية

العلاقة بين الصورة الأسية والصورة اللوغاريتمية

إذا كان $x > 0$ و $b > 0, b \neq 1$ فإن:



العلاقات الأساسية للوغاريتمات

إذا كان $x > 0$ و $b > 0, b \neq 1$ فإن:

- $\log_b 1 = 0$ $b^0 = 1$
- $\log_b b = 1$ $b^1 = b$
- $\log_b b^x = x$ $b^x = b^x$
- $b^{\log_b x} = x, x > 0$ $\log_b x = \log_b x$

قوانين اللوغاريتمات

إذا كانت b, x, y أعداداً حقيقية موجبة، و p عدداً حقيقياً، حيث $b \neq 1$ فإن:

- **قانون الجمع:** $\log_b xy = \log_b x + \log_b y$
- **قانون القسمة:** $\log_b \frac{x}{y} = \log_b x - \log_b y$
- **قانون القوة:** $\log_b x^p = p \log_b x$

رموز وأبجدة

arg	سعة الزاوية الترفيق	\overline{AB}	التقسيم المثلثي للقطوع A و B
Arg	سعة الزاوية العدد الترفيق	\overline{AB}	القطعة المستقيمة التي تقع بين A و B
ID	تحويل لورينزي	\overline{AB}	القطوع التي تقع على دائرة A وعلى القطعة B
m	قياس	AB	طول القطعة المستقيمة AB
km	كيلومتر	\overline{AB}	سعة الزاوية بين A و B عند نقطة B
cm	سنتيمتر	\vec{v}	المتجه v
kg	كيلوجرام	$ \vec{v} $	بطول المتجه v
g	جرام	$\angle A$	الزاوية A
s	ثانية	$\angle ABC$	الزاوية عند A بين AB و BC
min	دقيقة	$m\angle A$	قياس الزاوية A
h	ساعة	$\triangle ABC$	المثلث ABC
ln	لتر	\parallel	متوازي
l	لتر	\perp	عمودي على
$\binom{n}{r}$	توزيع n من شخصين إلى r فئات	$a:b$	نسبة a إلى b
C_n^r		\int	تكامل غير محدد
$P(A)$	احتمال الحدوث A	\int_a^b	تكامل محدد
$P(\bar{A})$	احتمال كونه الحدوث A	$f(x)$	دالة $f(x)$
μ	الوسط الحسابي		
σ	التباين المعياري		
σ^2	التباين		