




التعلم المبني على المفاهيم والنتائج الأساسية

الرياضيات

الصف الحادي عشر

للفروع: العلمي، والأدبي، والصناعي، والفندقي والسياحي



الناشر
وزارة التربية والتعليم
إدارة المناهج والكتب المدرسية

الحقوق جميعها محفوظة لوزارة التربية والتعليم
الأردن – عمان/ ص.ب (1930)

أشرف على تأليف هذه المادة التعليمية كل من:

د. نواف العقيل العجارمة/ الأمين العام للشؤون التعليمية
د. نجوى ضيف الله القبيلات/ الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية
د. محمد سلمان كنانة/ مدير إدارة المناهج والكتب المدرسية
د. أسامة كامل جرادات/ مدير المناهج
د. زايد حسن عكور/ مدير الكتب المدرسية
نقّين أحمد جوهر/ عضو مناهج الرياضيات

المتابعة والتنسيق: د. زبيدة حسن أبوشويمة/ ر.ق المباحث المهنية

لجنة التأليف:

د. سميرة حسن أحمد
تهاني عبد الرحمن العملة
لينا فتحي الجمل

التحرير العلمي: نقّين أحمد جوهر	التحرير اللغوي: ميسرة عبد الحليم صويص
التحرير الفني: نداء فؤاد أبو شنب	التصميم: عمر ابو عليان
الرسوم: بلال نوري ديرانيه	الإنشاج: سليمان أحمد الخاليلة

دقق الطباعة: د. سميرة حسن أحمد
راجع الطباعة: نقّين أحمد جوهر

قائمة المحتويات

الصفحة	الموضوع	المجال / المحور
4		المقدمة
7	أولاً: أوتار الدائرة وأقطارها ومماساتها.	المجال: الهندسة والقياس المحور: الدائرة
12	ثانياً: الزوايا في الدائرة.	
15	ثالثاً: معادلة الدائرة.	
22	أولاً: النسب المثلثية.	المجال: الهندسة والقياس المحور: حساب المثلثات
27	ثانياً: النسب المثلثية للزوايا، ضمن الدورة الواحدة.	
34	أولاً: اقترانات كثيرات الحدود.	المجال: الأنماط والجبر والاقترانات المحور: الاقترانات
39	ثانياً: قسمة كثيرات الحدود والاقترانات النسبية.	
42	ثالثاً: تركيب الاقترانات.	
44	رابعاً: الاقتران العكسي.	
50	أولاً: مقاييس التشتت لجدول تكراري ذي فئات.	المجال: معالجة البيانات والاحتمال المحور: تحليل البيانات

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد، فانطلاقاً من رؤية وزارة التربية والتعليم إلى تحقيق التعليم النوعي المتميّز على نحوٍ يلائم حاجات الطلبة، وإعداد جيل من المتعلمين على قدر من الكفاية في المهارات الأساسية اللازمة للتكيف مع متطلبات الحياة وتحدياتها، مزوّدِين بمعارف ومهارات وقيم تساعد على بناء شخصياتهم بصورة متوازنة.

يُبنى هذا المحتوى التعليمي على المفاهيم والنتاجات الأساسية لمبحث الرياضيات للصف الحادي عشر للفروع: العلمي، والأدبي، والصناعي، والفندقي والسياحي الذي يشكّل أساس الكفاءة العلميّة لدى الطلبة، ويركّز على المفاهيم التي لا بدّ منها لتمكين الطلبة من الانتقال إلى المرحلة اللاحقة انتقالاً سلساً من غير وجود فجوة في التعلّم؛ لذا حرصنا على بناء المفهوم بصورة مختزلة ومكثّفة ورشيقة بعيداً عن التوسّع الأفقيّ والسرد وحشد المعارف؛ إذ عُنِيَ بالتركيز على المهارات، وإبراز دور الطالب في عملية التعلّم، بتفعيل إستراتيجية التعلّم الذاتي، وإشراك الأهل في عملية تعلّم أبنائهم.

وقد اشتمل هذا المحتوى التعليمي على أربعة موضوعات رئيسية، يتضمّن كلّ منها المفاهيم الأساسيّة لتعلّم مهارات الرياضيات ومحاورها، بأسلوبٍ شائقٍ ومركّز.

لذا؛ بني هذا المحتوى على تحقيق النتاجات العامة الآتية:

- توظيف نظريات خاصة بالعلاقات بين أوتار الدائرة، وأقطارها، ومماسّاتها، والزوايا فيها لإيجاد وقياسات زوايا وأطوالٍ مجهولةٍ في الدائرة.
- إيجاد النسب المثلثية الأساسية (الجيب، جيب التمام، الظل) لزوايا معطاة ضمن الدورة الواحدة والعكس.
- التعرف إلى الاقترانات (كثيرات الحدود، والنسبي، والجزر التربيعي) وتحديد مجال ومدى كل منها وتمثيلها البياني.
- إيجاد مقاييس التشتت: (المدى، والانحراف المعياري، والتباين) لبيانات منظمة في جدول تكراري ذي فئات.

والله ولي التوفيق

المجال: الهندسة والقياس

المحور: الدائرة



معادلة الدائرة

- أجد مركز الدائرة وطول نصف قطرها؛ إذا علمت معادلتها بصورتها القياسية أو العامة.
- أكتب معادلة الدائرة؛ إذا أُعطيت معلومات كافية.



الزوايا في الدائرة

- أتعرف العلاقات بين الزوايا في الدائرة.
- أوظف هذه العلاقات في إيجاد قياسات زوايا وأطوال مجهولة في الدائرة.



أوتار الدائرة وأقطارها ومماساتها

- أتعرف العلاقات بين أوتار الدائرة وأقطارها ومماساتها.
- أوظف هذه العلاقات في إيجاد أطوال مجهولة في الدائرة.


دائرتان مشتركتان بالمركز، معادلتاهما:

$$(x - 6)^2 + (y - 8)^2 = 9$$

و


$$x^2 + y^2 + 12x + 2 = 0$$

كما في الشكل:




هل يمكنني حساب عرض الممر الناتج بينهما؟


هل توجد علاقة بين قياسي الزاويتين AOC، ABC في الدائرة O المرسومة في الشكل الآتي؟



قناة مائية مقطوعها العرضي على شكل نصف دائرة، طول قطرها 6m وعرض سطح الماء فيها 4.6m. أجد عمق الماء في القناة.



أَتَذَكَّرُ



أَوَّلًا: نظرية فيثاغورس:

إذا كان ABC مثلثًا قائم الزاوية في B ؛ فإن:

$$(AB)^2 + (BC)^2 = (AC)^2$$

مثال: ABC مثلث قائم الزاوية في B فيه $BC=3\text{cm}$, $AB=8\text{cm}$ أجد AB .

الحل

$$(AB)^2 + (3)^2 = (8)^2$$

تعويض في نظرية فيثاغورس:

$$(AB)^2 + 9 = 64$$

تبسيط:

$$(AB)^2 = 64 - 9 = 55$$

طرح 9 من طرفي المعادلة:

$$AB = \sqrt{55} \approx 7.4 \text{ cm}$$

أخذ الجذر التربيعي لطرفي المعادلة:

$$AB = 7.4 \text{ cm}$$

أهمل الإشارة السالبة لأن الطول موجب

ثانيًا: المسافة بين نقطتين:

المسافة d بين النقطتين $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ هي:

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

مثال: المسافة بين النقطتين $(2, 5)$, $(3, 7)$ هي:

$$d = \sqrt{(3-2)^2 + (7-5)^2}$$

تعويض $(x_2, y_2) = (3, 7)$

و $(x_1, y_1) = (2, 5)$

$$= \sqrt{1^2 + 2^2}$$

تبسيط:

$$= \sqrt{1+4} = \sqrt{5} \approx 2.2$$

تبسيط:

أختبر نفسي

(1) المثلث ABC قائم الزاوية

في B , $AB = 4\text{cm}$

$BC=3\text{cm}$ أجد AC

(2) المثلث ABC قائم الزاوية في B .

$AB=10\text{cm}$, $AC=20\text{cm}$

أجد BC .

(3) أحسب المسافة بين النقطتين

لكل مما يأتي:

- $(-1,6)$, $(-5,3)$
- $(-1,-2)$, $(-3,6)$
- $(0.75, 6)$, $(2, 0.5)$

أوتار الدائرة وأقطارها ومماساتها

الساعة




أرادتُ حينئذٍ صنعَ ساعةٍ حائطٍ دائريّةٍ؛ فأحضرتُ قطعةَ خشبٍ دائريّةً وعقاربَ ومحركًا للعقاربِ، ثمّ درّجتُ القطعةَ الخشبيّةَ وأرادتُ تثبيّتَ العقاربِ في مركزِ الدائرة. أَسَاعِدُ حينئذٍ على تحديدِ مركزِ الدائرة؛ لثُبُتِ العقاربِ عندهُ.

ماذا سأتعلّم؟

- العلاقاتُ التي تربطُ بينَ أوتارِ الدائرة وأقطارِها ومماساتها.


مفاهيمُ خاصّةٌ بالدائرة:



مثال (1)


يُمثل الشكل المجاور دائرة مركزها O أَسْمِي:

- (1) وترًا. (2) قطرًا. (3) نصف قطرٍ.
- (4) قاطعًا. (5) مماسًا. (6) نقطة التماس.



الحل

- (1) $\overline{AB}$ وتر؛ لأنه قطعة مستقيمة تصل بين نقطتين على الدائرة.
- (2) $\overline{CD}$ قطر؛ لأنه وتر يمر في مركز الدائرة.
- (3) $\overline{OB}$ نصف قطر؛ لأنه قطعة مستقيمة تصل بين المركز ونقطة على الدائرة.
- (4) $\overleftrightarrow{EC}$ قاطع؛ لأنه
- (5) $\overleftrightarrow{EF}$ مماس؛ لأنه:
- (6) F نقطة التماس؛ لأنها




أحاول

يُبين الشكل المجاور دائرة مركزها O، أَسْمِي:

- (1) قاطعًا للدائرة. (2) وترًا للدائرة. (3) مماسًا للدائرة.

نظريات تُبين علاقات بين أوتار الدائرة، ونصف قطرها، والعمود على الوتر، وطول الوتر.

• العمود المنصف للوتر يمر بالمركز.



مثال بالرموز:


إذا كان $\overline{BF} \perp \overline{CD}$ و $CF = FD$ ؛ فإن $\overline{BF}$ يمر بالمركز.

• العمود المار بالمركز ينصف الوتر.

مثال بالرموز:

إذا كان $\overline{BF} \perp \overline{CD}$ و $\overline{BF}$ يمر بالمركز؛ فإن: $CF = FD$

• الوتران المتطابقان في الدائرة، يبعدان بنفسه عن مركزها.



مثال بالرموز:

إذا كان $AB = CD$ فإن: $OE = OF$


• الوتران اللذان يبعدان بنفسه عن المركز متطابقان.

مثال بالرموز:

إذا كان $OE = OF$ فإن: $AB = CD$

مثال (2)

في الشكل المجاور، دائرة مركزها O وطول نصف قطرها 10cm،
 $ON = 9\text{cm} = OM$ أجد طول الوترين $\overline{AB}$ ، $\overline{CD}$.



الحل

المثلث AMO قائم الزاوية في M، إذن:


نظرية فيثاغورس:

تعويض $AO=10$ ، $OM=9$

تبسيط:

تبسيط:

أخذ الجذر التربيعي لطرفي المعادلة:



$$(AO)^2 = (OM)^2 + (AM)^2$$

$$(10)^2 = (9)^2 + (AM)^2$$

$$100 = 81 + (AM)^2$$

$$(AM)^2 = 100 - 81 = 19$$

$$AM = \sqrt{19} \approx 4.4$$


$$AB = 2 AM$$

$$= 2 \times \sqrt{19} \approx 8.8 \text{ cm}$$

$$CD = AB = 2\sqrt{19} = 8.8 \text{ cm}$$

$\overline{OM}$ عمود على الوتر ويمر بالمركز. إذن: يُنصف الوتر:

وتران يبعدان البعد نفسه عن المركز؛ فهما متساويان:



أحاول


في الشكل المجاور، دائرة مركزها O و $\overline{AB}$ ، $\overline{CD}$ وتران للدائرة

M منتصف $\overline{AB}$ و N منتصف $\overline{CD}$ ، $ON = OM = 6\text{cm}$ ، $AB = 16 \text{ cm}$

فأجد $\overline{OB}$ ، $\overline{CD}$.


نظريات المماس ونصف القطر

- المماسان المرسومان للدائرة من نقطة خارجها متساويان.




بالرموز: $AC = AB$

- مماس الدائرة عمودي على نصف القطر المرسوم من نقطة التماس.



بالرموز: $\overline{OC} \perp \overline{FD}$

مثال (3)



بناءً على الشكل المجاور الذي فيه دائرة مركزها O ومماسان للدائرة من النقطة A؛ أجد AB ، AO .

الحل

المثلث ACO قائم الزاوية في C لأن $\overline{OC} \perp \overline{AC}$ (نظرية نصف القطر المماس).

نظرية فيثاغورس:

$$(AO)^2 = (AC)^2 + (OC)^2$$

$$(AO)^2 = (12)^2 + (7)^2$$

تعويض $AC=12$ ، $OC=7$

$$(AO)^2 = 144 + 49$$

بالتربيع والجمع:

$$= 193$$

$$AO = \sqrt{193} \approx 13.9 \text{ cm}$$


الجزر التربيعي:

$$AB = AC = \sqrt{193}$$

المماسان للدائرة من نقطة خارجها متساويان:

$$\approx \text{cm } 13.9$$





أحاول




بناءً على الشكل المجاور الذي فيه دائرة مركزها O ، ونصف قطرها 5cm ، $\overline{AB}$ ، $\overline{AC}$ مماسان للدائرة من نقطة خارجها، $AO = 14 \text{ cm}$. أجد AC .


أختبرُ تعلّمي

(1) لكلِّ فقرةٍ ممّا يأتي 4 إجاباتٍ واحدةٍ منها صحيحةٌ. أختارُ الإجابةَ الصحيحةَ لكلِّ فقرةٍ:

(1)	(2)	(3)	(4)
 O مركزُ الدائرة، $\overline{OM} \perp \overline{AB}$ $AB=8\text{cm}$, $OM=3\text{cm}$ طولُ نصفِ قطرِ الدائرة بالسنتيمتراتِ يُساوي	 M منتصفُ $\overline{AB}$، N منتصفُ $\overline{CD}$ $m\angle BED = 60^\circ$ $m\angle MON = \dots$	 $AM = \dots\dots\dots$	 $m\angle OBC = 29^\circ$ $m\angle ABC = \dots$
a) $\sqrt{73}$ b) $\sqrt{55}$ c) 5 c) 10	a) 60° b) 90° c) 120° d) 30°	a) 15cm b) 25cm c) 20cm d) 10cm	a) 29° b) 58° c) 61° d) 90°



(2) يُبيّنُ الشكلُ المجاورُ دائرتينِ مشتركتينِ في المركزِ، طولُ نصفِ قطرِ الدائرةِ الكبرى 20cm و $\overline{AB}$ وترٌّ للدائرةِ الكبرى ومماسٌّ للدائرةِ الصغرى، $AB=30\text{cm}$. أجدُ المسافةَ بينَ الدائرتينِ.




(3) يُبيّنُ الشكلُ المجاورُ نافذةً مصمّمةً على شكلِ قوسِ دائرةٍ، طولُ قطرها 4m، فإذا كان ارتفاعُ قوسِ النافذةِ فوقَ منتصفِ قاعدتها يُساوي 1m؛ فأجدُ عرضَ قاعدةِ النافذةِ AB.

الزوايا في الدائرة

ماذا سأتعلم؟

- الزاوية المركزية.
- الزاوية المحيطية.
- الزاوية المماسية.

طائرة






تسلك طائرة مساراً دائرياً مركزه O، ونصف قطره 50km أطلق ضوء كشف من الطائرة وهي في الموقع A نحو الموقع B، الذي يبعد عن الرادار الموجود في مركز الدائرة O، مسافة 90km ما بعد الموقع B عن الطائرة عند تلك اللحظة؟

أنواع الزوايا في الدائرة

الزاوية المماسية	الزاوية المحيطية	الزاوية المركزية
الزاوية المحصورة بين المماس والوتر المرسوم من نقطة التماس.	الزاوية التي يكون رأسها على الدائرة، وضلعاها وتران في الدائرة.	الزاوية التي يقع رأسها على مركز الدائرة، وضلعاها نصف قطرین فيها.
مثال $\angle ABC$ زاوية مماسية.	مثال $\angle ABC$ زاوية محيطية.	مثال $\angle AOB$ زاوية مركزية.

العلاقات بين الزوايا في الدائرة

الزوايا المحيطية و الزوايا المماسية و الزوايا المحيطية	الزوايا المحيطية	الزوايا المركزية و الزوايا المحيطية
قياس الزوايا المماسية يساوي قياس الزوايا المحيطية المشتركة معها بالقوس.	قياسات الزوايا المحيطية المرسومة على قوس واحد جميعها متساوية.	قياس الزوايا المركزية يساوي ضعف قياس الزوايا المحيطية المرسومة على القوس نفسه.
 مثال: $m\angle ABC = m\angle BDC$	 مثال: $m\angle ADC = m\angle ABC$ $= m\angle AEC = m\angle AFC$	 مثال: $m\angle AOB = 2m\angle ACB$

مثال (1)

بناءً على الشكل المجاور، الذي فيه دائرة مركزها O، مماس $\overline{AB}$ ،
 $m\angle OCA = 35^\circ$. أجد قياس كل مما يأتي:

- (1) $m\angle COA$ (2) $m\angle ADC$ (3) $m\angle BAC$

الحل

مجموع قياسات زوايا المثلث 180° :

قياسات زوايا القاعدة في المثلث المتطابق الضلعين متساوية:

تبسيط:

ب طرح 70° من طرفي المعادلة:

$$(1) m\angle COA + m\angle OAC + m\angle OCA = 180^\circ$$

$$m\angle COA + 35^\circ + 35^\circ = 180^\circ$$

$$m\angle COA + 70^\circ = 180^\circ$$

$$m\angle COA = 180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$$

$$(2) m\angle ADC = \frac{1}{2} \times m\angle AOC$$

$$m\angle ADC = \frac{1}{2} \times 110^\circ = 55^\circ$$

$$m\angle AOC = 110^\circ$$

$$(3) m\angle BAC = m\angle ADC = 55^\circ$$

زاوية مماسية ومحيطية مشتركتان بالقوس نفسه:





أحاول

بناءً على الشكل المجاور، الذي فيه دائرة مركزها O، مماس $\overline{AB}$ ،
 $m\angle AOC = 130^\circ$. أجد قياس كل مما يأتي:

- (1) $m\angle ADC$ (2) $m\angle BAC$

أختبرُ تعلُّمي

أختارُ منَ العمودِ B قيمةَ x في كلِّ منَ الدوائرِ في العمودِ A؛ وأبرِّرُ إجابتي؛ علماً بأنَّ O هي مركزُ الدائرة.

(A)	(B)
	73° 31°
	39° 59
	17° 62° 64°
	8 26°

معادلة الدائرة



أبراج

صُمِّمَ برجُ هاتفٍ خلويٍّ خاصٍّ؛
لخدمة دائرة طول نصف قطرها
19km يقع البرج عند النقطة (5, -3)
على مستوى إحداثيات تُمثِّلُ وحداتها
بالكيلومترات. هل مستعمل الهاتف
الخلوي عند النقطة (8,0) ضمن نطاق
الخدمة؟

ماذا سأتعلَّم؟

الصورة القياسية
لمعادلة الدائرة.
- الصورة العامة
لمعادلة الدائرة.

الدائرة: النقاط جميعها التي تبعد بُعدًا ثابتًا عن مركزها، ويُمكنني كتابة معادلة الدائرة بصورتَيْها القياسية والعامة.

الصورة العامة

بفكّ التربيع في الصورة القياسية؛ نحصل على معادلة الدائرة:

$$x^2 + y^2 + 2fx + 2gy + c = 0$$

وإحداثيًا نقطة مركزها $(-f, -g) = (a, b)$

(سالب نصف معامل y ، سالب نصف معامل x) $(-f, -g)$

وطول نصف قطرها: $r = \sqrt{a^2 + b^2 - c}$

حيث $a^2 + b^2 - c > 0$

مثال: الدائرة $x^2 + y^2 + 8x - 6y + 2 = 0$

إحداثيًا نقطة مركزها:

$$\left(-\frac{8}{2}, -\frac{-6}{2}\right) = (-4, 3)$$

طول نصف قطرها:

$$r = \sqrt{(-4)^2 + 3^2 - 2} = \sqrt{23} \approx 4.8$$

إنّ: طول نصف قطرها 4.8 وحدات طول.

الصورة القياسية

معادلة الدائرة التي إحداثيًا نقطة مركزها (a, b) ، وطول نصف قطرها r هي:

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$$

مثال: الدائرة

$$(x - 3)^2 + (y + 4)^2 = 16$$

إحداثيًا مركزها $(3, -4)$ ،

"لماذا $b = -4$ ؟"

وطول نصف قطرها $r = \sqrt{16} = 4$

إنّ: طول نصف قطرها 4 وحدات طول.

مثال (1)

أُمِيزُ معادلةَ الدائرة في كلِّ ممَّا يأتي، وأجدُ إحداثيَّ نقطةِ المركزِ وطولَ نصفِ القطرِ للمعادلةِ التي تُمثِّل دائرةً.

$$(1) 2x^2 + y^2 + 8x + 6y + 1 = 0$$

$$(2) x^2 + y^2 + 4x + 6y + 20 = 0$$

$$(3) 2x^2 + 2y^2 + 8x + 12y - 12 = 0$$

الحل

ليست معادلة دائرة؛ لأنَّ معاملي x^2 ، y^2 ليسا متساويين:

$$(1) 2x^2 + y^2 + 8x + 6y + 1 = 0$$

معاملا x^2 ، y^2 متساويان؛ فأتحقَّق من شرط ما تحت الجذر:

$$(2) x^2 + y^2 + 4x + 6y + 20 = 0$$

$$a = \frac{-4}{2} = -2, b = \frac{-6}{2} = -3, c = 20$$

$$a^2 + b^2 - c = (-2)^2 + (-3)^2 - 20 = -7$$

ليست معادلة دائرة لأنَّ $a^2 + b^2 - c < 0$

معاملا x^2 ، y^2 لا يساويان 1، لكنَّهما متساويان:

$$(3) 2x^2 + 2y^2 + 8x + 12y - 12 = 0$$

بالقسمة على 2 (معامل x^2 ، y^2):

$$x^2 + y^2 + 4x + 6y - 6 = 0$$

$$a = \frac{-4}{2} = -2, b = \frac{-6}{2} = -3, c = -6$$

$$a^2 + b^2 - c = (-2)^2 + (-3)^2 + 6$$

$$= 19$$

إذن: معادلة دائرة لأنَّ $a^2 + b^2 - c > 0$

ويكون إحداثيَّ نقطةِ مركزِ الدائرة $(a, b) = (-2, -3)$

وطول نصفِ القطر $\sqrt{19}$ وحدة طولٍ

أحاول

أجدُ إحداثيَّ نقطةِ المركزِ وطولَ نصفِ قطرِ الدائرة التي معادلتها $x^2 + y^2 + 4x - 14y + 17 = 0$

حالاتٌ يمكنني إيجاد معادلةِ الدائرة فيها

2

معلوميةُ مركزِ الدائرة (a, b) ونقطةٍ عليَّها.

1

معلوميةُ إحداثيَّ نقطةِ مركزِ الدائرة (a, b) وطول نصفِ قطرها r أو طولِ قطرها d ،
 $(r = \frac{1}{2} d)$.

مثال (2)

أجد معادلة الدائرة في الحالات الآتية:

(1) مركزها (1, 2) وطول نصف قطرها 10 وحدات.

(2) مركزها (1, 5) وتمرُّ بالنقطة (2, 4).

الحل

(1) مركزها (1, 2) وطول نصف قطرها 10 وحدات.

معادلة الدائرة:

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$$

$$(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = (10)^2$$

$$(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 100$$

المركز $(a, b) = (1, 2)$ فأعوّض $a = 1$, $b = 2$ و $r = 10$

تبسيط:

(2) مركزها (1, 5) وتمرُّ بالنقطة (2, 4).

طول نصف القطر r هو المسافة بين مركز الدائرة وأي نقطة عليها:

تعويض، $(x_2, y_2) = (2, 4)$, $(x_1, y_1) = (1, 5)$

تبسيط:

$$r = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$= \sqrt{(2 - 1)^2 + (4 - 5)^2}$$

$$= \sqrt{1 + 1} = \sqrt{2}$$

معادلة الدائرة:

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$$

$$(x - 1)^2 + (y - 5)^2 = (\sqrt{2})^2$$

$$(x - 1)^2 + (y - 5)^2 = 2$$

أحاول

أجد معادلة الدائرة في الحالات الآتية:

(1) مركزها (-1, 3) وطول قطرها 12 وحدة.

(2) مركزها (-3, 2) وتمرُّ بالنقطة (1, 1).

أختبرُ تعلُّمي




(1) أجدُ إحداثيَّ نقطة المركز، وطول نصف القطر لكلِّ دائرة في ما يأتي:

a) $(x + 5)^2 + (y - 2.25)^2 = 17$

b) $x^2 + y^2 + 6x - 20y - 1 = 0$

c) $5x^2 + 5y^2 + 100x + 60y + 20 = 0$

(2) أجدُ معادلةَ الدائرة؛ بناءً على الرسم في كلِّ حالةٍ ممَّا يأتي:



(3) ليكن $x^2 + y^2 - 6x + 4y = d$ معادلة دائرة. أجدُ كلاً ممَّا يأتي:

(1) إحداثيَّ نقطة مركز الدائرة.

(2) قيمة الثابت d علماً بأنَّ طول نصف قطر الدائرة 6 وحدات طول.

(4) أوجدتُ فاطمة إحداثيَّ نقطة المركز وطول نصف القطر للدائرة: $2x^2 + 2y^2 + 4x + 6y = 0$ ؛ فكانتُ

إجابتها: "أقسم المعادلة على العدد 2 لتصبح $x^2 + y^2 + 2x + 3y = 0$ إذن: إحداثيَّ مركز الدائرة $(-2, -3)$ ".


ما الخطأ الذي وقعت به فاطمة؟

التقويم الختامي


نشاط




الشبكة الآتية تضم أسئلة متنوعة بإجابات محيطة بكل سؤال. كل سؤال له إجابة صحيحة واحدة تنقلني إلى السؤال التالي. أتبع الإجابات الصحيحة للخروج من الشبكة:



138°



$x = -6$




42°

32°


$x = 6$

$x = -3, 2$


$x = 3, 2$



80°



59°



$O(1, -2)$

$r = \sqrt{3}$

$$(2x-2)^2 + (2y+4)^2 = 12$$

إحداثيات نقطة مركز
الدائرة وطول نصف
قطرها:

145°

المجال: الهندسة والقياس

المحور: حساب المثلثات




النسب المثلثية للزوايا ضمن الدورة الواحدة

- أجد النسب المثلثية الأساسية للزوايا ضمن الدورة الواحدة.
- أجد الزاوية إذا علمت إحدى نسبها المثلثية؛ باستعمال الزوايا المشهورة أو الآلة الحاسبة.


النسب المثلثية

- أتعرف الوضع القياسي للزاوية.
- أجد النسب المثلثية الأساسية، لزاوية في وضعها القياسي علمت إحداثيي ضلع انتهائها.

أجد إحداثيي نقطة تقاطع ضلع انتهاء الزاوية 240° في الوضع القياسي مع دائرة الوحدة.




أراد فارسُ الرسم على قرصٍ مدمج؛ فنبَّهه على ورقة رسمٍ بيانيٍّ رُسمَ عليها المستوى الإحداثي؛ بحيثُ جعلَ نصفَ قطرِ القرصِ وحدةً واحدةً، وجعلَ مركزه نقطة الأصل. أساعدُ فارساً في رسمِ الزوايا؛ لتقسيمِ القرصِ، وأعيِّنُ إحداثياتِ النقاطِ المشتركة بينَ القرصِ والزاوية المرسومة.



أَتَذَكَّرُ

النسب المثلثية الأساسية للزوايا الحادة، وعلاقتها بأضلاع المثلث القائم.



$$\cos \theta = \frac{\text{المجاور}}{\text{الوتر}}$$


$$\sin \theta = \frac{\text{المقابل}}{\text{الوتر}}$$

$$\tan \theta = \frac{\text{المقابل}}{\text{المجاور}}$$

مثال

أجد قيمة x في كل من المثلثات القائمة الآتية:

1)



$$x^2 = 9^2 + 7^2$$

$$x^2 = 81 + 49$$

$$x^2 = 130$$

$$x = \pm \sqrt{130}$$

أهمل الإشارة السالبة؛ لأن x يمثل طولاً.

$$x = \sqrt{130} \text{ cm}$$


نظرية فيثاغورس:

تبسيط:

جمع:

بأخذ الجذر للطرفين:

2)



$$\sin 30^\circ = \frac{\text{المقابل}}{\text{الوتر}}$$

$$\sin 30^\circ = \frac{x}{20}$$

$$x = 20 \sin 30^\circ$$

$$x = 20 \times 0.5$$

$$x = 10 \text{ cm}$$

قانون الجيب:


تعويض:

ضرب المعادلة بـ 20:

تعويض:

إيجاد ناتج الضرب:

3)



$$\sin x = \frac{\text{المقابل}}{\text{الوتر}}$$

$$\sin x = \frac{1}{5}$$

$$x = \sin^{-1}\left(\frac{1}{5}\right) = 11.54^\circ$$


قانون الجيب:

أعوّض:


أستعمل الآلة الحاسبة:

أختبر نفسي


أجد قيمة x المجهولة في كل مما يأتي:




1)



2)



3)




4)

النسب المثلثية

مطعم

ماذا سأتعلم؟

- الوضع القياسي للزاوية.
- دائرة الوحدة.
- ربط النسب المثلثية بدائرة الوحدة.




تناول سعيد وعائلته الطعام في مطعم أرضيته مستديرة ومتحركة بشكل دائري. تحركت الأرضية بزاوية مقدارها 120° عكس عقارب الساعة. هل يختلف مكان طاولة سعيد وعائلته؛ إذا تحركت الأرضية بزاوية مقدارها 240° مع عقارب الساعة؟

مفاهيم خاصة بالزاوية:

الزاوية		
قياس الزاوية		تعريفها
للزاوية قياس موجب وآخر سالب.		شعاعان لهما نقطة البداية نفسها، تُسمى النقطة المشتركة رأس الزاوية، وأحد الشعاعين ضلع الابتداء والشعاع الآخر ضلع الانتهاء.
القياس الموجب: عند الاتجاه عكس عقارب الساعة من ضلع الابتداء إلى ضلع الانتهاء.	القياس السالب: عند الاتجاه مع عقارب الساعة من ضلع الابتداء إلى ضلع الانتهاء.	أمثلة


الوضع القياسي للزاوية والزوايا الربعية



تكون الزاوية المرسومة على المستوى الإحداثي في الوضع القياسي؛ إذا حَقَّتْ الزاوية ثلاثة شروط، هي:

- (1) يقع رأس الزاوية عند نقطة الأصل.
- (2) ينطبق ضلع الابتداء على محور x الموجب.
- (3) يقع ضلع الانتهاء في أحد الأرباع، أو على أحد المحاور الرئيسية للمستوى الإحداثي.



أمثلة على زوايا ليست في الوضع القياسي:



الزاوية ليست في الوضع القياسي؛ لأن رأسها:


.....

أمثلة لزوايا في الوضع القياسي:




الزاوية ليست في الوضع القياسي؛ لأن ضلع

الابتداء:



إرشاد: تقع الزاوية في الربع الذي يقع فيه ضلع انتهائها، وهي مرسومة في الوضع القياسي. فمثلاً: الزاوية التي قياسها 120° تقع في الربع الثاني؛ لأن ضلع انتهائها يقع في الربع الثاني.

الزاوية الربعية: زاوية في الوضع القياسي ينطبق ضلع الانتهاء لها على أحد المحاور الرئيسة في المستوى الإحداثي.




دائرة الوحدة: دائرة على المستوى الإحداثي يقع مركزها في نقطة الأصل، ونصف قطرها وحدة واحدة.

يقطع ضلع انتهاء الزاوية θ في الوضع القياسي دائرة الوحدة في النقطة $P(x, y)$. فتكون النسب المثلثية الأساسية هي:

$$\cos \theta = \frac{\text{المجاور}}{\text{الوتر}} = \frac{x}{1} = x ,$$


$$\sin \theta = \frac{\text{المقابل}}{\text{الوتر}} = \frac{y}{1} = y ,$$

$$\tan \theta = \frac{\text{المقابل}}{\text{المجاور}} = \frac{y}{x}$$



إشارة النسب المثلثية الأساسية: يُحدّد الربع الذي تقع فيه الزاوية إشارة النسب المثلثية. وهو نفسه موقع النقطة $P(x, y)$.

بالنظر إلى تمثيل الزوايا الآتي، أستنتج إشارة كل من $\sin \theta$, $\cos \theta$, $\tan \theta$ حسب الربع الذي تقع فيه الزاوية.



4

الزاوية في الربع الرابع
النسب المثلثية الموجبة:
النسب المثلثية السالبة:

3

الزاوية في الربع الثالث
النسب المثلثية الموجبة:
النسب المثلثية السالبة:

2

الزاوية في الربع الثاني
النسب المثلثية الموجبة:
النسب المثلثية السالبة:

1

الزاوية في الربع الأول
النسب المثلثية الموجبة:
النسب المثلثية السالبة:

مثال (1)

أجد النسب المثلثية الأساسية لكل زاوية θ مما يأتي، والمرسومة في الوضع القياسي، ويقطع ضلع انتهائها دائرة الوحدة بالنقاط الآتية:

- (1) $P(0.8, 0.6)$ (2) $P(-1, 0)$ (3) $P(-\frac{1}{\sqrt{5}}, -\frac{2}{\sqrt{5}})$ (4) $P(0, -1)$

الحل

- (1) $P(0.8, 0.6)$

$$\cos \theta = x = 0.8 \quad \sin \theta = y = 0.6 \quad \tan \theta = \frac{y}{x} = \frac{0.6}{0.8} = \frac{3}{4}$$

- (2) $P(-1, 0)$

$$\cos \theta = x = -1 \quad \sin \theta = y = 0 \quad \tan \theta = \frac{y}{x} = \frac{0}{-1} = 0$$

- (3) $P(-\frac{1}{\sqrt{5}}, -\frac{2}{\sqrt{5}})$

$$\cos \theta = x = -\frac{1}{\sqrt{5}} \quad \sin \theta = y = -\frac{2}{\sqrt{5}} \quad \tan \theta = \frac{y}{x} = \frac{-\frac{2}{\sqrt{5}}}{-\frac{1}{\sqrt{5}}} = 2$$

- (4) $P(0, -1)$

$$\cos \theta = x = 0 \quad \sin \theta = y = -1$$

$\tan \theta$ غير معرفة؛ لأنه لا يمكنني القسمة على صفر

أحاول

أجد النسب المثلثية الأساسية لكل زاوية θ مما يأتي، والمرسومة في الوضع القياسي، ويقطع ضلع انتهائها دائرة الوحدة بالنقاط الآتية:

- (1) $P(-0.8, -0.6)$


- (2) $P(1, 0)$

- (3) $P(\sqrt{\frac{3}{7}}, -\sqrt{\frac{2}{7}})$

- (4) $P(0, 1)$

أنفذ النشاط للإجابة عن السؤال الآتي: هل تساعدني معرفة نسبة مثلثية واحدة والربع الذي تقع فيه الزاوية على حساب بقية النسب المثلثية الأساسية؟

نشاط



$$x^2 + \dots = \dots$$

$$\cos \theta = x, \sin \theta = y$$

$$\cos^2 \theta + \dots = \dots$$

$$\tan \theta = \frac{y}{x} = \dots$$

أطبق نظرية فيثاغورس على المثلث المجاور:

أعوض بكل مما يأتي:

فأحصل على:

وأيضاً:

مثال (2)

إذا كانت θ زاوية تقع في الربع الثالث، وكان $\tan \theta = 3$ ؛ فأجد قيمة كل من $\sin \theta$ ، $\cos \theta$.

الحل

تعويض:

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = 3$$

$$\sin \theta = 3 \cos \theta \dots (1)$$

بالضرب التبادلي:

$$\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1 \dots (2)$$

نظرية فيثاغورس:

$$\cos^2 \theta + (3 \cos \theta)^2 = 1$$

تعويض المعادلة (1) في (2).

$$\cos^2 \theta + 9 \cos^2 \theta = 1$$

تربيع $3 \cos \theta$

$$10 \cos^2 \theta = 1$$

تبسيط:

$$\cos^2 \theta = \frac{1}{10}$$

قسمة الطرفين على 10

$$\cos \theta = \pm \frac{1}{\sqrt{10}}$$

أخذ الجذر التربيعي لطرفي المعادلة فينتج حلان:

أهمّل الإشارة الموجبة؛ لأنّ ضلع انتهاء θ في الوضع القياسي في الربع الثالث،

$$\cos \theta = - \frac{1}{\sqrt{10}}$$

والنسبة $\cos$ سالبة للزاوية في الربع الثالث:

$$\sin \theta = - \frac{3}{\sqrt{10}}$$

تعويض:

أحاول

إذا كانت θ زاوية تقع في الربع الثالث، وكان $\cos \theta = 0.3$ ؛ فأجد قيمة كل من $\sin \theta$ ، $\tan \theta$.

أختبرُ تعلّمي

(1) أجد الربع الذي تقع فيه كل زاوية من الزوايا الآتية؛ إذا رُسمت في الوضع القياسي:

- (1) 43° (2) 290° (3) 110° (4) -110°

(2) أجد النسب المثلثية لكل زاوية θ من الزوايا الآتية، والمرسومة في الوضع القياسي والتي تقطع دائرة الوحدة بالنقطة:

- (1) $P \left(\frac{6}{\sqrt{45}}, \frac{3}{\sqrt{45}} \right)$ (2) $P \left(-\frac{2}{5}, \frac{\sqrt{21}}{5} \right)$

(3) أجد النسبتين المثلثيتين الأساسيتين الباقيتين في الحالات الآتية:

- 1) $\sin \theta = \frac{1}{4}$, $90^\circ < \theta < 180^\circ$ 2) $\tan \theta = -3$, $270^\circ < \theta < 360^\circ$


(4) هل يمكن لزاوية θ مرسومة في الوضع القياسي، بحيث $\sin \theta = 0.5$ و $\tan \theta = -0.58$ ، أن يكون قياسها 210° ؟ أبرّر إجابتني.

النسب المثلثية للزوايا ضمن الدورة الواحدة

ماذا سَتَعْلَمُ؟

- الزاوية المرجعية.
- معكوس النسبة المثلثية.

كرة قدم



يقذف عمرُ كرة إلى المرمى بزاوية مقدارها 130° مع المحور الأفقي الموجب، من بُعد x m، كما هو مبين في الشكل المجاور؛ فالتقطها حارس المرمى على ارتفاع 2.3 m أجد المسافة x باستعمال إحدى النسب المثلثية.

أتذكر

النسب المثلثية لزاويا خاصة

θ	$\sin \theta$	$\cos \theta$	$\tan \theta$
30°	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$
45°	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	1
60°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$

أتذكر


الربيع الأول - الربيع الثاني

$\sin \theta +$	$\sin \theta$	$\sin \theta$	$\sin \theta$
$\cos \theta$	$\cos \theta$	$\cos \theta$	$\cos \theta$
$\tan \theta$	$\tan \theta$	$\tan \theta$	$\tan \theta$
$\sin \theta$	$\sin \theta$	$\sin \theta$	$\sin \theta$
$\cos \theta$	$\cos \theta$	$\cos \theta$	$\cos \theta$
$\tan \theta$	$\tan \theta$	$\tan \theta$	$\tan \theta$


الربيع الثالث - الربيع الرابع

تسمى الزاوية الحادة المحصورة بين ضلع الانتهاء للزاوية θ والمحور x الزاوية المرجعية θ' للزاوية θ .


في الربع الثاني: $\theta' = 180^\circ - \theta$




في الربع الأول: $\theta' = \theta$



في الربع الثالث: $\theta' = \theta - 180^\circ$



في الربع الرابع: $\theta' = 360^\circ - \theta$



تُحدّد القيم العددية للنسب المثلثية للزاوية θ' ، باستعمال القيم العددية للنسب المثلثية للزاوية θ ، ويُحدّد الربع الذي تقع فيه الزاوية إشارة النسبة المثلثية للزاوية θ .

مثال (1)

أجد قيمة كل مما يأتي:

(1) $\sin 120^\circ$

(2) $\tan 330^\circ$

الحل

(1) $\sin 120^\circ$

$$\theta' = 180^\circ - \theta$$

$$\theta' = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$$

$$\begin{aligned}\sin 120^\circ &= + \sin 60^\circ \\ &= + \frac{\sqrt{3}}{2}\end{aligned}$$

120° تقع في الربع الثاني:

الزاوية المرجعية للزاوية في الربع الثاني:

$$\theta = 120^\circ \text{ تعويض}$$

120° زاوية في الربع الثاني، والنسبة $\sin$ موجبة:

60° زاوية خاصة:

(2) $\tan 330^\circ$

$$\theta' = 360^\circ - \theta$$

$$\theta' = 360^\circ - 330^\circ = 30^\circ$$

$$\begin{aligned}\tan 330^\circ &= - \tan 30^\circ \\ &= - \frac{1}{\sqrt{3}}\end{aligned}$$

330° تقع في الربع الرابع:

الزاوية المرجعية للزاوية في الربع الرابع:

$$\theta = 330^\circ \text{ تعويض}$$

330° زاوية في الربع الرابع، والنسبة $\tan$ سالبة:

30° زاوية خاصة:

أحاول

أجد قيمة كل مما يأتي:

(1) $\cos 225^\circ$

(2) $\sin 330^\circ$

يمكن أن تكون الزاوية المرجعية للزاوية θ ليست من الزوايا الخاصة. وفي هذه الحالة؛ أستخدم الآلة الحاسبة في إيجاد النسب المثلثية الأساسية، كما هو موضح في المثال الآتي.

مثال (2)

أجد قيمة كل مما يأتي:

(1) $\sin 200^\circ$

(2) $\cos 320^\circ$

الحل

(1) $\sin 200^\circ$

$$\theta' = \theta - 180^\circ$$

$$\theta' = 200^\circ - 180^\circ = 20^\circ$$

$$\sin 200^\circ = - \sin 20^\circ$$

200° تقع في الربع الثالث:

الزاوية المرجعية للزاوية في الربع الثالث:

$$\theta = 200^\circ \text{ تعويض}$$

200° زاوية في الربع الثالث، والنسبة $\sin$ سالبة:

أستعمل الآلة الحاسبة بالضغط على مفتاح Sin ثم 20، ثم مفتاح = كالاتي؛ لأحصل على النتيجة:

Sin 2 0 = 0 . 3 4 2 0 2 0 1 4 3 3 2

$$\sin 200^\circ = -\sin 20^\circ = -0.342$$

بالتقريب لـ 3 منازل عشرية:

$$(2) \cos 320^\circ$$

320° تقع في الربع الرابع:

$$\theta' = 360^\circ - \theta$$

الزاوية المرجعية لزاوية في الربع الرابع:

$$\theta' = 360^\circ - 320^\circ = 40^\circ$$

تعويض $\theta = 320^\circ$

$$\cos 320^\circ = +\cos 40^\circ$$

320° زاوية في الربع الرابع، والنسبة cos موجبة:

أستعمل الآلة الحاسبة بالضغط على مفتاح cos ثم 20، ثم مفتاح = كالاتي؛ لأحصل على النتيجة:

cos 4 0 = 0 . 7 6 6 0 4 4 4 4 3 1 1

$$\cos 320^\circ = \cos 40^\circ = 0.766$$

بالتقريب لـ 3 منازل عشرية:

أحاول

أجد قيمة كل مما يأتي:

$$(1) \sin 130^\circ$$

$$(2) \cos 200^\circ$$

$$(3) \tan 315^\circ$$

يمكنني إيجاد الزاوية؛ إذا علمت إحدى النسب المثلثية باستعمال الآلة الحاسبة.

مثال (3)

أجد قيم θ التي تجعل $\sin \theta = -0.65$ حيث $0^\circ \leq \theta \leq 360^\circ$

الحل

$$\sin \theta = -0.65$$

θ تقع في الربع الثالث أو الرابع:

الإشارة تُحدّد الربع.

القيمة العددية تُحدّد الزاوية.

إيجاد الزاوية المرجعية؛ باستعمال معكوس النسبة المثلثية:

استعمال الآلة الحاسبة كما يأتي:

$$\theta' = \sin^{-1}(0.65)$$

shift Sin 0 . 6 5 = 4 0 . 5 4 1 6 0 1 8 7

$$\theta' = \sin^{-1}(0.65) = 40.5^\circ$$

التقريب إلى منزلة عشرية واحدة:

$$\theta' = \theta - 180^\circ \Rightarrow \theta = \theta' + 180^\circ$$

في الربع الثالث:

$$\theta = 40.5^\circ + 180^\circ = 220.5^\circ$$

تعويض $\theta' = 40.5^\circ$

$$\theta' = 360^\circ - \theta \Rightarrow \theta = 360^\circ - \theta'$$

في الربع الرابع:

$$\theta = 360^\circ - 40.5^\circ = 319.5^\circ$$

تعويض الزاوية المرجعية θ' :

أحاول

أجد قيمة θ التي تجعل $\cos \theta = -0.41$ حيث $0^\circ \leq \theta \leq 360^\circ$

أختبرُ تعلُّمي

(1) أجد قيمة كلٍّ مما يأتي:

(1) $\sin 135^\circ$

(2) $\cos 240^\circ$

(3) $\cos 300^\circ$

(4) $\tan 90^\circ$

(5) $\sin 42^\circ$

(6) $\tan 318^\circ$

(2) أجد قيمة الزاوية θ مقربةً إلى منزلةٍ عشريَّةٍ في كلٍّ مما يأتي، علمًا بأنَّ $0^\circ \leq \theta \leq 360^\circ$

(1) $\cos \theta = 0.32$

(2) $\sin \theta = -1$

(3) $\tan \theta = \sqrt{3}$

(3) تقولُ عبيرُ إنَّ قيمةَ الزاويةِ θ الوحيدةَ التي تجعلُ $\tan \theta = \frac{1}{\sqrt{3}}$ هي 30° ؛ فهل هي على صوابٍ؟
أبررُ إجابتي.

(4) أجد قيمة: $\cos^2 1^\circ + \cos^2 2^\circ + \cos^2 3^\circ + \dots + \cos^2 177^\circ + \cos^2 178^\circ + \cos^2 179^\circ$

خطوات النشاط:

- (1) أرسم المستوى الإحداثي على ورق الرسم البياني.
- (2) أرسم الزاوية 110° على المستوى الإحداثي في الوضع القياسي باستخدام المنتقلة.
- (3) أرسم دائرة الوحدة (وهي دائرة نصف قطرها وحدة واحدة، ومركزها نقطة الأصل).
- (4) أجد قيمة تقريبية لإحداثيي نقطة تقاطع ضلع الانتهاء للزاوية، في الوضع القياسي مع دائرة الوحدة.
- (5) عن طريق الرسم؛ أجد قيمة تقريبية لكل مما يأتي:
 $\sin 110^\circ$, $\cos 110^\circ$, $\tan 110^\circ$
- (6) أجد الزاوية المرجعية للزاوية 110° .
- (7) أستعمل الآلة الحاسبة لإيجاد النسب المثلثية الأساسية للزاوية المرجعية.
- (8) أقارن نتائج الخطوتين 5 و 7
- (9) أجد قيمة $\sin 250^\circ$ و $\cos 250^\circ$ و $\tan 250^\circ$.
- (10) أجد قيم θ الممكنة جميعها إلى أقرب درجة، التي تجعل $\cos \theta = 0.34$ ، حيث $0^\circ \leq \theta \leq 360^\circ$

المجال: الأنماط والجبر والاقترانات

المحور: الاقترانات

الاقتران العكسي

- أتعرفُ الاقترانَ العكسيَّ وشروطه.
- أجدُ قاعدةَ الاقترانِ العكسيِّ، وأحدّدُ مجاله ومداه.
- أتعرفُ الاقترانَ الجذريَّ ومجاله ومداه.

تركيبُ الاقترانات

- أتعرفُ الاقترانَ المركَّبَ وشروطه.
- أجدُ قاعدةَ اقترانِ مركَّب؛ إذا علمتُ قاعدتي مركَّبتيه.

قسمةُ كثيراتِ الحدودِ والاقتراناتِ النسبيَّة

- أجدُ ناتجَ قسمةِ اقترانٍ كثيرِ حدودٍ على آخر.
- أتعرفُ الاقترانَ النسبيَّ، وأجدُ مجاله ومداه.

اقتراناتُ كثيراتِ الحدودِ

- أتعرفُ اقتراناتِ كثيراتِ الحدودِ.
- أجدُ ناتجَ عمليَّاتِ الجمعِ والضربِ، على كثيراتِ الحدودِ.

إذا كان $g(x) = \frac{4}{3} \pi x^3$ يُمثِّل حجمَ كرةٍ طولُ نصفِ قطرها x cm. فما طولُ نصفِ قطرِ كرةٍ حجمها 971 cm^3 ؟

يزرعُ سعيدٌ عددًا من أشجارِ الزيتونِ على قطعةِ أرضٍ مساحتها (x) مترًا مربعًا، وقد قدَّرَ كمِّيَّةَ الإنتاجِ من الزيتونِ بالاقتران $f(x) = 30x$ ، كما أرادَ التنبُّؤَ بإيرادهِ من بيعِ (f) من المحصولِ وفق المعادلة:

$$g(f) = 2f - 5$$

سعيدٌ من بيعِ إنتاجِ أرضِهِ بدلالةِ x ؟

لدى حسامٍ مبلغٌ من المالِ، وأرادَ توزيعَ زكاةِ أموالِهِ المقدَّرةِ بالمقدار $(2x^4 + x^3 + 4x^2 + 1)$ على $(2x+1)$ فقيرًا ما نصيبُ كلِّ فقيرٍ من أموالِ الزكاةِ؟

قطعةُ أرضٍ مستطيلةُ الشكلِ بُعدها $(6x+5)$ ، و $(2x-1)$ وحدةً طولٍ، حيثُ $x > \frac{1}{2}$ ما طولُ السياجِ اللازمِ لإحاطةِ قطعةِ الأرضِ؟ وما مساحةُ قطعةِ الأرضِ؟

أَتَذَكَّرُ

أولاً: أجد ناتج كل مما يأتي بأبسط صورة:

$$1) x^2 + 5 + 3xy - 4x^2 + 2$$

$$= (x^2 - 4x^2) + 3xy + (5 + 2)$$

بتجميع الحدود المتشابهة ذات المتغير والأس نفسه:

$$= -3x^2 + 3xy + 7$$

$$2) -2x^3 \times 5x^2 = (-2 \times 5)(x^3 \times x^2)$$

$$= -10x^5$$

بضرب الثوابت وجمع الأسس:

$$3) (2x + 3)(x - y) = 2x(x - y) + 3(x - y)$$

$$= 2x^2 - 2xy + 3x - 3y$$

$$4) \frac{6x^5}{2x^4} = 3x^{(5-4)} = 3x^1$$

بقسمة الثوابت وطرح الأسس:

أختبر نفسي

أولاً: أجد ناتج كل مما يأتي بأبسط صورة:

$$1) 5x + 4xy + 2x - 6xy$$

$$2) 3x^2 + y^2 + x + 5y^2$$

$$3) 2x(x + 4)$$

$$4) (5y + 1)(3x - y)$$

$$5) 3x^4 \times 2x^5$$

$$6) \frac{18x^9}{2x^3}$$

ثانياً: أُمثلُ الاقترانات الآتية بيانياً:

$$1) f(x) = 2x + 1$$

$$2) g(x) = 2x^2 - 4x + 5$$

$$3) q(x) = 4 - x^2$$

ثانياً: أُمثلُ الاقتران التربيعي الآتي بيانياً:

$$h(x) = x^2 - 2x + 3$$

الاقتران $h(x)$ على الصورة $ax^2 + bx + c$

حيث: $a = 1$ ، $b = -2$ ، $c = 3$


أجد قيمة $\frac{-b}{2a}$ التي تُساوي $\frac{-(-2)}{2 \times 1}$ وتساوي 1، التي تُمثلُ

الإحداثي x لرأس المنحنى، ثم أكوّن جدولاً يحتوي على نقطة رأس المنحنى، ونقاط قبلها وبعدها كالآتي:


x	0	$\frac{-b}{2a} = 1$	2
$h(x)$	3	2	3

أعيّن الأزواج المرتبة $(0, 3)$ ، $(1, 2)$ ، $(2, 3)$ وأصل بينها

بمنحنى كالآتي:



اقترانات كثيرات الحدود



أشكال بالبطاقات

عدد البطاقات اللازمة لتكوين شكل هرمي عدد صفوفه x كما في الشكل المجاور يُعطى بالاقتران:
 $f(x) = \frac{x}{2} (3x + 1)$ ، وعدد البطاقات اللازمة لتكوين شكل درج مكون من x من الصفوف كما في الشكل المجاور يُعطى بالاقتران: $g(x) = x^2 + 2x$. فما مجموع البطاقات اللازمة لتكوين شكلين هرمي ودرجي مكون كل منهما من x صفًا. وكم يزيد عدد بطاقات الشكل الدرجي على الشكل الهرمي؟

ماذا سأتعلم؟


- اقتران وحيد الحد
- بمتغير واحد.
- كثير الحدود.
- درجة كثير الحدود.
- الصورة القياسية.
- التمثيل البياني.
- جمع كثيرات الحدود
- وطرحها وضربها.

أتذكر

العلاقة: تربط عناصر بين مجموعتين، تُسمى المجموعة الأولى المجال، وتُسمى المجموعة الثانية المدى.

الاقتران: علاقة يرتبط فيها كل عنصر في المجال بعنصر واحد فقط في المدى.

أشكال الاقتران:



مثل { (3,5), (1,2), (4,2) }


المجال = {3, 1, 4} ، المدى = {5, 2}

(3) قاعدة تُعبّر عنه، مثل: $f(x) = 2x + 1$

المجال: قيم (x) ومجال الاقتران (f) هو مجموعة الأعداد الحقيقية.

المدى: قيم $f(x)$ بعد التعويض، ومدى الاقتران (f) هو مجموعة الأعداد الحقيقية.

الاقتران وحيد الحد بمتغير واحد، هو اقتران قاعدته ناتج ضرب ثابت بمتغير مرفوع لأس صحيح غير سالب، مثل: 20 ، $\frac{1}{3}x^2$ ، $2x$



الاقتران كثير الحدود، هو اقتران قاعدته وحيد الحد أو مجموع وحيدات حدود بمتغير واحد، مثل:

اقتران وحيد الحد: $f(x) = 5$

مجموع وحيدات حدود: $g(x) = 2x^7 + x^2 - 3$

مجال اقتران كثير الحدود هو مجموعة الأعداد الحقيقية.

الصورة القياسية لاقتران كثير الحدود، هي:

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

حيث n عدد صحيح غير سالب، x متغير،

$a_n, a_{n-1}, a_{n-2}, \dots, a_1, a_0$ أعداد حقيقية تُسمى معاملات الحدود، حيث $a_n \neq 0$.

يُسمى a_n المعامل الرئيس، a_0 الحد الثابت، n درجة كثير الحدود وهو أكبر أس لـ x .
ألاحظ في اقتران كثير الحدود الآتي، أن الأس مرتبة من الأكبر إلى الأصغر، ولم تُكتب الحدود التي معاملاتها أصفار.

$$f(x) = \frac{1}{2} x^5 + 9x^2 - x - 3$$

المعامل الرئيس هو $\frac{1}{2}$ لأن $a_5 = \frac{1}{2}$

$n=5$ إذن: الاقتران من الدرجة الخامسة، وهو أكبر أس لـ x .

الحد الثابت -3 أي إن $a_0 = -3$

كثير الحدود الصفري هو $f(x) = 0$ ، وهو كثير حدود معاملاته جميعها أصفار وليس له درجة.

مثال (1)

أي الاقترانات الآتية اقتران كثير حدود؟ وأيها ليس اقتران كثير حدود؟ أكتب الصورة القياسية والدرجة والمعامل الرئيس والحد الثابت للاقتران كثير الحدود منها.

$$1) f(x) = 5x - \sqrt{3}x^2 + 2 \quad 2) g(x) = 4x^3 - x \quad 3) h(x) = 4x^{-2} + 1$$

الحل

كثير حدود مكوّن من مجموع وحيدات حدود.

أرتّب الحدود من الأس الأكبر إلى الأصغر؛ لأكتب كثير الحدود بالصورة القياسية.

$$f(x) = -\sqrt{3}x^2 + 5x + 2$$

وهو من الدرجة الثانية؛ لأن $n = 2$ وأن المعامل الرئيس يساوي $-\sqrt{3}$ لأن $a_2 = -\sqrt{3}$ وأن الحد الثابت

$$a_0 = 2$$

$$2) g(x) = 4x^3 - x$$

كثير حدود مكوّن من مجموع وحيدات حدود، ومكتوب بالصورة القياسية $g(x) = 4x^3 - x$

وهو من الدرجة الثالثة؛ لأن $n = 3$ وأن المعامل الرئيس يساوي 4؛ لأن $a_3 = 4$ وأن الحد الثابت هو $a_0 = 0$

$$3) h(x) = 4x^{-2} + 1$$

الاقتران ليس اقتران كثير حدود؛ لأن المتغير في الحد $4x^{-2}$ مرفوع للأس -2 وهو عدد صحيح سالب.

أحاول

أي الاقتارات الآتية اقتران كثير حدود؟ وأيها ليس اقتران كثير حدود؟ أكتب الصورة القياسية والدرجة والمعامل الرئيس والحد الثابت للاقتار كثير الحدود منها.

1) $f(x) = 5 - \frac{3}{2}x^4$

2) $g(x) = 7$

3) $h(x) = 3\sqrt{x^3} + 2x + 1$

أتعلم

مجال كثير الحدود ومداه، هما مجموعة الأعداد الحقيقية أو مجموعة جزئية منها.


مثال (2)

أمثل بياناً الاقتران $f(x) = x^3 + 2.5x^2$, $-3 \leq x \leq 1$ وأحدد مجاله ومداه.

الحل

مجال الاقتران هو قيم x التي يُسمح بتعويضها في الاقتران $f(x)$ ، وتساوي $[-3, 1]$.
والمدى هو نتائج التعويض في الاقتران $f(x)$ وهي $[f(-3), f(1)] = [-4.5, 3.5]$
أكون جدول القيم الآتي:

x	-3	-2	-1	0	0.5	1
$f(x)$	-4.5	2	1.5	0	0.75	3.5
(x, y)	$(-3, -4.5)$	$(-2, 2)$	$(-1, 1.5)$	$(0, 0)$	$(0.5, 0.75)$	$(1, 3.5)$



أعين الأزواج المرتبة على المستوى الإحداثي، وأصل بينها بخط منحن كما في الشكل المجاور.

أحاول

أمثل الاقتران

$g(x) = x^3$, $-2 \leq x \leq 2$ بياناً.

جمع اقترانات كثيرات الحدود وطرحها

لجمع اقترانين كثيري الحدود؛ أجمع الحدود المتشابهة (وهي التي تمتلك المتغيرات والأسس ذاتها، ولا يشترط تساوي المعاملات)، ثم أجمع معاملاتهما، وأرمز لعملية الجمع بـ $f(x) + g(x)$ ، وأرمز لعملية طرح الاقتران $g(x)$ من $f(x)$ بـ $f(x) - g(x)$ وتساوي $f(x) + (-g(x))$.

مثال (3)

إذا كان $f(x) = 5x^4 + 3x^2 - x$ ، $g(x) = -5x^3 - x^2 - 2x + 1$ ؛ فأجد ناتج $f(x) + g(x)$ و $f(x) - g(x)$

$$\begin{aligned}
 1) f(x) + g(x) &= (5x^4 + 3x^2 - x) + (-5x^3 - x^2 - 2x + 1) \\
 &= 5x^4 + -5x^3 + (3x^2 + -x^2) + (-x + -2x) + 1 \\
 &= 5x^4 + -5x^3 + (3 + -1)x^2 + (-1 + -2)x + 1 \\
 &= 5x^4 + -5x^3 + 2x^2 + -3x + 1
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2) f(x) - g(x) &= (5x^4 + 3x^2 - x) - (-5x^3 - x^2 - 2x + 1) \\
 &= (5x^4 + 3x^2 - x) + (5x^3 + x^2 + 2x - 1) \\
 &= 5x^4 + 5x^3 + (3x^2 + x^2) + (-x + 2x) + (-1) \\
 &= 5x^4 + 5x^3 + (3 + 1)x^2 + (-1 + 2)x + (-1) \\
 &= 5x^4 + 5x^3 + 4x^2 + 1x - 1
 \end{aligned}$$

أحاول

إذا كان $h(x) = 2x^3 - x^2 + x + 4$ ، $g(x) = 8x^3 + 3x^2 + 2$ ، فأجد ناتج: $h(x) + g(x)$ و $g(x) - h(x)$

ضرب كثيرات الحدود

أتذكر

خاصية توزيع الضرب على الجمع:

$$a \times (b+c) = a \times b + a \times c$$

$$(a+b) \times (c+d) =$$

$$(a \times c) + (a \times d) + (b \times c) + (b \times d)$$

أرمز لعملية ضرب اقتران كثير حدود $f(x)$ في اقتران كثير حدود آخر $g(x)$ بالرمز $f(x) \cdot g(x)$ عند ضرب كثيرات حدود؛ أستعمل خاصية توزيع الضرب على الجمع.

مثال (4)

$$\begin{aligned}
 1) f(x) \cdot g(x) &= (2x + 3) \cdot (x^3 + x - 2) \\
 &= 2x \cdot x^3 + 2x \cdot x + 2x \cdot (-2) + 3 \cdot x^3 + 3 \cdot x + 3 \cdot (-2) \\
 &= 2x^4 + 2x^2 + -4x + 3x^3 + 3x - 6 \\
 &= 2x^4 + 3x^3 + 2x^2 + (-1)x + (-6)
 \end{aligned}$$

بضرب معاملات الحدود، وتطبيق قاعدة ضرب المقادير الأسية.

جمع الحدود المتشابهة، وكتابة الناتج بالصورة القياسية.

أتذكر

قاعدة ضرب المقادير الأسية:

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m}$$

إذا كان $f(x) = 2x^4 + x + 1$ ، $g(x) = 5x^2 + x$ ، فأجد ناتج: $f(x) \cdot g(x)$

أحاول

(1) إذا كان $f(x) = x^5 - 5x$ ، $g(x) = x^2 + 3x$ ؛ فأجدُ كلاً ممَّا يأتي:

(1) درجة $f(x)$ والمعامل الرئيس والحد الثابت له.

(2) الصورة القياسية للاقتران $f(x)$.

(3) $f(x) + g(x)$

(4) $g(x) - f(x)$

(5) $f(x) \cdot g(x)$

(2) ليكن $f(x) = -4x^5 + 2x$ ، $g(x) = 2x - 6x^2 + 2$. أملأ المربعات الفارغة في الشكل بالحد

الجبري المناسب؛ بحيثُ تُحقَّق الآتي:

	1	2	3	4
1				
2				
3				
4				
5				
6				

المربعات الأفقية:

(1) $4x^2$ (2) ناتج $f(x) + g(x)$

(3) النظريرُ الجمعي للحد x^2 a_2 للاقتران $g(x)$ ، $-8x^6$

(4) معكوس الحد الثابت لـ $g(x)$ ، درجة $g(x)$ مضروباً بـ $12x^7$

المربعات العمودية

(1) ناتج $f(x) - g(x)$ (2) المعامل الرئيس لـ $g(x)$ مضروباً بـ x^2

(3) ناتج $f(x) \cdot g(x)$ (4) الحد الثابت لـ $g(x)$

هذه روابط لتمرين جمع كثيرات حدودٍ وطرحها وضربها:

<https://www.ixl.com/math/algebra-1/add-and-subtract-polynomials-using-algebra-tiles>

قسمة كثيرات الحدود والاقترانات النسبية



مصنع الألبان

يُنتج مصنع ألبان يوميًا، ما مقداره:
 $(2x^3 + 9x^2 + 10x + 3)$ لترًا من الحليب، يُرادُ
 تعبئتها في عبوات سعة كل منها $(2x+1)$ لترًا،
 فكم عبوة يُنتج المصنع يوميًا؟

ماذا سأتعلّم؟

- قسمة كثيرات الحدود.
- الاقتران النسبي ومجاله ومداه.

أتذكّر

قاعدة قسمة المقادير الأسية:

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, a \neq 0$$

ألاحظ أنّ إيجاد عدد العبوات المنتجة في مسألة مصنع الألبان، يحتاج إلى إجراء عملية قسمة كثير حدود على كثير حدود آخر.

يمكنني إجراء قسمة اقتران كثير حدود $f(x)$ على كثير حدود آخر $g(x)$ حيث $g(x) \neq 0$ ، إذا كانت درجة $f(x)$ أكبر من أو تساوي درجة $g(x)$.
 أسمي $f(x)$ المقسوم و $g(x)$ المقسوم عليه.


عند قسمة $f(x)$ على $g(x)$ ، أكتب الاقتران $f(x)$ بالصورة القياسية مُضمّنًا الحدود جميعها من الحدّ ذي الأس الأكبر إلى الثابت، وأكتب أصفارًا مكان معاملات الحدود غير الموجودة.
 فمثلاً $f(x) = 3x^4 + x + 5$ تصبح:

$$f(x) = 3x^4 + 0x^3 + 0x^2 + x + 5$$

أستعمل خوارزمية القسمة:

ناتج القسمة

المقسوم ← $g(x) \overline{) f(x)}$ ← المقسوم عليه



مثال (1)

أجد ناتج قسمة $f(x) = 2x^2 + 5x^4 + 7$ على $g(x) = x + 2$

الحل

أكتب $f(x)$ بالصورة القياسية مُضمّنًا الحدود التي معاملاتها أصفارًا كما يأتي:

$$f(x) = 5x^4 + 0x^3 + 2x^2 + 0x + 7$$

أقسم $5x^4$ على x ، وأكتب الناتج فوق $5x^4$

أضرب ناتج القسمة $5x^3$ في المقسوم عليه $x + 2$

أطرح ناتج الضرب من المقسوم، ثم أقسم $-10x^3$ على x

أضرب $-10x^2$ في $x + 2$

أطرح ثم أقسم $22x^2$ على x ، ثم أضرب $22x$ في $x + 2$

أطرح ثم أقسم $-44x$ على x ، ثم أضرب $-44x$ في $x + 2$

$$\begin{array}{r}
 5x^3 - 10x^2 + 22x - 44 \\
 x + 2 \overline{) 5x^4 + 0x^3 + 2x^2 + 0x + 7} \\
 \underline{(-) 5x^4 + 10x^3} \\
 0 + -10x^3 + 2x^2 + 0x + 7 \\
 \underline{(-) -10x^3 - 20x^2} \\
 + 22x^2 + 0x + 7 \\
 \underline{(-) 22x^2 + 44x} \\
 -44x + 7 \\
 \underline{(-) -44x - 88} \\
 95
 \end{array}$$

95

درجة ناتج الطرح أقل من درجة المقسوم عليه، إذن: أتوقف عن القسمة

ناتج القسمة هو $h(x) = (5x^3 - 10x^2 + 22x - 44)$

وباقى القسمة $r(x) = (95)$

أذكر

إذا كان باقي قسمة المقسوم على المقسوم عليه صفرًا؛ فإن المقسوم يقبل القسمة على المقسوم عليه، ونقول إن المقسوم عليه عامل من عوامل المقسوم.

للتحقق من صحة القسمة؛ أضرب ناتج القسمة في المقسوم عليه، وأضيف للناتج باقي القسمة كالاتي:

$$h(x) \times g(x) + r(x)$$

$$(5x^3 - 10x^2 + 22x - 44) \times (x + 2) + (95) = \dots\dots\dots$$

ألاحظ أن:

إذا كان $f(x) = h(x) \times g(x) + r(x)$ ؛ فإن ناتج القسمة صحيح.

أحاول

أجد ناتج قسمة $f(x) = 3x^2 + x^3 + 4$ على $g(x) = x + 1$ وأتحقق من صحة الحل.

الاقتران النسبي هو اقتران مكتوب على الصورة $\frac{h(x)}{g(x)}$ حيث $h(x)$ و $g(x)$ كثيرات حدود و $g(x) \neq 0$.

مجال الاقتران النسبي هو مجموعة الأعداد الحقيقية عدا أصفار $g(x)$

أذكر

أصفار الاقتران $g(x)$ هي قيم x التي تجعل $g(x) = 0$

مثال (2)

أجد مجال الاقتران النسبية الآتية:

$$1) \frac{2x^3 + x + 1}{x^2 + 3x + 2}$$

$$2) \frac{(x+3)(x+2)}{(x+3)}$$

الحل

$$1) \frac{2x^3 + x + 1}{x^2 + 3x + 2}$$

أجد أصفار المقام $x^2 + 3x + 2$ ؛ وذلك بحل المعادلة $x^2 + 3x + 2 = 0$

بالتحليل $(x+2)(x+1) = 0$ إذن: أصفار المقام $x = -1, x = -2$

مجال الاقتران هو مجموعة الأعداد الحقيقية ما عدا $-1, -2$ ، وأكتبه بصورة المجموعة $\{x | x \neq -1, x \neq -2\}$

$$2) \frac{(x+3)(x+2)}{(x+3)}$$

أجد أصفار المقام $(x+3)$ وذلك بحل المعادلة $x+3 = 0$ إذن: $x = -3$

مجال الاقتران هو مجموعة الأعداد الحقيقية ما عدا -3 ، وأكتبه بصورة المجموعة $\{x | x \neq -3\}$

أحاول

$$\frac{x^2 + 4}{x^2 + 2x}$$

أختبرُ تعلُّمي

1) أُمَيِّزُ بَيْنَ العباراتِ الصحيحةِ وغيرِ الصحيحةِ في ما يأتي، وأبرِّرُ إجابتي:

(1) $(x+3)$ هو عاملٌ من عوامل $(2x^2 + x - 15)$.

(2) $(x^3 + 7x^2 + 14x + 9)$ يقبلُ القسمةَ على $(x+4)$.

(3) مجالُ الاقتران $\frac{x^2 - 4}{x + 2}$ هو مجموعة الأعداد الحقيقية.

2) أقتَرُحُ اقتراً نسبياً مجاله مجموعة الأعداد الحقيقية ما عدا $x = -7$

3) لدى هدى $(x^4 + 2x + 1)$ لترّاً من العصير، تريدُ توزيعها في اجتماعٍ على كؤوسٍ تتسعُ كلُّ واحدةٍ

مِنها لـ $(x^2 + 1)$ لترّاً. فهلُ تستطيعُ تعبئتها في كؤوسٍ كاملةٍ من دونِ نقصٍ أو زيادةٍ؟

للاستزادة <https://www.ixl.com/math/algebra-2/divide-polynomials-using-long-division>

تركيب الاقترانات



أحتاج إلى طلاء حائطٍ مربع الشكل مساحته تُعطى بالعلاقة $A(x) = x^2$ حيث x طول ضلع الحائط بالأمتار. وكانت التكلفة اللازمة لطلاء الحائط بالدينار الأردني هي $f(A) = 1.5A$ حيث A مساحة الحائط بالأمتار المربعة. كيف أحسب تكلفة طلاء جدارٍ طول ضلعه 4m ؟

ماذا سأتعلم؟


- الاقتران المركب.
- تركيب اقترانين.
- شروط تركيب اقترانين.

لحل المسألة السابقة؛ سأعوض $x = 4$ في اقتران $A(x)$ لإيجاد المساحة أولاً، ثم سأعوض الناتج في

الاقتران $f(A)$ لإيجاد التكلفة؛ فتكون تكلفة الطلاء الكلية JD24

ماذا لو أردت حساب تكلفة طلاء حائطٍ طول ضلعه x m؟ ألاحظ أنني أطبق الاقتران $A(x)$ ثم أعوض المقدار الناتج في الاقتران $f(A)$

أسمي هذه العملية **تركيب الاقترانات** وأرمز لها بالرمز: $(f \circ A)(x) = f(A(x))$ وأقرأها f بعد A لـ x أي: تطبيق الاقتران A بداية ثم تطبيق الاقتران f على الناتج. والشكل التالي يوضح ذلك.



مثال (1)

إذا كان $f(x) = x + 1$ ، $g(x) = x^2$ ، فأجد الآتي:

- (1) مجال $f(x)$ ومدى $g(x)$
- (2) $(f \circ g)(x)$
- (3) $(g \circ f)(x)$
- (4) $(f \circ g)(1)$

الحل

(1) مجال $f(x)$ هو مجموعة الأعداد الحقيقية، ومدى $g(x)$ هو مجموعة الأعداد الحقيقية الموجبة والصفر. ألاحظ أن مدى $g(x)$ هو مجموعة جزئية من مجال $f(x)$

بتطبيق قاعدة تركيب الاقترانات وتعويض الاقتران $g(x)$:

$$(2) (f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x^2)$$

بتطبيق قاعدة $f(x)$:

$$f(x^2) = x^2 + 1 = x^2 + 1$$

بتطبيق قاعدة تركيب الاقترانات وتعويض الاقتران $f(x)$:

$$(3) (g \circ f)(x) = g(f(x)) =$$

بتطبيق قاعدة $g(x)$:

$$= g(x + 1) = (x + 1)^2$$

ألاحظُ أنَّ $(g \circ f)(x) \neq (f \circ g)(x)$.

تعويض قيمة $g(1) = (1)^2 = 1$ ثمَّ تعويض الإجابة

$$4) (f \circ g)(1) = f(g(1))$$

في الاقتران $f(x)$:

$$= f(1) = 1 + 1 = 2$$

استنتج: يُمكنني إيجاد $(f \circ g)(x)$ ، إذا كان مدى $g(x)$ مجموعة جزئية من مجال $f(x)$
مجال $(f \circ g)(x)$ هو مجموعة جزئية من مجال $g(x)$ ، ومدى $(f \circ g)(x)$ هو مجموعة جزئية من مدى $f(x)$.

أحاولُ

إذا كان $g(x) = x + 1$ ، $f(x) = x^2 + 1$ ؛ فأجدُ: $(f \circ g)(2)$ ، $(f \circ g)(x)$

أختبرُ تعلُّمي

(1) إذا كان $f(x) = x + 1$ ، $g(x) = \sqrt{x}$ ؛ فأجدُ $(f \circ g)(x)$ ، ثمَّ أجدُ مجاله ومداه.

(2) أقتَرُحُ اقترانين $f(x)$ و $g(x)$ بحيثُ يكونُ ناتجُ تركيب $(f \circ g)(x)$ يُساوي $\frac{2}{x^2 + 1}$

(3) هل $(f \circ h)(x) = (h \circ f)(x)$ ؟ أبرِّرُ إجابتي.

(4) حوضُ ماءٍ على شكلِ نصفِ كرةٍ، يتسرَّبُ منه الماءُ بحيثُ يتحدَّدُ طولُ نصفِ قطرِ سطحِ

الماءِ فيه وفقَ الاقترانِ $r(t) = \frac{18}{2t + 3}$ ، حيثُ t : الزمنُ بالثواني، و r : طولُ نصفِ

القطرِ بالأمتار. أجدُ مساحةَ سطحِ الماءِ بعدَ مرورِ 12s

أتذكَّرُ

مساحةُ الدائرة $A(r)$

$$A(r) = \pi r^2$$

حيثُ r : طولُ نصفِ قطرِ الدائرة.

الاقتران العكسي



المكعبات

تُستعمل العلاقة $V(x) = x^3$ لإيجاد حجم قطع مكعبة الشكل عُلِمَ طول ضلعها x cm. كيف أستطيع إيجاد طول ضلع مكعب حجمه 8cm^3 أو مكعب حجمه 64cm^3 ؟ هل يمكنني استنتاج قاعدة عامة لذلك؟

ماذا سأتعلم؟


- الاقتران العكسي.
- الاقتران واحد لواحد.
- الاقتران الجذري.
- مجال الاقتران
- الجذري ومداة.

يُستعمل الاقتران $f(x) = y = 100x$ ، للتحويل من وحدة المتر (m) إلى وحدة السنتيمتر (cm)، حيث x عدد الوحدات بالمتر، و y عدد الوحدات بالسنتيمتر بعد التحويل. والاقتران $f(x)$ خطي مجاله، ومداة ويمكنني إيجاد اقتران للتحويل من وحدة السنتيمتر إلى المتر، ويُسمى مثل هذا الاقتران **الاقتران العكسي**. ويرمزُ للاقتران العكسي لـ $f(x)$ بالرمز $f^{-1}(x)$

وأجدُ الاقتران العكسي $f^{-1}(x)$ يجعل مدى $f(x)$ مجالاً لـ $f^{-1}(x)$ ،

وجعل مجال $f(x)$ مدى لـ $f^{-1}(x)$ ، أي بعكس المجموعتين.

ويكون للاقتران $f(x)$ اقتران عكسي إذا كان كل عنصر في مداة هو صورة لعنصر واحد فقط في مجاله، ومثل هذا الاقتران يُسمى **اقتران واحد لواحد**. (أي لا تتكرر الصورة نفسها لعنصرين مختلفين).



مثال (1)

أجدُ المجال والمدى والاقتران العكسي لكل اقتران مما يأتي، ثم أجدُ مجال الاقتران العكسي الناتج ومداة:

(1) $\{(2,3), (4,5), (6,7)\}$ (2) $f(x) = 2x + 1$

الحل

(1) المجال = $\{2, 4, 6\}$ ، والمدى = $\{3, 5, 7\}$. وبعكس الأزواج المرتبة يكون الاقتران العكسي هو: $\{(3,2), (5,4), (7,6)\}$. ومجال الاقتران العكسي = $\{3, 5, 7\}$ ، والمدى = $\{2, 4, 6\}$.

$$f(x) = 2x + 1 \quad (2)$$

مجال الاقتران f هو مجموعة الأعداد الحقيقية، ومداه أيضاً مجموعة الأعداد الحقيقية.

$$y = 2x + 1$$

لإيجاد الاقتران العكسيّ أسمى $f(x)$ بـ y ثم أكتب x بدلالة y :

$$y - 1 = 2x$$

ب طرح العدد 1 من طرفي المعادلة:

$$\frac{y - 1}{2} = \frac{2x}{2}$$

بقسمة طرفي المعادلة على العدد 2:

$$x = \frac{y - 1}{2}$$

$$f^{-1}(x) = \frac{x - 1}{2}$$

بإعادة تسمية x بـ $f^{-1}(x)$ والمتغير y بـ x

ويكون مجال $f^{-1}(x)$ مجموعة الأعداد الحقيقية، كذلك مدى $f^{-1}(x)$ هو مجموعة الأعداد الحقيقية.

أحاول

أجد الاقتران العكسيّ لكل من:

$$1) f(x) = \frac{x + 1}{3}$$

$$2) g(x) = x^3$$

الاقتران الجذريّ

صورته $f(x) = \sqrt[n]{g(x)}$ حيث n عدد صحيح.

إذا كان n زوجيّاً؛

فمجال $f(x) =$ مجموعة قيم x التي تجعل $g(x) \geq 0$
 $\{x \mid g(x) \geq 0\} =$

مثال:

$$n = 2, f(x) = \sqrt{x - 1}$$

مجال $f(x) =$ مجموعة قيم x التي تجعل $x - 1 \geq 0$
 ويساوي $\{x \mid x \geq 1\}$

إذا كان n فرديّاً

فمجال $f(x) =$ مجال $g(x)$

مثال:

$$f(x) = \sqrt[3]{\frac{1}{x}} \text{ مجال } \{x \mid x \neq 0\}$$

مجال $f(x) = \sqrt[5]{x^2 + x - 6}$ هو مجموعة الأعداد الحقيقية.

مثال (2)

أجد المجال والمدى للاقتراح الجذري $f(x) = \sqrt{x+1}$ ثم أجد الاقتران العكسي $f^{-1}(x)$ له.

أتذكر

$$\{x \mid x \geq a\} = [a, \infty)$$

$$\{x \mid x > a\} = (a, \infty)$$

$$\{x \mid x \leq a\} = (-\infty, a]$$

$$\{x \mid x < a\} = (-\infty, a)$$

الحل

- (1) المجال هو مجموعة قيم x التي تجعل $x+1 \geq 0$
لحل المتباينة السابقة أضيف العدد -1 لطرفي المتباينة؛ فأحصل على
 $x \geq -1$. إذن: المجال هو $\{x \mid x \geq -1\} = [-1, \infty)$
- (2) المدى هو نواتج تعويض المجال في الاقتران، ويساوي $[0, \infty)$.
- (3) لإيجاد الاقتران العكسي للاقتران $f(x)$:

$$y = \sqrt{x+1}$$

$$y^2 = (\sqrt{x+1})^2$$

$$y^2 = x+1$$

$$y^2 - 1 = x$$

$$f^{-1}(x) = x^2 - 1$$

بتربيع الطرفين:

بإضافة العدد -1 لطرفي المعادلة

بتسمية x بـ $f^{-1}(x)$ والمتغير y بـ x

أحاول

أجد المجال والمدى للاقتراح، ثم أجد الاقتران العكسي له $f(x) = \sqrt[3]{2x+1}$

أختبرُ تعلُّمي

(1) أجد الاقتران العكسي (إن وجد) لكل مما يأتي:

(1) $f(x) = x+2$

(2) $g(x) = x^2$, $x \geq 0$

(3) $h(x) = x^3 - 11$

(2) أجد المجال والمدى للاقتراح $g(x) = \sqrt{\frac{x+1}{3}}$ ، ثم أجد الاقتران العكسي له

(3) أقترح اقتراناً $f(x)$ بحيث يكون $f(x) = f^{-1}(x)$ ، وأبرر إجابتي.

التقويم الختامي

(١) أكمل المخطط الآتي:

الاقتراانات التي درستها

الاقتران الجذري
وصورته العامة

.....

الاقتران النسبي
وصورته العامة

.....

كثيرات الحدود
وصورتها القياسية هي:

.....

مجال الاقتران الجذري

.....

مجال الاقتران النسبي

.....

العمليات على كثيرات الحدود:

الجمع والطرح و.....
و.....

(2) ألع مع الاقتراانات:

ليكن $f(x) = x^3 + 2x + 1$, $h(x) = 2 - x$, $g(x) = x^2 + 1$. أملأ المربعات المتقاطعة المجاورة بحيث تُحقّق الآتي:

المربعات الأفقية:

1) $x^3 - f(x)$

2) $-3 \cdot h^{-1}(x)$

3) $x \cdot g(x)$

المربعات العمودية:

1) $(hoh^{-1})(x)$

2) $f(x) - h(x)$

3) $2h(x) - 10$

	1	2	3
1			
2			
3			


المجال: معالجة البيانات والاحتمال

المحور: تحليل البيانات

مقاييس التشتت لجدول تكراري ذي فئات

- أجد مقاييس التشتت:
(المدى، والانحراف المعياري، والتباين) لبيانات منظمة في جدول تكراري ذي فئات.

أمامي تمثيلان بيانيان لرواتب موظفين في مؤسستين مختلفتين.



أي المؤسستين رواتب موظفيها الأكثر تشتتاً؟

الوسط الحسابي

أجد الوسط الحسابي للبيانات المنظمة في الجدول التكراري، في كل مما يأتي:

(1)

الفئات	2 - 4	5 - 7	8 - 10
التكرار	3	6	9

(2)

الفئات	5 - 9	10 - 14	15 - 19
التكرار	3	8	9

أتذكر

الوسط الحسابي لبيانات مبوبة في جدول تكراري ذي فئات هو

مجموع حواصل ضرب مراكز الفئات في تكرارها

مجموع التكرار

$$\bar{x} = \frac{\sum x f}{\sum f}$$

حيث: $\bar{x}$ الوسط الحسابي، x مراكز الفئات، f التكرار.

مثال: أجد الوسط الحسابي للبيانات المنظمة في الجدول الآتي:

الفئات	1 - 5	6 - 10	11 - 15	المجموع
التكرار	4	11	5	20

الحل

أولاً: أجد مركز الفئة لكل فئة في الجدول، حيث:

$$x = \frac{\text{الحد الأدنى} + \text{الحد الأعلى}}{2}$$

$$\frac{1 + 5}{2} = 3 \text{ فمركز الفئة (1 - 5) هو: } 3$$

ثانياً: أنظم جدولاً يتضمن الفئات والتكرار ومراكز الفئات، وحاصل ضرب مراكز الفئات في تكرارها كالاتي:

الفئات	التكرار f	x	$x f$
1 - 5	4	3	12
6 - 10	11	8	88
11 - 15	5	13	65
	20		165

ثالثاً: أطبق قانون الوسط الحسابي:

$$\bar{x} = \frac{\sum x f}{\sum f} = \frac{165}{20} = 8.25$$

مقاييس التشتت لجدول تكراري ذي فئات

ملاحظة بحرّية

فئات العلامات	تكرار الشعبة أ	تكرار الشعبة ب
$60 < x \leq 70$	2	31
$70 < x \leq 80$	5	7
$80 < x \leq 90$	3	6
$90 < x \leq 100$	10	8
المجموع	20	22

يرغب باحث في عمل دراسة على طلبة الصف العاشر في مدرسة ما، فاطّلع على علامات شعبي (أ) و(ب) لمبحث الرياضيات كما في الجدول المجاور. أي الصّفين يُفضّل الباحث عمل دراسته عليه؟ لماذا؟

ماذا سأتعلّم؟

- المدى.
- الانحراف المعياري.
- التباين.

أصّف تجمّع أو تشتت البيانات باستعمال مقاييس التشتت، وهي: المدى، والتباين، والانحراف المعياري. وكلّما زادت قيمة أيّ من هذه المقاييس زاد التشتت والتباعد بين البيانات. توجد حالتان للبيانات؛ أن تكون مفردات، أو أن تكون منظّمة في جداول تكرارية.

مقاييس التشتت للمفردات

- المدى R هو الفرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة للبيانات.
- التباين يُساوي الوسط الحسابي لمربعات انحرافات القيم عن وسطها الحسابي، وتُعطى بالقانون:

$$\sigma^2 = \frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n}$$

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n} \quad \text{حيث } x \text{ قيم البيانات، و } n \text{ عددها}$$

- الانحراف المعياري σ

مثال (1)

البيانات الآتية تُمثّل درجات الحرارة في 5 أيّام في شهر شبّاط: 20, 18, 15, 9, 8. أجد المدى والتباين والانحراف المعياري.

الحلّ

$$R = 20 - 8 = 12$$

- المدى: أكبر قيمة؛ مطروحاً منها أصغر قيمة:

- التباين:

(أ) أحسب الوسط الحسابي باستعمال القانون.

$$\bar{x} = \frac{20 + 18 + \dots + \dots + 8}{5} = \frac{\quad}{5} = \quad$$

(ب) أكمل الجدول الآتي:

$$\sigma^2 = \frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n} = \frac{114}{5} = 5.7$$

التباين

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n}} = \sqrt{5.7}$$

الانحراف المعياري

x	$(x - \bar{x})$	$(x - \bar{x})^2$
20	$20 - 14 = 6$	36
15	1	
9	-5	25
8		
18		
المجموع	0	114

مقاييس التشتت للجدول التكراري

(1) المدى هو الفرق بين الحد الفعلي الأعلى لآخر فئة، والحد الفعلي الأدنى لأول فئة.

(2) التباين يُعطى بالقانون:

$$\sigma^2 = \frac{\sum (x - \bar{x})^2 f}{\sum f}$$

إذ إن: x مركز الفئة و $\bar{x}$ الوسط الحسابي و f تكرار الفئة.

(3) الانحراف المعياري = التباين $\sigma = \sqrt{\text{التباين}}$

مثال (2)

يُمثل الجدول التكراري الآتي الأجر اليومي لمجموعة من العمال. أجد التباين والانحراف المعياري لأجورهم.

الحل

(1) لإيجاد التباين؛ أكمل الجدول الآتي:

التكرار	الفئات
6	$5 < x \leq 10$
9	$10 < x \leq 15$
5	$15 < x \leq 20$

الفئات	f	x	xf	$x - \bar{x}$	$(x - \bar{x})^2$	$(x - \bar{x})^2 f$
$5 < x \leq 10$	6	7.5	45	-4.75	22.56	135.36
$10 < x \leq 15$	9	12.5	112.5	0.25	0.06	0.56
$15 < x \leq 20$	5					
المجموع	20		245			273.5

$$\bar{x} = \frac{245}{20} = 12.25$$

$$\sigma^2 = \frac{\sum (x - \bar{x})^2 f}{\sum f} = \frac{273.5}{20} \approx 13.685$$

$$\sigma = \sqrt{\text{التباين}} = \sqrt{13.685} = 3.7$$

الانحراف المعياري:

أحاول

الجدول الآتي يبيّن زمن التأخير عن الدوام بالدقائق لموظفي مؤسسة ما. أكمل الجدول لأجد الوسط الحسابي والتباين ، والانحراف المعياري σ .

الفئات	التكرار f	مركز الفئة x	xf	$x - \bar{x}$	$(x - \bar{x})^2$	$(x - \bar{x})^2 f$
$5 < x \leq 9$	2					
$9 < x \leq 13$	7					
$13 < x \leq 17$	5					
المجموع						

$$\bar{x} =$$

$$\sigma^2 =$$

$$\sigma =$$

أختبرُ تعلّمي

1) جُمعت بيانات دراسة ما في جدول تكراري، فكان $\sum xf = 150$ ، $\sum x = 18$ ، $\sum (x - \bar{x})^2 f = 450$ ، حيث x مركز كل فئة و f التكرار و $\bar{x}$ الوسط الحسابي. أكمل الفقرات 1، 2، 3 في العمود الأول بما يناسبها من العمود الثاني:

3.9

أ) إذا كان التباين يساوي 15؛ فإن حجم عينة الدراسة (مجموع التكرارات):

30

ب) الوسط الحسابي للبيانات يساوي:

5

ج) الانحراف المعياري يساوي:

2) أكمل الجدول الآتي؛ لإيجاد الوسط الحسابي والتباين والانحراف المعياري:

الفئات	التكرار f	مركز الفئة x	xf	$x - \bar{x}$	$(x - \bar{x})^2$	$(x - \bar{x})^2 f$
$1 < x \leq 4$	2					
$4 < x \leq 7$	7					
$7 < x \leq 10$	5					
المجموع						

$$\bar{x} =$$

$$\sigma^2 =$$

$$\sigma =$$

نَمَّ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى